千金翼方

景元大德本千金翼方三十卷

景元大德本千金翼方三十卷

光緒戊寅上海印行
獨山莫繩孫補署檢

1878

光緒戊寅上海印行
獨山莫繩孫精署檢

校正千金翼方表

臣聞醫方之學其來遠矣上古神農播穀嘗藥以養其生黃帝歧伯君臣問對垂於不刊爲萬世法中古有長桑扁鵲漢有陽慶倉公張機華佗晉宋如王叔和葛稚川皇甫謐范汪胡洽深師陶景之流凡數十家皆師祖農黃著爲經方迨及唐世孫思邈出誠一代之良醫也其行事見諸史傳撰千金方三十卷辨論精博囊括衆家高出於前輩猶慮或有所遺又撰千金翼方以輔之一家之書可謂大備矣其書之傳於今訛舛尤甚雖洪儒碩學不能辨之

仁宗皇帝詔儒臣校正醫書臣等今校定千金
翼方謂乎物之繁必先得其要故首之以藥録
纂要凡治病者宜别藥之性味故次之以本草
人之生育由母無疾故次之以婦人疾病之急
無急於傷寒故次之以傷寒然後養其少小故
次之以小兒人身既立必知所以自養故次之
以養性養性者莫善於養氣故次之以辟穀氣
之盈乃可安閒故次之以退居退居者當事補
養故次之以補益若補養失宜則風疾乃作故
次之以中風風者百病之長邪氣緣而畢至故
次之以雜病又次之以萬病愈諸疾者必資乎大
藥故次之以飛鍊乳石性堅久服生熱故次之
以瘡癰衆多之疾源乎脉證故次之以色脉色
脉既明乃通腧穴故次之以針灸而禁經終焉
總三十卷目録一卷臣以爲晉有人欲刊正周
易及諸藥方與祖訥論祖云辨釋經典縱有異
同不足以傷風教至於湯藥小小不達則後人
受弊不少是醫方不可以輕議也臣等不敢肆
臆見妄加塗竄取自神農以來書行於世者而
質之有所未至以俟來者書成繕寫將預
聖覽恭惟
皇帝陛下天縱深仁孝述前烈刊行方論拯治

生類俾天下家藏其書人知其學皆得爲忠孝
亦　皇風之高致焉太子右贊善大夫臣高保
衡尚書都官員外郎臣孫奇太常少卿充秘閣
校理臣林億等謹上

千金翼方序

唐　逸士　孫　思邈　撰

原夫神醫祕術至賾參於道樞寶餌凝靈宏功浹於眞畛知關籥玄牡駐歷之効已深轡策天機全生之德爲大稽炎農於紀籙資太一而反營魂鏡軒后於遺編事岐伯而宣藥力故能甞味之績鬱騰天壤診體之教播在神寰醫道由是濫觴時義肇基于此亦有志其大者高密問紫文之術先其遠者伯陽流玉册之經擬斯壽於乾坤豈伊難老儔厥齡於龜鶴詎可蠲痾兹適大道之眞以持身抑斯之謂也若其業濟含

靈命懸茲乎則有越人徹視於腑藏秦和洞達
於膏肓仲景候色而驗眉元化刳腸而湔胃斯
皆方軌疊跡思韞入神之妙極變探幽精超絕
代之巧晉宋方技既其無繼齊梁醫術曾何足
云若夫醫道之爲言寔惟意也固以神存心手
之際意析毫芒之裏當其情之所得口不能言
數之所在言不能諭然則三部九候廼經絡之
樞機氣少神餘亦鍼刺之鈞軸況乎良醫則貴
察聲色神工則深究萌芽心考錙銖安假懸衡
之驗敏同機駭曾無挂髮之淹非天下之至精
其孰能與於此是故先王鏤之于玉板往聖藏
之以金匱豈不以營疊至道括囊眞頤者歟余
幼智蔑聞老成無已才非公幹夙嬰沈痰德異
士安早纏尫瘵所以志學之歲馳百金而徇經
方耄及之年竟三餘而勤藥餌酌華公之錄帙
異術同窺採葛生之玉函奇方畢綜每以爲生
者兩儀之大德人者五行之秀氣氣化則人育
伊人稟氣而存德合則生成是生曰德而立既
知生不再於我人處物爲靈可幸蘊靈心闕頤
我性源者由檢押神秘幽求今古撰方一部號
曰千金可以濟物攝生可以窮微盡性猶恐岱
山臨目必昧秋毫之端雷霆在耳或遺玉石之

響所以更撰方翼三十卷共成一家之學譬輗軏之相濟運轉無涯等羽翼之交飛搏摇不測矧夫易道深矣孔宣繫十翼之辭玄文奥矣陸績增玄翼之說或沿斯義述此方名矣貽厥子孫求爲家訓雖未能譬言中庚比潤上池亦足以慕遠測深稽門叩鍵者哉儻經目於君子庶知余之所志焉

千金翼方目録

唐　逸士　孫　思邈　撰

卷之一

採藥時節　藥名　藥出州土
用藥處方　治風藥品　濕痺腰脊藥品
攣急𤻲曳藥品　身瘙痒藥品　驚癇藥品
鬼魅藥品　蠱毒藥品　痰實藥品
固冷積聚腹痛腸堅藥品　腹痛脹滿嘔吐藥品
胷脅滿藥品　補五臟藥品　益氣藥品
長陰陽益精氣藥品　補骨髓藥品
長肌肉藥品　堅筋骨藥品　陰下濕痒藥品
消渴藥品　消食藥品　淋閉藥品
利小便藥品　止小便利藥品　明目藥品

止淚藥品　　目赤痛藥品　　霍亂轉筋藥品
腸痔藥品　　鼠漏并痔藥品　　三蟲藥品
益肝膽藥品　　補養心氣藥品　　補養腎氣藥品
補脾藥品　　欬逆上氣藥品　　下氣藥品
下部䘌藥品　　崩中下血藥品　　女人血閉藥品
女人寒熱疝瘕漏下藥品　　產難胞衣不出藥品
女人陰冷腫痛藥品　　陰蝕瘡藥品
傷寒溫疫藥品　　健忘藥品　　通九竅藥品
下部痢藥品　　虛損洩精藥品
唾粘如膠并唾血藥品　　吐血藥品
下血藥品　　衄血藥品　　尿血藥品
耳聾藥品　　止汗藥品　　出汗藥品
堅齒藥品　　癰腫藥品　　惡瘡藥品

熱極喘口舌焦乾藥品　　利血脉藥品
失魂魄藥品　　悅人面藥品　　口瘡藥品
脚弱疼冷藥品

○卷之二

玉石部上品二十二味

玉泉　　玉屑　　丹砂　　空青　　綠青
曾青　　白青　　扁青　　石膽　　雲母
石鍾乳　　朴消　　消石　　芒消　　礬石
滑石　　紫石英　　白石英　　五石脂　　太一餘粮
石中黃子　　禹餘糧

玉石部中品二十九味

金屑　　銀屑　　水銀　　雄黃　　雌黃
殷孽　　孔公孽　　石腦　　石硫黃　　陽起石

凝水石　石膏　磁石　玄石　理石
長石　膚青　鐵落　鐵　生鐵
剛鐵　鐵精　光明鹽　緑鹽　密陀僧
桃花石　珊瑚　石花　石牀

玉石部下品三十一味

青琅玕　礜石　特生礜石　握雪礜石
方解石　蒼石　土陰孽　代赭　鹵鹹
大鹽　戎鹽　白堊　鉛丹　粉錫
錫銅鏡鼻　銅弩牙　金牙　石灰
冬灰　鍛竈灰　伏龍肝　東壁土　紫鉚騏驎竭
硇砂　薑石　赤銅屑　銅鑛石　白瓷瓦屑
烏古瓦　石鷰　梁上塵

草部上品之上四十味

青芝　赤芝　黄芝　白芝　黒芝
紫芝　赤箭　天門冬　麥門冬　朮
女萎萎蕤　黄精　乾地黄（生者附）　菖蒲　遠志（葉附）
澤瀉（葉實附）　署預　菊花　甘草　人參
石斛　牛膝　卷柏　細辛　獨活
升麻　茈胡（葉附）　防葵　蓍實　菴䕡子
薏苡人　車前子（葉根附）　菥蓂子　茺蔚子（莖附）　木香
龍膽　菟絲子　巴戟天　白英　白蒿

草部上品之下二十八味

肉蓯蓉　地膚子　忍冬　蒺蔾子（葉附）　防風（葉附）
石龍芻　絡石　千歲虆　黄連　沙參
丹參　王不留行　藍實（葉附）　景天（花附）　天名精
蒲黄　香蒲　蘭草　决明子　芎藭

蘼蕪　續斷　雲實（花附）　黃蓍（莖葉附）　徐長卿
杜若　蛇床子　茵陳蒿　漏蘆　茜根
飛廉　營實（根附）　薇銜　五味子　旋花（根附）
白兎藿　鬼督郵　白花藤

草部中品之上三十七味

當歸　秦膠　黃芩（子附）　芍藥　乾薑（生薑附）
藁本（實附）　麻黃　葛根（汁葉花附）　前胡　知母
大青　貝母　栝樓根（實莖葉附）　玄參
苦參　石龍芮　石韋　狗脊　萆薢
菝葜　通草　瞿麥　敗醬　白芷（葉附）
杜蘅　紫草　紫菀　白鮮　白薇
枲耳（葉附）　茅根（苗附）　百合　酸漿　紫參
女萎　淫羊藿（仙靈脾是也）　蠡實（馬藺子是也花葉等附）

草部中品之下三十九味

欵冬　牡丹　防已　女菀　澤蘭
地榆　王孫　爵牀　白前　百部
王瓜　薺苨　高良薑　馬先蒿　蜀羊泉
積雪草　惡實（根莖附）　莎草（根名香附子）　大小薊根
垣衣　艾葉　水萍　海藻　昆布
葒草　陟釐　井中苔萍（藍附）　蔛草
鳧葵　菟葵　鱧腸（蓮子草）　蒟醬　百脉根
蘿摩子　白藥　蘹香子　鬱金　薑黃
阿魏

○卷之三

草部下品之上二十五味

大黃　桔梗　甘遂　葶藶　芫花（根附）

澤漆　大戟　蕘花　旋復花根附　鈎吻
藜蘆　赭魁　及已　烏頭射罔烏喙附　天雄
附子　側子　羊躑躅　茵芋　射干
鳶尾　貫衆花附　半夏　由跋　虎掌
莨菪子　蜀漆　恒山　青葙子莖葉附　牙子
白斂　白及　蛇含　草蒿　雚菌

草部下品之下六十八味

連翹　白頭翁　䕡茹　苦芺　羊桃
羊蹄　鹿藿　牛扁　陸英　蒴藋
藎草　夏枯草　烏韭　蚤休　虎杖
石長生　鼠尾草　馬鞭草　胡桐淚　馬勃
雞腸　蛇苺　苧根　菰根　狼跋子
弓弩弦　春杵頭細糠　敗天公　半天河
地漿　敗蒲席　敗船茹　敗鼓皮　屋遊
赤地利　赤車使者　劉寄奴　三白草
牽牛子　豬膏苺　紫葛　蓖麻子葉附
葎草　格注草　獨行根　狗舌　烏蘞
豨薟　狼毒　鬼臼　蘆根　甘蕉根
萹蓄　酢漿草　苘實　蒲公草　商陸
女青　水蓼　角蒿　昨葉何草
白附子　鶴虱　甑帶灰　屐屧鼻繩
故麻鞋底　雀麥　筆頭灰

木部上品一十七味

茯苓茯神附　琥珀　松脂實葉節根[illegible]等附　柏實葉皮等附
菌桂　牡桂　桂　杜仲　楓香脂皮附
乾漆生漆附　蔓荊實　牡荊　女貞實　桑上寄生

蕤核　五加皮　沉香（薰陸香詹糖香雞舌香楓香等附）藿香
蘗木（根附）辛夷　木蘭　榆皮（花附）酸棗
槐實（枝皮等附）楮實（葉及莖等附）枸杞　蘇合香
橘柚

木部中品二十九味

龍眼　厚朴　猪苓　竹葉（根實附）
淡竹葉（瀝皮等附）茹笋　枳實　山茱萸　吳茱萸（根附）
秦皮　梔子　檳榔　合歡　秦椒
衛矛　紫葳（莖葉等附）蕪荑　食茱萸　椋子木
毋始王木　折傷木　茗苦搽
桑根白皮（五木耳等附）松蘿　白棘　棘刺花（實附）
安息香　龍腦香　菴摩勒　毗梨勒

木部下品四十五味

黃環　石南（實附）巴豆　蜀椒　莽草
郁李人（根附）鼠李（根附）欒華　杉材　楠材
櫪實　蔓椒　鈎樟根皮　雷丸
溲疏　欅樹皮　白楊　水楊葉　欒荊
小蘗　莢蒾　鈎藤　藥實根　皂莢
楝實（根附）柳華（子附）桐葉（花附）梓白皮（葉附）蘇方木
接骨木　枳椇　木天蓼　烏臼木　赤爪木（實附）
訶梨勒　楓柳皮　賣子木　大空　紫真檀
椿木葉（樗木附）胡椒　橡實　無食子
楊櫨木　槲若（皮附）

人獸部五十六味

髮髲　亂髮　人乳汁　頭垢　屎溺
龍骨（白龍骨齒角等附）牛黃　麝香　馬乳

牛乳　羊乳　酥　熊脂　白膠
阿膠　醍醐　底野迦　酪　犀角
羚羊角　羖羊角（髓肺肉骨等附）　牛角鰓（髓膽腎齒肉溺等附）
白馬莖（眼蹄齒心肺肉骨溺等附）　狗陰莖（膽心腦齒血肉等附）　鹿茸（骨角髓肉等附）
麞骨（肉髓等附）　虎骨（膏肉等附）　豹肉　貍骨（肉陰莖等附）
兎頭骨（腦肝肉等附）　六畜毛蹄甲　鼺鼠
麋脂（角附）　鼹鼠　獺肝（肉附）
狐陰莖（五藏腸屎等附）　豚卵（蹄足心腎膽齒膏肉等附）　驢屎（尿乳軸垢等附）
豺皮　猯膏（肉胞等附）　野猪黄
丹雄雞（肉膽血肪腸肝羽骨等附）　白鵝膏（毛肉等附）
鶩肪（白鴨屎附）　鴈肪　鷓鴣　雉肉　鷹屎白
雀卵（腦頭血屎等附）　鸛骨　雄鵲　鴝鵒
鷰屎　孔雀　鸕鷀屎（頭附）　鴟頭

卷之四

蟲魚部七十一味　論一首
石蜜　蜜蠟（白蠟附）　蜂子（黄蜂土蜂附）　牡蠣
桑螵蛸　海蛤　文蛤　魁蛤　石决明
秦龜　龜甲　鯉魚膽（肉骨齒附）　蠡魚
鮑魚　鮧魚　鱓魚　鯽魚　伏翼
天鼠屎　蝟皮　石龍子　露蜂房　樗雞
蚱蟬　白殭蠶　木䖟　蜚䖟　蜚蠊
䗪蟲　蠐螬　蛞蝓　蝸牛　水蛭
鼈甲（肉附）　鮀魚甲（肉附）　烏賊魚骨（肉附）　蟹（爪附）
原蠶蛾（屎附）　鰻鱺魚　鮫魚皮　紫貝　蝦蟇
鼃　牡鼠（肉糞附）　蚺蛇膽（膏附）　蝮蛇膽（肉附）
鯪鯉甲　蜘蛛　蜻蛉　石蠶　蛇蛻
蛇黄　蜈蚣　馬陸　蠮螉　雀甕

鼠婦 螢火 衣魚 白頸蚯蚓 螻蛄
蜣蜋 斑猫 芫青 葛上亭長 地膽
馬刀 貝子 田中螺汁 甲香 珂

果部二十五味

豆蔻 葡萄 蓬蘽 覆盆子 大棗生棗及葉附
藕實莖 鷄頭實 芰實 栗 櫻桃
梅實 枇杷葉 柿 木瓜 甘蔗
石蜜乳糖也 沙糖 芋 烏芋 杏核人花實附
桃核人花梟蠹膠實等附 李核人根實附 梨
柰 安石榴殼根附

菜部三十七味

白瓜子 白冬瓜 瓜蔕花附 冬葵子根葉附
莧實 苦菜 薺實附 蕪菁子附 萊菔根
龍葵子附 菘 芥 苜蓿 荏子葉附
蓼實葉附 葱實根汁附 薤 韭根附
白蘘荷 菾菜 紫蘇子附 水蘇 假蘇
香薷 薄荷 秦荻梨 苦瓠 水芹
馬芹子 蓴 落葵 蘩蔞 蕺
葫大蒜也 蒜小蒜也 菫 芸臺

米穀部二十八味

胡麻 青蘘 麻蕡子附 飴糖 大豆黃卷生大豆附
赤小豆 豉 大麥 穬麥蘖附 小麥麴附
青粱米 黃粱米 白粱米 粟米 丹黍米
蘗米 秫米 陳廩米 酒 腐婢
藊豆葉附 黍米 粳米 稻米 稷米
醋 醬 食鹽

有名未用一百九十六味

青玉　白玉髓　玉英　璧玉　合玉石
紫石華　白石華　黑石華　黄石華　厲石華
石肺　石肝　石脾　石腎　封石
陵石　碧石青　遂石　白肌石　龍石膏
五羽石　石流青　石流赤　石耆　紫加石
終石　玉伯　文石　曼諸石　山慈石
石濡　石芸　石劇　路石　曠石
敗石　越砥石　金莖　夏臺　柒紫
鬼目　鬼蓋　馬顛　馬唐　馬逢
牛舌　羊乳　羊實　犀洛　鹿良
莬棗　雀梅　雀翹　雞涅　相烏
鼠耳　蛇舌　龍常草　離樓草　神護草

黄護草　吴唐草　天雄草　雀醫草　木甘草
益決草　九熟草　兑草　酸草　異草
灌草　茈草　莘草　勒草　英草華
吴葵華　封華　北荇華　隩華　棑華
節華　徐李　新雉木　合新木　俳蒲木
遂陽木　學木核　木核　栒核　荻皮
桑莖實　滿陰實　可聚實　讓實　蕙實
青雌附根並　白背　白女腸　白扇根　白給
白并　白辛　白昌　赤舉　赤涅
黄秫　徐黄　黄白支　紫藍　紫給
天蓼　地朕　地芩　地筋　地耳
土齒　燕齒　酸惡　酸赭　巴棘
巴朱　蜀格　纍根　苗根　參果根

黃辯　良達　對盧　虀藍　委蛇
麻伯　王明　類鼻　師系　逐折
并苦　領灰　父陛根　索干　荊莖
鬼麗　竹付　秘惡　唐夷　知杖
坐松　河煎　區余　三葉　五母麻
疥拍腹　常吏之生　救赦人者
丁公寄　城裏赤柱　城東腐木
芥　載　慶　腂　雄黃蟲
天社蟲　桑蠹蟲　石蠹蟲　行夜　蝸籬
麋魚　丹戩　扁前　蚖類　蜚厲
梗雞　益符　地防　黃蟲

唐本退二十味

薰草　姑活　別羇　牡蒿　石下長卿
麡舌　練石草　弋共　蕈草　五色符
蘘草　翹根　鼠姑　船虹　屈草
赤赫　淮木　占斯　嬰桃　鴆鳥毛

○卷之五

婦人求子第一論一首方七首
婦人積聚第二方六首
婦人乳疾第三方一十三首
婦人雜病第四方一十二首
婦人面藥第五論一首方三十九首
熏衣浥衣香第六方六首
令身香第七方一十二首
生髮黑髮第八方一十九首

○卷之六

產後心悶第一方四首
產後虛煩第二方一十三首
陰脫第三方八首
惡露第四方一十八首
心痛第五方四首
腹痛第六方一十六首
虛損第七方一十七首
○卷之七
虛乏第一方一十二首
盜汗第二方四首
下乳第三方一十六首
中風第四方一十一首
心悸第五方四首
下痢第六方一十七首
淋渴第七方一十一首
○卷之八
崩中第一方三十六首
月水不利第二方三十四首
損傷第三方七首
○卷之九傷寒
太陽病用桂枝湯法第一五十七證方五首
太陽病用麻黃湯法第二一十六證方四首
太陽病用青龍湯法第三四證方二首
太陽病用柴胡湯法第四一十五證方七首
太陽病用承氣湯法第五九證方四首
太陽病用陷胸湯法第六三十一證方一十六首

太陽病雜療法第七 二十證方一十三首
陽明病狀第八 七十五證方一十一首
少陽病狀第九 九證

卷之十

太陰病狀第一 八證方二首
少陰病狀第二 四十五證方一十六首
厥陰病狀第三 五十六證方七首
傷寒宜忌第四 十五章
發汗吐下後病狀第五 三十證方一十五首
霍亂病狀第六 一十證方三首
陰易病已後勞復第七 七證方四首附方六首

卷之十一

養小兒第一 合八十九條方二十首灸法二首論一首
小兒雜治第二 方五十七首論一首
眼病第三 合一百二十三方灸法二首論一首

卷之十二

養性禁忌第一 論一首
養性服餌第二 方三十七首
養老大例第三 論三首
養老食療第四 方十七首論五首

卷之十三 辟穀

服茯苓第一 方六首
服松柏脂第二 方二十首論一首
服松柏實第三 方一十九首
酒膏散第四 方十六首論一首
服雲母第五 方三首論一首

服水第六論一首法七首

○卷之十四 退居

擇地第一

締刱第二

服藥第三

飲食第四

養性第五

種造藥第六法三十五首

雜忌第七

○卷之十五 補益

敘虛損論第一論一首

大補養第二論一首方八首

解散發動第三論一首方三十五首與第二十二卷通

補五藏第四方四十五首

五藏氣虛第五方九首

補虛圓散第六方二十二首

○卷之十六 中風

諸酒第一方二十首

諸散第二方九首論一首

諸膏第三方三首

喎僻第四方四首

心風第五方一十四首

風眩第六方一十七首

○卷之十七

中風第一方三十五首論四首灸法二首

脚氣第二論一首方二十一首

癮瘮第三　方一十六首灸法一首
癧瘍第四　方一十四首灸法一首

○卷之十八　雜病

霍亂第一　方二十七首
痎瘧第二　方二首禳法十二首鍼灸法七首
黃疸第三　論三首方二十八首鍼灸一十法
吐血第四　論三首方三十首
胷中熱第五　方一十七首
壓熱第六　方一十三首論一首

○卷之十九

消渴第一　方二十二首
淋病第二　方二十首
水腫第三　方二十六首并五不治證
痰飲第四　方一十四首
癖積第五　方一十四首
寒冷第六　方九首
飲食不消第七　方一十七首論一首
雜療第八　方法一百二十首

○卷之二十

備急第一　方二十七首論一首
蠱毒第二　論一首方七首灸法一首
藥毒第三　方一十二首
從高墮下第四　方一十一首
金瘡第五　方六十二首
沙蝨第六　方三十一首
癭病第七　方九首

陰病第八 方十四首

○卷之二十一

總療萬病第一 論一首

阿伽陀圓理萬病第二

耆婆療惡病第三 方一十一首 論七首

蹋麴療冷第四 方六首

○卷之二十二

飛鍊研煑鍾乳及和草藥服療第一 方六首

飛鍊研煑五石及和草藥服療第二 方二十一首 論一首

服石及寒食散已違失節度發病療之法合四十五條

第三 論三首

解石及寒食散并下石第四 論一首方六十九首

○卷之二十三 瘡癰

黃父相癰疽論第一

診癰疽起發處第二 方一首

候癰疽色法第三

診知是癰疽法第四

診癰疽有膿法第五

候人年得疽法第六

相五色疽死生法第七

薄貼第八 方三十一首

處療癰疽第九 論一首 方三十三首

○卷之二十四

癰疽發背第一 方九首

鼠瘻第二 論一首方二十一首灸法三首

瘭疽第三 方八首

惡核第四論一首方一十二首
丹胗第五方二十八首
甘濕第六論二首方三十八首
腸痔第七方三十六首論一首
疥癬第八論一首方三十四首灸法一首
代指第九方六首
濕熱瘡第十方三十四首
○卷之二十五
診氣色法第一
診脉大意第二
診四時脉第三
診寸口脉第四
診關上脉第五
診尺中脉第六
診雜病脉第七
○卷之二十六 針灸
取孔穴法第一
婦人第二法四十五首
小兒驚癇第三法二十一首
鼻病第四法七首
舌病第五法二十五首
脚氣第六法三首論一首
諸風第七法六十九首論
時行第八法四首
黃疸第九法一十一首
瘧病第十法一十三首

卷之二十七
肝病第一 五十一法
膽病第二 一十二法
心病第三 一十八法
小腸病第四 八十一法訣二首
脾病第五 三十二法
胃病第六 三十四法
肺病第七 四十五法
大腸病第八 二十二法論一首
腎病第九 一十四法
膀胱病第十 三十二法
卷之二十八
消渴第一 十二法論一首
淋病第二 七十三法
尿血第三 七法
水病第四 二十五法
癰疽第五 七十法論一首
痔漏第六 十八法
脫肛第七 四十法
卒死第八 十三法
雜法第九
鍼灸宜忌第十
卷之二十九 禁經
持禁齋戒法第一
受禁法第二
雜受禁法第三

禁法大例第四
掌訣法第五
禁鬼客忤氣第六
禁温疫時行第七
禁瘧病第八
禁瘡腫第九
禁喉痺第十
禁産運第十一

○卷之三十

禁金瘡第十二
禁蠱毒第十三
禁遁注第十四
禁邪病第十五
禁惡獸虎狼第十六
禁蛇毒第十七
禁蠍蜂第十八
禁狗鼠第十九
護身禁法第二十
禁賊盜第二十一
呪童子令說鬼姓字第二十二

千金翼方目錄終

千金翼方卷第一

朝奉郎守太常少卿充秘閣校理判登聞檢院上護軍賜緋魚袋臣林億等校正

藥錄纂要

採藥時節第一

論曰夫藥採取不知時節不以陰乾暴乾雖有藥名終無藥實故不依時採取與朽木不殊虛費人功卒無裨益其法雖具大經學者尋覽造次難得是以甄別即日可知耳

萎蕤（立春後採陰乾）　菊花（正月採根三月採葉五月採莖九月採花十一月採實皆陰乾）

白英（春採葉夏採莖秋採花冬〻採根）　絡石（正月採）　飛廉（正月採根七八月採花陰）

藁本（正月二月採暴三十日成）　通草（正月採陰）　女菀（正月二月採陰）

烏頭烏喙（正月二月採春採為烏頭冬〻採為附子八月上旬採根陰）　蒴藋（春夏採葉秋冬〻採莖根）

柏葉（四時各依方面採陰）　枸杞（春夏採葉秋採莖實冬〻採根陰）　茗（春採）

桃梟（正月採）　天門冬〻（二月三月七月八月採暴）　麥門冬〻（二月三月八月十月採陰）

朮二月三月八月九月採暴　黃精二月採陰　乾地黃二月八月採陰　署預二月八月採暴
甘草二月八月採暴乾十日成　人參二月四月八月上旬採暴乾無令見風
牛膝二月八月十月採陰　細辛二月八月採陰　獨活二月八月採暴　升麻二月八月採日乾
柴胡二月八月採暴　龍膽二月八月十一月十二月採陰　巴戟天二月八月採陰
白蒿二月採　防風二月十月採暴　黃連二月八月採　沙參二月八月採暴
王不留行二月八月採　黃蓍二月十月採陰　杜若二月八月採暴
茜根二月三月採暴　當歸二月八月採陰　秦艽二月八月採暴　芍藥二月八月採暴
前胡二月八月採暴　知母二月八月採暴　括樓二月八月採根暴三十日成
石龍芮五月五日採子二月八月採皮陰　石韋二月採陰　狗脊二月八月採暴
萆薢二月八月採暴　菝葜二月八月採暴　白芷二月八月採暴　紫菀二月三月採陰
百合二月八月採暴　牡丹二月八月採陰　防已二月八月採陰　地榆二月八月採暴
莎草根二月八月採　大黃二月八月採火乾　桔梗二月八月採暴　甘遂二月採陰
赭魁二月採　天雄二月採陰　貫衆二月八月採陰　虎掌二月八月採陰

白歛二月八月採暴　羊桃二月採陰　狼毒二月八月採陰　鬼臼二月八月採
茯苓茯神二月八月採陰　桂十二月八月採陰　杜仲二月五月六月九月採
商陸二月八月採日乾　丁香二月八月採　榆皮二月採皮暴乾八月採實
猪苓二月八月採陰　秦皮二月八月採陰　石南二月四月採葉八月採實陰
藍葉二月三月採暴本草無　赤箭三月四月八月採暴　防葵三月三日採暴
芎藭三月四月採暴　徐長卿三月採　黃芩三月三日採陰　大青三月四月採陰
玄參三月四月採暴　苦參三月八月十月採暴　杜蘅三月三日採暴　紫草三月採陰
白薇三月三日採陰　紫參三月採火乾　澤蘭三月三日採陰　王瓜三月採陰
垣衣三月三日採陰　艾葉三月三日採暴　水萍三月採暴　芫花三月三日採陰
澤漆三月三日七月七日採陰　藜蘆三月採陰　羊躑躅三月採陰
茵芋三月三日採陰　射干三月三日採陰　青葙子三月採莖葉陰五月六月採子
紫葛三月八月採日乾　白附子三月採　桑上寄生三月三日採陰
厚朴三月九月十月採陰　蕪荑三月採陰　黃環三月採陰　烏芋三月三日採暴

桃花三月三日採陰 苦菜三月三日採陰 遠志四月採陰 菥蓂子四月五月採暴
景天四月四日七月七日採陰 蒲黃四月採 蘭草四月五月採
蘼蕪四月五月採暴 白頭翁四月採 夏枯草四月採 溲疏四月採
鼠尾草四月採葉七月採花陰 昌蒲五月十二月採陰 卷柏五月七月採陰
澤瀉五月六月八月採陰葉五月採實九月採 車前子五月五日採陰
茺蔚子五月採 石龍芻五月七日採暴 丹參五月採暴 天名精五月採
肉蓯蓉五月五日採陰 蛇牀子五月採陰 茵蔯蒿五月及立秋採陰
旋花五月採陰 葛根五月採暴 酸漿五月採陰 蠡實五月採陰
大小薊五月採 葒草五月採實 旋覆花五月採日乾 鳶尾五月採
半夏五月八月採暴 莨菪子五月採 蜀漆五月採陰 䕡茹五月採陰
萹蓄五月採陰 生漆夏至後採 蕤核五月六月採日乾 松蘿五月採陰
五加皮五月七月採莖十月採根陰 莽草五月採陰 郁李根五月六月採
欒華五月採 覆盆子五月採 梅實五月採火乾 杏核人五月採

蘩蔞五月五日採 葫五月五日採 蒜五月五日採 青蘘五月採本草無
紫芝六月八月採 茅根六月採 莞花六月採陰 昨葉何草夏採日乾
松脂六月採 五木耳六月採暴乾 石斛七月八月採陰 蒺藜子七月八月採暴
續斷七月八月採陰 薇銜七月採 麻黃立秋採陰 瞿麥立秋採陰
海藻七月七日採暴 陸英立秋採 菌桂立秋採 槐實七月七日十月巳日採
桃核仁七月採陰 瓜蒂七月七日採陰 水蘇七月採 麻蕡七月七日採
鼠婦七月採陰 蓍實八月九月採日乾 薏苡仁八月採實根無時 地膚子八月十月採陰
漏蘆八月採陰 營實八月九月採陰 五味子八月採陰 敗醬八月採
恒山八月採陰 牙子八月採暴 蛇含八月採陰 藋菌八月採陰
連翹八月採陰 屋遊八月九月採 女青八月採陰 牡荊實八月九月採陰
酸棗八月採陰 楮實八月九月採日乾 秦椒八月九月採 衛矛八月採陰
巴豆八月採陰 蜀椒八月採陰 雷丸八月採暴 大棗八月採暴
藕實八月採 雞頭實八月採 白瓜子八月採 菟絲子九月採暴

蓋草九月十月採　乾薑九月採　松實九月採陰　辛夷九月採暴
枳實九月十月採陰　山茱萸九月十月採陰　吳茱萸九月九日採陰　梔子九月採暴
皂莢九月十月採陰　栗九月採　荏九月採陰　麻子九月採
大豆九月採　菴蕳子十月採　決明子十月十日採陰百日　雲實十月採暴
貝母十月採暴　女貞立冬採　橘柚十月採　款冬花十一月採陰
棘刺冬至後一百二十日採　莧實十一月採　忍冬十二月採陰　大戟十二月採陰
木蘭十二月採陰　冬葵子十二月採　白鮮四月五月採陰　葶藶立夏後採陰

論曰凡藥皆須採之有時日陰乾暴乾則有氣力若不依時採之則與凡草不別徒棄功用終無益也學者當要及時採掇以供所用耳

藥名第二

論曰有天竺大醫耆婆云天下物類皆是靈藥萬物之中無一物而非藥者斯乃大醫也故神農本草舉其大綱未盡其理亦猶咎繇創律但述五刑豈卒其事且令後學者因事典法觸類長之無窮竭則神農之意從可知矣所以述錄藥名品欲令學徒知無物之非藥耳

玉泉　玉屑　丹砂　空青　綠青
曾青　白青　扁青　石膽　雲母
朴消　消石　芒消　滑石　石鍾乳
紫石英　礬石馬齒礬 黃礬 絳礬 青礬　白石英　五石脂
太一餘糧　紫禹餘糧　石中黃子　禹餘糧　黃禹餘糧
金屑　銀屑　水銀附汞粉　雄黃　雌黃
殷孽　孔公孽　石腦　石硫黃　熏黃
陽起石　凝水石　石膏　磁石　玄石
理石　長石　膚青　石黛　鐵落
鐵　生鐵　剛鐵　鐵精　鐵漿

食鹽　光明鹽　緑鹽　蜜陀僧　桃花石
珊瑚　石花　乳牀　青琅玕　礜石
特生礜石　握雪礜石　方解石　蒼石　土陰孼
代赭　鹵鹹　大鹽　戎鹽　青鹽
赤鹽　白堊　鉛丹　錫粉　錫銅鏡鼻
銅弩牙　金牙　石灰　冬灰　炭
鍛竈灰　伏龍肝　東壁土　半天河　地漿
硇砂　薑石　赤銅屑　銅礦石　銅青
白瓷瓦屑　烏古瓦　石鷰　梁上塵　不灰木
青芝　赤芝　黄芝　白芝　黑芝
紫芝　赤箭　天門冬　麥門冬　朮
女萎萎蕤　黄精　乾地黄　昌蒲　遠志小草
澤瀉附葉實　署預　菊花　甘草　人參

石斛　牛膝　卷柏　細辛　獨活
升麻　柴胡　防葵　蓍實　菴䕡子
薏苡仁　車前子附葉　菥蓂子　茺蔚子　木香
龍膽　菟絲子　巴戟天　白英　白蒿
肉蓯蓉　地膚子　忍冬　蒺藜子　防風葉附
石龍芻　絡石　千歲蘽　黄連　沙參
丹參　藍實　景天　天名精　王不留行
蒲黄　蘭草　決明子　芎窮　香蒲蒲根附
蘼蕪　續斷　雲實　黄耆　徐長卿
杜若　蛇牀子　茵陳蒿　漏蘆　茜根
飛廉　營實　薔薇根　薇銜　五味子
旋花　白兔藿　鬼督郵　白花藤　當歸
秦艽　黄芩　芍藥　藁本實附　乾薑生薑附

麻黃(附根子) 葛根(汁葉花附) 前胡 知母 大青
貝母 栝樓(實莖葉附) 玄參 苦參 石龍芮
石韋 狗脊 萆薢 菝葜 通草
瞿麥 敗醬 白芷 杜蘅 紫草
紫菀 白鮮皮 白薇 枲耳 茅根
百合 酸漿 王參 女萎 淫羊藿
蠡實(附花葉) 款冬花 牡丹 防己 女菀
澤蘭 地榆 王孫 爵牀 白前
百部根 王瓜 薺苨 高良薑 馬先蒿
蜀羊泉 積雪草 惡實 莎草 大小薊
垣衣 艾葉 水萍 海藻 昆布
葒草 陟釐 蔛草 鳧葵 井中苔萍(藍附)
鱧腸 蒟醬 百脉根 蘿摩子 白藥

蘹香子 鬱金 薑黃 百兩金 阿魏
大黃 桔梗 甘遂 葶藶 芫花
澤漆 大戟 蕘花 旋復花 鉤吻
藜蘆 赭魋 及己 天雄 烏頭(附罔[illegible]喙附)
附子 側子 羊躑躅 茵芋 射干
鳶尾 貫衆(花附) 半夏 由跋 虎掌
莨菪子 蜀漆 恒山 青葙子 牙子
白斂 白及 蛇含 草蒿 雚菌
連翹 白頭翁 藺茹 苦芺 羊桃
羊蹄 鹿藿 牛扁 陸英 蒴藋
藎草 夏枯草 烏韭 蚤休 虎杖
石長生 鼠尾草 馬鞭草 馬勃 松脂(實葉根節花等附)
蛇莓 苧根 菰根 狼跋子 弓弩弦

敗天公 敗蒲席 敗船茹 屋遊 赤地利
赤車使者 三白草 牽牛子 豬膏母 劉寄奴草
紫葛 蓖麻子 葎草 格注草 獨行根
狗舌草 烏蘞莓 豨薟 狼毒 鬼臼
蘆根 甘蕉根 萹蓄 酢漿草 蓾實
蒲公草 商陸 女青 水蓼 角蒿
白附子 鶴虱 魚網 馬絆繩 昨葉何草
破扇 破故紙 甑帶灰 鬼蓋 屐屧鼻繩
雀麥 茯苓(茯神附) 琥珀(玉附) 柏實(葉皮等附) 麻布叩幅頭
菌桂 牡桂 桂 杜仲 故麻鞋底
楓香脂皮 乾漆(生漆) 蔓荊實 牡荊 女貞實
蕤核 五加皮 沈香(薰陸香 詹糖香 雞舌香 楓香等附) 藿香
丁香 蘗木(根附) 辛夷 木蘭 桑上寄生

榆皮(花附) 酸棗 槐實(枝皮等附) 枸杞 楮實(葉皮莖白汁附)
蘇合香 龍眼 厚朴 豬苓 竹葉(根汁實瀝皮茹笋附)
枳實(刺茹附) 山茱萸 吳茱萸(根附) 秦皮 梔子
檳榔 合歡 秦椒 衛矛 紫葳
蕪荑 食茱萸 椋子木 折傷木 每始王木
茗苦梌 蜀桑根 松蘿 桑根白皮(葉耳五木耳桑灰等附)
白棘 安息香 龍腦 菴摩勒 棘刺花(實棗針附)
毗梨勒 紫鉚 騏驎竭 胡桐淚 黃環
石南(實附) 巴豆 蜀椒 莽草 郁李仁(根附)
鼠李 欒華 杉材 楠材 釣樟根皮
榧實 蔓椒 雷丸 溲疏 櫸樹皮
白楊皮 水楊葉 欒荊 小檗 莢蒾
釣藤 藥實根 皂莢 楝實(根附) 柳華(葉實汁附)

桐葉花附 梓白皮 蘇枋木 接骨木 枳椇
木天蓼 烏臼木 赤爪木 訶梨勒 楓柳皮
賣子木 大空 紫真檀 胡椒 椿木葉鶻木附
橡實 無食子 楊櫨木 槲若 鹽麩子
紫荊 髮髲 亂髮 人乳汁 頭垢
屎溺
龍骨白龍骨齒角等附 牛黃 麝香 象牙齒睛等附
馬乳 牛乳 羊乳 酥 熊脂膽附
白膠 阿膠 醍醐 底野迦 酪
犀角 羚羊角 鹿茸 羖羊角髓肺骨肉齒骨頭血肚暗靨齒蹄屎附
牛角䚡髓膽腎心肝齒脹尾毛脂肉莅龍中毛耳中垢屎溺屎中豆等附 腊 麞骨肉髓等附
豹肉 狼牙 狸骨肉陰莖等附 虎骨膏爪肉威等附
兎頭骨腦肝肉等附 筆頭灰 六畜毛蹄甲

鼺鼠 麋脂角附 豚卵蹄心腎膽肚䏶毛筋齒膏肉耳中垢等附
鼹鼠 獺肝肉屎附 狐陰莖五藏腸屎等附 貒膏肉胞等附
野猪黃 驢屎屎乳軸垢等附 豺皮 野駝脂 敗鼓皮
白馬莖頭蹄齒心肝肺肉骨鬐膏鬐毛溺通汁屎中粟等附 狗陰莖腹心腦齒血肉乳黃中骨等附
丹雄雞白雄雞黃雌雞脂烏雄雞肉膽心血冠血肪肝屎白腸肶胵裏黃皮左右翅毛黑雌雞黃雌雞雞子卵中白皮
雞冢東門上雞頭等附 白鵝膏毛肉等附子 鶩肪
鴈肪 鷓鴣 雉肉喉下白毛附 鷹屎白脂鵰屎附
鸛骨 雄鵲 鴝鵒 鷰屎 雀卵腦頭血屎附
伏翼 天鼠屎 孔雀 鸕鷀屎頭附 鴟頭
石蜜 蜜蠟白蠟附 牡蠣 桑螵蛸 蜂子黃蜂土蜂附
海蛤 文蛤 魁蛤 石决明 真珠
秦龜 龜甲 蠡魚 鮑魚 鯉魚膽肉骨附
鮧魚 鱓魚血附 鯽魚 黃魚膽 蝟皮

石龍子　露蜂房　樗雞　蚱蟬　白殭蠶
木䖟　蜚䖟　蜚蠊　䗪蟲　蠐螬
蛞蝓　蝸牛　水蛭　水馬　鼈甲肉附
鮀魚甲肉附　蟹爪附　螈蠶蛾繰附蠶子紙　烏賊魚骨
鰻鱺魚　鮫魚皮　紫貝　蝦蟇　鼉
牡鼠肉糞附　蚺蛇膽膏附　蝮蛇膽肉附　陵鯉甲　蜘蛛
蜻蛉　石蠶　蛇蛻　蛇黃　烏蛇
蜈蚣　馬陸　蠮螉　雀甕　鼠婦
螢火　衣魚　螻蛄　蜣蜋　白項蚯蚓
斑猫　芫青　地膽　馬刀　葛上亭長
貝子　甲香　珂　田中螺汁
豆蔻　葡萄　蓬蘽　覆盆子　大棗生棗及葉附
藕實莖　雞頭實　芰實　栗　櫻桃

橘柚　橙葉　梅實　枇杷葉　柹
木瓜　甘蔗　石蜜　沙糖　芋
烏芋　杏核仁花實附　桃核仁花梟毛蠹皮葉膠實附
李核仁根實附　梨葉附　柰　安石榴殼根附
白瓜子　白冬瓜　瓜蔕子附　莧實　冬葵子根葉附
苦菜　薺　蕪菁　萊菔　龍葵
菘　芥　苜蓿　荏子　蓼
葱實　薤　白蘘荷　菾菜　蘇
水蘇　假蘇　香薷　薄荷　秦荻梨
苦瓠　水斳　馬芹子　蓴　落葵
蘩蔞　雞腸草　蕺　葫　蒜
堇　芸薹
胡麻葉附　青蘘　麻蕡子附　飴糖　大豆黃卷生大豆附

赤小豆　豉　大麥　穬麥　小麥
麥奴　青粱米　黃粱米　白粱米　粟米
丹黍米　蘖米　秫米　陳廩米　春杵頭糠
酒　腐婢　藊豆葉附　黍米　粳米
稻米附稻蘘　稷米　醋　醬　草豆

右六百八十種皆今時見用藥並可收採以備急要用也

藥出州土第三

論曰按本草所出郡縣皆是古名今之學者卒尋而難曉自聖唐開闢四海無外州縣名目事事惟新所以須甄明即因土地名號後之學者容易即知其出藥土地凡一百三十三州合五百一十九種其餘州土皆有不堪進御故不繁錄耳

○關內道

雍州　柏子仁　茯苓

華州　覆盆子　柏白皮　杜衡　茯苓　茵芋　茯神　木防己　天門冬　黃精　署預　白朮　王不留行
款冬花　白芷　牛膝　白斂　細辛　狼牙　鼈甲　水蛭　丹參　松花　鬼臼　鼈頭
桑螵蛸　五味子　松子　菝葜　松蘿　桔梗　兎肝　玄參　遠志　沙參　澤瀉　續斷
山茱萸　石南　萆薢　石韋　白薇　龜頭　通草　麥門冬　小草

同州　寒水石　麻黃根　班猫　蕪荑　麻黃　蒲黃　䗪虫　麻黃

岐州　鬼督郵　及已　樗雞　藜蘆　麋骨　秦艽　麞髓　甘草

寧州　菴蕳子　菴蕳花　芫青　荊子　萹蓄　蝱蟲　鄜州　芍藥　黃芩　䕡茹　秦艽

原州　[illegible]狼牙　[illegible]柳皮　蓯蓉　白藥　黃耆　延州　蕪荑

涇州　澤瀉　秦艽　防風　黃芩　靈州　代赭　蓯蓉　野猪黃　徂脂

鹽州　青鹽

○河南道

洛州　秦椒　黃石脂　黃魚膽　穀州　半夏　桔梗　鄭州　秦椒

陝州　栝樓　柏子仁　汝州　鹿角　鹿茸　許州　鹿茸

虢州茯苓細辛 茯神栝樓 桔梗白石英 桑上寄生 豫州吳茱萸鹿茸
齊州阿膠防風 榮婆藥 萊州牡蠣文蛤 蔄茹牛黃 海藻海蛤 馬刀烏賊魚 七孔決明
兗州防風雲母 羊石紫石英 仙靈脾桃花石 密州海蛤牛黃 泗州麋脂麋角
徐州桑上寄生 淄州防風 沂州紫石英

○河東道

蒲州龍骨石膽 紫參龍角 蒲黃龍齒 五味子 絳州防風
隰州當歸大黃 汾州石龍芮石膏 潞州赤石脂人參 不灰木白石脂
澤州人參防風 禹餘粮白石英 并州白菀礬石 鬼督郵礜石 白龍骨甘草 柏子仁
晉州白堊紫參 代州柏子仁 蔚州松子 慈州白石脂

○河北道

懷州牛膝 相州知母磁石 箕州人參 滄州雚菌
幽州人參蛇膽 知母 檀州人參 營州野猪黃 平州野猪黃

○山南西道

梁州小蘗蘇子 芒消狟脂 理石防己 皂莢野猪黃 洋州野猪黃狟脂 鳳州鹿茸
始州重臺巴戟天 通州藥子 渠州賣子木
商州香零皮楓香木 厚朴秦椒 熊膽辛夷 龍膽恒山 楓香脂獺肝 菖蒲熊
杜仲枳實 莽草芍藥
金州獺肝獺肉 枳茹枳實 莽草枳刺 蜀漆恒山

○山南東道

鄧州夜干蜈蚣 甘菊花梔子花 蜥蜴牡荊子 均州萎蕤 荊州橘皮
襄州石龍芮[illegible]鷄頭 藍實橙葉 蜀水花梔子花 茗草蜥蜴 雷丸蜈蚣 陵鯉甲孔公孽 烏梅敗醬 牽牛子貝母 乾白
復州橘皮 峽州杜仲 房州野猪黃狟脂 唐州鹿茸

○淮南道

楊州白芷蛇床子 鹿脂鹿角 壽州光州蘄州黃州舒州石斛並出生 申州白及

○江南東道

潤州續斷鬼臼 貝母半夏 卷柏 越州榧子 劉寄奴

婺州睦州歙州建州並出黃連　泉州乾薑

○江南西道

宣州半夏黃連　饒州黃連　吉州陟釐　江州生石斛

岳州杉木楠木蟬蛻鼈甲　潭州生石斛　朗州牛黃

永州石鷰　郴州鈎樟根　辰州丹砂

○隴右道

秦州防葵狼牙芎藭鹿茸　狼毒蘼蕪　鹿角　成州防葵狼牙

蘭州蓯蓉鹿角膠　武州石膽雌黃　雄黃　廓州大黃

宕州藁本當歸　獨活

○河西道

涼州大黃鹿茸　白附子　甘州椒根　肅州肉蓯蓉百脉根

伊州伏翼葵子　瓜州甘草　西州蒲桃　沙州石膏

○劒南道

益州苧根蜀漆　枇杷葉百兩金　黃環薏苡　鬱金小山　姜黃乾薑　木蘭百部根　沙糖慎火草

眉州巴豆　綿州天雄側子　烏頭甘皮　附子巴戟天　烏喙

資州折傷木　嘉州巴豆紫葛　邛州賣子木　瀘州蒟醬

茂州升麻朴消　羌活大黃　金牙雄黃　芒消礬石　馬齒礬馬牙消

巂州高良薑　松州當州並出當歸　扶州芎藭

龍州側子烏頭　巴戟天烏喙　天雄附子　柘州黃連

○嶺南道

廣州石斛決明子　白藤花甘椒根　丁根　韶州石斛鍾乳　牡桂

賀州梧州象州並出蚺蛇膽　春州封州瀧州並出石斛

恩州蚺蛇膽　桂州滑石蚺蛇膽　柳州桂心　鈎樟根

融州桂心　潘州蚺蛇膽　交州檳榔龍眼　三百兩銀木藍子

峯州豆蔻

馬牙石一名長石一名太乳一名牛腦石出在齊州歷城縣

論曰既知無物非藥及所出土地復採得時須在貯積以供
時急不得虛棄光陰臨事忽遽失其機要使風燭不救實可
悲哉博學者深可思之用爲備耳

用藥處方第四

論曰凡人在身感病無窮而方藥醫療有限由此觀之設藥
方之篇是以依其大意豈能得之萬一聊舉所全以發後學
此篇凡有六十五章總攝衆病善用心者所以觸類長之其
救苦亦以博矣臨事處方可得依之取訣也

治風第一

當歸　秦艽　乾薑　藁本　麻黃
葛根　前胡　知母　石韋　狗脊
萆薢　杜蘅　白薇　白芷　葈耳
女萎　桔梗　大戟　烏頭　烏喙
附子　側子　天雄　躑躅　茵芋
貫衆　白及　蒴藋　藺茹　鬼箭
磁石　石膏　天門冬　萎蕤　白朮
昌蒲　澤瀉　署預　菊花　細辛
獨活　升麻　菴蕳　薏苡　巴戟天
松葉　松節　石南　蜀椒　莽草
防風　王不留行　芎藭　黃耆　杜若
辛夷　牡荊子　五加皮　木蘭　枸杞
竹葉　厚朴　松實　秦皮　牡丹皮
防己　秦椒　女菀　澤蘭　竹瀝
山茱萸　吳茱萸　蒺藜子　曾青　礜石
代赭

濕痺腰脊第二

白膠　阿膠　鹿茸　鹿角　鹿脂
雞頭　蔓荊　竹瀝　肉蓯蓉　防風
芎藭　景天　丹參　絡石　千歲蘽汁
王不留行　山櫻木汁　蛇床　漏蘆　茜根
飛廉　礜石　桔梗　芫花　旋復花
附子　側子　天雄　躑躅　茵芋
當歸　秦艽　芍藥　乾薑　葛根
石龍芮　狗脊　萆薢　菝葜　敗醬
葈耳　白鮮　蠡實　青蘘　大豆卷
石南　蜀椒　蔓荊　皂莢　天門冬
白朮　萎蕤　乾地黃　菖蒲　澤瀉
菊花　署藥　石斛　牛膝　細辛
柴胡　菴藺　薏苡　車前子　柏子仁

菥蓂　蒴藋　桂心　杜仲　乾漆
五加皮　酸棗　枸杞　松子　上寄生
續斷　天名

攣急疼痛第三

秦艽　藁本　狗脊　萆薢　通草
石南　防風　芎藭　續斷　天門冬
女萎　乾地黃　石斛　牛膝　薏苡
菟絲　杜仲　乾漆　荊子　枸杞
大豆卷　天雄　附子　野葛　蒴藋

身瘙痒第四

青琅玕　石灰　丹砂　雄黃　水銀
硫黃　牙子　白及　鐵落　枳實
蒺藜子　莽草　柳花　蜀羊泉　水萍

防風　蘭茹　羊蹄　藎草　敗醬
藜蘆　青葙　青蒿　羖羊角　蟬蛻
秦艽　天鼠矢

驚癇第五

鈆丹　紫石英　白石脂　秦皮　銀屑
玄石　鐵精　鈎藤　款冬花　牡丹皮
白鮮皮　紫菀　女菀　柏子仁　茯苓
茯神　桔梗　蕘花　莨菪子　蛇銜
遠志　人參　細辛　防葵　龍膽
杏仁　龍骨　龍齒　牛黃　頭髮
白芝　龍角　羊齒　羊骨　亂髮
牛齒　白馬莖　白馬齒　赤馬齒　白馬懸蹄
鹿茸　牡狗齒　豚卵　狐五藏　石蚕

海蛤　蚱蟬　露蜂房　白殭蠶　蛇脫
雀甕　蛇黃　鼠婦　蜣蜋　六畜毛蹄甲

鬼魅第六

代赭　粉錫　金牙　衛矛　赤箭
銅鏡鼻　升麻　牛黃　青木香　藍實
蘼蕪　徐長卿　雲實　黃環　狸骨
獺肝　桃花　桃梟　蜈蚣　蛇膽
亭長　芫青　斑猫　石長生　狼毒
鬼臼　商陸　躑躅　白及　野葛
琥珀　六畜毛蹄甲

蠱毒第七

方解石　代赭　金牙　衛矛　赤箭
徐長卿　升麻　瓜蔕　雷丸　紫菀

黃環　青木香　巴豆　麝香　景天
蘘荷　犀角　羚羊角　狏卵　獺肝
狐莖　鸛骨　蜂房　胡鷰屎　鮫魚皮
白頸蚯蚓　蛇蛻　蜈蚣　斑猫　芫青
芫花　藜蘆　野葛　梔子　豬苓
敗鼓皮　桑上亭長　六畜毛蹄甲

痰實第八

淡竹葉　枳實　吳茱萸　厚朴　胡椒
檳榔仁　萊菔　茯苓　恒山　松蘿
旋復花　大黃　芫花　蕘花　半夏
烏頭　黃芩　前胡　巴豆　柴胡
白朮　細辛　朴消　芒消

固冷積聚腹痛腸堅第九

礜石　雄黃　殷孽　厚朴　特生礜石
曾青　戎鹽　硫黃　陽起石　石膏
理石　高良薑　朴消　芫花　桔梗
吳茱萸　葶藶　旋復花　麥門冬　太一餘粮
澤瀉　茯苓　人參　柴胡　蒺藜
雚菌　防葵　牡丹　蕘花　海藻
肉蓯蓉　丹參　巴戟天　莽草　芍藥
烏頭　麻黃　貝母　乾薑　玄參
苦參　藺茹　狼毒　大黃　附子

腹痛脹滿嘔吐第十

厚朴　竹茹　枳實　吳茱萸　檳榔
葛根　桑白皮　松蘿　橘皮　大黃
桔梗　甘遂　乾薑　大戟　藜蘆

半夏　恒山　朴消　生薑　藁本
阿膠　禹餘粮　人參　戎鹽

胷脅滿第十一

方解石　蘭草　杜若　莎草　竹葉
厚朴　枳實　乾薑　前胡　玄參
紫菀　枸杞　桔梗　蕘花　茯苓
芫花　旋復花　射干　烏頭　半夏
恒山　人參　菊花　細辛　柴胡

補五臟第十二

白石脂　五石脂　琥珀　紫菀　石韋
大黃　桔梗　石蜜　龍骨　牛髓
鹿肉　鵝肉　乾漆　柏子仁　女貞
銀屑　沙參　酸棗　五味子　枳實
山茱萸　麥門冬　乾地黃　昌蒲　澤瀉
署藥　人參　石斛　細辛　菥蓂
龍膽　巴戟天　牡丹　韭　貝母
蕪菁　葱白　覆盆　當歸　鍾乳
玄參　苦參

益氣第十三

玉泉　鍾乳　五石脂　白石英　柏子仁
柏葉　蘭草　續斷　茵蔯　黃耆
飛廉　營實　五味子　旋花　澤瀉
署藥　巴戟天　大棗　牡蒙　青蘘
烏麻　枳實　赤箭　蕪菁子　苦菜
蒲桃　覆盆子　芍藥　紫草　淫羊藿
羊肉　桑螵蛸　牛髓　蠟　牛肉

鹿茸　鹿角　猪肚　雲母粉
兎屎　兎肉　戎鹽　石蜜

長陰陽益精氣第十四

羊腎　牛腎　肉蓯蓉　蓬虆　磁石
理石　地膚子　決明子　杜若　白棘
蛇床子　茜根　黑石脂　五味子　天雄
附子　栝樓　玄參　石韋　石龍芮
白薇　萆薢　紫參　麥門冬　遠志
小草　署藥　石斛　牛膝　卷柏
細辛　柴胡　車前子　茺蔚子　菟絲子
巴戟天　茯苓　枸杞　杜仲　丹砂
扁青　雲母　滑石　鍾乳

補骨髓第十五

五石脂　乾漆　金屑　乾地黃　防葵
菟絲子　烏麻　天門冬　青蘘　貝母
淫羊藿　附子　天雄　羊腎　零羊角
磁石

長肌肉第十六

藁本　天門冬　當歸　白馬莖　桑上寄生
冬葵子　白芷　蠡實　垣衣　麥門冬
麻仁　乾地黃　澤瀉　署藥　菟絲子
石斛　甘草　女貞子　五加皮　枳實
胡麻　玉泉　磁石　赤石脂　厚朴
蒲桃　赤箭　五味子　酸棗仁

堅筋骨第十七

玉泉　雲母　杜仲　乾漆　枸杞

硫黃　蔓荊　絡石　礠石　戎鹽

續斷　烏麻　金屑　五加皮　酸棗仁

陰下濕痒第十八

木蘭　槐皮　五加皮　杜仲　蛇床子

漏蘆　飛廉　陽起石

消渴第十九

曾青　滑石　紫石英　白石英　凝水石

丹砂　石膏　理石　竹筍　桑白皮

枸杞根　松脂　茯苓　馬乳　兔骨

紫參　赤小豆　大麥　小麥　澤瀉

菝葜　人參　麥門冬　蕁菜　腐婢

粟米　青粱　甘草　牡蠣　豬肚

雞屎白　雲實　黃連　礜石　栝樓

葛根　玄參　苦參　茅根　竹根

長石　知母　菰根　生葛汁　王瓜

冬瓜　水萍　羊酪

消食第二十

白朮　桔梗　大黃　黃芩　大豆屑熬

穬麥蘖　皂莢　萊菔根　麥門冬　吳茱萸

檳榔　橘皮　小蒜　厚朴　苦參

淋閉第二十一

玉泉　石膽　芒消　茯苓　琥珀

石鷰　瞿麥　胡鷰屎　茅根　鯉魚齒

鬉髮　亂髮　頭垢

利小便第二十二

消石　滑石　紫參　栝樓　百合

白石脂　海藻　揄皮　地膚子　山茱萸
蒲黄　棘人　天門冬　車前子　麻子仁
赤小豆　郁李仁　冬瓜　冬葵子　牽牛子
茅根　葎草　犍牛尿　橘皮　楝實
長石　天名精　苦參　茵陳　秦艽

止小便利第二十三

赤石脂　鈆丹　粉錫　昌蒲　王瓜
栝樓　菝葜　牡蠣　菰根　蘆根
雞腸草　龍骨　鹿茸　鹿角　雞肶胵
山茱萸

明目第二十四

玉泉　丹砂　空青　紫貝　螢火
貝齒　馬珂　石膽　鍾乳　礜石
五石脂　鹵鹹　戎鹽　理石　特生礜石
蔓荊子　桑椹子　梶子　蕤仁　地膚子
鐵精　長石　黄連　景天花　菖蒲
决明子　飛廉　杜若　枳實　秦艽
合歡　秦椒　棘仁　人參　細辛
蓍實　菴蕳　菟絲子　茺蔚子　菥蓂
烏麻　薺子　蕪青子　蓼子　葱子
前胡　玄參　瞿麥　石决明　石龍芮
羚羊角　羖羊角　青牛膽　兎肝　狗脊

止淚第二十五

空青　曾青　蔓荊　蕤仁　緑鹽
苦參　白芷　杜若　菊花　欒花
菥蓂　皂莢　芎藭　决明子　白朮

目赤痛第二十六
空青　車前子　曾青　石膽　礬石
戎鹽　菥蓂　蕤人　薺子　欒花
鯉魚膽　蘗木　石鹽　萎蕤　决明子
益肝膽第二十七
空青　曾青　礜石　酸棗仁　細辛
龍膽　苦參　薺菜　黃連
補養心氣第二十八
紫石英　遠志　羚羊角　人參
補養腎氣第二十九
六畜腎　絡石　澤瀉　石南　萆薢
車前子　狗脊　栗子　沙參　白棘
玄參　黑石脂　磁石　瞿麥　粟米
石斛　鹿茸
補脾第三十
大棗　櫻桃　甘蔗　石蜜
欬逆上氣第三十一
石膽　蘼蕪　蜀椒　款冬　桑根白皮
狼毒　竹葉　女菀　白前　吳茱萸
百部根　當歸　麻黃　貝母　紫菀
白鮮皮　蕘花　藜蘆　烏頭　附子
鬼臼　射干　半夏　蜀漆　昌蒲
遠志　甘草　細辛　防葵　杏仁
桃仁　瓜丁　猯脂肉　牡礪　桂心
白石脂　羊肺　紫石英　鍾乳　硫黃
蒺藜　芫花　五味子　茯苓

下氣第三十二

鉛丹　梅實　蛇床　石韋　水蘇

竹葉　蘇子　薄荷　蒺蔾　秦荻梨

甘草　石斛　細辛　牡荊　枇杷葉

甘蔗　署藥　馬肉　白石英　鹿茸

杏仁　石膏　橘皮　鍾乳　雲母

礜石　胡椒

霍亂轉筋第三十三

木瓜　雞屎白　乾薑　附子　瞿麥

女萎　香薷　藊豆　薄荷　橘皮

人參　桂心　白朮　厚朴

腸痔第三十四

石膽　消石　丹砂　五石脂　水銀

雄黃　殷孽　石硫黃　孔公孽　礠石

蘗木　槐子　桐皮　飛廉　敗醬

露蜂房　鰻鱺魚　蛇脫皮　蠡魚　蝟皮

鼈甲　猪後足懸蹄

鼠漏并痔第三十五

黃耆　續斷　連翹　夏枯草　王不留行

鼠尾草　萹蓄　通草　狼毒　敗醬

桐葉　及己　蛇銜草　側子　地榆

王瓜　昆布　牡蠣　蠡魚　露蜂房

文蛤　龜甲　蝟皮　鼈甲　蚺蛇膽

蛇脫皮　斑猫　虎骨　地膽　猪懸蹄

五石脂　陵鯉甲

三蟲第三十六

粉錫 梓白皮 山茱萸 檳榔 衛矛
蕪荑 天門冬 天名精 桑白皮 乾漆
蔓荊 苦參 蘼蕪 雷丸 特生礜石
楝實 莧實 麝香 通草 白頸蚯蚓
桃仁 桃花 連翹 貫衆 鸛蝨
萹蓄 青葙 雚蘆 牙子 榧實
槲皮 薏苡根
下部䘌第三十七
石硫黃 雄黃 雌黃 苦參 艾葉
大蒜 鹽 馬鞭草 蚺蛇膽
崩中下血第三十八
白瓷屑 伏龍肝 敗船茹 青石脂 衛矛
桃毛 紫葳 蘗木 當歸 桑上寄生

白斂 茅根 牡狗齒 玉泉 鯉魚骨
白殭 龍骨 白膠 阿膠 牛角䚡
陽起石 地榆 生地黃 茜根 白芷
艾葉 景天花 烏賊魚骨 小麥 大小薊根
女人血閉第三十九
銅鏡鼻 銅弩牙 桃仁 茅根 烏賊魚骨
白芷 栝樓 大黃 桑螵蛸 牛角䚡
蠐螬 蝱蟲 䗪蟲 水蛭 芎藭
菴蕳子 陽起石 紫葳 黃芩 巴豆
牛膝 瞿麥 當歸
女人寒熱疝瘕漏下第四十
白堊 乾漆 茯苓 黃耆 蛇牀子
禹餘粮 陽起石 秦椒

産難胞衣不出第四十一

代赭　石鷰　冬葵子　弓弩絃　滑石

蚱蟬　澤瀉　續斷　羖羊角　王不留行

女人陰冷腫痛第四十二

松蘿　白鮮皮　卷柏

陰蝕瘡第四十三

土陰孽　蕳茹　五加皮　黒石脂　礬石

蘗木　桐葉　礜石　石膽　蝦蟆

龜甲　狐莖

傷寒温疫第四十四

犀角屑　羖羊角　徐長卿　麻黄　前胡

生葛汁　葛根　大青　栝樓　柴胡

青木香　吴藍　貝母　玄參　白薇

知母　桂心　芍藥

健忘第四十五

遠志　昌蒲　人參　茯神　蓍實

蕳茹　白馬心　龍膽　龜甲　通草

通九竅第四十六

大棗　芥子　遠志　昌蒲　細辛

蔓荊

下部䘌第四十七

榧實　龍骨　鼠尾草　營實　黄連

黄芩　乾薑　附子　倉米　蜀椒

五石脂　無食子　槲若　地榆　龍膽

黄蘗

虚損洩精第四十八

白棘 韭子 鹿茸 山茱萸 澤瀉

菟絲子 牡蠣 白龍骨

唾粘如膠并唾血第四十九

紫菀 紫參 旋復花 麻黃 茯苓

桂心 槐子 芎藭 乾薑 射干

小麥

吐血第五十

戎鹽 柏葉 水蘇 敗船茹 生地黃汁

竹茹 蠐螬 艾葉 白膠 大小薊根

羚羊角 馬屎

下血第五十一

白瓷屑 伏龍肝 柏葉 青羊脂 艾葉

五石脂 赤箭 天名精 蒲黃 生地黃

黃芩 茜根 敗船茹 水蘇 白膠

馬屎 槲脉

衂血第五十二

亂髮灰 水蘇 紫參 柏葉 王不留行

生地黃汁

尿血第五十三

龍骨 戎鹽 鹿茸 葱涕汁

耳聾第五十四

磁石 昌蒲 山茱萸 烏雞脂 鵝脂

通草 王瓜

止汗第五十五

牡蠣 龍骨 柏實 衛矛

出汗第五十六

山茱萸　細辛　石膏　蜀椒　乾薑
葱白鬚　桂心　葛根　麻黄

堅齒第五十七

桑上寄生　香蒲　蔓荊　秦椒
蜀椒　鼠李根　戎塩

癰腫第五十八

營實　飛廉　蒺藜子　白棘　王不留行
木蘭皮　絡石　紫石英　五石脂　磁石
芍藥　防己　澤蘭　大蒜　連翹
黄耆　白斂　苦參　敗醬　通草
王瓜

惡瘡第五十九

白及　藿蘆　蛇銜　青葙　牙子
狼毒　營實　黄芩　當歸　苦參
萆薢　雌黄　松脂　漏蘆　及已
通草　地榆　蜀羊泉

熱極喘口舌焦乾第六十

石膏　石蜜　麥門冬　栝樓　絡石
杏仁　茯苓　松脂　紫菀　款冬
梅子　大黄　甘草

利血脉第六十一

玉泉　丹砂　空青　長石　芒消
乾地黄　人參　甘草　通草　芍藥
桂心　蜀椒　麻子

失魂魄第六十二

玉泉　丹砂　紫石英　茯神　琥珀

龍骨　人參　牛黃

悅人面第六十三

白瓜子　雄黃　丹砂　落葵子　鹿髓

菌桂　旋復花　麝香　瓜樓

口瘡第六十四

黑石脂　乾地黃　黃連　龍膽　大青

升麻　蘗木　小蘗　苦竹葉　酪

酥　豉　石蜜

脚弱疼冷第六十五

石斛　石鍾乳　穀蘗　孔公蘗　石硫黃

附子　豉　丹參　五加皮　竹瀝

大豆　天雄　側子　木防已　獨活

松節　牛膝

一卷終

千金翼方卷第二

本草上

論曰金石草木自有本經而條例繁富非淺學近識所能悟之忽逢事逼豈假披討所以錄之於卷附之於方使忠臣孝子怱遽之際造次可見故錄之以冠篇首焉

玉石部上品　二十二味

玉泉 味甘平無毒主五藏百病柔筋強骨安魂魄長肌肉益氣利血脉療婦人帶下十二病除氣癃明耳目久服耐寒暑不飢渴不老神仙輕身長年人臨死服五斤死三年色不變

一名玉札生藍田山谷採無時

玉屑 味甘平無毒主除胃中熱喘息煩滿止渴屑如麻豆服之久服輕身長年生藍田採無時

丹砂 味甘微寒無毒主身體五臟百病養精神安魂魄益氣

明目通血脉止煩滿消渴益精神悅澤人面殺精魅邪惡鬼除中惡腹痛毒氣疥瘻諸瘡久服通神明不老輕身神仙能化爲汞作末名眞朱光色如雲母可析者良生符陵山谷採無時

空青 味甘酸寒大寒無毒主青盲耳聾明目利九竅通血脉養精神益肝氣療目赤痛去膚瞖止淚出利水道下乳汁通關節破堅積久服輕身延年不老令人不忘志高神仙能化銅鐵鉛錫作金生益州山谷及越巂山有銅處銅精熏則生空青其腹中空三月中旬採亦無時

綠青 味酸寒無毒主益氣療鼽鼻止洩痢生山之陰穴中色青白

曾青 味酸小寒無毒主目痛止淚出風痺利關節通九竅破癥堅積聚養肝膽除寒熱殺白蟲療頭風腦中寒止煩渴補不足盛陰氣久服輕身不老能化金銅生蜀中山谷及越巂採無時

白青 味甘酸鹹平無毒主明目利九竅耳聾心下邪氣令人吐殺諸毒三蟲久服通神明輕身延年不老可消爲銅劍辟五兵生豫章山谷採無時

扁青 味甘平無毒主目痛明目折跌癰腫金瘡不瘳破積聚解毒氣利精神去寒熱風痺及丈夫莖中百病益精久服輕身不老生朱崖山谷武都朱提採無時

石膽 味酸辛寒有毒主明目目痛金瘡諸癇痓女子陰蝕痛石淋寒熱崩中下血諸邪毒氣令人有子散癥積欬逆上氣及鼠瘻惡瘡鍊餌服之不老久服增壽神仙能化鐵爲銅成金銀一名畢石一名黑石一名碁石一名銅勒生羌道山谷羌里句青山二月庚子辛丑日採

雲母 味甘平無毒主身皮死肌中風寒熱如在車船上除邪
氣安五藏益子精明目下氣堅肌續絶補中療五勞七傷虛
損少氣止痢久服輕身延年悅澤不老耐寒暑志高神仙一
名雲珠色多赤一名雲華五色具一名雲英色多青一名雲
液色多白一名雲砂色青黄一名磷石色正白生太山山谷
齊盧山及琅邪北定山石間二月採

石鍾乳 味甘溫無毒主欬逆上氣明目益精安五臟通百節
利九竅下乳汁益氣補虛損療脚弱疼冷下焦腸竭強陰久
服延年益壽好顔色不老令人有子不鍊服之令人淋一名
公乳一名蘆石一名夏石生少室山谷及太山採無時

朴消 味苦辛寒大寒無毒主百病除寒熱邪氣逐六腑積聚
結固留癖胃中食飲熱結破留血閉絶停痰痞滿推陳致新
能化七十二種石鍊餌服之輕身神仙鍊之白如銀能寒能
熱能滑能濇能辛能苦能鹹能酸入地千歲不變色青白者
佳黄者傷人赤者殺人一名消石朴生益州山谷有鹹水之
陽採無時

消石 味苦辛寒大寒無毒主五臟積熱胃脹閉滌去蓄結飲
食推陳致新除邪氣療五藏十二經脉中百二十疾暴傷寒
腹中大熱止煩滿消渇利小便及瘻蝕瘡鍊之如膏久服輕
身天地至神之物能化成十二種石一名芒消生益州山谷
及武都隴西西羌採無時

芒消 味辛苦大寒主五臟積聚久熱胃閉除邪氣破留血腹
中痰實結搏通經脉利大小便及月水破五淋推陳致新生
於朴消

礬石 味酸寒無毒主寒熱洩痢白沃陰蝕惡瘡目痛堅骨齒
除固熱在骨髓去鼻中息肉鍊餌服之輕身不老增年岐伯

云久服傷人骨能使鐵爲銅一名羽碮一名羽澤生河西山谷及隴西武都石門採無時

滑石 味甘寒大寒無毒主身熱洩澼女子乳難癃閉利小便蕩胃中積聚寒熱益精氣通九竅六腑津液去留結止渴令人利中久服輕身耐飢長年一名液石一名共石一名脫石一名番石生赭陽山谷及太山之陰或掖北白山或卷山採無時

紫石英 味甘辛溫無毒主心腹欬逆邪氣補不足女子風寒在子宮絕孕十年無子療上氣心腹痛寒熱邪氣結氣補心氣不足定驚悸安魂魄塡下焦止消渴除胃中久寒散癰腫令人悅澤久服溫中輕身延年生太山山谷採無時

白石英 味甘辛微溫無毒主消渴陰痿不足欬逆胸膈間久寒益氣除風濕痹療肺痿下氣利小便補五臟通日月光久服輕身長年耐寒熱生華陰山谷及太山大如指長二三寸六面如削白澈有光其黃端白稜名黃石英赤端名赤石英青端名青石英黑端名黑石英二月採亦無時

青石 赤石 黃石 白石 黑石脂 等味甘平主黃疸洩痢腸澼膿血陰蝕下血赤白邪氣癰腫疽痔惡瘡頭瘍疥瘙久服補髓益氣肥健不飢輕身延年五石脂各隨五色補五藏生南山之陽山谷中

青石脂 味酸平無毒主養肝膽氣明目療黃疸洩痢腸澼女子帶下百病及疽痔惡瘡久服補髓益氣不飢延年生齊區山及海崖採無時

赤石脂 味甘酸辛大溫無毒主養心氣明目益精療腹痛洩澼下痢赤白小便利及癰疽瘡痔女子崩中漏下產難胞衣不出久服補髓好顏色益智不飢輕身延年生濟南射陽及

太山之陰採無時

黄石脂 味苦平無毒主養脾氣安五藏調中大人小兒洩痢腸澼下膿血去白蟲除黄疸癰疽蟲久服輕身延年生嵩高山色如鶯雛採無時

白石脂 味甘酸平無毒主養肺氣厚腸補骨髓療五藏驚悸不足心下煩止腹痛下水小腸澼熱溏便膿血女子崩中漏下赤白沃排癰疽瘡痔久服安心不飢輕身長年生太山之陰採無時

黒石脂 味鹹平無毒主養腎氣強陰主陰蝕瘡止腸澼洩痢療口瘡咽痛久服益氣不飢延年一名石涅一名石墨出頳川陽城採無時

太一餘糧 味甘平無毒主欬逆上氣癥瘕血閉漏下除邪氣肢節不利大飽絶力身重久服耐寒暑不飢輕身飛行千里神仙一名石腦生太山山谷九月採

石中黄子 味甘平無毒久服輕身延年不老此禹餘粮殼中未成餘粮黄濁水也出餘糧處有之陶云芝品中有石中黄子非也

禹餘粮 味甘寒平無毒主欬逆寒熱煩滿下赤白血閉癥瘕大熱療小腹痛結煩疼鍊餌服之不飢輕身延年一名白餘粮生東海池澤及山島中或池澤中

玉石部中品二十九品

金屑 味辛平有毒主鎮精神堅骨髓通利五藏除邪毒氣服之神仙生益州採無時

銀屑 味辛平有毒主安五藏定心神止驚悸除邪氣久服輕身長年生永昌採無時

水銀 味辛寒有毒主疥瘻痂瘍白秃殺皮膚中蝨墮胎除熱

以傳男子陰陰消無氣殺金銀銅錫毒鎔化還復爲丹久服
神仙不死一名永生符陵平土出於丹砂

雄黄 味苦甘平寒大温有毒主寒熱鼠瘻惡瘡疽痔死肌療
疥蟲䘌瘡目痛鼻中息肉及絶筋破骨百節中大風積聚癖
氣中惡腹痛鬼疰殺精物惡鬼邪氣百蟲毒勝五兵殺諸虵
虺毒解藜蘆毒悅澤人面鍊食之輕身神仙餌服之皆飛入
人腦中勝鬼神延年益壽保中不飢得銅可作金一名黄食
石生武都山谷燉煌山之陽採無時

雌黄 味辛甘平大寒有毒主惡瘡頭禿痂疥殺毒蟲蝨身痒
邪氣諸毒蝕鼻中息肉下部䘌瘡身面白駮散皮膚死肌及
恍惚邪氣殺蜂蛇毒鍊之久服輕身增年不老令人腦滿生
武都山谷與雄黄同山生其陰 山有金金精熏則生雌黄採
無時

殷孽 味辛温無毒主爛傷瘀血洩痢寒熱鼠瘻癥瘕結氣脚
冷疼弱一名薑石鍾乳根也生趙國山谷又梁山及南海採
無時

孔公孽 味辛温無毒主傷食不化邪結氣惡瘡疽瘻痔利九
竅下乳汁男子陰瘡女子陰蝕及傷食病常欲眠睡一名通
石殷孽根也青黄色生梁山山谷

石腦 味甘温無毒主風寒虚損脚腰疼痺安五藏益氣一名
石飴餅生名山土石中採無時

石硫黄 味酸温大熱有毒主婦人陰蝕疽痔惡血堅筋骨除
頭禿療心腹積聚邪氣冷癖在脅欬逆上氣脚冷疼弱無力
及鼻衄惡瘡下部䘌瘡止血殺疥蟲能化金銀銅鐵奇物生
東海牧羊山谷中及太山河西山礬石液也

陽起石 味鹹微温無毒主崩中漏下破子藏中血癥瘕結氣

寒熱腹痛無子陰痿不起補不足療男子莖頭寒陰下濕痒去臭汗消水腫久服不飢令人有子一名白石一名石生一名羊起石雲母根也生齊山山谷及琅邪或雲山陽起山採無時

凝水石 味辛甘寒大寒無毒主身熱腹中積聚邪氣皮中如火燒煩滿水飲之除時氣熱盛五藏伏熱胃中熱煩滿止渴水腫小腹痺久服不飢一名白水石一名寒水石一名凌水石色如雲母可析者良鹽之精也生常山山谷又水中縣及邯鄲

石膏 味辛甘微寒大寒無毒主中風寒熱心下逆氣驚喘口乾舌焦不能息腹中堅痛除邪鬼産乳金瘡除時氣頭痛身熱三焦大熱皮膚熱腸胃中膈氣解肌發汗止消渴煩逆腹脹暴氣喘息咽熱亦可作浴湯一名細石細理白澤者良黄者令人淋生齊山山谷及齊盧山魯蒙山採無時

慈石 味辛鹹寒無毒主周痺風濕肢節中痛不可持物洗洗酸痟除大熱煩滿及耳聾養腎藏強骨氣益精除煩通關節消癰腫鼠瘻頸核喉痛小兒驚癇鍊水飲之亦令人有子一名玄石一名處石生太山川谷及慈山山陰有鐵處則生其陽採無時

玄石 味鹹溫無毒主大人小兒驚癇女子絶孕小腹冷痛少精身重服之令人有子一名玄水石一名處石生太山之陽山陰有銅銅者雌玄者雄

理石 味辛甘寒大寒無毒主身熱利胃解煩益精明目破積聚去三蟲除營衛中去來大熱結熱解煩毒止消渴及中風痿痺一名立制石一名肌石如石膏順理而細生漢中山谷及盧山採無時

長石 味辛苦寒無毒主身熱胃中結氣四肢寒厥利小便通血脉明目去瞖眇下三蟲殺蠱毒止消渴下氣除脅肋肺間邪氣久服不飢一名方石一名土石一名直石理如馬齒方而潤澤玉色生長子山谷及太山臨淄採無時

膚青 味辛鹹平無毒主蠱毒及蛇菜肉諸毒惡瘡不可久服令人瘦一名推青一名推石生益州川谷

鐵落 味辛甘平無毒主風熱惡瘡瘍疽瘡痂疥氣在皮膚中除胷膈中熱氣食不下止煩去黑子一名鐵液可以染皂生牧羊平澤及祊城或析城採無時

鐵 主堅肌耐痛

生鐵 微寒主療下部及脫肛

鋼鐵 味甘無毒主金瘡煩滿熱中胷膈氣塞食不化一名跳鐵

鐵精 平微溫主明目化銅療驚悸定心氣小兒風癇陰㿉脫肛

光明鹽 味鹹甘平無毒主頭面諸風目赤痛多眵淚生鹽州五原鹽池下鑿取之大者如升皆正方光澈一名石鹽

綠鹽 味鹹苦辛平無毒主目赤淚出膚瞖眵暗

蜜陀僧 味鹹辛平有小毒主久痢五痔金瘡面上瘢䵟面膏藥用之

桃花石 味甘溫無毒主大腸中冷膿血痢久服令人肌熱能食

珊瑚 味甘平無毒主宿血去目中瞖鼻衄末吹鼻中生南海

石花 味甘溫無毒主腰脚風冷與殷孽同一名乳花

石牀 味甘溫無毒酒漬服與殷孽同一名乳牀一名逆石

玉石部下品 三十一味

青琅玕 味辛平無毒主身痒火瘡癰傷白禿疥瘙死肌浸淫在皮膚中煮鍊服之起陰氣可化爲丹一名石珠一名青珠生蜀郡平澤採無時

礜石 味辛甘大熱生溫熟熱有毒主寒熱鼠瘻蝕瘡死肌風痺腹中堅癖邪氣除熱明目下氣除膈中熱止消渴益肝氣破積聚痼冷腹痛去鼻中息肉久服令人筋攣火鍊百日服一刀圭不鍊服則殺人及百獸一名青分石一名立制石一名固羊石一名白礜石一名太白石一名澤乳一名食鹽生漢中山谷及少室採無時

特生礜石 味甘溫有毒主明目利耳腹內絕寒破堅結及鼠瘻殺百蟲惡獸久服延年一名蒼礜石一名鼠毒生西域採無時

握雪礜石 味甘溫無毒主痼冷積聚輕身延年多食令人熱

方解石 味苦辛大寒無毒主胸中留熱結氣黃疸通血脉去蠱毒一名黃石生方山採無時

蒼石 味甘平有毒主寒熱下氣瘻蝕殺禽獸生西域採無時

土陰孽 味鹹無毒主婦人陰蝕大熱乾痂生高山崖上之陰色白如脂採無時

代赭 味苦甘寒無毒主鬼疰賊風蠱毒殺精物惡鬼腹中毒邪氣女子赤沃漏下帶下百病產難胞衣不出墮胎養血氣除五藏血脉中熱血痺血瘀大人小兒驚氣入腹及陰痿不起一名須丸一名血師生齊國山谷赤紅青色如雞冠有染爪甲不渝者良採無時

鹵鹹 味苦鹹寒無毒主大熱消渴狂煩除邪及下蠱毒柔肌膚去五藏腸胃留熱結氣心下堅食已嘔逆喘滿明目目痛生河東鹽池

大鹽 味甘鹹寒無毒主腸胃結熱喘逆胸中病令人吐生邯鄲及河東池澤

戎鹽 味鹹寒無毒主明目目痛益氣堅肌骨去毒蠱心腹痛

溺血吐血齒舌血出一名胡鹽生胡鹽山及西羌北地酒泉
福祿城東南角北海青南海赤十月採

白堊 味苦辛溫無毒主女子寒熱癥瘕月閉積聚陰腫痛漏
下無子洩痢不可久服傷五藏令人羸瘦一名白善生邯鄲
山谷採無時

鉛丹 味辛微寒主吐逆胃反驚癇癲疾除熱下氣止小便利
除毒熱臍攣金瘡溢血鍊化還成九光久服通神明一名鉛
華生於鉛生蜀郡平澤

粉錫 味辛寒無毒主伏尸毒螫殺三蟲去鱉瘕療惡瘡墮胎
止小便利一名解錫

錫銅鏡鼻 主女子血閉癥瘕伏腸絕孕及伏尸邪氣生桂陽
山谷

銅弩牙 主婦人產難血閉月水不通陰陽隔塞

金牙 味鹹無毒主鬼疰毒蠱諸疰生蜀郡如金色者良

石灰 味辛溫主疽瘍疥瘙熱氣惡瘡癩疾死肌墮眉殺痔蟲
去黑子息肉療髓骨疽一名惡灰一名希灰生中山川谷

冬灰 味辛微溫主黑子去肬息肉疽蝕疥瘙一名藜灰生方
谷川澤

鍛竈灰 主癥瘕堅積去邪惡氣

伏龍肝 味辛微溫主婦人崩中吐血止欬逆止血消癰腫毒氣

東壁土 主下部瘡脫肛

紫鉚騏驎竭 味甘鹹平有小毒主五藏邪氣帶下止痛破積
血金瘡生肉與騏驎竭二物大同小異

硇砂 味鹹苦辛溫有毒不宜多服主積聚破結血爛胎止痛
下氣療欬嗽宿冷去惡肉生好肌柔金銀可為銲藥出西戎
形如牙消光淨者良驢馬藥亦用

薑石 味鹹寒無毒主熱豌豆瘡丁毒等腫生土石間狀如薑有五種色白者最良所在有之以爛不磣者好齊州歷城東者良

赤銅屑 以醋和如麥飯袋盛先刺腋下脉出血封之攻腋臭神效又熬使極熱投酒中服五合日三主賊風反折又燒赤銅五斤內酒二斗中百遍服同前主賊風甚驗

銅鑛石 味酸寒有小毒主丁腫惡瘡驢馬脊瘡臭腋石上水磨取汁塗之其丁腫末之傅瘡上良

白瓷瓦屑 平無毒主婦人帶下白崩止嘔吐逆破血止血水磨塗瘡滅瘢定州者良餘皆不如

烏古瓦 寒無毒以水煑及漬汁飲止消渴取屋上年深者良

石燕 以水煑汁飲之主淋有效婦人難産兩手各把一枚立驗出零陵

梁上塵 主腹痛噎中惡鼻衂小兒軟瘡

草部上品之上 四十味

青芝 味酸平主明目補肝氣安精魂仁恕久食輕身不老延年神仙一名龍芝生泰山

赤芝 味苦平主胷腹結益心氣補中增智惠不忘久食輕身不老延年神仙一名丹芝生霍山

黄芝 味甘平主心腹五邪益脾氣安神忠信和樂久食輕身不老延年神仙一名金芝生嵩高山

白芝 味辛平主欬逆上氣益肺氣通利口鼻強志意勇悍安魄久食輕身不老延年神仙一名玉芝生華山

黒芝 味鹹平主癃利水道益腎氣通九竅聰察久食輕身不老延年神仙一名玄芝生常山

紫芝 味甘温主耳聾利關節保神益精氣堅筋骨好顔色久

服輕身不老延年一名木芝生高夏山谷六芝皆無毒六月八月採

赤箭 味辛溫主殺鬼精物蠱毒惡氣消癰腫下支滿疝下血久服益氣力長陰肥健輕身增年一名離母一名鬼督郵生陳倉川谷雍州及太山少室三月四月八月採根暴乾

天門冬 味苦甘平大寒無毒主諸暴風濕偏痺強骨髓殺三蟲去伏尸保定肺氣去寒熱養肌膚益氣力利小便冷而能補久服輕身益氣延年不飢一名顛勒生奉高山谷二月三月七月八月採根暴乾

麥門冬 味甘平微寒無毒主心腹結氣傷中傷飽胃絡脉絕羸瘦短氣身重目黃心下支滿虛勞客熱口乾燥渴止嘔吐愈痿蹷強陰益精消穀調中保神定肺氣安五藏令人肥健美顏色有子久服輕身不老不飢秦名羊韭齊名愛韭楚名馬韭越名羊耆一名禹葭一名禹餘粮葉如韭冬夏長生生函谷川谷及堤坂肥土石間久廢處二月三月八月十月採陰乾

朮 味苦甘溫無毒主風寒濕痺死肌痙疸止汗除熱消食主大風在身面風眩頭痛目淚出消痰水逐皮間風水結腫除心下急滿及霍亂吐下不止利腰臍間血益津液暖胃消穀嗜食作煎餌久服輕身延年不飢一名山薊一名山薑一名山連生鄭山山谷漢中南鄭二月三月八月九月採根暴乾

女萎萎蕤 味甘平無毒主中風暴熱不能動搖跌筋結肉諸不足心腹結氣虛熱濕毒腰痛莖中寒及目痛眥爛淚出久服去面黑皯好顏色潤澤輕身不老一名熒一名地節一名玉竹

黃精 味甘平無毒主補中益氣除風濕安五藏久服輕身延

年不飢一名重樓一名菟竹一名雞格一名救窮一名鹿竹
生山谷二月採根陰乾

乾地黃 味甘苦寒無毒主折跌絶筋傷中逐血痺塡骨髓長
肌肉作湯除寒熱積聚除痺主男子五勞七傷女子傷中胞
漏下血破惡血溺血利大小腸去胃中宿食飽力斷絶補五
藏内傷不足通血脉益氣力利耳目生者尤良

生地黃 大寒主婦人崩中血不止及産後血上薄心悶絶傷
身胎動下血胎不落墮墜踠折瘀血留血衂鼻吐血皆擣飲
之久服輕身不老一名地髓一名芐一名芑生咸陽川澤黃
土地者佳二月八月採根陰乾

昌蒲 味辛溫無毒主風寒濕痺欬逆上氣開心孔補五藏通
九竅明耳目出音聲主耳聾癰瘡溫腸胃止小便利四肢濕
痺不得屈伸小兒溫瘧身積熱不解可作浴湯久服輕身聰
耳明目不忘不迷惑延年益心智高志不老一名昌陽生上
洛池澤及蜀郡嚴道一寸九節者良露根不可用五月十二
月採根陰乾

遠志 味苦溫無毒主欬逆傷中補不足除邪氣利九竅益智
惠耳目聰明不忘強志倍力利丈夫定心氣止驚悸益精去
心下膈氣皮膚中熱面目黃久服輕身不老好顔色延年葉
名小草主益精補陰氣止虛損夢洩一名棘菀一名葽繞一
名細草生太山及寃句川谷四月採根葉陰乾

澤瀉 味甘鹹寒無毒主風寒濕痺乳難消水養五藏益氣力
肥健補虛損五勞除五藏痞滿起陰氣止洩精消渴淋瀝逐
膀胱三膲停水久服耳目聰明不飢延年輕身面生光能行
水上扁鵲云多服病人眼一名水瀉一名及瀉一名芒芋一
名鵠瀉生汝南池澤五月六月八月採根陰乾

葉 味鹹無毒主大風乳汁不出產難強陰氣久服輕身五月採

實 味甘無毒主風痺消渴益腎氣強陰補不足除邪濕久服面生光令人無子九月採

署預 味甘溫平無毒主傷中補虛羸除寒熱邪氣補中益氣力長肌肉主頭面遊風風頭眼眩下氣止腰痛補虛勞羸瘦充五藏除煩熱強陰久服耳目聰明輕身不飢延年一名山芋秦楚名玉延鄭越名土諸生嵩高山谷二月八月採根暴乾

菊花 味苦甘平無毒主風頭頭眩腫痛目欲脫淚出皮膚死肌惡風濕痺療腰痛去來陶陶除胷中煩熱安腸胃利五脉調四肢久服利血氣輕身耐老延年一名節華一名日精一名女節一名女華一名女莖一名更生一名周盈一名傳延年一名陰成生雍州川澤及田野正月採根三月採葉五月採莖九月採花十一月採實皆陰乾

甘草 味甘平無毒主五藏六腑寒熱邪氣堅筋骨長肌肉倍力金瘡尰解毒溫中下氣煩滿短氣傷藏欬嗽止渴通經脉利血氣解百藥毒為九土之精安和七十二種石一千二百種草久服輕身延年一名蜜甘一名美草一名蜜草一名蕗草生河西川谷積沙山及上郡二月八月除日採根暴乾十日成

人參 味甘微寒微溫無毒主補五藏安精神定魂魄止驚悸除邪氣明目開心益智療腸胃中冷心腹鼓痛胷脅逆滿霍亂吐逆調中止消渴通血脉破堅積令人不忘久服輕身延年一名人銜一名鬼蓋一名神草一名人微一名土精一名血參如人形者有神生上黨山谷及遼東二月四月八月上旬採根竹刀刮暴乾無令見風

石斛 味甘平無毒主傷中除痺下氣補五藏虛勞羸瘦強陰

益精補內絕不足平胃氣長肌肉逐皮膚邪熱痱氣脚膝疼冷痺弱久服厚腸胃輕身延年定志除驚一名林蘭一名禁生一名杜蘭一名石遂生六安山谷水傍石上七月八月採莖陰乾

牛膝 爲君味苦酸平無毒主寒濕痿痺四肢拘攣膝痛不可屈伸逐血氣傷熱火爛墮胎療傷中少氣男子陰消老人失溺補中續絕塡骨髓除腦中痛及腰脊痛婦人月水不通血結益精利陰氣止髮白久服輕身耐老一名百倍生河內川谷及臨朐二月八月十月採根陰乾

卷柏 味辛甘溫平微寒無毒主五藏邪氣女子陰中寒熱痛癥瘕血閉絕子止欬逆治脫肛散淋結頭中風眩痿蹷強陰益精久服輕身和顏色令人好容體一名萬歲一名豹足一名求股一名交時生常山山谷石間五月七月採陰乾

細辛 味辛溫無毒主欬逆頭痛腦動百節拘攣風濕痺痛死肌溫中下氣破痰利水道開胷中除喉痺齆鼻風癎癲疾下乳結汁不出血不行安五藏益肝膽通精氣久服明目利九竅輕身長年一名小辛生華陰山谷二月八月採根陰乾

獨活 味苦甘平微溫無毒主風寒所擊金瘡止痛賁豚癎痓女子疝瘕療諸賊風百節痛風無久新者久服輕身耐老一名羌活一名羌青一名護羌使者一名胡王使者一名獨搖草此草得風不搖無風自動生雍州川谷或隴西南安二月八月採根暴乾

升麻 味甘苦平微寒無毒主解百毒殺百精老物殃鬼辟溫疫瘴氣邪氣蠱毒入口皆吐出中惡腹痛時氣毒癘頭痛寒熱風腫諸毒喉痛口瘡久服不夭輕身長年一名周麻生益州山谷二月八月採根日乾

茈胡爲君味苦平微寒無毒主心腹去腸胃中結氣飲食積
聚寒熱邪氣推陳致新除傷寒心下煩熱諸痰熱結實胷中
邪逆五藏間遊氣大腸停積水脹及濕痺拘攣亦可作浴湯
久服輕身明目益精一名地薰一名山茱一名茹草葉名芸
蒿辛香可食生弘農川谷及宛句二月八月採根暴乾
防葵味辛甘苦寒無毒主疝瘕腸洩膀胱熱結溺不下欬逆
温瘧癲癇驚邪狂走療五藏虛氣小腹支滿臚脹口乾除腎
邪強志久服堅骨髓益氣輕身中火者不可服令人恍惚見
鬼一名梨蓋一名房慈一名爵離一名農果一名利茹一名
方蓋生臨淄川谷及嵩高太山少室三月三日採根暴乾
蓍實味苦酸平無毒主益氣充肌膚明目聰慧先知久服不
飢不老輕身生少室山谷八月九月採實日乾
菴䕡子味苦微寒微温無毒主五藏瘀血腹中水氣臚脹留
熱風寒濕痺身體諸痛療心下堅膈中寒熱周痺婦人月水
不通消食明目久服輕身延年不老駏驉食之神仙生雍州
川谷亦生上黨及道邊十月採實陰乾
薏苡仁味甘微寒無毒主筋急拘攣不可屈伸風濕痺下氣
除筋骨邪氣不仁利腸胃消水腫令人能食久服輕身益氣
其根下三蟲一名解蠡一名屋菼一名起實一名贛生眞定
平澤及田野八月採實採根無時
車前子味甘鹹寒無毒主氣癃止痛利水道小便除濕痺男
子傷中女子淋瀝不欲食養肺強陰益精令人有子明目療
赤痛久服輕身耐老
葉及**根**味甘寒主金瘡止血衂鼻瘀血血瘕下血小便赤止
煩下氣除小蟲一名當道一名芣苢一名蝦蟇衣一名牛遺
一名勝舄生眞定平澤丘陵阪道中五月五日採陰乾

菥蓂子 味辛微温無毒主明目目痛淚出除痺補五藏益精
光療心腹腰痛久服輕身不老一名蔑菥一名大戢一名馬
辛一名大蕺生咸陽川澤及道傍四月五月採暴乾
茺蔚子 味辛甘微温微寒無毒主明目益精除水氣療血逆
大熱頭痛心煩久服輕身
莖 主癮疹上音隱下音軫痒可作浴湯一名益母一名益明一名大
札一名貞蔚生海濱池澤五月採
木香 味辛温無毒主邪氣辟毒疫温鬼强志主淋露療氣劣
肌中偏寒主氣不足消毒殺鬼精物温瘧蠱毒行藥之精久
服不夢寤魘寐輕身致神仙一名蜜香生永昌山谷
龍膽 味苦寒大寒無毒主骨間寒熱驚癇邪氣續絶傷定五
藏殺蠱毒除胃中伏熱時氣温熱熱泄下痢去腸中小蟲益
肝膽氣止驚惕久服益智不忘輕身耐老一名陵游生齊朐

山谷及寃句二月八月十一月十二月採根陰乾
菟絲子 味辛甘平無毒主續絶傷補不足益氣力肥健汁去
面䵟養肌强陰堅筋骨主莖中寒精自出溺有餘瀝口苦燥
渴寒血為積久服明目輕身延年一名菟蘆一名菟縷一名
蓎蒙一名玉女一名赤網一名菟纍生朝鮮川澤田野蔓延
草木之上色黄而細為赤網色淺而大為菟纍九月採實暴乾
巴戟天 味辛甘微温無毒主大風邪氣陰痿不起强筋骨安
五藏補中增志益氣療頭面遊風小腹及陰中相引痛下氣
補五勞益精利男子生巴郡及下邳山谷二月八月採根陰乾
白英 味甘寒無毒主寒熱八疸消渴補中益氣久服輕身延
年一名穀菜一名白草生益州山谷春採葉夏採莖秋採花
冬採根
白蒿 味甘平無毒主五藏邪氣風寒濕痺補中益氣長毛髮

令黑療心懸少食常飢久服輕身耳目聰明不老

草部上品之下　三十八味

肉蓯蓉 味甘酸鹹微溫無毒主五勞七傷補中除莖中寒熱痛養五藏強陰益精氣多子婦人癥瘕除膀胱邪氣腰痛止痢久服輕身生河西山谷及代郡鴈門五月五日採陰乾

地膚子 味苦寒無毒主膀胱熱利小便補中益精氣去皮膚中熱氣散惡瘡疝瘕強陰久服耳目聰明輕身耐老使人潤澤一名地葵一名地麥生荊州平澤及田野八月十日採實陰乾

忍冬 味甘溫無毒主寒熱身腫久服輕身長年益壽十二月採陰乾

蒺梨子 味苦辛溫微寒無毒主惡血破癥結積聚喉痺乳難身體風癢頭痛欬逆傷肺肺痿止煩下氣小兒頭瘡癰腫陰㿉可作摩粉其葉主風瘙可煮以浴久服長肌肉明目輕身一名旁通一名屈人一名止行一名犲羽一名升推一名即棃一名茨生馮翊平澤或道傍七月八月採實暴乾

防風 味甘辛溫無毒主大風頭眩痛惡風風邪目盲無所見風行周身骨節疼痺煩滿脅痛脅風頭面去來四肢攣急字乳金瘡內痙久服輕身葉主中風熱汗出一名銅芸一名茴草一名百枝一名屏風一名蕳根一名百蜚生沙苑川澤及邯鄲琅邪上蔡二月十月採根暴乾

石龍芻 味苦微寒微溫無毒主心腹邪氣小便不利淋閉風濕鬼疰惡毒補內虛不足痞滿身無潤澤出汗除莖中熱痛殺鬼疰惡毒氣久服補虛羸輕身耳目聰明延年一名龍鬚一名草續斷一名龍朱一名龍華一名懸莞一名草毒九節多味者良生梁州山谷濕地五月七月採莖暴乾

絡石味苦溫微寒無毒主風熱死肌癰傷口乾舌焦癰腫不消喉舌腫不通水漿不下大驚入腹除邪氣養腎主腰髖痛堅筋骨利關節久服輕身明目潤澤好顏色不老延年通神一名石鯪一名石磋一名略石一名明石一名領石一名懸石生太山川谷或石山之陰或高山巖石上或生人間正月採

千歲虆汁味甘平無毒主補五臟益氣續筋骨長肌肉去諸痺久服輕身不飢耐老通神明一名虆蕪生太山川谷

黃連味苦寒微寒無毒主熱氣目痛眥傷泣出明目腸澼腹痛下痢婦人陰中腫痛五臟冷熱久下洩澼膿血止消渴大驚除水利骨調胃厚腸益膽療口瘡久服令人不忘一名王連生巫陽川谷及蜀郡太山二月八月採

沙參味苦微寒無毒主血積驚氣除寒熱補中益肺氣療胃痺心腹痛結熱邪氣頭痛皮間邪熱安五藏補中久服利人一名知母一名苦心一名志取一名虎鬚一名白參一名識美一名文希生河內川谷及寃句般陽續山二月八月採根暴乾

丹參味苦微寒無毒主心腹邪氣腸鳴幽幽如走水寒熱積聚破癥除瘕止煩滿益氣養血去心腹痼疾結氣腰脊強腳痺除風邪留熱久服利人一名郄蟬草一名赤參一名木羊乳生桐柏山川谷及太山五月採根暴乾

王不留行味苦甘平無毒主金瘡止血逐痛出刺除風痺內寒止心煩鼻衄癰疽惡瘡瘻乳婦人產難久服輕身耐老增壽生太山山谷二月八月採

藍實味苦寒無毒主解諸毒殺蠱蚑疰鬼螫毒久服頭不白輕身其葉汁殺百藥毒解狼毒射罔毒其莖葉可以染青生河內平澤

景天 味苦酸平無毒主大熱火瘡身熱煩邪惡氣諸蠱毒痂疕寒熱風痺諸不足花主女人漏下赤白輕身明目久服通神不老一名戒火一名火母一名救火一名據火一名慎火生太山川谷四月四日七月七日採陰乾

天名精 味甘寒無毒主瘀血血瘕欲死下血止血利小便除小蟲去痺除胷中結熱止煩渴逐水大吐下久服輕身耐老一名麥句薑一名蝦蟇藍一名豕首一名天門精一名玉門精一名彘顱一名蟾蜍蘭一名覲生平原川澤五月採

蒲黃 味甘平無毒主心腹膀胱寒熱利小便止血消瘀血久服輕身益氣力延年神仙生河東池澤四月採

香蒲 味甘平無毒主五藏心下邪氣口中爛臭堅齒明目聰耳久服輕身耐老一名睢一名醮生南海池澤

蘭草 味辛平無毒主利水道殺蠱毒辟不祥除胷中痰澼久服益氣輕身不老通神明一名水香生大吳池澤四月五月採

決明子 味鹹苦甘平微寒無毒主青盲目淫膚赤白膜眼赤痛淚出療脣口青久服益精光輕身生龍門川澤石決明生豫章十月十日採陰乾百日

芎藭 味辛溫無毒主中風入腦頭痛寒痺筋攣緩急金瘡婦人血閉無子除腦中冷動面上遊風去來目淚出多涕唾忽忽如醉諸寒冷氣心腹堅痛中惡卒急腫痛脅風痛溫中內寒一名胡窮一名香果其葉名蘼蕪生武功川谷斜谷西嶺三月四月採根暴乾

蘼蕪 味辛溫無毒主欬逆定驚氣辟邪惡除蠱毒鬼疰去三蟲久服通神主身中老風頭中久風風眩一名薇蕪一名江蘺芎藭苗也生雍州川澤及寃句四月五月採葉暴乾

續斷 味苦辛微溫無毒主傷寒補不足金瘡癰傷折跌續筋

骨婦人乳難崩中漏血金瘡血內漏止痛生肌肉及跌傷惡血腰痛關節緩急久服益氣力一名龍豆一名屬折一名接骨一名南草一名槐生常山山谷七月八月採陰乾

雲實味辛苦溫無毒主洩痢腸澼殺蟲蠱毒去邪惡結氣止痛除寒熱消渴花主見鬼精物多食令人狂走殺精物下水燒之致鬼久服輕身通神明益壽一名員實一名雲英一名天豆生河間川谷十月採暴乾

黃耆味甘微溫無毒主癰疽久敗瘡排膿止痛大風癩疾五痔鼠瘻補虛小兒百病婦人子藏風邪氣逐五藏間惡血補丈夫虛損五勞羸瘦止渴腹痛洩痢益氣利陰氣生白水者冷補其莖葉療渴及筋攣癰腫疽瘡一名戴糝一名戴椹一名獨椹一名芰草一名蜀脂一名百本生蜀郡山谷白水漢中二月十日採陰乾

徐長卿味辛溫無毒主鬼物百精蠱毒疫疾邪惡氣溫瘧久服強悍輕身益氣延年一名鬼督郵生太山山谷及隴西三月採

杜若味辛微溫無毒主胷脅下逆氣溫中風入腦戶頭腫痛多涕淚出眩倒目䀮䀮止痛除口臭氣久服益精明目輕身令人不忘一名杜蘅一名杜連一名白連一名白芩一名若芝生武陵川澤及冤句二月八月採根暴乾

蛇床子味苦辛甘平無毒主婦人陰中腫痛男子陰痿濕癢除痺氣利關節癲癇惡瘡溫中下氣令婦人子藏熱男子陰強久服輕身好顏色令人有子一名蛇粟一名蛇米一名虺床一名思益一名繩毒一名棗棘一名牆蘼生臨淄川谷及田野五月採實陰乾

茵蔯蒿味苦平微寒無毒主風濕寒熱邪氣熱結黃疸通身

發黃小便不利除頭𩑶去伏瘕久服輕身益氣耐老面白悅
長年白兎食之仙生太山及丘陵坂岸上五月及立秋採陰乾
漏蘆味苦鹹寒大寒無毒主皮膚熱惡瘡疽痔濕痺下乳汁
止遺溺熱氣瘡癢如麻豆可作浴湯久服輕身益氣耳目聰
明不老延年一名野蘭生喬山山谷八月採根陰乾
茜根味苦寒無毒主寒濕風痺黃疸補中止血內崩下血膀
胱不足踒跌蠱毒久服益精氣輕身可以染絳一名地血一
名茹藘一名茅蒐一名蒨生喬山川谷二月三月採根暴乾
飛廉味苦平無毒主骨節熱脛重酸疼頭眩頂重皮間邪風
如蜂螫針刺魚子細起熱瘡癰疽痔濕痺止風邪欬嗽下乳
汁久服令人身輕益氣明目不老可煑可乾一名漏蘆一名
天薺一名伏猪一名飛輕一名伏兎一名飛雉一名木禾生
河內川澤正月採根七月八月採花陰乾

營實味酸溫微寒無毒主癰疽惡瘡結肉跌筋敗瘡熱氣陰
蝕不瘳利關節久服輕身益氣根止洩痢腹痛五藏客熱除
邪逆氣疽癩諸惡瘡金瘡傷撻生肉復肌一名牆薇一名牆
麻一名牛棘一名牛勒一名薔蘼一名山棘生零陵川谷及
蜀郡八月九月採陰乾
薇銜味苦平微寒無毒主風濕痺歷節痛驚癇吐舌悸氣賊
風鼠瘻癰腫暴癥逐水療痿蹷久服輕身明目一名麋銜一
名承膏一名承肌一名無心一名無顛生漢中川澤及寃句
邯鄲七月採莖葉陰乾
五味子味酸溫無毒主益氣欬逆上氣勞傷羸瘦補不足強
陰益男子精養五藏除熱生陰中肌一名會及一名玄及生
齊山山谷及代郡八月採實陰乾
旋花味甘溫無毒主益氣去面皯黒色媚好其根味辛主腹

中寒熱邪氣利小便久服不飢輕身一名筋根花一名金沸一名美草生豫州平澤五月採陰乾

白兔藿 味苦平無毒主蛇虺蜂蠆猘狗菜肉蠱毒鬼疰風疰諸大毒不可入口者皆消除之又去血可末著痛上立消毒入腹者煑飲之即解一名白葛生交州山谷

鬼督郵 味辛苦平無毒主鬼疰卒忤中惡心腹邪氣百精毒温瘧疫疾強腰脚益膂力一名獨搖草

白花藤 味苦寒無毒主解諸藥菜肉中毒酒漬服之主虛勞風勢生嶺南交州廣州平澤

草部中品之上　三十七味

當歸 味甘辛温大温無毒主欬逆上氣温瘧寒熱洗洗在皮膚中婦人漏下絶子諸悪瘡瘍金瘡煑飲之温中止痛除客血内塞中風痓汗不出濕痺中悪客氣虛冷補五藏生肌肉一名乾歸生隴西川谷二月八月採根陰乾

秦膠 味苦辛平微温無毒主寒熱邪氣寒濕風痺肢節痛下水利小便療風無問久新通身攣急生飛烏山谷二月八月採根暴乾

黄芩 味苦平大寒無毒主諸熱黄疸腸澼泄痢逐水下血閉悪瘡疽蝕火瘍療痰熱胃中熱小腹絞痛消穀利小腸女子血閉淋露下血小兒腹痛一名腐腸一名空腸一名内虛一名黄文一名經芩一名妬婦其子主腸澼膿血生秭歸川谷及宽句三月三日採根陰乾

芍藥 味苦酸平微寒有小毒主邪氣腹痛除血痺破堅積寒熱疝瘕止痛利小便益氣通順血脉緩中散悪血逐賊血去水氣利膀胱大小腸消癰腫時行寒熱中悪腹痛腰痛一名白朮一名餘容一名犁食一名解倉一名鋌生中岳川谷及

丘陵二月八月採根暴乾

乾薑 味辛溫大熱無毒主胸滿欬逆上氣溫中止血出汗逐風濕痺腸澼下痢寒冷腹痛中惡霍亂脹滿風邪諸毒皮膚間結氣止唾血生者尤良

生薑 味辛微溫主傷寒頭痛鼻塞欬逆上氣止嘔吐久服去臭氣通神明生犍為川谷及荊州揚州九月採

藁本 味辛苦溫微溫微寒無毒主婦人疝瘕陰中寒腫痛腹中急除風頭痛長肌膚悅顏色辟霧露潤澤療風邪嚲曳金瘡可作沐藥面脂實主風流四肢一名鬼卿一名地新一名微莖生崇山山谷正月二月採乾暴乾三十日成

麻黃 味苦溫微溫無毒主中風傷寒頭痛溫瘧發表出汗去邪熱氣止欬逆上氣除寒熱破癥堅積聚五藏邪氣緩急風脅痛字乳餘疾止好唾通腠理疎傷寒頭疼解肌洩邪惡氣消赤黑斑毒不可多服令人虛一名卑相一名龍沙一名卑鹽生晉地及河東立秋採莖陰乾令青

葛根 味甘平無毒主消渴身大熱嘔吐諸痺起陰氣解諸毒療傷寒中風頭痛解肌發表出汗開腠理療金瘡止痛脅風痛生根汁大寒療消渴傷寒壯熱葛穀主下痢十歲已上白葛燒以粉瘡止痛斷血葉主金瘡止血花主消酒一名雞齊根一名鹿藿一名黃斤生汶山川谷五月採根暴乾

前胡 味苦微寒無毒主療痰滿胸脅中痞心腹結氣風頭痛去痰實下氣治傷寒寒熱推陳致新明目益精二月八月採根暴乾

知母 味苦寒無毒主消渴熱中除邪氣肢體浮腫下水補不足益氣療傷寒久瘧煩熱脅下邪氣膈中惡及風汗內疸多服令人洩一名蚳母一名連母一名野蓼一名地參一名水

參一名水浚一名貨母一名蝭母一名女雷一名女理一名兒草一名鹿列一名韭逢一名兒踵草一名東根一名水須一名沈燔一名薚生河內川谷二月八月採根暴乾

大青 味苦大寒無毒主療時氣頭痛大熱口瘡三月四月採莖陰乾

貝母 味辛苦平微寒無毒主傷寒煩熱淋瀝邪氣疝瘕喉痹乳難金瘡風痙療腹中結實心下滿洗洗惡風寒目眩項直欬嗽上氣止煩熱渴出汗安五臟利骨髓一名空草一名藥實一名苦花一名苦菜一名商草一名勒母生晉地十月採根暴乾

栝樓根 味苦寒無毒主消渴身熱煩滿大熱補虛安中續絕傷除腸胃中痼熱八疸身面黃脣乾口燥短氣通月水止小便利一名地樓一名果蓏一名天瓜一名澤姑實名黃瓜主胸痹悅澤人面莖葉療中熱傷暑生弘農川谷及山陰地入土深者良生鹵地者有毒二月八月採根暴乾三十日成

玄參 味苦鹹微寒無毒主腹中寒熱積聚女子產乳餘疾補腎氣令人目明主暴中風傷寒身熱支滿狂邪忽忽不知人溫瘧洒洒血瘕下寒血除胸中氣下水止煩渴散頸下核癰腫心腹痛堅癥定五臟久服補虛明目強陰益精一名重臺一名玄臺一名鹿腸一名正馬一名咸一名端生河間川谷及冤句三月四月採根暴乾

苦參 味苦寒無毒主心腹結氣癥瘕積聚黃疸溺有餘瀝逐水除癰腫補中明目止淚養肝膽氣安五藏定志益精利九竅除伏熱腸澼止渴醒酒小便黃赤療惡瘡下部䘌平胃氣令人嗜食輕身一名水槐一名苦識一名地槐一名菟槐一名橋槐一名白莖一名虎麻一名祿莖一名祿白一名陵

郎生汝南山谷及田野二月八月十月採根暴乾

石龍芮 味苦平無毒主風寒濕痺心腹邪氣利關節止煩滿平腎胃氣補陰氣不足失精莖冷久服輕身明目不老令人皮膚光澤有子一名魯果能一名地椹一名石能一名彭根一名天豆生太山川澤石邊五月五日採子二月八月採皮陰乾

石韋 味苦甘平無毒主勞熱邪氣五癃閉不通利小便水道止煩下氣通膀胱滿補五勞安五藏去惡風益精氣一名石韉一名石皮用之去黃毛毛射人肺令人欬不可療生華陰山谷石上不聞水及人聲者良二月採葉陰乾

狗脊 味苦甘平微溫無毒主腰背強關機緩急周痺寒濕膝痛頗利老人療失溺不節男子腳弱腰痛風邪淋露少氣目闇堅脊利俛仰女子傷中關節重一名百枝一名強膂一名扶蓋一名扶筋生常山川谷二月八月採根暴乾

萆解 味苦甘平無毒主腰背痛強骨節風寒濕周痺惡瘡不瘳熱氣傷中恚怒陰痿失溺關節老血老人五緩一名赤節生眞定山谷二月八月採根暴乾

菝葜 味甘平溫無毒主腰背寒痛風痺益血氣止小便利生山野二月八月採根暴乾

通草 味辛甘平無毒主去惡蟲除脾胃寒熱通利九竅血脈關節令人不忘療脾疸常欲眠心煩噦出音聲療耳聾散癰腫諸結不消及金瘡惡瘡鼠瘻踒折齆鼻息肉墮胎去三蟲一名附支一名丁翁生石城山谷及山陽正月採枝陰乾

瞿麥 味苦辛寒無毒主關格諸癃結小便不通出刺決癰腫明目去翳破胎墮子下閉血養腎氣逐膀胱邪逆止霍亂長毛髮一名巨句麥一名大菊一名大蘭生太山川谷立秋採

實陰乾

【敗醬】味苦鹹平微寒無毒主暴熱火瘡赤氣疥瘙疽痔馬鞍熱氣除癰腫浮腫結熱風痹不足產後腹痛一名鹿腸一名鹿首一名馬草一名澤敗生江夏川谷八月採根暴乾

【白芷】味辛溫無毒主女人漏下赤白血閉陰腫寒熱風頭侵目淚出長肌膚潤澤可作面脂療風邪久渴吐嘔兩脅滿風痛頭眩目癢可作膏藥面脂潤顏色一名芳香一名白茝一名虈一名莞一名苻蘺一名澤芬葉名蒚麻可作浴湯生河東川谷下澤二月八月採根暴乾

【杜衡】味辛溫無毒主風寒欬逆香人衣體生山谷三月三日採根熟洗暴乾

【紫草】味苦寒無毒主心腹邪氣五疸補中益氣利九竅通水道療腹腫脹滿痛以合膏療小兒瘡及面皶一名紫丹一名紫芙生碭山山谷及楚地三月採根陰乾

【紫菀】味苦辛溫無毒主欬逆上氣胸中寒熱結氣去蠱毒痿蹷安五藏療欬唾膿血止喘悸五勞體虛補不足小兒驚癇一名紫蒨一名青菀生房陵山谷及真定邯鄲二月三月採根陰乾

【白鮮】味苦鹹寒無毒主頭風黃疸欬逆淋瀝女子陰中腫痛濕痺死肌不可屈伸起止行步療四肢不安時行腹中大熱飲水欲走大呼小兒驚癇婦人產後餘痛生上谷川谷及冤句四月五月採根陰乾

【白薇】味苦鹹平大寒無毒主暴中風身熱支滿忽忽不知人狂惑邪氣寒熱酸疼溫瘧洗洗發作有時療傷中淋露下水氣利陰氣益精一名白幕一名薇草一名春草一名骨美久服利人生平原川谷三月三日採根陰乾

枲耳實 味甘苦溫葉味苦辛微寒有小毒主風頭寒痛風濕周痺四肢拘攣痛惡肉死肌膝痛溪毒久服益氣耳目聰明強志輕身一名胡枲一名地葵一名葹一名常思生安陸川谷及六安田野實熟時採

茅根 味甘寒無毒主勞傷虛羸補中益氣除瘀血血閉寒熱利小便下五淋除客熱在腸胃止渴堅筋婦人崩中久服利人其苗主下水一名蘭根一名茹根一名地菅一名地筋一名兼杜生楚地山谷田野六月採根

百合 味甘平無毒主邪氣腹脹心痛利大小便補中益氣除浮腫臚脹痞滿寒熱通身疼痛及乳難喉痺腫止涕淚一名重箱一名重邁一名摩羅一名中逢花一名強瞿生荆州川谷二月八月採根暴乾

酸漿 味酸平寒無毒主熱煩滿定志益氣利水道産難吞其實立產一名醋漿生荆楚川澤及人家田園中五月採陰乾

紫參 味苦辛寒微寒無毒主心腹積聚寒熱邪氣通九竅利大小便療腸胃大熱唾血衄血腸中聚血癰腫諸瘡止渴益精一名牡蒙一名衆戎一名童腸一名馬行生河西及冤句山谷三月採根火炙使紫色

女萎 味辛溫主風寒洒洒霍亂泄痢腸鳴遊氣上下無常驚癇寒熱百病出汗李氏本草云止下消食

淫羊藿 味辛寒無毒主陰痿絕傷莖中痛利小便益氣力強志堅筋骨消瘰癧赤癰下部有瘡洗出蟲丈夫久服令人無子一名剛前生上郡陽山山谷

蠡實 味甘平溫無毒主皮膚寒熱胃中熱氣風寒濕痺堅筋骨令人嗜食止心煩滿利大小便長肌肉肥大久服輕身花葉去白蟲療喉痺多服令人溏泄一名荔實一名劇草一名

三堅一名豕首生河東川谷五月採實陰乾

草部中品之下　三十九味

款冬 味辛甘溫無毒主欬逆上氣善喘喉痺諸驚癇寒熱邪氣消渴喘息呼吸一名橐吾一名顆東一名虎鬚一名菟奚一名氐冬生常山山谷及上黨水傍十一月採花陰乾

牡丹 味辛苦寒微寒無毒主寒熱中風瘈瘲痙驚癇邪氣除癥堅瘀血留舍腸胃安五藏療癰瘡除時氣頭痛客熱五勞勞氣頭腰痛風噤癲疾一名鹿韭一名鼠姑生巴郡山谷及漢中二月八月採根陰乾

防己 味辛苦平溫無毒主風寒溫瘧熱氣諸癇除邪利大小便療水腫風腫去膀胱熱傷寒寒熱邪氣中風手脚攣急止洩散癰腫惡結諸蝸疥癬蟲瘡通腠理利九竅一名解離文如車輻理解者良生漢中川谷二月八月採根陰乾

女菀 味辛溫無毒主風寒洗洗霍亂洩痢腸鳴上下無常處驚癇寒熱百疾療肺傷欬逆出汗久寒在膀胱支滿飲酒夜食發病一名白菀一名織女菀一名茆生漢中川谷或山陽正月二月採陰乾

澤蘭 味苦甘微溫無毒主乳婦內衄中風餘疾大腹水腫身面四肢浮腫骨節中水金瘡癰腫瘡膿產後金瘡內塞一名虎蘭一名龍棗一名虎蒲生汝南諸大澤傍三月三日採陰乾

地榆 味苦甘酸微寒無毒主婦人乳痓痛七傷帶下十二病止痛除惡肉止汗療金瘡止膿血諸瘻惡瘡消酒除消渴補絕傷產後內塞可作金瘡膏生桐柏及冤句山谷二月八月採根暴乾

王孫 味苦平無毒主五藏邪氣寒濕痺四肢疼酸膝冷痛療百病益氣吳名白功草楚名王孫齊名長孫一名黃孫一名

黃昏一名海孫一名蔓延生海西川谷及汝南城郭垣下

爵牀 味鹹寒無毒主腰脊痛不得著牀俛仰艱難除熱可作浴湯生漢中川谷及田野

白前 味甘微温無毒主胷脅逆氣欬嗽上氣

百部根 微温有小毒主欬嗽上氣

王瓜 味苦寒無毒主消渴内痺瘀血月閉寒熱酸疼益氣愈聾療諸邪氣熱結鼠瘻散癰腫留血婦人帶下不通下乳汁止小便數不禁逐四肢骨節中水療馬骨刺人瘡一名土瓜生魯地平澤田野及人家垣牆間三月採根陰乾

薺苨 味甘寒無毒主解百藥毒

高良薑 大温無毒主暴冷胃中冷逆霍亂腹痛

馬先蒿 味苦平無毒主寒熱鬼疰中風濕痺女子帶下病無子一名馬屎蒿生南陽川澤

蜀羊泉 味苦微寒無毒主頭秃惡瘡熱氣疥瘙痂癬蟲療齲齒女子陰中内傷皮間實積一名羊泉一名羊飴生蜀郡川谷

積雪草 味苦寒無毒主大熱惡瘡癰疽浸淫赤熛皮膚赤身熱生荆州川谷

惡實 味辛平無毒主明目補中除風傷根莖療傷寒寒熱汗出中風面腫消渴熱中逐水久服輕身耐老生魯山平澤

莎草根 味甘微寒無毒主除胷中熱充皮毛久服利人益氣長鬚眉一名薃一名侯莎其實名緹生田野二月八月採

大小薊根 味甘温主養精保血大薊主女子赤白沃安胎止吐血衄鼻令人肥健五月採

垣衣 味酸無毒主黃疸心煩欬逆血氣暴熱在腸胃金瘡内塞久服補中益氣長肌好顔色一名昔邪一名烏韭一名垣嬴一名天韭一名鼠韭生古垣牆陰或屋上三月三日採陰乾

【艾葉】味苦微温無毒主灸百病可作煎止下痢吐血下部䘌
瘡婦人漏血利陰氣生肌肉辟風寒使人有子一名水臺一
名醫草生田野三月三日採暴乾作煎勿令見風
【水萍】味辛酸寒無毒主暴熱身痒下水氣勝酒長鬚髮止消
渴下氣以沐浴生毛髮久服輕身一名水花一名水白一名
水蘇生雷澤池澤三月採暴乾
【海藻】味苦鹹寒無毒主癭瘤氣頸下核破散結氣癰腫癥瘕
堅氣腹中上下鳴下十二水腫療皮間積聚暴㿉留氣熱結
利小便一名落首一名藫生東海池澤七月採暴乾
【昆布】味鹹寒無毒主十二種水腫癭瘤聚結氣瘻瘡生東海
【葒草】味鹹微寒無毒主消渴去熱明目益氣一名鴻䕬如馬
蓼而大生水傍五月採實
【陟釐】味甘大温無毒主心腹大寒温中消穀強胃氣止洩痢
生江南池澤
【井中苔】及【萍】大寒主漆瘡熱瘡水腫井中藍殺野葛巴豆諸毒
【蔛草】味甘寒無毒主暴熱喘息小兒丹腫一名蔛榮生水傍
【鳧葵】味甘冷無毒主消渴去熱淋利小便生水中即荇菜也
【菟葵】味甘寒無毒主下諸石五淋止虎蛇毒
一名接余五月採
【鱧腸】味甘酸平無毒主血痢鍼灸瘡發洪血不可止者傅之
立已汁塗髮眉生速而繁生下濕地
【蒟醬】味辛温無毒主下氣温中破痰積生巴蜀
【百脉根】味甘苦微寒無毒主下氣止渴去熱除虚勞補不足
酒浸若水煑丸散兼用之出肅州巴西
【蘿摩子】味甘辛温無毒主虚勞葉食之功同於子陸機云一
名芄蘭幽州謂之雀瓢

白藥 味辛溫無毒主金瘡生肌出原州

蘹香子 味辛平無毒主諸瘻霍亂及蛇傷

鬱金 味辛苦寒無毒主血積下氣生肌止血破惡血血淋尿血金瘡

薑黃 味辛苦大寒無毒主心腹結積疰忤下氣破血除風熱消癰腫功力烈於鬱金

阿魏 味辛平無毒主殺諸小蟲去臭氣破癥積下惡氣除邪鬼蠱毒生西蕃及崑崙

本草中

草部下品之上 三十五味

大黃 將軍 味苦寒大寒無毒主下瘀血血閉寒熱破癥瘕積聚留飲宿食蕩滌腸胃推陳致新通利水穀調中化食安和五藏平胃下氣除痰實腸間結熱心腹脹滿女子寒血閉脹小腹痛諸老血留結一名黃良生河西山谷及隴西二月八月採根火乾

桔梗 味辛苦微溫有小毒主胸脅痛如刀刺腹滿腸鳴幽幽驚恐悸氣利五藏腸胃補血氣除寒熱風痺溫中消穀療喉咽痛下蠱毒一名利如一名房圖一名白藥一名梗草一名薺苨生嵩高山谷及冤句二月八月採根暴乾

甘遂 味苦甘寒大寒有毒主大腹疝瘕腹滿面目浮腫留飲

宿食破癥堅積聚利水穀道下五水散膀胱留熱皮中痞熱氣腫滿一名甘藁一名陵藁一名陵澤一名重澤一名主田生中山川谷二月採根陰乾

亭歷味辛苦寒大寒無毒主癥瘕積聚結氣飲食寒熱破堅逐邪通利水道下膀胱水伏留熱氣皮間邪水上出面目浮腫身暴中風熱痱痒利小腹久服令人虛一名丁歷一名蕇蒿一名大室一名大適生藁城平澤及田野立夏後採實陰乾得酒良

芫花味辛苦溫微溫有小毒主欬逆上氣喉鳴喘咽腫短氣蠱毒鬼瘧疝瘕癰腫殺蟲魚消胷中痰水喜唾水腫五水在五藏皮膚及腰痛下寒毒肉毒久服令人虛一名去水一名毒魚一名杜芫其根名蜀桑根療疥瘡可用毒魚生淮源川谷三月三日採花陰乾

澤漆味苦辛微寒無毒主皮膚熱大腹水氣四肢面目浮腫丈夫陰氣不足利大小腸明目輕身一名漆莖大戟苗也生太山川澤三月三日七月七日採莖葉陰乾

大戟味苦甘寒大寒有小毒主蠱毒十二水腹滿急痛積聚中風皮膚疼痛吐逆頸腋癰腫頭痛發汗利大小腸一名邛鉅生常山十二月採根陰乾

蕘花味苦辛寒微寒有毒主傷寒溫瘧下十二水破積聚大堅癥瘕蕩滌腸胃中留癖飲食寒熱邪氣利水道療痰飲欬嗽生咸陽川谷及河南中牟六月採花陰乾

旋復花味鹹甘溫微溫冷利有小毒主結氣脅下滿驚悸除水去藏間寒熱補中下氣消胷上痰結唾如膠漆心脅痰水膀胱留飲風氣濕痺皮間死肉目中眵䁾利大腸通血脉益色澤一名戴椹一名金沸草一名盛椹其根主風濕生平澤

川谷五月採花日乾二十日成

鉤吻 味辛温有大毒主金瘡乳痓中惡風欬逆上氣水腫殺鬼疰蠱毒破癥積除脚膝痺痛四肢拘攣惡瘡疥蟲殺鳥獸一名野葛折之青烟出者名固活甚熱不入湯生傅高山谷及會稽東野

藜蘆 味辛苦寒微寒有毒主蠱毒欬逆洩痢腸澼頭瘍疥瘙惡瘡殺諸蟲毒去死肌療噦逆喉痺不通鼻中息肉馬刀爛瘡不入湯一名葱苒一名葱菼一名山葱生太山山谷三月採根陰乾

赭魁 味甘平無毒主心腹積聚除三蟲生山谷二月採

及已 味苦平有毒主諸惡瘡疥痂瘻蝕及牛馬諸瘡

烏頭 味辛甘温大熱有大毒主中風惡風洗洗出汗除寒濕痺欬逆上氣破積聚寒熱消胸上痰冷食不下心腹冷疾臍間痛肩胛痛不可俛仰目[illegible]痛不可久視又墮胎其汁煎之名射罔殺禽獸

射罔 味苦有大毒療尸疰癥堅及頭中風痺痛一名奚毒一名即子一名烏喙

烏喙 味辛微温有大毒主風濕丈夫腎濕陰囊痒寒熱歷節掣引腰痛不能行步癰腫膿結又墮胎生朗陵山谷正月二月採陰乾長三寸以上爲天雄

天雄 味辛甘温大温有大毒主大風寒濕痺歷節痛拘攣緩急破積聚邪氣金瘡強筋骨輕身健行療頭面風去來疼痛心腹結積關節重不能行步除骨間痛長陰氣強志令人武勇力作不倦又墮胎一名白幕生少室山谷二月採根陰乾

附子 味辛甘温大熱有大毒主風寒欬逆邪氣温中金瘡破癥堅積聚血瘕寒濕踒躄拘攣膝痛脚疼冷弱不能行步腰

脊風寒心腹冷痛霍亂轉筋下痢赤白堅肌骨強陰又墮胎
爲百藥長生犍爲山谷及廣漢冬月採爲附子春採爲烏頭

【側子】味辛大熱有大毒主癰腫風痺歷節腰脚疼冷寒熱鼠瘻又墮胎

【羊躑躅】味辛温有大毒主賊風在皮膚中淫淫痛温瘧惡毒諸痺邪氣鬼疰蠱毒一名玉支生太行山川谷及淮南山三月採花陰乾

【茵芋】味苦温微温有毒主五藏邪氣心腹寒熱羸瘦如瘧狀發作有時諸關節風濕痺痛療久風流走四肢脚弱一名莞草一名卑共生太山川谷三月三日採葉陰乾

【射干】味苦平微温有毒主欬逆上氣喉痺咽痛不得消息散結氣腹中邪逆食飲大熱療老血在心脾間欬唾言語氣臭散胷中熱氣久服令人虛一名烏扇一名烏蒲一名烏翣一名烏吹一名草薑生南陽川谷田野三月三日採根陰乾

【鳶尾】味苦平有毒主蠱毒邪氣鬼疰諸毒破癥瘕積聚大水下三蟲療頭眩殺鬼魅一名烏園生九疑山谷五月採

【貫衆】味苦微寒有毒主腹中邪熱氣諸毒殺三蟲去寸白破癥瘕除頭風止金瘡花療惡瘡令人洩一名貫節一名貫渠一名百頭一名虎卷一名扁符一名伯萍一名藥藻此謂草鴟頭生玄山山谷及宛句少室山二月八月採根陰乾

【半夏】味辛平生微寒熟温有毒主傷寒寒熱心下堅下氣喉咽腫痛頭眩胷脹欬逆腸鳴止汗消心腹胷膈痰熱滿結欬嗽上氣心下急痛堅痞時氣嘔逆消癰腫墮胎療痿黃悅澤面目生令人吐熟令人下用之湯洗令滑盡一名守田一名地文一名水玉一名示姑生槐里川谷五月八日採根暴乾

【由跋】主毒腫結熱

虎掌 味苦温微寒有大毒主心痛寒熱結氣積聚伏梁傷筋痿拘緩利水道除陰下濕風眩生漢中山谷及冤句二月八月採陰乾

莨菪子 味苦甘寒有毒主齒痛出蟲肉痺拘急使人健行見鬼療癲狂風癇顛倒拘攣多食令人狂走久服輕身走及奔馬強志益力通神一名横唐一名行唐生海濱川谷及雍州五月採子

蜀漆 味辛平微温有毒主瘧及欬逆寒熱腹中癥堅痞結積聚邪氣蠱毒鬼疰療胷中邪結氣吐出之生江林山川谷及蜀漢中常山苗也五月採葉陰乾

恒山 味苦辛寒微寒有毒主傷寒寒熱熱發温瘧鬼毒胷中痰結吐逆療鬼蠱往來水脹洒洒惡寒鼠瘻一名互草生益州川谷及漢中八月採根陰乾

青葙子 味苦微寒無毒主邪氣皮膚中熱風瘙身痒殺三蟲惡瘡疥蝨痔蝕下部䘌瘡子名草決明療脣口青一名草蒿一名萋蒿生平谷道傍三月採莖葉陰乾五月六月採子

牙子 味苦酸寒有毒主邪氣熱氣疥瘙惡瘍瘡痔去白蟲一名狼牙一名狼齒一名狼子一名犬牙生淮南川谷及冤句八月採根暴乾中濕腐爛生衣者殺人

白斂 味苦甘平微寒無毒主癰腫疽瘡散結氣止痛除熱目中赤小兒驚癇温瘧女子陰中腫痛下赤白殺火毒一名菟核一名白草一名白根一名崑崙生衡山山谷二月八月採根暴乾

白及 味苦辛平微寒無毒主癰腫惡瘡敗疽傷陰死肌胃中邪氣賊風鬼擊痱緩不收除白癬疥蟲一名甘根一名連及草生北山川谷及冤句及越山

蛇含 味苦微寒無毒主驚癇寒熱邪氣除熱金瘡疽痔鼠瘻
惡瘡頭瘍療心腹邪氣腹痛濕痺養胎利小兒一名蛇銜生
益州山谷八月採陰乾

草蒿 味苦寒無毒主疥瘙痂痒惡瘡殺蝨留熱在骨節間明
目一名青蒿一名方潰生華陰川澤

雚菌 味鹹甘平微溫有小毒主心痛溫中去長蟲白瘲蟯蟲
蛇螫毒癥瘕諸蟲疽蝸去蚘蟲寸白惡瘡一名雚蘆生東海
池澤及渤海章武八月採陰乾

草部下品之下 六十八味

連翹 味苦平無毒主寒熱鼠瘻瘰癧癰腫惡瘡癭瘤結熱蠱
毒去白蟲一名異翹一名蘭華一名折根一名軹一名三廉
生太山山谷八月採陰乾

白頭翁 味苦溫無毒有毒主溫瘧狂易寒熱癥瘕積聚癭氣
逐血止痛療金瘡鼻衄一名野丈人一名胡王使者一名奈
何草生高山山谷及田野四月採亦療毒痢

䕡茹 味辛酸寒微寒有小毒主蝕惡肉敗瘡死肌殺疥蟲排
膿惡血除大風熱氣善忘不樂去熱痺破癥瘕除息肉一名
屈據一名離婁生代郡川谷五月採根陰乾黑頭者良

苦芙 微寒主面目通身漆瘡作灰療金瘡大驗

羊桃 味苦寒有毒主熛熱身暴赤色風水積聚惡瘍除小兒
熱去五藏五水大腹利小便益氣可作浴湯一名鬼桃一名
羊腸一名萇楚一名御弋一名銚弋生山林川谷及生田野
二月採陰乾

羊蹄 味苦寒無毒主頭禿疥瘙除熱女子陰蝕浸淫疽痔殺
蟲一名東方宿一名連蟲陸一名鬼目一名蓄生陳留川澤

鹿藿 味苦平無毒主蠱毒女子腰腹痛不樂腸癰瘰癧瘍氣

生汶山山谷

牛扁 味苦微寒無毒主身皮瘡熱氣可作浴湯殺牛蝨小蟲又療牛病生桂陽川谷

陸英 味苦寒無毒主骨間諸痺四肢拘攣疼酸膝寒痛陰痿短氣不足脚腫生熊耳川谷及寃句立秋採

蒴藋 味酸温有毒主風瘙癮瘮身痒濕痺可作浴湯一名堇草一名芨生田野春夏採葉秋冬採莖根

藎草 味苦平無毒主久欬上氣喘逆久寒驚悸痂疥白秃瘍氣殺皮膚小蟲可以染黃作金色生青衣川谷九月十月採

夏枯草 味苦辛寒無毒主寒熱瘰癧鼠瘻頭瘡破癥散癭結氣脚腫濕痺輕身一名夕句一名乃東一名燕面生蜀郡川谷四月採

烏韭 味甘寒無毒主皮膚往來寒熱利小腸膀胱氣療黃疸

金瘡內塞補中益氣好顏色生山谷石上

蚤休 味苦微寒有毒主驚癇搖頭弄舌熱氣在腹中癲疾癰瘡陰蝕下三蟲去蛇毒一名蚩休生山陽川谷及寃句

虎杖根 微温主通利月水破留血癥結

石長生 味鹹苦微寒有毒主寒熱惡瘡大熱辟鬼氣不祥下三蟲一名丹草生咸陽山谷

鼠尾草 味苦微寒無毒主鼠瘻寒熱下痢膿血不止白花者主白下赤花者主赤下一名葝一名陵翹生平澤中四月採葉七月採花陰乾

馬鞭草 主下部䘌瘡

胡桐淚 味鹹苦大寒無毒主大毒熱心腹煩滿水和服之取吐又主牛馬急黃黑汗水研二三兩灌之立瘥又爲金銀銲藥出肅州以西平澤及山谷中形似黃礬而堅實有夾爛木

者云是胡桐樹滋淪入土石鹼鹵地作之其樹高大皮葉似白楊青桐桑葦故名胡桐木堪器用又名胡桐律西域傳云胡桐似桑而曲

馬芀 味辛平無毒主惡瘡馬疥一名馬疕生園中久腐處

雞腸草 主腫止小便利

蛇莓汁 大寒主胷腹大熱不止瘡浸毒射工傷寒大熱甚良

苧根 寒主小兒赤丹其漬苧汁療渴

菰根 大寒主腸胃固熱消渴止小便利

狼跋子 有小毒主惡瘡蝸疥殺蟲魚

弓弩弦 主難產胞衣不出

舂杵頭細糠 主卒噎

敗天公 平主鬼疰精魅

半天河 微寒主鬼疰狂邪氣惡毒洗諸瘡用之

地漿 寒主解中毒煩悶

敗蒲席 平主筋溢惡瘡

敗船茹 平主婦人崩中吐痢血不止燒作灰服之

敗鼓皮 平主中蠱毒燒作灰水服

屋遊 味甘寒主浮熱在皮膚往來寒熱利小腸膀胱氣生屋上陰處八月九月採

赤地利 味苦平無毒主赤白冷熱諸痢斷血破血帶下赤白生肌肉所在山谷有之

赤車使者 味辛苦溫有毒主風冷邪疰蠱毒癥瘕五藏積氣

劉寄奴草 味苦溫主破血血下脹多服令人痢生江南

三白草 味甘辛寒有小毒主水腫脚氣利大小便消痰破癖除積聚消丁腫生池澤畔

牽牛子 味苦寒有毒主下氣療脚滿水腫除風毒利小便

猪膏苺味辛苦平無毒主金瘡止痛斷血生肉除諸惡瘡消浮腫擣封之湯漬散傅並良

紫葛味甘苦寒無毒主癰腫惡瘡取根皮擣爲末醋和封之生山谷中不入方用

蓖麻子味甘辛平有小毒主水癥水研二十枚服之吐惡沫加至三十枚三日一服瘥則止又主風虛寒熱身體瘡癢浮腫尸疰惡氣窄取油塗之葉主脚氣風腫不仁擣蒸傅之

葎草味甘苦寒無毒主五淋利小便止水痢除瘧虛熱渴煑汁及生汁服之生故墟道傍

格注草味辛苦溫有大毒主蠱疰諸蠱毒痛疼等生齊魯山澤

獨行根味辛苦冷有毒主鬼疰積聚諸毒熱腫蛇毒水磨爲泥封之日三四立瘥水煑一二兩取汁服吐蠱毒

狗舌草味苦寒有小毒主蠱疥瘙殺小蟲

烏蘞苺味酸苦寒無毒主風毒熱腫游丹蛇傷擣傅并飲汁

豨薟味苦寒有小毒主熱䘌煩滿不能食生擣汁服三四合多則令人吐

狼毒味辛平有大毒主欬逆上氣破積聚飲食寒熱水氣脅下積癖惡瘡鼠瘻疽蝕鬼精蠱毒殺飛鳥走獸一名續毒生秦亭山谷及奉高二月八月採根陰乾陳而沈水者良

鬼臼味辛溫微溫有毒主殺蠱毒鬼疰精物辟惡氣不祥逐邪解百毒療欬嗽喉結風邪煩惑失魄妄見去目中膚瞖殺大毒不入湯一名爵犀一名馬目毒公一名九臼一名天臼一名解毒生九真山谷及寃句二月八月採根

蘆根味甘寒主消渴客熱止小便利

甘蕉根大寒主癰腫結熱

萹蓄味苦平無毒主浸淫疥瘙疽痔殺三蟲療女子陰蝕生

東萊山谷五月採陰乾

酢漿草 味酸寒無毒主惡瘡瘑瘻擣傅之殺諸小蟲生道傍

苘實 味苦平無毒主赤白冷熱痢散服飲之吞一枚破癰腫

蒲公草 味甘平無毒主婦人乳癰腫水煑汁飲之及封之立消一名構耨草

商陸 味辛酸平有毒主水脹疝瘕痺熨除癰腫殺鬼精物療胷中邪氣水腫痿痺腹滿洪直疏五藏散水氣如人形者有神一名募根一名夜呼生咸陽川谷

女青 味辛平有毒主蠱毒逐邪惡氣殺鬼溫瘧辟不祥一名雀瓢蛇銜根也生朱崖八月採陰乾

水蓼 主蛇毒擣傅之絞汁服止蛇毒入內心悶水煑漬捋脚消氣腫

角蒿 味辛苦平有小毒主甘濕䘌諸惡瘡有蟲者

昨葉何草 味酸平無毒主口中乾痛水穀血痢止血生上黨屋上如蓬初生一名瓦松夏採日乾

白附子 主心痛血痺面上百病行藥勢生蜀郡三月採

鶴蝨 味苦平有小毒主蚘蟯蟲用之為散以肥肉臛汁服方寸匕亦圓散中用生西戎

甑帶灰 主腹脹痛脫肛煑汁服主胃反小便失禁不通及淋中惡尸疰金瘡刃不出

屐屧鼻繩灰 水服主噎哽心痛胷滿

故麻鞋底 水煑汁服之解紫石英發毒又主霍亂吐下不止及解食牛馬肉毒腹脹吐痢不止

雀麥 味甘平無毒主女人產不出煑汁飲之一名蘥一名燕麥生故墟野林下葉似麥

筆頭灰 久著主小便不通小便數難陰腫中惡脫肛淋瀝燒

灰水服之　木部上品一十七味

茯苓 味甘平無毒主胷脅逆氣憂恚驚邪恐悸心下結痛寒熱煩滿欬逆口焦舌乾利小便止消渴好唾大腹淋瀝膈中痰水水腫淋結開胷腑調藏氣伐腎邪長陰益氣力保神守中久服安魂養神不飢延年一名伏菟其有木根者名茯神

茯神 平主辟不祥療風眩風虛五勞口乾止驚悸多恚怒善忘開心益智安魂魄養精神生太山山谷大松下二月八月採陰乾

琥珀 味甘平無毒主安五藏定魂魄殺精魅邪鬼消瘀血通五淋生永昌

松脂 味苦甘溫無毒主疽惡瘡頭瘍白禿疥瘙風氣安五藏除熱胃中伏熱咽乾消渴及風痺死肌鍊之令白其赤者主惡痺久服輕身不老延年一名松膏一名松肪生太山山谷六月採

松實 味苦溫無毒主風痺寒氣虛羸少氣補不足九月採陰乾

松葉 味苦溫主風濕瘡生毛髮安五藏守中不飢延年

松節 溫主百節久風風虛脚痺疼痛

松根白皮 主辟穀不飢

柏實 味甘平無毒主驚悸安五藏益氣除風濕痺療恍惚虛損吸吸歷節腰中重痛益血止汗久服令人潤澤美色耳目聰明不飢不老輕身延年生太山山谷柏葉尤良

柏葉 味苦微溫無毒主吐血衄血利血崩中赤白輕身益氣令人耐寒暑去濕痺止飢四時各依方面採陰乾

柏白皮 主火灼爛瘡長毛髮

菌桂 味辛溫無毒主百病養精神和顏色為諸藥先聘通使

久服輕身不老面生光華媚好常如童子生交趾桂林山谷巖崖間無骨正圓如竹立秋採

牡桂 味辛温無毒主上氣欬逆結氣喉痺吐吸心痛脅風脅痛温筋通脉止煩出汗利關節補中益氣久服通神輕身不老生南海山谷

桂 味甘辛大熱有小毒主温中利肝肺氣心腹寒熱冷疾霍亂轉筋頭痛腰痛出汗止煩止唾欬嗽鼻齆能墮胎堅骨節通血脉理踈不足宣導百藥無所畏久服神仙不老生桂陽二月八月十月採皮陰乾

杜仲 味辛甘平温無毒主腰脊痛補中益精氣堅筋骨強志除陰下痒濕小便餘瀝脚中酸疼不欲踐地久服輕身耐老一名思仙一名思仲一名木綿生上虞山谷及上黨漢中二月五月六月九月採皮

楓香脂 味辛苦平無毒主癮疹風痒浮腫齒痛一名白膠香其樹皮味辛平有小毒主水腫下水氣煑汁用之所在大山皆有

乾漆 味辛温無毒有毒主絶傷補中續筋骨塡髓腦安五藏五緩六急風寒濕痺療欬嗽消瘀血痞結腰痛女子疝瘕利小腸去蚘蟲生漆去長蟲久服輕身耐老生漢中川谷夏至後採乾之

蔓荊實 味苦辛微寒平温無毒主筋骨間寒熱濕痺拘攣明目堅齒利九竅去白蟲長蟲主風頭痛腦鳴目淚出益氣久服輕身耐老令人潤澤顏色小荊實亦等

牡荊實 味苦温無毒主除骨間寒熱通利胃氣止欬逆下氣生河間南陽寃句山谷或平壽都鄉高岸上及田野中八月九月採實陰乾

女貞實 味苦甘平無毒主補中安五藏養精神除百疾久服肥健輕身不老生武陵川谷立冬採

桑上寄生 味苦甘平無毒主腰痛小兒背強癰腫安胎充飢膚堅髮齒長鬚眉主金瘡去痺女子崩中內傷不足產後餘疾下乳汁其實明目輕身通神一名寄屑一名寓木一名宛童一名蔦生弘農川谷桑上三月三日採莖葉陰乾

蕤核 味甘溫微寒無毒主心腹邪結氣明目目赤痛傷淚出目腫眥爛齆鼻破心下結痰痞氣久服輕身益氣不飢生函谷川谷及巴西

五加皮 味辛苦溫微寒無毒主心腹疝氣腹痛益氣療躄小兒不能行疽瘡陰蝕男子陰痿囊下濕小便餘瀝女人陰痒及腰脊痛兩脚疼痺風弱五緩虛羸補中益精堅筋骨強志意久服輕身耐老一名豺漆一名豺節五葉者良生漢中及宛句五月七月採莖十月採根陰乾

沉香 **薰陸香** **雞舌香** **藿香** **詹糖香** **楓香** 並微溫悉療風水毒腫去惡氣薰陸詹糖去伏尸雞舌藿香療霍亂心痛楓香療風瘾疹痒毒

蘗木 味苦寒無毒主五藏腸胃中結氣熱黃疸腸痔止泄痢女子漏下赤白陰傷蝕瘡療驚氣在皮間肌膚熱赤起目熱赤痛口瘡久服通神

根 一名**檀桓** 主心腹百病安魂魄不飢渴久服輕身延年通神生漢中山谷及永昌

辛夷 味辛溫無毒主五藏身體寒熱風頭腦痛面䵟溫中解肌利九竅通鼻塞涕出治面腫引齒痛眩冒身兀兀如在車船之上者生鬚髮去白蟲久服下氣輕身明目增年耐老可作膏藥用之去心及外毛毛射人肺令人欬一名辛矧一名

侯桃一名房木生漢中川谷九月採實暴乾

【木蘭】味苦寒無毒主身大熱在皮膚中去面熱赤皰酒皶惡風癲疾陰下痒濕明耳目療中風傷寒及癰疽水腫去臭氣一名林蘭一名杜蘭皮似桂而香生零陵山谷及太山十二月採皮陰乾

【榆皮】味甘平無毒主大小便不通利水道除邪氣腸胃邪熱氣消腫性滑利久服輕身不飢其實尤良療小兒頭瘡痂疕花主小兒癇小便不利傷熱一名零榆生潁川山谷二月採皮取白暴乾八月採實並勿令中濕濕則傷人

【酸棗】味酸平無毒主心腹寒熱邪結氣聚四肢酸疼濕痺煩心不得眠臍上下痛血轉久泄虛汗煩渴補中益肝氣堅筋骨助陰氣令人肥健久服安五藏輕身延年生河東川澤八月採實陰乾四十日成

【槐實】味苦酸鹹寒無毒主五內邪氣熱止涎唾補絕傷五痔火瘡婦人乳瘕子藏急痛以七月七日取之擣取汁銅器盛之日煎令可作圓大如鼠屎內竅中三易乃愈又墮胎久服明目益氣頭不白延年枝主洗瘡及陰囊下濕痒皮主爛瘡根主喉痺寒熱生河南平澤可作神燭

【楮實】味甘寒無毒主陰痿水腫益氣充肌膚明目久服不飢不老輕身生少室山一名穀實所在有之八月九月採實日乾四十日成

【葉】味甘無毒主小兒身熱食不生肌可作浴湯又主惡瘡生肉皮主逐水利小便莖主癮疹痒單煑洗浴皮間白汁療癬

【枸杞】味苦寒根大寒子微寒無毒主五內邪氣熱中消渴周痺風濕下胸脅氣客熱頭痛補內傷大勞噓吸堅筋骨強陰利大小腸久服堅筋骨輕身不老耐寒暑一名杞根一名地

骨一名枸忌一名地輔一名羊乳一名却暑一名仙人杖一
名西王母杖生常山平澤及諸丘陵阪岸冬採根春夏採葉
秋採莖實陰乾

蘇合香 味甘溫無毒主辟惡殺鬼精物溫瘧蠱毒癇痓去三
蟲除邪令人無夢魘久服通神明輕身長年生中臺川谷

橘柚 味辛溫無毒主胸中瘕熱逆氣利水穀下氣止嘔欬除
膀胱留熱停水五淋利小便主脾不能消穀氣衝胸中吐逆
霍亂止洩去寸白久服之去臭氣通神明長年一名橘皮生
於南山川谷及生江南十月採

木部中品二十九味

龍眼 味甘平無毒主五藏邪氣安志厭食除蟲去毒久服強
魂聰明輕身不老通神明一名益智其大者似檳榔生南海
山谷

厚朴 味苦溫大溫無毒主中風傷寒頭痛寒熱驚悸氣血痺
死肌去三蟲溫中益氣消痰下氣療霍亂及腹痛脹滿胃中
冷逆胸中嘔不止洩痢淋露除驚去留熱心煩滿厚腸胃一
名厚皮一名赤朴其樹名榛其子名逐折療鼠瘻明目益氣
生交阯冤句三月九月十月採皮陰乾

猪苓 味甘苦平無毒主痎瘧解毒蠱疰不祥利水道久服輕
身耐老一名猳猪屎生衡山山谷及濟陰冤句二月八月採
陰乾

箽竹葉 味苦平大寒無毒主欬逆上氣溢筋急惡瘍殺小蟲
除煩熱風痓喉痺嘔吐根作湯益氣止渴補虛下氣消毒汁
主風痓實通神明輕身益氣生益州

淡竹葉 味辛平大寒主胸中痰熱欬逆上氣瀝大寒療暴中
風風痺胸中大熱止煩悶

皮茹微寒主嘔啘溫氣寒熱吐血崩中溢筋

竹笋味甘無毒主消渴利水道益氣可久食

枳實味苦酸寒微寒無毒主大風在皮膚中如麻豆苦痒除寒熱結止痢長肌肉利五藏益氣輕身除胷脅痰澼逐停水破結實消脹滿心下急痞痛逆氣脅風痛安胃氣止溏洩明目生河内川澤九月十月採陰乾

山茱萸味酸平微溫無毒主心下邪氣寒熱溫中逐寒濕痺去三蟲腸胃風邪寒熱疝瘕頭風風氣去來鼻塞目黄耳聾面皰溫中下氣出汗強陰益精安五藏通九竅止小便利久服輕身明目強力長年一名蜀棗一名雞足一名鬾實生漢中山谷及琅邪冤句東海承縣九月十月採實陰乾

吴茱萸味辛溫大熱有小毒主溫中下氣止痛欬逆寒熱除濕血痺逐風邪開腠理去痰冷腹内絞痛諸冷實不消中惡心腹痛逆氣利五藏根殺三蟲根白皮殺蟯蟲治喉痺欬逆止洩注食不消女子經産餘血療白癬一名藙生上谷川谷及冤句九月九日採陰乾

秦皮味苦微寒大寒無毒主風寒濕痺洗洗寒氣除熱目中青瞖白膜療男子少精婦人帶下小兒癇身熱可作洗目湯久服頭不白輕身皮膚光澤肥大有子一名岑皮一名石檀生廬江川谷及冤句二月八月採皮陰乾

梔子味苦寒大寒無毒主五内邪氣胃中熱氣面赤酒皰皶鼻白癩赤癩瘡瘍療目熱赤痛胷心大小腸大熱心中煩悶胃中熱氣一名木丹一名越桃生南陽川谷九月採實暴乾

檳榔味辛溫無毒主消穀逐水除痰澼殺三蟲伏尸療寸白生南海

合歡味甘平無毒主安五藏利心志令人歡樂無憂久服輕

身明目得所欲生益州山谷

秦椒 味辛溫生溫熟寒有毒主風邪氣溫中除寒痺堅齒髮明目療喉痺吐逆疝瘕去老血產後餘疾腹痛出汗利五藏久服輕身好顏色耐老增年通神生太山川谷及秦嶺上或琅邪八月九月採實

衛矛 味苦寒無毒主女子崩中下血腹滿汗出除邪殺鬼毒蠱疰中惡腹痛去白蟲消皮膚風毒腫令陰中解一名鬼箭生霍山山谷八月採陰乾

紫葳 味酸微寒無毒主婦人產乳餘疾崩中癥瘕血閉寒熱羸瘦養胎

莖葉 味苦無毒主痿蹷益氣一名陵苕一名芙華生西海川谷及山陽

蕪荑 味辛平無毒主五內邪氣散皮膚骨節中淫淫溫行毒去三蟲化食逐寸白散腸中嗢嗢喘息一名無姑一名蕨瑭生晉山川谷三月採實陰乾

食茱萸 味辛苦大熱無毒功用與吳茱萸同少為劣爾療水氣用之乃佳

椋子木 味甘鹹平無毒主折傷破惡血養好血安胎止痛生肉

每始王木 味苦平無毒主傷折跌筋骨生肌破血止痛酒水煑濃汁飲之生資州山谷

折傷木 味甘鹹平無毒主傷折筋骨疼痛散血補血產後血悶止痛酒水煑濃汁飲之生資州山谷

茗 **苦搽茗** 味甘苦微寒無毒主瘻瘡利小便去痰熱渴令人少睡春採之

苦搽 主下氣消宿食作飲加茱萸葱薑等良

桑根白皮 味甘寒無毒主傷中五勞六極羸瘦崩中脉絕補

虛益氣去肺中水氣唾血熱渴水腫腹滿臚脹利水道去寸
白可以縫金瘡採無時出土上者殺人葉主除寒熱出汗汁
解蜈蚣毒
【桑耳】味甘有毒黒者主女子漏下赤白汁血病癥瘕積聚陰
痛陰陽寒熱無子療月水不調其黃熟陳白者止久洩益氣
不飢其金色者治癖飲積聚腹痛金瘡一名桑菌一名木麥
五木耳名檽益氣不飢輕身強志生犍爲山谷六月多雨時
採即暴乾
【松蘿】味苦甘平無毒主瞋怒邪氣止虛汗頭風女子陰寒腫
痛療痰熱溫瘧可爲吐湯利水道一名女蘿生熊耳山川谷
松樹上五月採陰乾
【白棘】味辛寒無毒主心腹痛癰腫潰膿止痛決刺結療丈夫
虛損陰痿精自出補腎氣益精髓一名棘鍼一名棘刺生雍
州川谷
【棘刺花】味苦平無毒主金瘡內漏冬至後百二十日採之實
主明目心腹痿痹除熱利小便生道傍四月採一名菥蓂一
名馬朐一名刺原又有棗針療腰痛喉痹不通
【安息香】味辛苦平無毒主心腹惡氣鬼疰出西戎似松脂黃
黒色爲塊新者亦柔韌
【龍腦香】及【膏香】味辛苦微寒一云温平無毒主心腹邪氣風
濕積聚耳聾明目去目赤膚瞖出婆律國形似白松脂作杉
木氣明淨者善久經風日或如雀屎者不佳云合糯一作粳米
炭相思子貯之則不耗膏主耳聾
【菴摩勒】味苦甘寒無毒主風虛熱氣一名餘甘生嶺南交廣
愛等州
【毗梨勒】味苦寒無毒功用與菴摩勒同出西域及嶺南交愛

等州戎人謂之三果

木部下品四十五味

黄環 味苦平有毒主蠱毒鬼疰鬼魅邪氣在藏中除欬逆寒熱一名凌泉一名大就生蜀郡山谷三月採根陰乾

石南 味辛苦平有毒主養腎氣內傷陰衰利筋骨皮毛療脚弱五藏邪氣除熱女子不可久服令思男實殺蠱毒破積聚逐風痺一名鬼目生華陰山谷二月四月採葉八月採實陰乾

巴豆 味辛溫生溫熟寒有大毒主傷寒溫瘧寒熱破癥瘕結聚堅積留飲痰癖大腹水脹蕩滌五藏六腑開通閉塞利水穀道去惡肉除鬼毒蠱疰邪物殺蟲魚療女子月閉爛胎金瘡膿血不利丈夫陰殺斑猫毒可鍊餌之益血脉令人色好變化與鬼神通一名巴椒生巴郡川谷八月採陰乾用之去心皮

蜀椒 味辛溫大熱有毒主邪氣欬逆溫中逐骨節皮膚死肌寒濕痺痛下氣除六腑寒冷傷寒溫瘧大風汗不出心腹留飲宿食腸澼下痢洩精女子字乳餘疾散風邪瘕結水腫黄疸鬼疰蠱毒殺蟲魚毒久服之頭不白輕身增年開腠理通血脉堅齒髮調關節耐寒暑可作膏藥多食令人乏氣口閉者殺人一名巴椒一名蓎藙生武都川谷及巴郡八月採實陰乾

莽草 味辛苦溫有毒主風頭癰腫乳癰疝瘕除結氣疥瘙殺蟲魚療喉痺不通乳難頭風癢可用沐勿令入眼一名葞一名春草生上谷山谷及冤句五月採葉陰乾

郁李仁 味酸平無毒主大腹水腫面目四肢浮腫利小便水道根主齒斷腫齲齒堅齒去白蟲一名爵李一名車下李一名棣生高山川谷及丘陵上五月六月採根

鼠李 主寒熱瘰癧瘡

其皮 味苦微寒無毒主除身皮熱毒一名牛李一名鼠梓一名椑生田野採無時

欒華 味苦寒無毒主目痛淚出傷眥消目腫生漢中川谷五月採

杉材 微溫無毒主療漆瘡

楠材 微溫主霍亂吐下不止

榧實 味甘無毒主五痔去三蟲蠱毒鬼疰生永昌

蔓椒 味苦溫無毒主風寒濕痹歷節疼除四肢厥氣膝痛一名豕椒一名猪椒一名彘椒一名狗椒生雲中川谷及丘冢間採莖根煮釀酒

釣樟根皮 主金瘡止血

雷丸 味苦鹹寒微寒有小毒主殺三蟲逐毒氣胃中熱利丈夫不利女子作摩膏除小兒百病逐邪氣惡風汗出除皮中熱結積蠱毒白蟲寸白自出不止久服令陰痿一名雷矢一名雷實赤者殺人生石城山谷及漢中土中八月採根暴乾

溲疏 味辛苦寒微寒無毒主身皮膚中熱除邪氣止遺溺通利水道除胃中熱下氣可作浴湯一名巨骨生熊耳川谷及田野故丘墟地四月採

櫸樹皮 大寒主時行頭痛熱結在腸胃

白楊皮 味苦無毒主毒風脚氣腫四肢緩弱不隨毒氣遊易在皮膚中痰癖等酒漬服之取葉圓大蒂小無風自動者良

水楊葉 嫩枝味苦平無毒主久痢赤白擣和水絞取汁服一升日二大效

欒荊 味辛苦溫有小毒主大風頭面手足諸風癲癇狂痓濕痺寒冷疼痛俗方大用之而本草不載亦無別名但有欒花

功用又别非此花也

【小蘗】味苦大寒無毒主口瘡甘䘌殺諸蟲去心腹中熱氣一名山石榴

【莢蒾】味甘苦平無毒主三蟲下氣消穀

【鈎藤】微寒無毒主小兒寒熱十二驚癇

【藥實根】味辛溫無毒主邪氣諸痺疼酸續絶傷補骨髓一名連木生蜀郡山谷採無時

【皂莢】味辛鹹溫有小毒主風痺死肌邪氣風頭淚出利九竅殺精物療腹脹滿消穀除欬嗽囊結婦人胞不落明目益精可為沐藥不入湯生雍州川谷及魯鄒縣如猪牙者良九月十月採莢陰乾

【楝實】味苦寒有小毒主溫疾傷寒大熱煩狂殺三蟲疥瘍利小便水道

【根】微寒療蚘蟲利大腸生荊山山谷

【柳華】味苦寒無毒主風水黃疸面熱黑痂疥惡瘡金瘡一名柳絮葉主馬疥痂瘡取煎煑以洗馬疥立愈又療心腹內血止痛實主潰癰逐膿血子汁療渴生琅邪川澤

【桐葉】味苦寒無毒主惡蝕瘡著陰皮主五痔殺三蟲療賁㹠氣病花主傅猪瘡飼猪肥大三倍生桐柏山谷

【梓白皮】味苦寒無毒主熱去三蟲療目中疾葉擣傅猪瘡飼猪肥大三倍生河内山谷

【蘇方木】味甘鹹平無毒主破血產後血脹悶欲死者水煑若酒煑五兩取濃汁服之效

【接骨木】味甘苦平無毒主折傷續筋骨除風癢齲齒可作浴湯

【枳椇】味甘平無毒主頭風小腹拘急一名木蜜其木皮溫無毒主五痔和五藏以木為屋屋中酒則味薄此亦奇物

木天蓼味辛温有小毒主癥結積聚風勞虛冷生山谷中

烏臼木根皮味苦微温有毒主暴水癥結積聚生山南平澤

赤爪木味苦寒無毒主水痢風頭身癢生平陸所在有之

實味酸冷無毒汁服主水痢沐頭及洗身上瘡癢一名羊梂
一名鼠查

訶梨勒味苦温無毒主冷氣心腹脹滿下食生交愛州

楓柳皮味辛大熱有毒主風齲齒痛出原州

賣子木味甘微鹹平無毒主折傷血內溜續絶補骨髓止痛
安胎生山谷中其葉似柿出劔南卭州

大空味辛苦平有小毒主三蟲殺蟣虱生山谷中取根皮作
末油和塗蟣蝨皆死

紫真檀味鹹微寒主惡毒風毒

椿木葉味苦有毒主洗瘡疥風疽水煑葉汁用之皮主甘䘌
樗木根葉尤良

胡椒味辛大温無毒主下氣温中去痰除藏腑中風冷生西
戎形如鼠李子調食用之味甚辛辣而芳香當不及蜀椒

橡實味苦微温無毒主下痢厚腸胃肥健人其殼為散及煑
汁服亦主痢并堪染用一名杼斗槲櫟皆有斗以櫟為勝所
在山谷中皆有

無食子味苦温無毒主赤白痢腸滑生肌肉出西戎

楊櫨木味苦寒有毒主疽瘻惡瘡水煑葉汁洗瘡立瘥生籬
垣間一名空疏所在皆有

槲若味甘苦平無毒主痔止血療血痢止渴取脉灸用之

皮味苦水煎濃汁除蠱毒及瘻俗用甚效

人獸部　五十六味

髮髲味苦温小寒無毒主五癃關格不通利小便水道療小

兒癎大人痓仍自還神化合鷄子黃煎之消爲水療小兒驚熱

亂髮微溫主欬嗽五淋大小便不通小兒驚癎止血鼻衂燒之吹内立止

人乳汁主補五藏令人肥白悅澤

頭垢主淋閉不通

人屎寒主療時行大熱狂走解諸毒宜用絶乾者擣末沸湯沃服之

人溺療寒熱頭疼溫氣童男者尤良溺白垽療鼻衂湯火灼瘡東向圊厠溺坑中青泥療喉痺消癰腫若已有膿即潰

龍骨味甘平微寒無毒主心腹鬼疰精物老魅欬逆洩痢膿血女子漏下癥瘕堅結小兒熱氣驚癎療心腹煩滿四肢痿枯汗出夜卧自驚恚怒伏氣在心下不得喘息腸癰内疽陰蝕止汗縮小便溺血養精神定魂魄安五藏

白龍骨療夢寐洩精小便洩精齒主小兒大人驚癎癲疾狂走心下結氣不能喘息諸痙殺精物小兒五驚十二癎身熱不可近大人骨間寒熱又殺蠱毒

角主驚癎瘈瘲身熱如火腹中堅及熱洩久服輕身通神明延年生晉地川谷及太山巖水岸土穴中死龍處採無時

牛黃味苦平有小毒主驚癎寒熱熱盛狂痓除邪逐鬼療小兒百病諸癎熱口不開大人狂顛又墮胎久服輕身增年令人不忘生晉地平澤於牛得之即陰乾百日使時燥無令見日月光

麝香味辛溫無毒主辟惡氣殺鬼精物溫瘧蠱毒癎痓去三蟲療諸凶邪鬼氣中惡心腹暴痛脹急痞滿風毒婦人產難墮胎去面䵟目中膚翳久服除邪不夢寤魘寐通神仙生中臺川谷及益州雍州山谷春分取之生者益良

馬乳 止渴

牛乳 微寒補虛羸止渴

羊乳 溫補寒冷虛乏

酥 微寒補五藏利大腸主口瘡

熊脂 味甘微寒微溫無毒主風痺不仁筋急五藏腹中積聚寒熱羸瘦頭瘍白秃面皯皰食飲吐嘔久服強志不飢輕身長年生雍州山谷十一月取

白膠 味甘平溫無毒主傷中勞絕腰痛羸瘦補中益氣婦人血閉無子止痛安胎療吐血下血崩中不止四肢酸疼多汗淋露折跌傷損久服輕身延年一名鹿角膠生雲中煑鹿角為之得火良

阿膠 味甘平微溫無毒主心腹內崩勞極洒洒如瘧狀腰腹痛四肢酸疼女子下血安胎丈夫小腹痛虛勞羸瘦陰氣不足脚酸不能久立養肝氣久服輕身益氣一名傅致膠生東平郡煑牛皮作之出東阿

醍醐 味甘平無毒主風邪痺氣通潤骨髓可為摩藥性冷利功優於酥生酥中

底野迦 味辛苦平無毒主百病中惡客忤邪氣心腹積聚出西戎

酪 味甘酸寒無毒主熱毒止渴解散發利除胷中虛熱身面上熱瘡肌瘡

犀角 味苦酸鹹寒微寒無毒主百毒蠱疰邪鬼瘴氣殺鉤吻鴆羽蛇毒除邪不迷惑魘寐療傷寒溫疫頭痛寒熱諸毒氣久服輕身駿健生永昌山谷及益州

羚羊角 味鹹苦寒微寒無毒主明目益氣起陰去惡血注下辟蠱毒惡鬼不祥安心氣常不魘寐療傷寒時氣寒熱熱在

肌膚温風注毒伏在骨間除邪氣驚夢狂越僻謬及食噎不通久服強筋骨輕身利丈夫生石城山川谷及華陰山採無時

羖羊角 味鹹苦温微寒無毒主青盲明目殺疥蟲止寒洩辟惡鬼虎狼止驚悸療百節中結氣風頭痛及蠱毒吐血婦人産後餘痛燒之殺鬼魅辟虎狼久服安心益氣輕身生河西川谷取無時勿使中濕濕即有毒

羊髓 味甘温無毒主男女傷中陰氣不足利血脉益經氣以酒服之

青羊膽 主青盲明目

羊肺 補肺主欬嗽

羊心 止憂恚膈氣

羊腎 補腎氣益精髓

羊齒 主小兒羊癇寒熱三月三日取之

羊肉 味甘大熱無毒主緩中字乳餘疾及頭腦大風汗出虛勞寒冷補中益氣安心止驚

羊骨 熱主虛勞寒中羸瘦

羊屎 燔之主小兒洩痢腸鳴驚癇

牛角䚡 下閉血瘀血疼痛女人帶下血燔之味苦無毒

水牛角 療時氣寒熱頭痛髓補中塡骨髓久服增年

髓 味甘温無毒主安五藏平三焦温骨髓補中續絕傷益氣止洩痢消渇以酒服之

膽 可圓藥膽味苦大寒除心腹熱渇利口焦燥益目精

心 主虛忘

肝 主明目

腎 主補腎氣益精

齒 主小兒牛癇

肉味鹹平無毒主消渴止吐洩安中益氣養脾胃自死者不良

屎寒主水腫惡氣用塗門戶著壁者燔之主鼠瘻惡瘡

黃犍牛**烏牯牛**溺主水腫腹脹脚滿利小便

白馬莖味鹹甘平無毒主傷中脉絶陰不起強志益氣長肌

肉肥健生子小兒驚癇陰乾百日

眼主驚癇腹滿瘧疾

懸蹄主驚邪瘈瘲乳難辟惡氣鬼毒蠱疰不祥止衄血內漏

駒齒生雲中平澤

白馬蹄療婦人瘻下白崩

赤馬蹄療婦人赤崩

齒主小兒馬癇

鬐頭膏主生髮

鬐毛主女子崩中赤白

心主喜忘

肺主寒熱小兒莖痿

肉味辛苦冷主熱下氣長筋強腰脊壯健強志輕身不飢**脯**

療寒熱痿痺

屎名馬通微溫主婦人崩中止渴及吐下血鼻衄金瘡止血

頭骨主喜眠令人不睡

溺味辛微寒主消渴破癥堅積聚男子伏梁積疝婦人瘕疾

銅器承飲之

牡狗陰莖味鹹平無毒主傷中陰痿不起令強熱大生子除

女子帶下十二疾一名狗精六月上伏取陰乾百日

膽主明目痂瘍惡瘡

心主憂恚氣除邪

腦主頭風痺下部䘌瘡鼻中息

齒 主癲癇寒熱卒風痱伏日取之
頭骨 主金瘡止血
四脚蹄 煑飲之下乳汁
白狗血 味鹹無毒主癲疾發作
肉 味鹹酸温主安五藏補絶傷輕身益氣
屎中骨 主寒熱小兒驚癇
鹿茸 味甘酸温微温無毒主漏下惡血寒熱驚癇益氣強志生齒不老療虛勞洒洒如瘧羸瘦四肢酸疼腰脊痛小便利洩精溺血破留血在腹散石淋癰腫骨中熱疽癢
骨 安胎下氣殺鬼精物不可近陰令痿久服耐老四月五月解角時取陰乾使時燥
角 味鹹無毒主惡瘡癰腫逐邪惡氣留血在陰中除小腹血急痛腰脊痛折傷惡血益氣七月取

髓 味甘温主丈夫女子傷中絶脉筋急痛欬逆以酒和服之良
腎 平主補腎氣
肉 温補中強五藏益氣力生者療口僻割薄之
麞骨 微温主虛損洩精
肉 温補益五藏
髓 益氣力悅澤人面
虎骨 主除邪惡氣殺鬼疰毒止驚悸主惡瘡鼠瘻頭骨尤良
膏 主狗嚙瘡
爪 辟惡魅
肉 主惡心欲嘔益氣力
豹肉 味酸平無毒主安五藏補絶傷輕身益氣久服利人
狸骨 味甘温無毒主風疰尸疰鬼疰毒氣在皮中淫躍如針刺者心腹痛走無常處及鼠瘻惡瘡頭骨尤良

肉 療諸疰

陰莖 主月水不通男子陰㿗燒之以東流水服之

兔頭骨 平無毒主頭眩痛癲疾

骨 主熱中消渴

腦 主凍瘡

肝 主目暗

肉 味辛平無毒主補中益氣

六畜毛蹄甲 味鹹平有毒主鬼疰蠱毒寒熱驚癇癲痓狂走

駱駝毛 尤良

鼺鼠 主墮胎令産易生山都平谷

麋脂 味辛溫無毒主癰腫惡瘡死肌寒風濕痺四肢拘緩不收風頭腫氣通腠理柔皮膚不可近陰令痿一名宮脂

角 味甘無毒主痺止血益氣力生南山山谷及淮海邊十月取

豚卵 味甘溫無毒主驚癇癲疾鬼疰蠱毒除寒熱賁豚五癃邪氣攣縮一名豚顛陰乾藏之勿令敗

懸蹄 主五痔伏熱在腸腸癰內蝕

猪四足 小寒主傷撻諸敗瘡下乳汁

心 主驚邪憂恚

腎 冷和理腎氣通利膀胱

膽 主傷寒熱渴

肚 主補中益氣止渴利

齒 主小兒驚癇五月五日取

鬐膏 生髮

肪膏 主煎諸膏藥解斑猫芫青毒

豭猪肉 味酸冷療狂病

凡猪肉 味苦主閉血脉弱筋骨虛人肌不可久食病人金瘡

者尤甚

猪屎 主寒熱黄疸濕痹

鼹鼠 味鹹無毒主癰疽諸瘻蝕惡瘡陰䘌爛瘡在土中行五月取令乾燔之

獺肝 味甘有毒主鬼疰蠱毒却魚鯁止久嗽燒服之

肉 療疫氣温病及牛馬時行病煮屎灌之亦良

狐陰莖 味甘有毒主女子絶産陰痒小兒陰㿉卵腫

五藏及**腸** 味苦微寒有毒主蠱毒寒熱小兒驚癇

雄狐屎 燒之辟惡在木石上者是

猯肉胞膏 味甘平無毒主上氣乏氣欬逆酒和三合服之日二又主馬肺病蟲顙等病

肉 主久水脹不瘥垂死者作羹臛食之下水大效胞乾之湯磨如雞卵許空腹服吐諸蠱毒

野猪黄 味辛甘平無毒主金瘡止血生肉療癲癇水研如棗核日二服效

驢屎 熬之主熨風腫瘻瘡

屎汁 主心腹卒痛諸疰忤

尿 主癥癖胃反吐不止牙齒痛水毒

牝驢尿 主燥水

駁驢尿 主濕水一服五合良燥水者畫體成字濕水者不成字

乳 主小兒熱急黄等多服使痢

尾下軸垢 主瘧水洗取汁和麪如彈丸二枚作燒餅瘧未發前食一枚至發時食一枚療瘧無久新發無期者

豺皮 性熱主冷痹脚氣熟之以纏病上即瘥

丹雄雞 味甘微温微寒無毒主女人崩中漏下赤白沃補虛温中止血久傷乏瘡通神殺毒辟不祥

頭　主殺鬼東門上者尤良

白雄雞肉　味酸微温主下氣療狂邪安五藏傷中消渴

烏雄雞肉　微温主補中止痛

膽　微寒主療目不明肌瘡

心　主五邪

血　主踒折骨痛及痿痹

肪　主耳聾

腸　主遺溺小便數不禁

肝　及左翅毛主起陰

冠血　主乳難

肶胵裏黃皮　微寒主泄利小便利遺溺除熱止煩

屎白　微寒主消渴傷寒寒熱破石淋及轉筋利小便止遺溺

滅瘢痕

黑雌雞　主風寒濕痹五緩六急安胎

血　無毒主中惡腹痛及踒折骨痛乳難

翮羽　主下血閉

黃雌雞　味酸甘平主傷中消渴小便數不禁腸澼泄利補益

五藏　續絕傷療勞益氣

肋骨　主小兒羸瘦食不生肌

雞子　主除熱火瘡癇痓可作虎魄神物

卵白　微寒療目熱赤痛除心下伏熱止煩滿欬逆小兒下泄

婦人產難胞衣不出醯漬之一宿療黃疸破大煩熱

卵中白皮　主久欬結氣得麻黃紫菀和服之立已雞白蠹肥

脂生朝鮮平澤

白鵝膏　主耳卒聾以灌之

毛　主射工水毒

肉平利五藏
鶩肪味甘無毒主風虛寒熱
白鴨屎名通主殺石藥毒解結縛散畜熱
肉補虛除熱和藏腑利水道
鴈肪味甘平無毒主風攣拘急偏枯氣不通利久服長毛髮
鬚眉益氣不飢輕身耐老一名鶩肪生江南池澤取無時
鷓鴣味甘溫無毒主嶺南野葛菌毒生金毒及溫瘴久欲死
不可差者合毛熬酒漬服之生擣取汁服最良生江南形似
母雞鳴云鈎輈格磔者是
雉肉味酸微寒無毒主補中益氣力止洩痢除蟻瘻
鷹屎白主傷撻滅瘢
雀卵味酸溫無毒主下氣男子陰痿不起強之令熱多精有子
腦主耳聾
頭血主雀盲
雄雀屎療目痛決癰癤女子帶下溺不利除疝瘕五月取之良
鸛骨味甘無毒主鬼蠱諸疰毒五尸心腹疾
雄鵲肉味甘寒無毒主石淋消結熱可燒作灰以石投中散
解者是雄也
鴝鵒肉味甘平無毒主五痔止血炙食或為散飲服之
鷰屎味辛平有毒主蠱毒鬼疰逐不祥邪氣破五癃利小便
生高山平谷
孔雀屎微寒主女子帶下小便不利
鸕鷀屎一名蜀水花去面黑䵟黶誌
頭微寒主鯁及噎燒服之
鴟頭味鹹平無毒主頭風眩顛倒癇疾

千金翼方卷第二

千金翼方卷第四

本草下

蟲魚部七十一味　論一首

石蜜 味甘平微溫無毒主心腹邪氣諸驚癎痓安五藏諸不足益氣補中止痛解毒除衆病和百藥養脾氣除心煩食飲不下止腸澼肌中疼痛口瘡明耳目久服強志輕身不飢不老延年神仙一名石飴生武都山谷河源山谷及諸山石中色白如膏者良

蜜蠟 味甘微溫無毒主下痢膿血補中續絶傷金瘡益氣不飢耐老

白蠟 療久洩澼後重見白膿補絶傷利小兒久服輕身不飢生武都山谷生於蜜房木石間

蜂子 味甘平微寒無毒主風頭除蠱毒補虛羸傷中心腹痛

大人小兒腹中五蟲口吐出者面目黄久服令人光澤好顏
色不老輕身益氣
大黄蜂子 主心腹脹滿痛乾嘔輕身益氣
土蜂子 主癰腫嗌痛一名蜚零生武都山谷
牡蠣 味鹹平微寒無毒主傷寒寒熱溫瘧洒洒驚恚怒氣除
拘緩鼠瘻女子帶下赤白除留熱在關節榮衛虛熱去來不
定煩滿止汗心痛氣結止渴除老血澀大小腸止大小便療
洩精喉痺欬嗽心脅下痞熱久服強骨節殺邪鬼延年一名
蠣蛤一名牡蛤生東海池澤採無時
桑螵蛸 味鹹甘平無毒主傷中疝瘕陰痿益精生子女子血
閉腰痛通五淋利小便水道又療男子虛損五藏氣微夢寐
失精遺溺久服益氣養神一名蝕肬生桑枝上螳蜋子也二
月三月採蒸之當火炙不爾令人洩

海蛤 味苦鹹平無毒主欬逆上氣喘息煩滿胷痛寒熱療陰
痿一名魁蛤生東海
文蛤 味鹹平無毒主惡瘡蝕五痔欬逆胷痺腰痛脅急鼠瘻
大孔出血崩中漏下生東海表有文取無時
魁蛤 味甘平無毒主痿痺洩痢便膿血一名魁陸一名活東
生東海正圓兩頭空表有文取無時
石決明 味鹹平無毒主目障翳痛青盲久服益精輕身生南海
秦龜 味苦無毒主除濕痺氣身重四肢關節不可動搖生山
之陰土中二月八月取
龜甲 味鹹甘平有毒主漏下赤白破癥瘕痎瘧五痔陰蝕濕
痺四肢重弱小兒顖不合頭瘡難燥女子陰瘡及驚恚氣心
腹痛不可久立骨中寒熱傷寒勞復或肌體寒熱欲死以作
湯良久服輕身不飢益氣資智亦使人能食一名神屋生南

海池澤及湖水中採無時勿令中濕中濕即有毒

鯉魚膽 味苦寒無毒主目熱赤痛青盲明目久服強悍益志氣

肉 味甘主欬逆上氣黃疸止渴生者主水腫脚滿下氣

骨 主女子帶下赤白

齒 主石淋生九江池澤取無時

蠡魚 味甘寒無毒主濕痺面目浮腫下大水療五痔有瘡者不可食令人瘢白一名鮦魚生九江池澤取無時

鮑魚 味辛臭温無毒主墜墮骽蹷踠折瘀血血痺在四肢不散者女子崩中血不止勿令中鹹

鮧魚 味甘無毒主百病

鱓魚 味甘大温無毒主補中益血療瀋脣五月五日取頭骨燒之止痢

鯽魚 主諸瘡燒以醬汁和塗之或取猪脂煎用又主腸癰頭灰主小兒頭瘡口瘡重舌目翳一名鮒魚合蓴作羹主胃弱不下食作鱠主久赤白痢

伏翼 味鹹平無毒主目瞑癢痛淋利水道明目夜視有精光久服令人喜樂媚好無憂一名蝙蝠生太山川谷及人家屋間立夏後採陰乾

天鼠屎 味辛寒無毒主面癰腫皮膚洗洗時痛腹中血氣破寒熱積聚除驚悸去面黑皯一名鼠法一名石肝生合浦山谷十月十二月取

蝟皮 味苦平無毒主五痔陰蝕下血赤白五色血汁不止陰腫痛引腰背酒煑殺之又療腹痛疝積亦燒爲灰酒服之生楚山川谷田野取無時勿使中濕

石龍子 味鹹寒有小毒主五癃邪結氣破石淋下血利小便利水道一名蜥蜴一名山龍子一名守宮一名石蜴生平陽川

谷及荊山山石間五月取著石上令乾

露蜂房味苦鹹平有毒主驚癇瘈瘲寒熱邪氣癲疾鬼精蠱毒腸痔火熬之良又療蜂毒毒腫一名蜂腸一名百穿一名蜂䴈生牂牁山谷七月七日採陰乾

樗雞味苦平有小毒主心腹邪氣陰痿益精強志生子好色補中輕身又療腰痛下氣強陰多精不可近目生河內川谷樗樹上七月採暴乾

蚱蟬味鹹甘寒無毒主小兒驚癇夜啼癲病寒熱驚悸婦人乳難胞衣不出又墮胎生楊柳上五月採蒸乾之勿令蠹

白殭蠶味鹹辛平無毒主小兒驚癇夜啼去三蟲滅黑䵟令人面色好男子陰瘍病女子崩中赤白産後餘痛滅諸瘡瘢痕生潁川平澤四月取自死者勿令中濕中濕有毒不可用

木䖟味苦平有毒主目赤痛眥傷淚出瘀血血閉寒熱酸慚無子一名魂常生漢中川澤五月取

蜚虻味苦微寒有毒主逐瘀血破下血積堅痞癥瘕寒熱通利血脉及九竅女子月水不通積聚除賊血在胷腹五藏者及喉痺結塞生江夏川谷五月取腹有血者良

蜚蠊味鹹寒有毒主血瘀癥堅寒熱破積聚喉咽痺內寒無子通利血脉生晉陽川澤及人家屋間立秋採

䗪蟲味鹹寒有毒主心腹寒熱洗洗血積癥瘕破堅下血閉生子大良一名地鼈一名土鼈生河東川澤及沙中人家墻壁下土中濕處十月取暴乾

蠐螬味鹹微溫微寒有毒主惡血血瘀痺氣破折血在脅下堅滿痛月閉目中淫膚青翳白膜療吐血在胷腹不去及破骨踒折血結金瘡內塞産後中寒下乳汁一名蟦蠐一名䖃齊一名勃齊生河內平澤及人家積糞草中取無時反行者良

蛞蝓 味鹹寒無毒主賊風喎僻軼筋及脫肛驚癇攣縮一名
陵蠡一名土蝸一名附蝸生太山池澤及陰地沙石垣下八
月取
蝸牛 味鹹寒主賊風喎僻踠跌大腸下脫肛筋急及驚癇
水蛭 味鹹苦平微寒有毒主逐惡血瘀血月閉破血瘕積聚
無子利水道及墮胎一名蚑一名至掌生雷澤池澤五月六
月採暴乾
鼈甲 味鹹平無毒主心腹癥瘕堅積寒熱去痞息肉陰蝕痔
惡肉療溫瘧血瘕腰痛小兒脅下堅
肉 味甘主傷中益氣補不足生丹陽池澤取無時
鮀魚甲 味辛微溫有毒主心腹癥瘕伏堅積聚寒熱女子崩
中下血五色小腹陰中相引痛瘡疥死肌五邪涕泣時驚腰
中重痛小兒氣癃眥潰

肉 主少氣吸吸足不立地生南海池澤取無時
烏賊魚骨 味鹹微溫無毒主女子漏下赤白經汁血閉陰蝕
腫痛寒熱癥瘕無子驚氣入腹腹痛環臍陰中寒腫令人有
子又止瘡多膿汁不燥
肉 味酸平主益氣強志生東海池澤取無時
蟹 味鹹寒有毒主胸中邪氣熱結痛喎僻面腫敗漆燒之致
鼠解結散血愈漆瘡養筋益氣
爪 主破胞墮胎生伊洛池澤諸水中取無時
原蠶蛾 雄者有小毒主益精氣強陰道交接不倦亦止精
屎 溫無毒主腸鳴熱中消渴風痹癮疹
鰻鱺魚 味甘有毒主五痔瘡瘻殺諸蟲
鮫魚皮 主蠱氣蠱疰方用之即裝刀靶鯌魚皮也
紫貝 主明目去熱毒

肉 釀作酒療癩疾諸瘻心腹痛下結氣除蠱毒其腹中吞鼠
有小毒療鼠瘻

鯪鯉甲 微寒主五邪驚啼悲傷燒之作灰以酒或水和方寸
匕療蟻瘻

蜘蛛 微寒主大人小兒㿗七月七日取其網療喜忘

蜻蛉 微寒強陰止精

石蠶 味鹹寒有毒主五癃破石淋墮胎

肉 解結氣利水道除熱一名沙蝨生江漢池澤

蛇蛻 味鹹甘平無毒主小兒百二十種驚癇瘈瘲癲疾寒熱
腸痔蟲毒蛇癇弄舌搖頭大人五邪言語僻越惡瘡嘔欬明
目火熬之良一名龍子衣一名蛇符一名龍子皮一名龍
子單衣一名弓皮生荊州川谷及田野五月五日十五日取
之良

蝦蟇 味辛寒有毒主邪氣破癥堅血癰腫陰瘡服之不患熱
病療陰蝕疽癘惡瘡猘犬傷瘡能合玉石一名蟾蜍一名䗇
又一名去甫一名苦蠪生江湖池澤五月五日取陰乾東行
者良

鼃 味甘寒無毒主小兒赤氣肌瘡臍傷止痛氣不足一名長
股生水中取無時

牡鼠 微溫無毒療踒折續筋骨擣傅之三日一易四足及尾
主婦人墮胎易產

肉 熱無毒主小兒哺露大腹炙食之

糞 微寒無毒主小兒癇疾大腹時行勞復

蚺蛇膽 味甘苦寒有小毒主心腹䘌痛下部䘌瘡目腫痛

膏 平有小毒主皮膚風毒婦人產後腹痛餘疾

蝮蛇膽 味苦微寒有毒主䘌瘡

蛇黃 主心痛疰忤石淋產難小兒驚癇以水煮研服汁出嶺
南蛇腹中得之圓重如錫黃黑青雜色

蜈蚣 味辛溫有毒主鬼疰蠱毒噉諸蛇蟲魚毒殺鬼物老精
溫瘧去三蟲療心腹寒熱結聚墮胎去惡血生大吳川谷江
南赤頭足者良

馬陸 味辛溫有毒主腹中大堅癥破積聚息肉惡瘡白禿療
寒熱痞結脅下滿一名百足一名馬軸生玄菟川谷

蠮螉 味辛平無毒主久聾欬逆毒氣出刺出汗療鼻窒其土
房主癰腫風頭一名土蜂生熊耳川谷及牂牁或人屋間

雀甕 味甘平無毒主小兒驚癇寒熱結氣蠱毒鬼疰一名躁
舍生漢中採蒸之生樹枝間蛅蟖房也八月取

鼠婦 味酸溫微寒無毒主氣癃不得小便婦人月閉血瘕癇
痓寒熱利水道一名負蟠一名蛜蝛一名螻蝝生魏郡平谷
及人家地上五月五日取

螢火 味辛微溫無毒主明目小兒火瘡傷熱氣蠱毒鬼疰通
神精一名夜光一名放火一名熠燿一名即炤生階地池澤
七月七日取陰乾

衣魚 味鹹溫無毒主婦人疝瘕小便不利小兒中風項強背
起摩之又療淋墮胎塗瘡滅瘢一名白魚一名蟫生咸陽平澤

白頸蚯蚓 味鹹寒大寒無毒主蛇瘕去三蟲伏尸鬼疰蠱毒
殺長蟲仍自化作水療傷寒伏熱狂謬大腹黃疸一名土龍
生平土三月取陰乾

螻蛄 味鹹寒無毒主產難出肉中刺潰癰腫下哽噎解毒除
惡瘡一名蟪蛄一名天螻一名螜生東城平澤夜出者良夏
至取暴乾

蜣蜋 味鹹寒有毒主小兒驚癇瘈瘲腹脹寒熱大人癲疾狂

易手足端寒肢滿賁豚一名蛣蟯火熬之良生長沙池澤五月五日取蒸藏之臨用當炙勿置水中令人吐

斑猫 味辛寒有毒主寒熱鬼疰蠱毒鼠瘻疥癬惡瘡疽蝕死肌破石癃血積傷人肌墮胎一名龍尾生河東川谷八月取陰乾

芫青 味辛微温有毒主蠱毒風疰鬼疰墮胎三月取暴乾

葛上亭長 味辛微温有毒主蠱毒鬼疰破淋結積聚墮胎七月取暴乾

地膽 味辛寒有毒主鬼疰寒熱鼠瘻惡瘡死肌破癥瘕墮胎蝕瘡中惡肉鼻中息肉散結氣石淋去子服一刀圭即下一名蚖青一名青蛙生汶山川谷八月取

馬刀 味辛微寒有毒主漏下赤白寒熱破石淋殺禽獸賊鼠除五藏間熱肌中鼠鼷止煩滿補中去厥痺利機関用之當鍊得水爛人腸又云得水良一名馬蛤生江湖池澤及東海取無時

田中螺汁 大寒主目熱赤痛止渴

貝子 味鹹平有毒主目瞖鬼疰蠱毒腹痛下血五癃利水道除寒熱温疰解肌散結熱燒用之良一名貝齒生東海池澤

甲香 味鹹平無毒主心腹滿痛氣急止痢下淋生南海

珂 味鹹平無毒主目中瞖斷血生肌貝類也大如鰒皮黃黑而骨白以為馬飾生南海採無時

論曰鳥獸蟲魚之類凡一百一十六種皆是生命各各自保愛其身與人不殊所以稱近取諸身遠取諸物人自受命即鳥獸自愛固可知也是以須藥者皆須訪覓先死者或市中求之必不可得自殺生以救己命若殺之者非立方之意也慎之慎之

果部二十五味

豆蔻味辛溫無毒主溫中心腹痛嘔吐去口臭氣生南海

葡萄味甘平無毒主筋骨濕痺益氣倍力強志令人肥健耐飢忍風寒久食輕身不老延年可作酒逐水利小便生隴西五原燉煌山谷

蓬蘽味酸鹹平無毒主安五藏益精氣長陰令堅強志倍力有子又療暴中風身熱大驚久服輕身不老一名覆盆一名陵藁一名陰藁生荊山平澤及宛句

覆盆子味甘平無毒主益氣輕身令髮不白五月採

大棗味甘平無毒主心腹邪氣安中養脾助十二經平胃氣通九竅補少氣少津液身中不足大驚四肢重和百藥補中益氣強力除煩悶療心下懸腸澼久服輕身長年不飢神仙一名乾棗一名美棗一名良棗八月採暴乾**三歲陳核中人**燔之味苦主腹痛邪氣

生棗味甘辛多食令人多寒熱羸瘦者不可食

葉覆麻黃能令出汗生河東平澤

藕實莖味甘平寒無毒主補中養神益氣力除百疾久服輕身耐老不飢延年一名水芝丹一名蓮生汝南池澤八月採

雞頭實味甘平無毒主濕痺腰脊膝痛補中除暴疾益精氣強志令耳目聰明久服輕身不飢耐老神仙一名鴈喙實一名芡生雷澤池澤八月採

芰實味甘平無毒主安中補五藏不飢輕身一名菱

栗味鹹溫無毒主益氣厚腸胃補腎氣令人耐飢生山陰九月採

櫻桃味甘主調中益脾氣令人好顏色美志

梅實味酸平無毒主下氣除熱煩滿安心肢體痛偏枯不仁死肌去青黑誌惡疾止下痢好唾口乾生漢中川谷五月採

火乾

枇杷葉 味苦平無毒主卒啘不止下氣

柿 味甘寒無毒主通鼻耳氣腸澼不足

木瓜實 味酸溫無毒主濕痺邪氣霍亂大吐下轉筋不止其枝亦可煑用之

甘蔗 味甘平無毒主下氣和中助脾氣利大腸

石蜜 味甘寒無毒主心腹熱脹口乾渴性冷利出益州及西戎煎鍊沙糖為之可作餅塊黃白色

沙糖 味甘寒無毒功體與石蜜同而冷利過之笮甘蔗汁煎作蜀地西戎江東並有之

芋 味辛平有毒主寬腸胃充肌膚滑中一名土芝

烏芋 味苦甘微寒無毒主消渴痺熱溫中益氣一名藉姑一名水萍二月生葉如芋三月三日採根暴乾

杏核仁 味甘苦溫冷利有毒主欬逆上氣雷鳴喉痺下氣產乳金瘡寒心賁豚驚癇心下煩熱風氣去來時行頭痛解肌消心下急殺狗毒五月採之其兩仁者殺人可以毒狗

花 味苦無毒主補不足女子傷中寒熱痺厥逆

實 味酸不可多食傷筋骨生晉山川谷

桃核仁 味苦甘平無毒主瘀血血閉瘕邪氣殺小蟲止欬逆上氣消心下堅除卒暴擊血破癥瘕通月水止痛七月採取仁陰乾

桃花 殺疰惡鬼令人好顏色味苦平無毒主除水氣破石淋利大小便下三蟲悅澤人面三月三日採陰乾

桃梟 味苦微溫主殺百鬼精物療中惡腹痛殺精魅五毒不祥一名桃奴一名梟景是實著樹不落實中者正月採之

桃毛 主下血瘕寒熱積聚無子帶下諸疾破堅閉刮取毛用之

桃蠹 殺鬼辟邪惡不祥食桃樹蟲也
莖白皮 味苦辛無毒除邪鬼中惡腹痛去胃中熱
葉 味苦平無毒主除尸蟲出瘡中蟲
膠 鍊之主保中不飢忍風寒
實 味酸多食令人有熱生太山川谷
李核仁 味苦平無毒主僵仆躋瘀血骨痛
根皮 大寒主消渴止心煩逆奔氣
實 味苦除痼熱調中
梨 味甘微酸寒多食令人寒中金瘡乳婦尤不可食
柰 味苦寒多食令人臚脹病人尤甚
安石榴 味甘酸無毒主咽燥渴損人肺不可多食
酸實殼 療下痢止漏精
東行根 療蚘蟲寸白

菜部二十七味

白瓜子 味甘平寒無毒主令人悅澤好顏色益氣不飢久服輕身耐老主除煩滿不樂久服寒中可作面脂令面悅澤一名水芝一名白瓜子生嵩高平澤冬瓜人也八月採
白冬瓜 味甘微寒主除小腹水脹利小便止渴
瓜蔕 味苦寒有毒主大水身面四肢浮腫下水殺蠱毒欬逆上氣及食諸果病在胷腹中皆吐下之去鼻中息肉療黃疸
花 主心痛欬逆生嵩高平澤七月七日採陰乾
冬葵子 味甘寒無毒主五藏六腑寒熱羸瘦五癃利小便療婦人乳難內閉久服堅骨長肌肉輕身延年生少室山十二月採之
葵根 味甘寒無毒主惡瘡療淋利小便解蜀椒毒
葉 為百菜主其心傷人

莧實 味甘寒大寒無毒主青盲白瞖明目除邪利大小便去寒熱殺蚘蟲久服益氣力不飢輕身一名馬莧一名莫實細莧亦同生淮陽川澤及田中葉如藍十一月採

苦菜 味苦寒無毒主五藏邪氣厭穀胃痺腸澼渴熱中疾惡瘡久服安心益氣聰察少卧輕身耐老耐飢寒高氣不老一名荼苦一名選一名游冬生益州川谷山陵道傍淩冬不死三月三日採陰乾

薺 味甘温無毒主利肝氣和中其實主明目目痛

蕪菁及蘆菔 味苦温無毒主利五藏輕身益氣可長食之蕪菁子主明目

萊菔根 味辛甘温無毒散服及炮煑服食大下氣消穀去痰澼肥健人生擣服主消渴試有大效

龍葵 味苦寒無毒食之解勞少睡去虛熱腫其子療丁腫所在有之

菘 味甘温無毒主通利腸胃除胷中煩解酒渴

芥 味辛温無毒歸鼻主除腎邪氣利九竅明耳目安中久食温中

苜蓿 味苦平無毒主安中利人可久食

荏子 味辛温無毒主欬逆下氣温中補體葉主調中去臭氣九月採陰乾

蓼實 味辛温無毒主明目温中耐風寒下水氣面目浮腫癰瘍葉歸於舌除大小腸邪氣利中益志馬蓼去腸中蛭蟲輕身生雷澤川澤

葱實 味辛温無毒主明目補中不足其莖葱白平可作湯主傷寒寒熱出汗中風面目腫傷寒骨肉痛喉痺不通安胎歸於目除肝邪氣安中利五藏益目睛殺百藥毒

葱根 主傷寒頭疼

葱汁 平温主溺血解藜蘆毒

薤 味辛苦温無毒主金瘡瘡敗輕身不飢耐老歸於骨菜芝也除寒熱去水氣温中散結利病人諸瘡中風寒水腫以塗之生魯山平澤

韭 味辛微酸温無毒歸於心安五藏除胃中熱利病人可久食子主夢泄精溺白根主養髮白蘘荷微温主中蠱及瘧

苦菜 味甘苦大寒主時行壯熱解風熱毒

紫蘇 味辛温主下氣除寒中其子尤良

水蘇 味辛微温無毒主下氣殺穀除飲食辟口臭去毒辟惡氣久服通神明輕身耐老主吐血衂血血崩一名雞蘇一名勞祖一名芥葅一名芥苴生九真池澤七月採

假蘇 味辛温無毒主寒熱鼠瘻瘰癧生瘡破結聚氣下瘀血除濕痹一名鼠蓂一名薑芥生漢中川澤

香薷 味辛微温主霍亂腹痛吐下散水腫

薄荷 味辛苦温無毒主賊風傷寒發汗惡氣心腹脹滿霍亂宿食不消下氣煮汁服亦堪生食人家種之飲汁發汗大解勞乏

秦荻梨 味辛温無毒主心腹冷脹下氣消食人所噉者生下濕地所在有之

苦瓠 味苦寒有毒主大水面目四肢浮腫下水令人吐生晉地川澤

水芹 味甘平無毒主女子赤沃止血養精保血脉益氣令人肥健嗜食一名水英生南海池澤

馬芹子 味甘辛温無毒主心腹脹滿下氣消食調味用之香似橘皮而無苦味

蓴味甘寒無毒主消渴熱痺

落葵味酸寒無毒主滑中散熱實主悅澤人面一名天葵一名繁露

繁蔞味酸平無毒主積年惡瘡不愈五月五日日中採乾用之

蕺味辛微溫主蠷螋溺瘡多食令人氣喘

葫味辛溫有毒主散癰腫䘌瘡除風邪殺毒氣獨子者亦佳歸五藏久食傷人損目明五月五日採

蒜味辛溫有小毒歸脾腎主霍亂腹中不安消穀理胃溫中除邪痺毒氣五月五日採之

堇汁味甘寒無毒主馬毒瘡擣汁洗之并服之堇菜也出小品方萬異方云除蛇蝎毒及癰腫

芸薹味辛溫無毒主風游丹腫乳癰

米穀部二十八味

胡麻味甘平無毒主傷中虛羸補五內益氣力長肌肉填髓腦堅筋骨療金瘡止痛及傷寒溫瘧大吐後虛熱羸困久服輕身不老明耳目耐飢渴延年以作油微寒利大腸胞衣不落生者摩瘡腫生禿髮一名巨勝一名狗蝨一名方莖一名鴻藏葉名青蘘生上黨川澤

青蘘味甘寒無毒主五藏邪氣風寒濕痺益氣補腦髓堅筋骨久服耳目聰明不飢不老增壽巨勝苗也生中原川谷

麻蕡味辛平有毒主五勞七傷利五藏下血寒氣破積止痺散膿多食令人見鬼狂走久服通神明輕身一名麻勃此麻花上勃勃者七月七日採良

麻子味甘平無毒主補中益氣中風汗出逐水利小便破積血復血脉乳婦產後餘疾長髮可為沐藥久服肥健不老神仙九月採入土者損人生太山川谷

餳糖　味甘微温主補虛乏止渴去血

大豆黃卷　味甘平無毒主濕痺筋攣膝痛五藏胃氣結積益氣止毒去黑皯潤澤皮毛

生大豆　味甘平塗癰腫煑汁飲殺鬼毒止痛逐水脹除胃中熱痺傷中淋露下瘀血散五藏結積内寒殺烏頭毒久服令人身重炒爲屑味甘主胃中熱去腫除痺消穀止腹脹生太山平澤九月採

赤小豆　味甘酸平無毒主下水排癰腫膿血寒熱熱中消渴止洩利小便吐逆卒澼下脹滿

豉　味苦寒無毒主傷寒頭痛寒熱瘴氣惡毒煩躁滿悶虛勞喘吸兩脚疼冷又殺六畜胎子諸毒

大麥　味鹹温微寒無毒主消渴除熱益氣調中又云令人多熱爲五穀長

穬麥　味甘微寒無毒主輕身除熱久服令人多力健行以作蘖温消食和中

小麥　味甘微寒無毒主除熱止躁渴咽乾利小便養肝氣止漏血唾血以作麴温消穀止痢以作麪温不能消熱止煩

青粱米　味甘微寒無毒主胃痺熱中消渴止洩利小便益氣補中輕身長年

黃粱米　味甘平無毒主益氣和中止洩

白粱米　味甘微寒無毒主除熱益氣

粟米　味鹹微寒無毒主養腎氣去胃脾中熱益氣陳者味苦主胃熱消渴利小便

丹黍米　味苦微温無毒主欬逆霍亂止洩除熱止煩渴

蘗米　味苦無毒主寒中下氣除熱

秫米　味甘微寒止寒熱利大腸療漆瘡

陳廩米 味鹹酸溫無毒主下氣除煩渴調胃止洩

酒 味苦甘辛大熱有毒主行藥勢殺百邪惡氣

腐婢 味辛平無毒主痎瘧寒熱邪氣洩痢陰不起止消渴病酒頭痛生漢中即小豆花也七月採陰乾

藊豆 味甘微溫主和中下氣葉主霍亂吐下不止

黍米 味甘溫無毒主益氣補中多熱令人煩

粳米 味甘苦平無毒主益氣止煩止洩

稻米 味苦主溫中令人多熱大便堅

稷米 味甘無毒主益氣補不足

醋 味酸溫無毒主消癰腫散水氣殺邪毒

醬 味鹹酸冷利主除熱止煩滿殺百藥熱湯及火毒

食鹽 味鹹溫無毒主殺鬼蠱邪疰毒氣下部䘌瘡傷寒寒熱吐胸中痰澼止心腹卒痛堅肌骨多食傷肺喜欬

有名未用 一百九十六味

青玉 味甘平無毒主婦人無子輕身不老長年一名瑴玉生藍田

白玉髓 味甘平無毒主婦人無子不老延年生藍田玉石間

玉英 味甘主風瘙皮膚痒一名石鏡明白可作鏡生山竅數十二月採

璧玉 味甘無毒主明目益氣使人多精生子

合玉石 味甘無毒主益氣療消渴輕身辟穀生常山中丘如彘肪

紫石華 味甘平無毒主渴去小腸熱一名茈石華生中牛山陰採無時

白石華 味辛無毒主癉消渴膀胱熱生掖北鄉北邑山採無時

黑石華 味甘無毒主陰痿消渴去熱療月水不利生弗其勞

山陰石間採無時

黃石華 味甘無毒主陰痿消渴膈中熱去百毒生液北山黃色採無時

厲石華 味甘無毒主益氣養神止渴除熱強陰生江南如石花採無時

石肺 味辛無毒主癘欬寒久痿益氣明目生水中狀如肺黑澤有赤文出水即乾陶隱居云今浮石亦療欬似肺而不黑澤恐非是

石肝 味酸無毒主身痒令人色美生常山色如肝

石脾 味甘無毒主胃寒熱益氣令人有子一名胃石一名膏石一名消石生隱蕃山谷石間黑如大豆有赤文色微黃而輕薄如碁子採無時

石腎 味鹹無毒主泄痢色如白珠

封石 味甘無毒主消渴熱中女子疽蝕生常山及少室採無時

陵石 味甘無毒主益氣耐寒輕身長年生華山其形薄澤

碧石青 味甘無毒主明目益精去白瘢延年

遂石 味甘無毒主消渴傷中益氣生太山陰採無時

白肌石 味辛無毒主強筋骨止渴不飢陰熱不足一名肌石一名洞石生廣焦國卷山青石間

龍石膏 無毒主消渴益壽生杜陵如鐵脂中黃

五羽石 主輕身長年一名金黃生海水中蓬葭山上倉中黃如金

石流青 味酸無毒主療泄益肝氣明目輕身長年生武都山石間青白色

石流赤 味苦無毒主婦人帶下止血輕身長年理如石耆生山石間

石耆 味甘無毒主欬逆氣生石間色赤如鐵脂四月採

紫加石 味酸主痺血氣一名赤英一名石血赤無理生邯鄲山如爵茈二月採

終石 味辛無毒主陰痿痺小便難益精氣生陵陰採無時

王伯 味酸溫無毒主輕身益氣止渴一名玉遂生石上如松高一五六寸紫花用莖葉

文石 味甘主寒熱心煩一名黍石生東郡山澤中水下五色有汁潤澤

曼諸石 味甘主益五藏氣輕身長年一名陰精六月七月石上青黃色夜有光

山慈石 味苦平有毒主女子帶下一名爰茈生山之陽正月生葉如藜蘆莖有衣

石濡 主明目益精氣令人不飢渴輕身長年一名石芥

石芸 味甘無毒主目痛淋露寒熱溢血一名螫烈一名顧喙二月五月採莖葉陰乾

石劇 味甘無毒主渴消中

路石 味甘酸無毒主心腹止汗生肌酒痂益氣耐寒實骨髓一名陵石生草石上天雨獨乾日出獨濡花黃莖赤黑三歲一實赤如麻子五月十月採莖葉陰乾

曠石 味甘平無毒主益氣養神除熱止渴生江南如石草

敗石 味苦無毒主渴痺

越砥石 味甘無毒主目盲止痛除熱瘙

金莖 味苦平無毒主金瘡內漏一名葉金草生澤中高處

夏臺 味甘主百疾濟絕氣

柒紫 味苦主小腹痛利小腹破積聚長肌肉久服輕身長年生冤句二月七月採

鬼目 味酸平無毒主明目一名來甘實赤如五味十月採

鬼蓋味甘平無毒主小兒寒熱癇一名地蓋生垣墻下叢生赤旦生暮死

馬顛味甘有毒療浮腫不可多食

馬唐味甘寒主調中明耳目一名羊麻一名羊粟生下濕地莖有節生根五月採

馬逢味辛無毒主癬蟲

牛舌實味鹹溫無毒主輕身益氣一名彖尸生水中澤傍實大葉長尺五月採

羊乳味甘溫無毒主頭眩痛益氣長肌肉一名地黃三月採立夏後母死

羊實味苦寒主頭禿惡瘡疥瘙痂癬生蜀郡

犀洛味甘無毒主癃一名星洛一名泥洛

鹿良味鹹臭主小兒驚癇賁豚瘈瘲大人痓五月採

莵棗味酸無毒主輕身益氣生丹陽陵地高尺許實如棗

雀梅味酸寒有毒主蝕惡瘡一名千雀生海水石谷間葉與實如麥李

雀翹味鹹主益氣明目一名去母一名更生生藍中葉細黃莖赤有刺四月實兊黃中黑五月採陰乾

雞涅味甘平無毒主明目目中寒風諸不足水腹邪氣補中止洩痢療女子白沃一名陰洛生雞山採無時

相烏味苦主陰痿一名烏葵如蘭香赤莖生山陽五月十五日採陰乾

鼠耳味酸無毒主痺寒寒熱止欬一名無心生田中下地厚華肥莖

蛇舌味酸平無毒主除留血驚氣蛇癇生大水之陽四月採花八月採根

龍常草 味鹹溫無毒主輕身益陰氣療痹寒溼生河水傍如龍芻冬夏生

離樓草 味鹹平無毒主益氣力多子輕身長年生常山七月八月採實

神護草 可使獨守叱咄人寇盜不敢入門生常山北八月採

黃護草 無毒主痺益氣令人嗜食生隴西

吳唐草 味甘平無毒主輕身益氣長年生故稻田中日夜有光草中有膏

天雄草 味甘溫無毒主益氣陰痿生山澤中狀如蘭實如大豆赤色

雀醫草 味苦無毒主輕身益氣洗浴爛瘡療風水一名白氣春生秋花白冬實黑

木甘草 主療癰腫盛熱煑洗之生木間三月生大葉如蛇床四四相值但折枝種之便生五月花白實核赤三月三日採

益決草 味辛溫無毒主欬逆肺傷生山陰根如細辛

九熟草 味甘溫無毒主出汗止洩療悶一名烏粟一名雀粟生人家庭中葉如棗一歲九熟七月採

兌草 味酸平無毒主輕身益氣長年生蔓草木上葉黃有毛冬生

酸草 主輕身延年生名山醴泉上陰居莖有五葉青澤根赤黃可以消玉一名醜草

異草 味甘無毒主痿痺寒熱去黑子生籬木上葉如葵莖傍有角汁白

灌草葉 主癰腫一名鼠肝葉滑青白

茈草 味辛無毒主傷金瘡

莘草 味甘無毒主盛傷痺腫生山澤如蒲黃葉如芥

勒草 味甘無毒主瘀血止精溢盛氣一名黑草生山谷如栝樓
英草華 味辛平無毒主痺氣強陰療面勞疽解煩堅筋骨療
風頭可作沐藥生蔓木上一名鹿英九月採陰乾
吳葵華 味鹹無毒主理心心氣不足
封華 味甘有毒主疥瘡養肌去惡肉夏至日採
北荇華 味苦無毒主氣脉溢一云芹華
隩華 味甘無毒主上氣解煩堅筋骨
排華 味苦主水氣去赤蟲令人好色不可久服春生乃採
節華 味苦無毒主傷中痿痺溢腫皮主脾中客熱氣一名山
節一名達節一名通漆十月採暴乾
徐李 主益氣輕身長年生太山陰如李小形實青色無核熟
採食之
新雉木 味苦香溫無毒主風眩痛可作沐藥七月採陰乾實
如桃
合新木 味辛平無毒解心煩止瘡痛生遼東
俳蒲木 味甘平無毒主少氣止煩生陵谷葉如柰實赤三核
遂陽木 味甘無毒主益氣生山中如白楊葉三月實十月熟
赤可食
學木核 味甘寒無毒主脅下留飲胃氣不平除熱如雞核五
月採陰乾
木核 療腸澼華療不足子療傷中根療心腹逆氣止渴十月採
栒核 味苦療水身面癰腫五月採
荻皮 味苦止消渴去白蟲益氣生江南如松葉有刺實赤黃
十月採
桑莖實 味酸溫無毒主字乳餘疾輕身益氣一名草王葉如
荏方莖大葉生園中十月採

蒲陰實 味酸平無毒主益氣除熱止渴利小便輕身長年生深山谷及園中莖如芥葉小實如櫻桃七月成

可聚實 味甘溫無毒主輕身益氣明目一名長壽生山野道中穗如麥葉如艾五月採

讓實 味酸主喉痺止洩痢十月採陰乾

惠實 味辛主明目補中

根莖中湯 一作溺 療傷寒寒熱出汗中風面腫消渴熱中逐水生魯山平澤

青雌 味苦主惡瘡禿敗瘡火氣殺三蟲一名蟲損一名孟推生方山山谷

白背 味苦平無毒主寒熱洗浴疥惡瘡生山陵根似紫葳葉如燕廬採無時

白女腸 味辛溫無毒主洩痢腸澼療心痛破疝瘕生深山谷中葉如藍實赤赤女腸亦同

白扇根 味苦寒無毒主瘧皮膚寒熱出汗令人變

白給 味辛平無毒主伏蟲白癬腫痛生山谷如藜蘆根白相連九月採

白并 味苦無毒主肺欬上氣行五藏令百病不起一名玉簫一名箭悍葉如小竹根黃皮白生山陵三月四月採根暴乾

白辛 味辛有毒主寒熱一名脫尾一名羊草生楚山三月採根白而香

白昌 味甘無毒主食諸蟲一名水昌一名水宿一名莖蒲十月採

赤舉 味甘無毒主腹痛一名羊飴一名陵渴生山陰二月花

兗蔓草 上五月實黑中有核三月三日採葉陰乾

赤涅 味甘無毒主疰崩中止血益氣生蜀郡山石陰地濕處

採無時

黃秫　味苦無毒主心煩止汗出生如桐根

徐黃　味辛平無毒主心腹積瘕莖主惡瘡生澤中大莖細葉香如藁本

黃白支　生山陵三月四月採根暴乾

紫藍　味鹹無毒主食肉得毒能消除之

紫給　味鹹主毒風頭洩注一名野葵生高陵下地三月三日採根根如烏頭

天蓼　味辛有毒主惡瘡去痺氣一名石龍生水中

地朕　味苦平無毒主心氣女子陰疝血結一名承夜一名夜光三月採

地芩　味苦無毒主小兒癇除邪養胎風痺洗洗寒熱目中青瞖女子帶下生腐木積草處如朝生天雨生蟲黃白色四月採

地筋　味甘平無毒主益氣止渴除熱在腹臍利筋一名菅根一名土筋生澤中根有毛三月生四月實白三月三日採根

地耳　味甘無毒主明目益氣令人有子生丘陵如碧石青

土齒　味甘平無毒主輕身益氣長年生山陵地中狀如馬牙

燕齒　主小兒癇寒熱五月五日採

酸惡　主惡瘡去白蟲生水傍狀如澤瀉

酸赭　味酸主內漏止血不足生昌陽山採無時

巴棘　味苦有毒主惡疥瘡出蟲一名女木生高地葉白有刺根連數十枚

巴朱　味甘無毒主寒止血帶下生雒陽

蜀格　味苦平無毒主寒熱痿痺女子帶下癰腫生山陽如藿菌有刺

纍根　主緩筋令不痛

苗根 味鹹平無毒主痺及熱中傷跌折生山陰谷中蔓草藤
上莖有刺實如椒
參果根 味苦有毒主鼠瘻一名百連一名烏蓼一名鼠莖一
名鹿蒲生百餘根根有衣裹莖三月三日採根
黃辯 味甘平無毒主心腹疝瘕口瘡臍傷一名經辯
良達 主齒痛止渴輕身生山陰莖蔓延大如葵子滑小
對廬 味苦寒無毒主疥諸久瘡不瘳生死肌除大熱煑洗之
八月採似菴蕳
糞藍 味苦主身癢瘡白禿漆瘡洗之生房陵
委蛇 味甘平無毒主消渴少氣令人耐寒生人家園中大枝
長鬚多葉而兩兩相值子如芥子
麻伯 味酸無毒主益氣出汗一名君莒一名衍草一名道止
一名自死生平陵如蘭葉黑厚白裹莖實赤黑九月採根

土明 味苦主身熱邪氣小兒身熱以浴之生山谷一名王草
類鼻 味酸溫無毒主痿痺一名類重生田中高地葉如天名
精美根五月採
師系 味甘無毒主癰腫惡瘡煑洗之一名臣堯一名臣骨一
名鬼芭生平澤八月採
逐折 殺鼠益氣明目一名百合厚實生木間莖黃七月實黑
如大豆
并苦 主欬逆上氣益肺氣安五藏一名蜮熏一名玉荊三月
採陰乾
領灰 味甘有毒主心腹痛鍊中不足葉如芒草冬生燒作灰
父陛根 味辛有毒以熨癰腫膚脹一名膏魚一名梓藻
索干 味苦無毒主易耳一名馬耳
荊莖 療灼爛八月十月採陰乾

鬼麗生石上挼之日柔爲沐
竹付味甘無毒主止痛除血
秘惡味酸無毒主療肝邪氣一名杜逢
唐夷味苦無毒主療踒折
知杖味甘無毒療疝
垄松味辛無毒主眩痺
河煎味酸主結氣癰在喉頸者生海中八月九月採
區余味辛無毒主心腹熱癃
三葉味辛主寒熱蛇蜂螫人一名起莫一名三石一名當田
生田中莖小黑白高三尺根黑三月採陰乾
五母麻味苦有毒主痿痺不便下痢一名鹿麻一名歸澤麻
一名天麻一名若一草生田野五月採
疥拍腹味辛溫無毒主輕身療痺五月採陰乾生上黨

常吏之生味苦平無毒主明目實有刺大如稻米
救赦人者味甘有毒主疝痺通氣諸不足生人家宮室五月
十月採暴乾
丁公寄味甘主金瘡痛延年一名丁父生石間蔓延木上葉
細大枝赤莖母大如磧黃有汁七月七日採
城裏赤柱味辛平療婦人漏血白沃陰蝕濕痺邪氣補中益
氣生晉平陽
城東腐木味鹹溫主心腹痛止洩便膿血
芥味苦寒無毒主消渴止血婦人疾除痺一名梨葉如大青
載味酸無毒主諸惡氣
慶味苦無毒主欬嗽
腂味甘無毒主益氣延年生山谷中白順理十月採
雄黃蟲主明目辟兵不祥益氣力狀如蠮螉

天社蟲 味甘無毒主絶孕益氣如蜂大腰食草木葉三月採

桑蠹蟲 味甘無毒主心暴痛金瘡肉生不足

石蠹蟲 主石癃小便不利生石中

行夜 療腹痛寒熱利血一名負盤

蝸籬 味甘無毒主燭館明目生江夏

麋魚 味甘無毒主痺止血

丹戩 味辛主心腹積血一名飛龍生蜀都如鼠負青股蜚翼赤七月七日採

扁前 味甘有毒主鼠瘻癃利水道生山陵如牛虻翼赤五月八月採

蚖類 療痺內漏一名蚖短土色而文

蜚厲 主婦人寒熱

梗雞 味甘無毒療痺

益符 療閉一名無舌

地防 令人不飢不渴生黃陵如濡居土中

黃蟲 味苦療寒熱生地上赤頭長足有角羣居七月七日採

唐本退二十味

薰草 味甘平無毒主明目止淚療泄精去臭惡氣傷寒頭痛上氣腰痛一名蕙草生下濕地三月採陰乾脫節者良

姑活 味甘溫無毒主大風邪氣濕痺寒痛久服輕身益壽耐老一名冬葵子生河東

別羇 味苦微溫無毒主風寒濕痺身重四肢疼酸寒邪歷節痛一名別枝一名別騎一名鼈羇生藍田川谷二月八月採

牡蒿 味苦溫無毒主充肌膚益氣令人暴肥不可久服血脉滿盛生田野五月八月採

石下長卿 味鹹平有毒主鬼疰精物邪惡氣殺百精蠱毒老

魅注易亡走啼哭悲傷恍惚一名徐長卿生隴西池澤山谷
麋舌味辛微温無毒主霍亂腹痛吐逆心煩生水中五月採
練石草味苦寒無毒主五癃破石淋膀胱中結氣利水道小
便生南陽川澤
弋共味苦寒無毒主驚氣傷寒腹痛羸瘦皮中有邪氣手足
寒無色生益州山谷
蕈草味鹹平無毒主養心氣除心温温辛痛浸淫身熱可作
鹽花生淮南平澤七月採
五色符味苦微温主欬逆五藏邪氣調中益氣明目殺蝨青
符白符赤符黑符黃符各隨色補其藏白符一名女木生巴
郡山谷
蘘草味甘苦寒無毒主温瘧寒熱酸嘶邪氣辟不祥生淮南
山谷

翹根味甘寒平有小毒主下熱氣益陰精令人面悅好明目
久服輕身耐老以作蒸飲酒病人生嵩高平澤二月八月採
鼠姑味苦平寒無毒主欬逆上氣寒熱鼠瘻惡瘡邪氣一名
䁍生丹水
船虹味酸無毒主下氣止煩滿可作浴湯藥色黃生蜀郡立
秋取
屈草味苦微寒無毒主胷脅下痛邪氣腸間寒熱陰痺久服
輕身益氣耐老生漢中川澤五月採
赤赫味苦寒有毒主痂瘍惡敗瘡除三蟲邪氣生益州川谷
二月八月採
淮木味苦平無毒主久欬上氣傷中虛羸補中益氣女子陰
蝕漏下赤白沃一名百歲城中木生晉陽平澤
占斯味苦温無毒主邪氣濕痺寒熱疽瘡除水堅積血癥月

閉無子小兒躄不能行諸惡瘡癰腫止腹痛令人子有子一名炭皮生太山山谷採無時

野女桃 味辛平無毒主止洩腸澼除熱調中益脾氣令人好色美志一名牛桃一名英豆實大如麥多毛四月採陰乾

鴆鳥毛 有大毒入五藏爛殺人其口主殺蝮蛇毒一名鵋日生南海

千金翼方卷第四

千金翼方卷第五

婦人一

論曰婦人之病難療比之丈夫十倍費功所以古人別立婦人之方焉是以今方具在四卷一卷泛療婦人三卷專論產後好學者宜細意用心觀之迺得覩其深趣耳

婦人求子第一　論一首　方七首

論曰夫人求子者服藥須有次第不得不知其次第者男服七子散女服盪胞湯及坐藥并服紫石門冬丸則無不得效矣不知此者得力鮮焉

七子散 主丈夫風虛目闇精氣衰少無子補不足方

牡荊子　五味子　菟絲子　車前子

菥蓂子　石斛　薯蕷　乾地黃

杜仲去皮炙　鹿茸炙　遠志各貳兩　附子炮去皮

蛇牀子 芎藭各壹兩半 山茱萸 天雄炮去皮
人參 茯苓 黃耆 牛膝各伍分
桂心貳兩半 巴戟天叁兩 肉從蓉柒分 鍾乳貳兩无亦得
右貳拾肆味擣篩爲散酒服方寸匕日二不知加至二匕以知爲度忌生冷醋滑猪雞魚蒜油麪不能酒者蜜和丸服亦佳一方加覆盆子二兩行房法一依素女經女人月信斷一日爲男二日爲女三日爲男四日爲女以外無子每日午時夜半後行事生子吉餘時生子不吉

蕩胞湯主婦人斷緒二三十年及生來無子并數數失子服此皆有子長命無病方

朴消 桃仁去皮尖兩人者熬 茯苓 牡丹皮
大黃各叁兩 人參 桂心 芍藥 厚朴炙
細辛 牛膝 當歸 橘皮各貳兩 附子壹兩半炮去皮
虻蟲去翅足熬 水蛭各陸拾枚熬
右壹拾陸味㕮咀以酒五升水六升合漬一宿煮取三升分肆服日三夜一服每服相去三時辰少時更服如常覆被少取汗汗不出冬月著火籠必下積血及冷赤膿如赤小豆汁本爲婦人子宮內有此惡物令然或天陰臍下痛或月水不調爲有冷血不受胎若斟酌下盡氣力弱大困不堪更服亦一日二三服即止如大悶不堪可食酢飯冷漿一口即止然恐去惡物不盡不大得藥力若能忍服盡大好一日後仍著導藥千金更有桔梗甘草各貳兩

坐導藥方

皂莢壹兩炙去皮子 五味子 乾薑 細辛各叁兩
葶藶子熬 苦瓠各叁分千金作山茱萸 礬石燒半日 大黃
戎鹽 蜀椒汗 當歸各貳兩

右壹拾壹味擣篩內輕絹袋子中如指許大長三寸盛藥令滿內子門中坐臥任意勿行走急小便時即去之仍易新者一日當下青黃冷汁汁盡止即可幸御自有子若未見病出亦可至十日安之（千金無葶藶一本又有砒霜三分）著藥後一日廼服紫石天門冬丸

紫石天門冬圓

紫石英（七日研之）　烏頭（炮去皮）　天門冬（各叁兩去心）
烏賊魚骨　牛膝（各壹兩半）　人參　牡丹皮
桑寄生　乾薑　細辛　厚朴（炙）　食茱萸
續斷（各五分）　署預（壹兩半）　柏子仁（壹兩）　牡荊子（千金作牡蒙）
禹餘糧　紫葳　石斛　辛夷心　卷柏
當歸　芎藭　桂心　乾地黃　甘草（炙各貳兩）

右貳拾陸味擣篩為末鍊蜜和丸如梧桐子酒服十九日三稍加至叁拾丸慎如藥法

白薇丸 主久無子或斷緒上熱下冷百病皆療方

白薇　車前子（各三分）　澤蘭　太一餘粮
赤石脂　細辛　人參　桃仁（去尖皮熬）　覆盆子
麥門冬（去心）　白芷（各一兩半）　紫石英　石膏（研）　藁本
菴藺子　卷柏（各伍分）　蒲黃　桂心（各二兩半）　當歸
芎藭　蛇牀子（各一兩）　乾薑　蜀椒（汗）
乾地黃（各二兩）　茯苓　遠志（去心）　白龍骨（各一兩）
橘皮（半兩）

右貳拾捌味擣篩為末鍊蜜和丸如梧桐子酒服拾伍丸日再增至肆拾丸以知為度亦可增至伍拾丸慎猪雞蒜生冷醋滑驢馬等肉覺有娠則止祕之勿妄傳也

慶雲散 主丈夫陽氣不足不能施化施化無成方

覆盆子　五味子各貳升　菟絲子壹升　白朮熬令色変
石斛各三兩　天雄壹兩炮去皮　天門冬玖兩去心　紫石英貳兩
桑寄生肆兩

右玖味擣篩爲散先食酒服方寸匕日三素不耐冷者去寄生加細辛肆兩陽氣不少而無子者去石斛加檳榔拾伍枚良

承澤丸主婦人下焦三十六疾不孕絶產方

梅核仁　辛夷各壹升　葛上亭長柒枚　澤蘭子伍合
溲疏　藁本各壹兩

右陸味擣篩爲末鍊蜜和丸如大豆先食酒服貳丸日三不知稍增之若腹中無堅積者去亭長加通草壹兩惡甘者和藥先以苦酒搜散乃内少蜜和爲丸

婦人積聚第二　方一十三首

牡蒙丸主男子疝瘕女子血瘕心腹堅積聚乳餘疾小腹堅滿貫臍痛熱中腰背痛小便不利大便難不下食有伏蟲臚脹腫久寒熱胃管有邪氣方

牡蒙　蓯蓉　烏喙炮去皮　石膏研　藜蘆各三分
巴豆陸拾枚去心皮熬　乾薑　桂心各二兩　半夏伍分洗

右玖味擣篩爲末別擣巴豆如膏合諸藥令調和擣至熟以飲服如小豆貳丸日三如不相得入少蜜

烏頭丸主心腹積聚膈中氣悶脹滿疝瘕內傷瘀血產乳衆病及諸不足方

烏頭炮去皮　巴豆去心皮熬各半兩　人參　消石各壹兩
大黃二兩　戎鹽壹兩半　苦參　黃芩　䗪蟲熬
半夏洗　桂心各三八分

右壹拾壹味擣篩爲末内蜜青牛膽汁拌和擣二千杵丸

如梧桐子大宿不食酒服五丸卧須臾當下黃者心腹積
也青如粥汁者膈上邪氣也下崩血如腐肉者內傷也赤
如血者乳餘疾也如蟲刺者蟲也下已必渴渴飲粥飢食
蘇糜三日後當溫食食必肥濃四十日平復

乾薑丸 治婦人瘕結脅肋下疾

乾薑壹兩半 芎藭 芍藥各貳兩 前胡熬 乾地黃熬
桃仁熬去皮尖兩仁者 茯苓各壹兩 人參 當歸各參兩
杏仁熬去皮尖兩仁者 朴消 蜀椒汗 蠐螬熬
䗪蟲熬 虻蟲去翅足熬 水蛭各壹合熬

右壹拾陸味擣篩為末鍊蜜和丸如梧桐子未食以飲服
參丸可增至拾丸千金用大黃柴胡各貳兩無前胡地黃

生地黃丸 主婦人臍下結堅大如杯升月經不通發熱往來
下痢羸瘦此為氣瘕也若生肉癥不可療未生癥者可療方

生地黃參拾斤擣絞取汁 乾漆壹斤熬擣篩為末

右二味相和微火煎令可圓藥成丸如梧桐子大食後以
酒服五圓千金云服參圓集驗至七八圓止

遼東都尉所上圓 主臍下堅癖無所不療

恒山 巴豆去心皮熬 大黃各壹分 天雄貳枚大者炮
雚蘆壹兩半一方貳兩 乾薑 人參 苦參
丹參 沙參 玄參 細辛 白薇各參分
龍膽 牡蒙各壹兩 芍藥 附子炮去皮 狼牙
牛膝 茯苓各伍分

右貳拾味擣篩為末鍊蜜和丸宿勿食酒服伍圓日參主
大羸瘦而黃月水不調當十五日服之下長蟲或下種種
病出二十五日腹中所苦悉愈肌膚充盛五十日萬病除
矣斷緒者皆有子也

五京圓主婦人腹中積聚九痛七害久寒腰中冷引小腹害食苦下或熱痢得冷便下方

乾薑(叁兩) 黃芩(壹兩) 吳茱萸(壹升) 附子(炮去皮)

狼毒 當歸 牡蠣(熬各貳兩)

右柒味擣篩為末鍊蜜和圓如梧桐子大酒日服伍圓加至拾圓此出京氏五君故名五京圓久患冷當服之

雞鳴紫圓主婦人腹中癥瘕積聚

大黃(貳兩) 前胡 人參(各肆兩) 皂莢(炙去皮子)

巴豆(去皮心熬) 礬石(鍊) 烏喙(炮去皮各半兩) 藜蘆

阿膠(壹兩半炙) 桂心(壹兩八分) 杏仁(去皮尖熬) 代赭(伍分)

乾薑 甘草(各叁八分)

右壹拾肆味擣篩為末鍊蜜和圓雞鳴時飲服壹圓如梧桐子日益壹圓至伍圓止仍從壹圓起下白者風也赤者癥瘕也青者疝也黃者心腹病也如白泔爛腐者水也

炭皮圓主婦人憂恚心下支滿膈氣腹熱月經不利血氣上搶心欲嘔不可眠懈怠不勤

炭皮 芎藭(各壹分) 桂心 乾薑 乾漆(熬)

白朮(各壹分半) 蜀椒(汗) 黃芩 芍藥 土瓜根

大黃(炙蜥蛉䗪蟲蟲各半兩去翅足熬)

右壹拾貳味擣篩為末鍊蜜和圓如梧桐子飲服五圓日叁不知稍增之

七氣圓主婦人勞氣食氣胷滿氣吐逆大下氣其病短氣胷脅滿氣結痛小便赤黃頭重方

葶藶子(熬) 半夏(各壹兩洗) 大黃 玄參 人參

苦參 麥門冬(去心) 黃芩 乾薑 芎藭

遠志(去心各壹兩半) 消石(壹兩) 瞿麥(壹兩半)

右壹拾叁味擣篩為末鍊蜜和圓如梧桐子以酒服陸圓

日一服亦理嘔逆破積聚

半夏湯 主婦人胷滿心下堅咽中貼貼如有炙臠咽之不下吐之不出方

半夏壹升洗　生薑伍兩　茯苓　厚朴各肆兩

右肆味㕮咀以水陸升煮取叁升分叁服　千金有蘇葉貳兩

厚朴湯 主婦人下焦勞冷膀胱腎氣損弱白汁與小便俱出

厚朴如手大長肆寸去皮炙削以酒伍升煮兩沸去滓取桂心壹尺絹篩內汁中調和宿勿食曉頓服之

溫經湯 主婦人小腹痛方

茯苓陸兩　芍藥　土瓜根各叁兩　薏苡仁半升

右肆味㕮咀以酒叁升漬一宿曉加叁升水煎取貳升分再服之

大補內黃耆湯 主婦人七傷骨髓疼小腹急滿面目黃黑不能食飲并諸虛不足少氣心悸不安方

黃耆　半夏各叁兩洗　大棗叁拾枚　當歸　乾地黃

桂心　人參　茯苓　遠志去心　芍藥

澤瀉　五味子　麥門冬去心　白术

甘草各貳兩炙　乾薑肆兩

右壹拾陸味㕮咀以水壹斗半煮取貳升壹服五合日叁

婦人乳疾第二　方六首

治乳堅方

當歸　芍藥　黃耆　蒺藜子　雞骨

附子炮去皮　枳實各貳兩炙　桂心叁兩　人參　薏苡仁各壹兩

右壹拾味擣篩為散酒服方寸匕日三服

治乳癰始作方

大黃　楝實　芍藥　馬蹄炙

右肆味等分擣篩為散酒服方寸匕取汗出差廣濟云治乳癰大堅硬赤紫色衣不得近痛不可忍經宿乃消

排膿散主乳癰方

鐵粉　細辛　芎藭　人參　防風

乾薑　黃芩　桂心　芍藥　蓯蓉各壹兩

當歸　甘草炙各伍分

右壹拾貳味擣篩為散酒服方寸匕日三夜一服加至一匕半服十日膿血出多勿怪是惡物除

生魚薄乳癰方

生鯽魚長五　伏龍肝　大黃　莽草各陸兩

右肆味別擣魚如膏下篩三物更擣令調以生地黃汁一升

如粥傅腫上日五六夜二三

治乳癰初有異則行此湯并將圓補之即愈方

麥門冬壹升去心　黃芩　黃耆　芍藥

茯苓　甘草炙　通草各貳兩　桑寄生　防風

人參各叁兩　糖捌兩　大棗拾枚

右壹拾貳味㕮咀以水壹斗煮取叁升去滓內糖分肆服

次服天門冬圓

天門冬伍兩去心　通草　黃耆　防風

乾地黃　桑寄生　人參各貳兩　羌活叁兩　大黃貳兩半

白芷壹兩半　升麻壹兩半　澤蘭　茯神　天雄炮去皮

黃芩　枳實炙　五味子各壹兩

右壹拾柒味擣篩為末鍊蜜和圓酒服貳拾圓日二加至

叁拾圓

婦人雜病第四

方一十二首

治婦人斷產方

故蠶子布壹尺燒一味末酒下終身不復懷孕也

治婦人無故尿血方

龍骨伍兩

右壹味擣篩爲散酒服方寸匕空腹服日三久者貳拾服愈

又方

鹿角屑　大豆黄卷　桂心各壹兩

右叁味擣篩爲散空腹酒服方寸匕日三服

又方

舡故茹爲散酒服方寸匕日三服亦主遺尿

治婦人遺尿不知出時方

白薇　芍藥各貳兩半

右貳味擣篩爲散酒服方寸匕日三服

又方

礬石熬　牡蠣熬各叁兩

右貳味擣篩爲散酒服方寸匕亦治丈夫

治妊娠得熱病五六日小便不利熱入五藏方

葵子壹升　榆白皮壹把切

右貳味水伍升煑五沸服一升日三服

又方

葵子　茯苓各壹兩

右貳味擣篩爲散水服方寸匕日三小便利則止

治婦人小便不通方

葵子貳升　朴消壹兩

右貳味以水五升煑取二升分再服

治婦人卒不得小便方

杏仁柒枚熬令變色去皮尖

右壹味擣篩爲散以水服之立下

又方

紫菀爲末井花水服三指撮立通

治丈夫婦人轉胞不得小便八九日方

滑石壹兩碎　寒水石壹兩碎　葵子壹升

右叁味以水一斗煮取五升服一升即利

婦人經服硫黃圓忽患頭痛項冷冷歇又心胷煩熱眉骨眼眥癢痛有時生瘡喉中乾燥四肢痛癢方

栝樓根　麥門冬去心　龍膽各叁兩　土瓜根捌兩

大黃貳兩　杏仁壹升去尖皮兩仁熬

右陸味擣篩爲末別擣杏仁如泥鍊蜜和圓如梧桐子大飲下拾圓日三稍加至二十圓

婦人面藥第五

論一首　方二十九首

論曰面脂手膏衣香澡豆仕人貴勝皆是所要然今之醫門極爲祕惜不許子弟泄漏一法至於父子之間亦不傳示然聖人立法欲使家家悉解人人自知豈使愚於天下令至道不行擁蔽聖人之意甚可怪也

面脂主面及皴黶黑皯凡是面上之病悉皆主之方

丁香拾分　零陵香　桃仁去皮　土瓜根　白斂

白及　梔子花　沈香　防風　當歸

辛夷　麝香研　芎藭　商陸各叁兩　白芷

萎蕤　菟絲子　甘松香　藿香各拾伍分　蜀水花

青木香各貳兩　茯苓拾肆分　木蘭皮　藁本

白殭蠶各貳兩半　冬瓜仁肆兩　鵝脂

羊腎脂壹升　猪胰貳具　清酒伍升　生猪肪脂叁大升　羊髓各壹升半

右叁拾貳味切以上件酒挼猪胰汁漬藥一宿於脂中以

炭火煎三上三下白芷黃綿濾貯器中以塗面

面脂方

防風　芎藭　白芷　白殭蠶　藁本

萎蕤　茯苓　白斂　細辛　土瓜根

栝樓仁　桃仁去皮尖　蜀水花　青木香　當歸

辛夷各半兩　鵝脂壹升　羊腎脂壹升　猪脂貳升

右壹拾玖味細切綿裹酒二升漬一日一夜內脂中急火煎之三上三下然後緩火一夜藥成去滓以寒水石粉半兩內脂中以柳木篦熟攪任用之

又方

杏仁貳升去皮尖　白附子参兩　密陀僧貳兩研如粉

生白羊髓貳升半　真珠拾肆枚研如粉　白鮮皮壹兩

雞子白柒枚　胡粉貳兩以帛肆重裹壹石米下蒸之熟下陰乾

右捌味以清酒貳升半先取杏仁於盆中研之如膏又下雞子白研二百遍又下羊髓研貳百遍擣篩諸藥內之研五百遍至千遍彌佳初研杏仁即少少下酒薄漸漸下使盡藥成以指捻看如脂即可用也草藥絹篩直取細如粉佳

又方

當歸　芎藭　細辛各伍分　蜀水花　密陀僧

商陸　辛夷　木蘭皮　栝樓　白殭蠶

藁本　桃花　香附子　杜蘅　鷹屎

零陵香　萎蕤　土瓜根各叁分　麝香

丁香各半兩　白朮貳兩　白芷柒分　白附子　玉屑各壹兩

鵝脂伍合　鹿髓壹升　白蠟肆兩　猪膏貳兩　羊髓壹升

右貳拾玖味細切醋浸密封一宿明曉以猪膏煎三上三下以白芷黃為藥成去滓攪數萬遍令色白傅面慎風日良

面膏方

杜蘅　牡蠣（熬一云杜若）　防風　藁本

細辛　白附子　白芷　當歸　木蘭皮

白术　獨活　萎蕤　天雄　茯苓

玉屑（各壹兩）　菟絲子　防己　商陸　梔子花

橘皮（一云橘仁）　白斂　人參（各叁兩）　甘松香　青木香

藿香　零陵香　丁香（各貳兩）　麝香（半兩）　白犬脂

白鵝脂（無鵝脂以羊髓代之）　牛髓（各壹升）　羊胰（叁具）

右叁拾貳味以水浸膏髓等五日日別再易水又五日日別一易水又十日二日一易水凡二十日止以酒壹升挼羊胰令消盡去脉乃細切香於瓷器中浸之密封一宿曉以諸脂等合煎三上三下以酒水氣盡為候即以綿布絞去滓研之千遍待凝乃止使白如雪每夜塗面晝則洗却

更塗新者十日以後色等桃花（外臺有冬瓜仁蘼蕪花無白斂人參）

面膏主有䵟𪒠及瘡瘢并皮膚皴劈方

防風　藁本　辛夷　芍藥　當歸

白芷　牛膝　商陸　細辛　密陀僧

芎藭　獨活　雞舌香　零陵香　萎蕤

木蘭皮　麝香　丁香　未穿真珠（各壹兩）

蕤仁　杏仁（各貳兩去皮尖）　牛髓（伍升）　油（壹升）

臘月豬脂（叁升煉）　麞鹿腦（各壹具若無麞鹿羊腦亦得）

右貳拾伍味先以水浸腦髓使白藿香以上㕮咀如麥片乃於腦髓脂油內煎之三上三下即以綿裹搦去滓乃內麝香及真珠末研之千遍凝即塗面上甚妙（今按藥止二十六味後一云藿香以上而方中無藿香必脫漏叁味也）

又方

香附子拾枚大者 白芷壹兩 零陵香貳兩 茯苓壹大兩
蔓菁油貳升無即豬脂代之 牛髓 羊髓各壹斗
白蠟捌兩 麝香半兩
右玖味切以油髓微火煎五物令色變去滓內麝香研千
遍凝每澡豆洗面而塗之

面藥方

朱砂研 雄黃研 水銀霜各半兩 胡粉貳團 黃鷹屎壹升
右伍味合和淨洗面夜塗之以壹兩藥和面脂令稠如泥
先於夜欲臥時澡豆淨洗面并手乾拭以藥塗面厚薄如
尋常塗面厚薄乃以指細細熟摩之令藥與肉相入乃臥
一上經五日五夜勿洗面止就上作粧即得要不洗面至
第六夜洗面塗一如前法滿三度洗更不塗也一如常洗
面也其色光淨與未塗時百倍也

悅澤面方

雄黃研 朱砂研 白殭蠶各壹兩 真珠拾枚研末
右肆味並粉末之以面脂和胡粉內藥和攪塗面作粧曉
以醋漿水洗面訖乃塗之三十日後如凝脂五十歲人塗
之面如弱冠夜常塗之勿絕

令面生光方

蜜陀僧研以乳煎之塗面即生光

令面白媚好方

白附子 白芷 杜若 赤石脂 白石脂
杏仁去皮尖 桃花 瓜子 牛膝 雞矢白
萎蕤 遠志去心
右壹拾貳味各三分擣篩為末以人乳汁一升白蜜一升
和空腹服柒圓日三服

鹿角用塗面方

鹿角壹握 芎藭 細辛 白蘞 白朮

白附子 天門冬去心 白芷各貳兩 杏仁貳拾枚去皮尖 牛乳叁升

右壹拾味鹿角先以水漬之百日令軟總內乳中微火煎之令汁竭出角以白練袋盛之餘藥勿收至夜取牛乳石上摩鹿角塗面曉以清漿水洗之令老如少也一方用酥叁兩

急面皮方

大豬蹄一具治如食法水二升清漿水一升不渝釜中煎成膠以洗面又和澡豆夜塗面曉以漿水洗令面皮急矣

治婦人令好顏色方

女菀貳兩半 鉛丹伍分

右貳味擣篩爲散酒服一刀圭日再服男十日女二十日知則止黑色皆從大便出色白如雪

又方

白瓜子伍分 白楊皮叁分 桃花壹兩

右叁味擣篩爲散以飲服方寸匕日三服三十日面白五十日手足白一云欲白加瓜子欲赤加桃花

令人面手白淨澡豆方

白鮮皮 白殭蠶 白附子 鷹屎白 白芷

芎藭 白朮 青木香一方用藁本 甘松香

白檀香 麝香 丁香各叁兩 桂心陸兩

瓜子壹兩一方用土瓜根 杏仁叁拾枚去皮尖 豬脂叁具

白梅叁七枚 冬瓜仁伍合 雞子白七枚 麪叁升

右貳拾味先以豬脂和麪暴令乾然後合諸藥擣篩爲散又和白豆屑二升用洗手面十日內色白如雪二十日如

凝脂千金有棗叁拾枚無桂心

又方

麝香貳分 豬胰兩具 大豆黃卷壹升伍合 桃花壹兩
菟絲子叁兩 冬葵子伍合一云冬瓜子 白附子貳兩
木蘭皮叁兩 萎蕤貳合 梔子花貳兩
苜蓿壹兩

右壹拾壹味以水浸豬胰三四度易水血色及浮脂盡乃擣諸味為散和令相得暴擣篩以洗手面面淨光潤而香

一方若無前件可得者直取苜蓿香一升土瓜根商陸青木香各一兩合擣為散洗手面大佳

澡豆方

細辛半兩 白朮叁分 栝樓貳枚 土瓜根叁分 皂莢伍挺炙去皮子
商陸壹兩半 冬瓜仁半升 雀矢半合 菟絲子貳合 豬胰壹具去脂
藁本 防風 白芷 白附子 茯苓
杏仁去皮尖 桃仁去皮尖各壹兩 豆末肆升 麪壹升

右壹拾玖味擣細篩以麪漿煑豬胰壹具令爛取汁和散作餅子暴之令乾更熟擣細羅之以洗手面甚佳

又方

丁香 沈香 青木香 桃花 鍾乳粉
真珠 玉屑 蜀水花 木瓜花各叁兩 㮈花
梨花 紅蓮花 李花 櫻桃花 白蜀葵花
旋復花各肆兩 麝香壹銖

右壹拾柒味擣諸花別擣諸香真珠玉屑別研成粉合和大豆末柒合研之千遍密貯勿洩常用洗手面作擬一百日其面如玉光淨潤澤臭氣粉滓皆除咽喉臂膊皆用洗之悉得如意

治面皰瘡瘢三十年以上并冷瘡蟲瘢令滅方

斑猫（去翅足熬）　巴豆（去心皮熬各叁枚）　胡粉　鵝脂

金洮沙　蜜陀僧　高良薑　海蛤（各叁兩）

右捌味為粉以鵝脂和夜半塗曉以甘草湯洗之

治面皯黯方

礬石（燒）　硫黃　白附子（各壹兩）

右叁味細研以大醋一盞浸之一宿淨洗面塗之慎風

治面皰方

白附子　青木香　麝香　由跋　細辛（各貳兩）

右五味細末水和之塗面日三（外臺方無細辛）

又方

木蘭皮（伍兩取厚者）　梔子仁（陸兩）

右貳味為散以蜜漿服方寸匕日三服

治面皰甚如麻豆痛癢搔之黃水出及黑色黯黮不可去方

冬瓜子　柏子仁　茯苓　冬葵子

右肆味等分擣篩飲服方寸匕日三服（外臺方無冬瓜子）

【白膏】主面瘡皰疥癰惡瘡方

附子（拾伍枚）　蜀椒（一升）　野葛（一尺伍寸）

右叁味切醋漬一宿猪膏一斤煎附子黃去滓塗之日三

【梔子圓】治酒瘡鼻皰方

梔子仁（叁升）　芎藭（肆兩）　大黃（陸兩）

好豉（熬叁升）　木蘭皮（半斤）　甘草（炙肆兩）

右陸味擣篩為末鍊蜜和圓如梧桐子以飲服拾圓日三

服稍加至貳拾伍圓

又傳方

蒺藜子　梔子仁　豉（各一兩）　木蘭皮（半斤一方無）

右肆味爲末以醋漿水和之如泥夜塗上日未出時以煖
水洗之亦滅瘢痕

又方

鸕鷀矢一斤

右壹味擣篩臘月猪脂和如泥夜塗之

飛水銀霜方

水銀一斤　朴消捌兩　大醋半升　黃礬拾兩
錫貳拾兩成鍊二遍者　玄精陸兩　鹽花叁斤

右柒味先鍊錫訖又溫水銀令熱乃投錫中又擣玄精黃礬令細以絹篩之又擣錫令碎以鹽花并玄精等合和以醋拌之令濕以鹽花壹斤藉底乃布藥令平以朴消蓋上訖以盆蓋合以鹽灰爲泥泥縫固際乾之微火三日武火四日凡七日去火一日開之掃取極須勤心守勿令須臾間懈慢大失矣

鍊粉方

胡粉三大升盆中盛水投粉於中熟攪以雞羽水上掃取以舊破雞子拾枚去黃瀉白於瓷椀中以粉置其上以瓷椀密蓋之伍升米下蒸之乃暴乾研用傅面百倍省面有光

滅瘢方

衣魚二枚　白石脂壹分　鴈屎三分　白附子一分　白殭蠶半兩

右伍味爲末臘月猪脂和傅愼生冷風日令肌膩

滅瘢方

丹參　羊脂

右貳味和煎傅之滅瘢神妙

又方

以蜜塗之佳

又方

取禹餘粮半夏等分擣末以雞子黄和先以新布拭皺上令赤以塗之勿見風塗之二十日十年皺並滅

手膏方

桃仁 杏仁各貳拾枚去皮尖 橘仁壹合 赤昀拾枚

大棗三拾枚 辛夷 芎藭 當歸 牛腦

羊腦 白狗腦各貳兩無白狗諸狗亦得

右壹拾壹味先以酒漬腦又別以酒陸升煑赤昀以上藥令沸停冷乃和諸腦等然後碎辛夷三味以綿裹之去棗皮核合内酒中以瓷器貯之五日以後先淨訖取塗手甚光潤而忌近火炙手

治手足皴裂血出疼痛方

取猪脂著熱酒中以洗之即瘥

治冬月冒涉凍凌面目手足瘃壞及始熱疼痛欲瘃方

取麥窠煑取濃汁熱漬手足兼洗之三五即度瘥

治手足皴凍欲脱方

椒 芎藭各半兩 白芷壹分 防風一分 薑一分作鹽

右伍味以水肆升煎令濃塗洗之三數遍即瘥

治凍傷十指欲墮方

取馬矢叁升煑令麻沸漬冷易之半日愈

熏衣浥衣香第六 方六首

熏衣香方

薫陸香捌兩 藿香 覽探各三兩一方無 甲香貳兩

詹糖伍兩 青桂皮伍兩

右陸味末前件乾香中先取硬者黏濕難碎者各別擣或

細切吹咀使如黍粟然後以一薄布於盤上自餘別擣亦別布於其上有須篩下者以紗不得太細別煎蜜就盤上以手搜搦令勻然後擣之燥濕必須調適不得過度太燥則難圓太濕則難燒濕則香氣不發燥則煙多煙多則惟有焦臭無復芬芳是故香復須麤細燥濕合度蜜與香相稱火又須微使香與綠煙而共盡

浥衣香方

沈香 苜蓿香各伍兩 丁香 甘松香

藿香 青木香 艾納香 雞舌香 雀腦香各壹兩

麝香半兩 白檀香叁兩 零陵香拾兩

右壹拾貳味各擣令如黍粟麩糠等物令細末乃和令相得若置衣箱中必須綿裹之不得用紙秋冬猶著盛熱暑之時令香速浥凡諸草香不但須新及時乃佳若欲少作者準此爲大率也

乾香方

丁香壹兩 麝香 白檀 沈香各半兩 零陵香伍兩

甘松香柒兩 藿香捌兩

右柒味先擣丁香令碎次擣甘松香合擣訖乃和麝香合和浥衣

五香圓 并湯主療一切腫下氣散毒心痛方

丁香 藿香 零陵香 青木香 甘松香各叁兩

桂心 白芷 當歸 香附子 檳榔各壹兩

麝香壹銖

右壹拾壹味擣篩爲末鍊蜜和擣千杵圓如梧子大含咽令津盡日三夜一一日一夜用拾貳圓當即覺香五日身香十日衣被香忌食五辛 其湯法取檳榔以前隨多少皆

等分以水微微火上煑一炊久大沸定内麝香末壹銖勿
去滓澄清服壹升凡丁腫口中喉中脚底背甲下癰疽痔
漏皆服之其湯不瘥作圓含之數以湯洗之一方有豆蔻無麝香

十香圓令人身體百處皆香方

沈香　麝香　白檀香　青木香　零陵香
白芷　甘松香　藿香　細辛　芎藭
檳榔　豆蔻各壹兩　香附子半兩　丁香叄分

右壹拾肆味擣篩為末鍊蜜和綿裹如梧子大日夕含之
咽津味盡即止忌五辛

香粉方

白附子　茯苓　白朮　白芷　白歛
白檀各壹兩　沈香　青木香　雞舌香　零陵香
丁香　藿香各貳兩　麝香壹分　粉英陸升

右壹拾肆味各細擣篩絹下以取色青黒者乃麤擣紗下
貯粉囊中置大合子内以粉覆之密閉七日後取之粉香
至盛而色白如本欲為香粉者不問香之白黒悉以和粉
粉雖香而色至黒必須分別用之不可悉和之粉囊以熟
帛雙紃作之

令身香第七　方一十三首

香身方

甘草伍分炙　芎藭壹兩　白芷叄分

右叄味擣篩為散以飲服方寸匕日三服三十日口香四
十日身香

又方

瓜子　松根白皮　大棗各壹兩

右叄味為散酒服方寸匕日二服百日衣被皆香

又方

瓜子　芎藭　槀本　當歸　杜蘅

細辛　防風各壹分

右柒味擣篩爲散食後以飲服方寸匕日三服五日口香十日身香二十日肉香三十日骨香五十日遠聞香六十日透衣香一方有白芷

治諸身體臭方

竹葉拾兩　桃白皮肆兩

右貳味以水壹石貳斗煮取五斗浴身即香也

治諸腋臭方

伏龍肝爲末和作泥傅之瘥

又方

牛脂和胡粉叁合煎令可圓塗之

又方

三年苦酒和石灰塗之

又方

赤銅屑以大醋和銅器中炒令極熱以布裹熨腋下冷則易之瘥

又方

青木香貳兩　附子　石灰各壹兩

礬石半兩燒　米粉壹升

右伍味擣篩爲散如常粉腋良

又方

馬齒草壹束擣碎以蜜和作團紙裹之以泥紙上厚半寸暴乾以火燒熟破取更以少許蜜和仍令熱勿使冷也先以生布拈之然後藥夾腋下令極痛亦忍不能得

然後以手巾勒兩臂著身即瘥

石灰散方

石灰壹升 青木香 楓香 薫陸香 丁香

陽起石各貳兩 橘皮貳兩 礬石肆兩

右捌味並熬擣篩為散以綿作袋麤細如肆指長四寸展使

著藥先以布揩令痛夾之也

又方

石灰伍合 馬齒草貳兩 礬石燒叁兩 甘松香壹兩

右肆味合擣篩先以生布揩病上令黃汁出拭乾以散傅

之滿三日瘥永除

又方

二月社日盜取社家糜饋一團猥地摩腋下二七遍擲

著五道頭勿令人知永瘥人知即不效

生髮黑髮第八 方一十九首

治髮薄不生方

先以醋泔清洗禿處以生布揩令火熱臘月脂并細研

鐵生煎三沸塗之日三遍

生髮鬚膏方

附子 荆實各貳兩 松葉 柏葉各叁兩 烏雞脂叁合

右伍味㕮咀合盛新瓦瓶中陰乾百日出擣以馬鬐膏和

如薄粥塗頭髮如澤法裹絮中無令中風三十日長

生髮膏 令髮速長而黑傅藥時特忌風方

烏喙 莽草 續斷 皇莢 澤蘭

白朮 細辛 竹葉各壹兩 防風 辛夷各壹兩

柏葉細切肆兩 杏仁別擣 松葉各叁兩 豬脂叁升

右壹拾肆味切先以三年大醋叁升漬令一宿內藥脂中

煎三上三下膏成去滓塗髮及頂上（千金有石南）

生髮膏 主髮鬢禿落不生方

升麻　薺苨（各貳兩）　莽草　白芷　防風（各壹兩）

蜣蜋（肆枚）　馬鬐脂　驢鬐脂　雄雞脂（一云熊脂）

猪脂　狗脂（各伍合）

右拾壹味藥伍味脂取成煎者並切以醋漬一宿曉合煎之沸則停火冷更上一沸停三上三下去滓傅頭以當澤用之三十日生矣

又方　羊矢灰灌取汁洗之三日一洗不過十洗即生矣

治髮落方

柏葉（切壹升）　附子（貳兩）

右貳味擣篩猪脂和作叁拾圓洗髮時即內壹圓泔中髮不落其藥以布裹密器貯勿令洩氣

長髮方

蔓荊子（叁升）　大附子（叁拾枚）

右貳味㕮咀以酒壹斗貳升漬之盛瓷瓶中封頭二十日取雞肪煎以塗之澤以汁櫛髮十日長一尺勿逼面塗

又方

麻子仁（叁升）　秦椒（叁升）

右貳味合以泔漬一宿以沐髮長矣

又方

麻子（貳升）　白桐葉（壹把）

右貳味以米泔汁煮去滓適寒溫沐二十日長矣

治髮落方

石灰叁升水拌令濕炒令極焦停冷以絹袋貯之以酒叁升漬之密封冬二七日春秋七日取酒溫服一合常

令酒氣相接七日落止百日服之終身不落新髮生也

又方　桑白皮壹石以水壹石煮三沸以沐髮三過即止

令白髮還黑方

隴西白芷　旋復花　秦椒各壹升　桂心壹尺

右肆味擣篩爲散以井花水服方寸匕日三服二十日還黑禁房室

又方　烏麻九蒸九暴擣末棗膏和圓久服之

又方

八角附子壹枚　大酢半升

右貳味於銅器中煎取兩沸內好礬石大如碁子壹枚消盡內脂參兩和令相得下之攪至凝內竹筩中拔白髮以膏塗上即生黑髮

髮黃方

臘月猪膏和羊矢灰蒲灰等分傅之三日一爲取黑止

又方　以醋煮大豆爛去豆煎令稠塗髮

又方

熊脂塗髮梳之散頭牀底伏地一食頃即出形盡當黑用之不過一升

染髮方

石榴參顆皮葉亦得針沙如棗核許大醋陸升水參升和藥合煮得壹升沸即熟灰汁洗乾染之

瓜子散　治頭髮早白又主虛勞腦髓空竭胃氣不和諸藏虛絕血氣不足故令人髮早白少而筭髮及憂愁早白遠視䀮䀮風淚出手足煩熱恍惚忘誤連年下痢服之一年後大驗

瓜子壹升　白芷去皮　當歸　芎藭　甘草各貳兩

右伍味擣篩爲散食後服方寸匕日三酒漿湯飲任性服

之一方有菘子貳兩

千金翼方卷第五

千金翼方卷第六

婦人二

產後心悶第一　方四首

治產後心悶眼不得開方

當產婦頭項上取髮如指大令人用力挽之眼即開

單行羚羊角散　治產後心悶是血氣上衝心方

羚羊角壹枚燒成灰

右壹味擣篩為散取東流水服方寸匕若不瘥須臾更服取瘥止

單行羖羊角散　治產後心悶方

羖羊角燒作灰

右壹味擣篩為散以溫酒服方寸匕若不瘥須臾更服取瘥止亦治產難

單行生赤小豆散主產後心悶方

赤小豆

右壹味擣篩爲散以東流水服方寸匕不瘥須臾更服即愈

產後虛煩第二 方一十三首

薤白湯治產後胷中煩熱逆氣方

薤白切 半夏湯洗去滑 人參 甘草炙 知母各貳兩

麥門冬半升去心 石膏肆兩打碎綿裹 栝樓叁兩

右捌味㕮咀以水壹斗叁升煑取肆升分爲五服日三夜再熱甚者加石膏知母各壹兩

竹根湯主產後虛煩方

竹根細切壹斗伍升

右以水貳斗煑取柒升去滓內小麥貳升大棗貳拾枚復煑麥熟又內甘草壹兩炙麥門冬壹升去心湯成去滓溫服伍合不瘥更服取瘥若短氣亦服之極佳

人參當歸湯主產後煩悶不安方

人參 當歸 芍藥 麥門冬去心 粳米壹升

乾地黃 桂心各壹兩 大棗貳拾枚去核 淡竹葉切叁升

右玖味㕮咀以水壹斗貳升先煎竹葉及米取捌升去滓內藥煑取叁升適寒溫分叁服若煩悶不安者當取豉壹升以水叁升煑取壹升盡服之甚良

甘竹茹湯主產後內虛煩熱短氣方

甘竹茹 人參 茯苓 黃芩 甘草炙各壹兩

右伍味㕮咀以水陸升煑取貳升分叁服

知母湯主產後乍寒乍熱通身溫熱胷心煩悶方

知母叁兩 黃芩 芍藥各貳兩 桂心 甘草各壹兩

右伍味㕮咀以水伍升煑取貳升伍合分爲叁服一方不用桂心加生地黃

竹葉湯 主產後心煩悶不解方
生淡竹葉切 麥門冬去心 小麥各壹升 大棗拾肆枚擘
茯苓 生薑切各叁兩 甘草貳兩炙
右柒味㕮咀以水一斗先煑竹葉小麥取捌升內諸藥煑
取叁升分爲叁服若心中虛悸者加人參貳兩若其人食
少無氣力者可更加白粳米伍合氣逆者加半夏貳兩
淡竹茹湯 主產後虛煩頭痛短氣欲死心中悶亂不起方
生淡竹茹壹升 麥門冬伍合去心 小麥伍合 大棗拾肆枚擘一方用石膏
生薑叁兩切一方用乾薑 甘草壹兩炙
右陸味㕮咀以水捌升煑竹茹小麥減壹升仍內諸藥更
煑取貳升分爲貳服羸人分爲三服若有人參內壹兩若
無人參內茯苓壹兩半亦佳人參茯苓皆治心煩悶及心
驚悸安定精神有即爲良無自依本方服一劑不瘥更作
服之若逆氣者加半夏貳兩洗去滑
單行白犬骨散 主產後煩悶不食方
白犬骨燒之擣篩以水和服方寸匕
單行小豆散 治產後煩悶不能食虛滿方
小豆叁柒枚燒作屑以冷水和頓服之
單行蒲黃散 治產後苦煩悶方
蒲黃
右壹味以東流水和服方寸匕極良
治產後虛熱往來心胷中煩滿骨節疼及頭痛壯熱晡時輒
甚又似微瘧方
蜀漆葉 黃芩 桂心 甘草炙各壹兩
生地黃壹斤 黃耆 蝭母各叁兩 芍藥貳兩
右捌味㕮咀以水壹斗先煑地黃取柒升去滓下諸藥煑

取貳升伍合分叁服湯治寒熱不損人

芍藥湯 治產後虛熱頭痛方

白芍藥 乾地黃 牡蠣熬各伍兩 桂心叁兩

右肆味㕮咀以水伍升煑取叁升半分三服湯不損人無毒亦治腹中急痛若通身發熱更加黃芩貳兩大熱即除

鹿角屑豉湯 主婦人墮身血不盡去苦煩悶方

鹿角屑壹兩 香豉壹升半

右貳味以水叁升先煑豉三沸去滓內鹿角屑攪令調頓服須臾血下

陰脫第三 方八首

灰坐漬法主產後陰道不閉方

石灰壹升熬令能燒草

右壹味以水貳斗投灰中適寒溫入汁中坐漬之須臾復易如常法此是神秘方不傳已治人有驗

當歸散 治婦人陰脫

當歸 黃芩各貳兩 芍藥伍分 蝟皮半兩 牡蠣熬貳兩半

右伍味擣篩為散酒服方寸匕日三服禁舉重良

黃芩散 治婦人陰脫

黃芩 蝟皮各半兩 芍藥壹兩 當歸叁分 牡蠣熬

松皮及實百日陰乾燒灰一方用狐莖 竹皮各貳兩半

右柒味擣篩為散飲服方寸匕日三服禁勞勿冷食

硫黃散 治婦人陰脫

硫黃半兩 烏賊魚骨半兩 五味子叁銖

右叁味擣下篩以粉其上良日再三粉之

治婦人陰脫鐵精羊脂傅方

羊脂煎訖適冷煖塗上以鐵精傅脂上多少令調以火

炙布溫以熨上漸推內之末磁石酒服方寸匕日三服

亦治脫肛

治婦人陰癢脫方

礬石熬

右壹味末之每日空腹酒和服方寸匕日三服

又方 取車缸脂傅之即愈

當歸湯 治婦人産後藏中風陰腫洗方

當歸 獨活各叁兩 白芷 地榆皮 礬石熬各貳兩

右伍味㕮咀以水壹斗伍升煑取壹斗貳升以洗浴之

惡露第四 方一十八首

治産後瘕病燒秤鎚酒方

鐵秤鎚燒令極赤投於酒壹升中浸令無聲出鎚頓服之不瘥更作

紫湯 治産後惡露未盡又兼有風身中急痛

取大豆壹升先取新布揩之令光生熬令豆不復聲纔斷以清酒壹升投豆中停三沸漉去滓每服壹升日三夜一服

乾地黃湯 治産後惡露不盡除諸疾補不足

乾地黃叁兩 芎藭 桂心 黃耆 當歸各叁兩

細辛 人參 茯苓 防風 芍藥

甘草炙各壹兩

右壹拾壹味㕮咀以水壹斗煑取叁升分為三服日再夜一

桃仁湯 主産後往來寒熱惡血不盡方

桃仁伍兩去皮尖及双仁 吳茱萸貳升 黃耆 當歸

芍藥各貳兩 生薑 柴胡去苗 百鍊蘇各捌兩

右捌味㕮咀以酒壹斗水貳升合煑取叁升絞去滓

適寒温先食服一升日三服

厚朴湯 主產後腹中滿痛惡露不盡方

厚朴炙 乾薑炮 桂心各肆兩 黃芩 芍藥

乾地黃 茯苓 大黃各叁兩 桃仁去皮尖熬 䗪蟲去翅足熬

甘草炙各貳兩 芒消壹兩 枳實炙 白朮各伍兩

右壹拾肆味㕮咀以水壹斗清酒叁升合煑取叁升絞去滓下芒消令烊適寒温服壹升日三一方用梔子拾肆枚

澤蘭湯 主婦人產後惡露不盡腹痛不除小腹急痛痛引腰背少氣力方

澤蘭 生地黃 當歸各貳兩 生薑 芍藥各壹兩

大棗拾枚擘 甘草壹兩半炙

右柒味切以水玖升煑取叁升分為叁服隨身欲死者服之亦瘥

甘草湯 治產後餘血不盡逆搶心胸手足冷脣乾腹脹短氣

甘草炙 芍藥 桂心各叁兩 大黃肆兩 阿膠叁兩

右伍味㕮咀以東流水壹斗煑取叁升絞去滓內阿膠令烊分為三服一服入腹面即有顏色一日一夜盡此三服即下惡血將養如新產婦也

大黃湯 治產後惡露不盡

大黃 當歸 生薑 牡丹去心 芍藥

甘草炙各貳兩 吳茱萸壹升

右柒味㕮咀以水壹斗煑取肆升分為肆服一日令盡極佳加人參貳兩名人參大黃湯

當歸湯 治產後血留下焦不去

當歸 桂心 甘草炙各貳兩 芎藭

乾地黃肆兩 芍藥各叁兩

右陸味㕮咀以水壹斗煑取伍升分爲五服

柴胡湯 治產後往來寒熱惡露不盡

柴胡去苗 生薑各貳兩切 桃仁伍拾枚去皮尖

芍藥 黄耆各叁兩 呉茱萸貳升 當歸

右柒味㕮咀以清酒壹斗叁升煑取叁升先食服壹升日三服千金以水煑

大黄湯 主產後餘疾有積血不去腹大短氣不得飲食上衝心胷時時煩憒逆滿手足煩疼胃中結熱

大黄 黄芩 甘草炙各壹兩 蒲黄半兩 大棗叁拾枚擘

右伍味㕮咀以水叁升煑取壹升清朝服至日中當利若下不止進冷粥半升即止若不下與少熱飲自下人羸者半之千金名蒲黄湯有芒消壹兩

梔子湯 治產後兒生處空留血不盡小腹絞痛

梔子叁拾枚以水壹斗煑取陸升內當歸芍藥各叁兩蜜伍合生薑伍兩羊脂壹兩於梔子汁中煎取貳升分爲三服

大黄湯 產後血不流方

大黄 黄芩 當歸 芍藥 芒消

甘草炙各壹兩 桃仁 杏仁各叁拾枚去皮尖

右捌味㕮咀以水壹斗煑取叁升去滓內芒消令烊分爲肆服淸當下利利若不止作白粥飲一盃煖服去一炊久乃再服

生地黄湯 治產後三日或四五日腹中餘血未盡絞痛強滿氣息不通

生地黄伍兩 生薑叁兩 大黄 細辛 甘草炙

桂心 黄芩 茯苓 芍藥 當歸各壹兩半

大棗貳拾枚擘

右壹拾壹味㕮咀以水捌升煑取貳升伍合分為三服禁生冷等良

大黃乾漆湯治新產後有血腹中切痛

大黃　乾漆熬　乾地黃　乾薑　桂心各壹兩

右伍味㕮咀以水清酒各五升煑取叁升去滓溫服壹升血當下若不下明日更服壹升滿三服病無不瘥

麻子酒治產後血不去

麻子伍升擣以酒壹斗漬一宿明旦去滓服壹升先食服不瘥復服壹升不吐下不得與男子交通一月將養如初產法

升麻湯治產後惡物不盡或經一月半歲一歲

升麻叁兩以酒伍升煑取貳升分再服當吐下惡物莫恠之極良

大黃苦酒治產後子血不盡

大黃捌銖切以苦酒貳升合煑取壹升適寒溫服之即血下甚良

心痛第五　方四首

羊肉桂心湯主產後虛冷心痛方

羊肉叁斤　桂心肆兩　當歸　乾薑　甘草炙各叁兩

吳茱萸　人參　芎藭　乾地黃各貳兩

右玖味㕮咀以水壹斗煑肉取汁伍升去肉內藥煑取貳升半分為叁服　一方有桔梗叁兩

蜀椒湯主產後心痛此大寒冷所為方

蜀椒貳合汗去目閉口者　當歸　半夏洗去滑　桂心

甘草炙　茯苓　人參各貳兩　芍藥叁兩　蜜壹升

生薑汁 伍合

右壹拾味㕮咀以水玖升煑椒令沸然後内藥煑取貳升半去滓内薑汁及蜜復煎取壹升半一服伍合漸加至陸合盡勿喫冷食佳

治産後心痛方 一云大巖蜜湯

乾地黃　當歸　獨活　芍藥　細辛

桂心　乾薑　小草　甘草 炙各叁兩　吴茱萸 壹升

右壹拾味㕮咀以水玖升煑取叁升分三服 千金用蜜五合

芍藥湯 主産後心痛此大寒冷所爲方

芍藥　桂心 各叁兩　當歸　半夏 洗去滑　茯苓 各貳兩

蜀椒 貳合　生薑汁 伍合　蜜 壹升

右捌味㕮咀以水柒升煑取貳升去滓内薑汁及蜜復煎取貳升伍合壹服五合漸加至陸合且服藥每相去一炊久再服忌冷食

腹痛第六　方一十六首

乾地黃湯 主産後兩脅滿痛兼除百病

乾地黃　芍藥 各貳兩　生薑 伍兩　當歸　蒲黃 各叁兩

桂心 陸兩　大棗 貳拾枚擘　甘草 壹兩炙

右捌味㕮咀以水壹斗煑取貳升半分叁服

芍藥湯 主産後腹痛

芍藥 肆兩　茯苓 叁兩　人參　乾地黃　甘草 各貳兩

右伍味㕮咀以清酒兼水各陸升煑取叁升分服日二

猪腎湯 治産後腹痛

猪腎 壹枚　茱萸 壹升　黃芩　當歸　芎藭

人參　茯苓　乾地黃 各貳兩　生薑 切

厚朴 炙　甘草 炙各叁兩　桂心 肆兩　半夏 伍兩洗去滑

右壹拾叁味㕮咀以水貳斗煑猪腎令熟取壹斗吹去肥膩又以清酒貳升煑取叁升分為肆服日三夜一服

又方

羊肉精壹斤 葱白壹斤 乾薑 當歸 桂心各叁兩

芍藥 芎藭 乾地黃 甘草貳兩炙各

右玖味㕮咀先以水貳斗煑肉取壹斗去肉內藥煎取三升分為肆服一日令盡

吳茱萸湯 主婦人先有寒冷胷滿痛或心腹刺痛或嘔吐或食少或腫生後益劇或寒或下更劇氣息綿惙欲絶皆主之

吳茱萸二兩 防風 桔梗 乾薑 乾地黃

當歸 細辛 甘草炙各半兩

右捌味㕮咀以水肆升煑取壹升伍合分為三服

緩中葱白湯 主産後腹痛少氣

葱白 當歸 人參 半夏湯洗去滑 細辛各貳兩

天門冬去心 芍藥 乾薑 甘草炙各陸兩 生地黃取汁

吳茱萸各壹升

右壹拾壹味㕮咀以水柒升煑取貳升壹服壹升日夜服之令盡

羊肉當歸湯 主産後腹中心下切痛不能食往來寒熱若中風乏氣力方

羊肉叁斤去脂 當歸貳兩 黃芩一方用黃耆 芎藭

防風各壹兩一方用人參 生薑伍兩 芍藥 甘草炙各叁兩

右捌味㕮咀以水貳斗煑肉取壹斗出肉內諸藥煎取叁升分為三服

蒲黃湯 主産後餘疾胷中少氣腹痛頭疼餘血未盡除腹中脹滿欲絶方

蒲黄 生薑 生地黄各伍兩 芒消貳兩
桃仁貳拾枚去皮尖 芎藭 桂心各壹兩 大棗拾伍枚擘
右捌味㕮咀以水玖升煮取貳升伍合去滓内芒消分爲
三服良驗

敗醬湯 主産後疾痛引腰腹如錐刀刺方
敗醬叁兩
右壹味切以水肆升酒貳升微火煎取貳升適寒温服七
合日三食前服之大良 千金有桂心芎藭各壹兩半當歸壹兩爲肆味

芎藭湯 主産後腹痛
芎藭貳兩 女萎伍分 黄芩 前胡 桃仁去皮尖
桂心各壹兩 芍藥 大黄各壹兩半 蒲黄伍合 生地黄切壹升
甘草炙貳兩 當歸叁分
右壹拾貳味㕮咀以水壹升酒叁升合煮取叁升分爲肆

服日三夜一服 千金有黄耆無黄芩

獨活湯 主産後腹痛引腰脊拘急方
獨活 當歸 芍藥 生薑 桂心各叁兩
大棗壹拾枚擘 甘草炙貳兩
右柒味㕮咀以水捌升煮取叁升分叁服相去如十里久
進之

芍藥黄耆湯 治産後心腹痛方
芍藥肆分 黄耆 白芷各叁兩 桂心 生薑
甘草炙各貳兩 大棗拾枚擘
右柒味㕮咀以酒并水各伍升合煮取叁升空腹服壹升
日叁服 千金有人參當歸芎藭地黄茯苓爲拾貳味

桃人芍藥湯 治産後疾痛方
桃仁半升去皮尖 芍藥叁兩 芎藭 當歸

乾漆熬　桂心　甘草炙各貳兩

右柒味㕮咀以水捌升煑取叁升分爲叁服服別相去一炊久再服

單行茱萸酒　治產後腹內疾痛方

吳茱萸壹升以酒叁升漬壹宿煎取半升頓服之亦可再服之

單行桂酒　主產後疾痛及卒心腹痛方

桂心叁兩切以酒叁升煑取貳升分爲叁服

單行生牛膝酒　主產後腹中苦痛方

生牛膝根伍兩切以酒伍升煑取貳升分爲貳服若用乾牛膝須以酒漬之然後可煑

虛損第七　方一十七首

羊肉黃耆湯　主產後虛乏當補益方

羊肉叁斤　黃耆　麥門冬去心各叁兩　大棗叁拾枚擘

乾地黃　茯苓　當歸　芍藥　桂心

甘草炙各貳兩

右壹拾味㕮咀以水貳斗煑肉取壹斗去肉內藥煎取叁升分爲叁服大良

鹿肉湯　主產後虛羸勞損補之方

鹿肉肆斤　乾地黃　芍藥　茯苓　黃耆

麥門冬去心　甘草炙各貳兩　芎藭　當歸　人參各叁兩

生薑陸兩　大棗貳拾枚擘　半夏壹升洗去滑

右壹拾叁味㕮咀以水叁斗煑肉取貳斗去肉內藥煎取叁升分爲肆服日三夜一服

麞骨湯　治產後虛乏五勞七傷虛損不足藏腑冷熱不調方

麞骨壹具剉　遠志去心　黃耆　芍藥　橘皮

茯神 厚朴炙 芎藭 甘草炙各叁兩 當歸
乾薑 防風 獨活各貳兩 生薑切 桂心各肆兩
右壹拾伍味㕮咀以水叁斗煑麞骨取壹斗去滓內藥煑
取叁升分爲肆服

羊肉湯 主産後及傷身大虛上氣腹痛兼微風方
羊肉貳斤無羊肉用麞肉代 麥門冬柒合去心 生地黃伍兩
大棗拾貳枚擘 黃耆 人參 獨活 桂心
茯苓 甘草炙各貳兩
右壹拾味㕮咀以水貳斗煑肉取壹斗去肉內藥煑取叁
升半分爲肆服日三夜一服

羊肉生地黃湯 主産後三日補中理藏強氣力消化血方 千金有乾薑
羊肉貳斤 芍藥叁兩 生地黃切貳升 當歸
芎藭 人參 桂心 甘草炙各貳兩

右捌味㕮咀以水貳斗煑肉取壹斗去肉內藥煎取叁升
分爲肆服日三夜一服

羊肉杜仲湯 治産後腰痛欬嗽方
羊肉肆斤 杜仲炙 紫菀 桂心 當歸
白朮各叁兩 細辛 五味子 款冬花 厚朴炙
附子炮去皮 萆薢 人參 芎藭 黃耆
甘草炙各貳兩 生薑切捌兩 大棗叁拾枚擘
右壹拾捌味㕮咀以水貳斗煑肉取壹斗去肉內藥煎取
叁升分溫三服

當歸建中湯 治産後虛羸不足腹中疾痛不止吸吸少氣或
若小腹拘急攣痛引腰背不能飲食産後一月日得服四五
劑爲善令人強壯內補方
當歸肆兩 桂心叁兩 甘草貳兩炙 芍藥陸兩 生薑叁兩

大棗拾貳枚擘

右陸味㕮咀以水壹斗煮取叁升分爲叁服一日令盡若大虛內飴糖陸兩作湯成內之於火上煖令飴糖消若無生薑則以乾薑叁兩代之若其人去血過多崩傷內衄不止加地黃陸兩阿膠貳兩合捌種作湯成去滓內阿膠若無當歸以芎藭代之

內補芎藭湯主婦人產後虛羸及崩傷過多虛竭腹中疾痛

芎藭　乾地黃各肆兩　芍藥伍兩　桂心貳兩

大棗肆拾枚擘　乾薑

右柒味㕮咀以水壹斗貳升煮取叁升分爲叁服若不差更作至叁劑若有寒苦微下加附子叁兩炮主婦人虛羸少氣七傷損絕腹中拘急痛崩傷虛竭面目無色及唾血甚良。

大補中當歸湯治產後虛損不足腹中拘急或溺血小腹苦痛或從高墮下犯內及金瘡血多內傷男子亦宜服之

當歸　乾薑　續斷　桂心各叁兩　乾地黃陸兩

芍藥肆兩　芎藭　麥門冬去心　白芷　甘草炙各貳兩

大棗肆拾枚擘　吳茱萸壹升

右壹拾貳味㕮咀以酒壹斗漬藥一宿明旦以水捌升合煮取伍升去滓分溫伍服日三夜二服有黃蓍入貳兩爲佳

緩中湯主婦人產後腹中拘急及虛羸少氣產後諸虛不足寬中補寒

吳茱萸壹升　乾薑　當歸　白芷　人參

甘草炙各貳兩　麥門冬去心　半夏洗去滑各叁兩　芍藥陸兩

細辛壹兩　生地黃壹斤取汁

右壹拾壹味㕮咀以水壹斗煮取三升去滓內地黃汁更

上火合煎三兩沸溫服壹升日三服若無當歸以芎藭肆

兩代之

大補湯 治產後虛不足少氣乏力腹中拘急痛及諸疾痛內

崩傷絕虛竭裏急腰及小腹痛

當歸　乾地黃　半夏(洗去滑)　桂心(各叁兩)　吳茱萸(壹升一本無)

人參　麥門冬(去心)　芎藭　乾薑　甘草(炙)

白芷(各貳兩)　芍藥(肆兩)　大棗(肆拾枚擘)

右壹拾叁味㕮咀以水壹斗煮取三升分三服

當歸芍藥湯 治產後虛逆害飲食方

當歸(壹兩半)　芍藥　人參　桂心　生薑(切)

甘草(炙各壹兩)　乾地黃(貳兩)　大棗(貳拾枚擘)

右捌味㕮咀以水柒升煮取三升分為三服

鮑魚湯 主產後腹中虛極水道閉絕逆脹咽喉短氣方

鮑魚(壹斤半)　麻子仁　細辛　茯苓　生薑(切)

五味子(各壹兩)　地黃(伍兩)

右柒味㕮咀以水壹斗煮鮑魚如食法取汁柒升內藥煎

取叁升分爲叁服大有神驗

厚朴湯 主產後四日之中血氣口乾噓吸方

厚朴(炙)　枳實(炙)　生薑(各叁兩)　芍藥　五味子

茯苓　前胡(各壹兩)　人參(半兩)　大棗(貳拾枚擘)

右玖味㕮咀以水陸升煮取貳升伍合分爲叁服適寒溫

服禁冷物

生地黃湯 主產後虛損少氣方

生地黃、人參　知母　桂心　厚朴(炙)

甘草(炙各貳兩)　赤小豆(熬升)

右柒味㕮咀以水貳斗伍升煮地黃取壹斗去滓內藥煎

取叁升分爲叁服

氣貫湯主婦人賁豚氣積勞藏氣不足胷中煩燥關元以下如懷五千錢狀方

厚朴炙　當歸　細辛　芍藥　桔梗

石膏碎　桂心各叁兩　大黃伍兩　乾地黃肆兩　乾薑

澤瀉　黃芩　甘草各伍兩炙

右壹拾叁味㕮咀以水壹斗煑取叁升分溫叁服服叁劑佳千金有吳茱萸無大黃

杏仁湯治產後虛氣方

杏仁去皮尖双仁者　蘇葉各壹升　半夏壹兩洗　生薑拾兩

桂心肆兩　人參　橘皮　麥門冬去心　白前各叁兩

右玖味㕮咀以水玖升煑取貳升伍合分叁服

千金翼方卷第六

虛損第一

柏子人圓主婦人五勞七傷羸弱瘦削面無顏色飲食減少貌失光澤及產後半身枯悴傷墜斷絕無子令人肥白能久服夫婦不相識神方

柏子人　白石英　鍾乳　乾薑　黃耆各貳兩

澤蘭九分取葉熬　藁本　蕪荑各叁分　芎藭貳兩半　防風伍分

蜀椒壹兩半去目及閉口者汗　人參　紫石英　石斛

赤石脂　乾地黃　芍藥　五味子　秦艽

肉蓯蓉　厚朴炙　龍骨　防葵　細辛

獨活　杜仲炙　白芷　茯苓　桔梗

白朮　桂心各壹兩　當歸　甘草炙各柒分

右叁拾叁味擣篩爲末練蜜和圓如梧子空肚煖酒服十

圓不知稍增至參拾圓以知爲度禁食生魚肥猪肉生冷
千金有烏頭无秦艽龍骨防葵茯苓

小澤蘭圓 治婦人產後虛損補益方
澤蘭九分取葉熬 蕪荑熬 藁本 厚朴炙 細辛
人參 柏子人 白朮各參分 蜀椒去目閉口者汗
白芷 乾薑 食茱萸 防風各壹兩 石膏弍兩
桂心半兩 當歸 芎藭 甘草炙各柒分
一方有芍藥壹兩
右壹拾捌味擣篩爲末鍊蜜和圓梧子大溫酒服貳拾圓
漸加至參拾圓日參服忌食生魚肥猪肉千金无乾薑有茯苓

大五石澤蘭圓 主婦人產後虛損寒中腹中雷鳴緩急風頭
痛寒熱月經不調繞臍惻惻痛或心下石堅逆害飲食手足
常冷多夢紛紜身體痺痛榮衞不和虛弱不能動搖方
澤蘭九分取葉熬 石膏 乾薑 白石英 陽起石各貳兩
芎藭 當歸各柒兩 人參 石斛 烏頭炮去皮
白朮 續斷 遠志去心 防風各伍分 紫石英
禹餘粮 厚朴炙 柏子人 乾地黃 五味子
細辛 蜀椒去目閉口者汗 龍骨 桂心
茯苓各壹兩半 紫菀 山茱萸各壹兩 白芷
藁本 蕪荑各參兩 鍾乳 黃耆 甘草炙各貳兩半
右參拾參味擣篩爲末鍊蜜和圓如梧桐子酒服貳拾圓
漸加至參拾圓千金無陽起石

小五石澤蘭圓 主婦人勞冷虛損飲食減少面失光色腹中
冷痛月候不調吸吸少氣無力補益溫中方
澤蘭九分取葉熬 藁本 柏子人 厚朴炙 白朮各壹兩
芍藥 蜀椒去目閉口者汗 山茱萸 人參各伍分

紫石英　鍾乳　白石英　肉蓯蓉　礬石燒
龍骨　桂心各壹兩半　石膏　乾薑　陽起石各貳兩
蕪荑熬叁分　赤石脂　當歸　甘草各柒分炙
右貳拾叁味擣篩爲末鍊蜜和圓如梧子酒服貳拾圓加
至叁拾圓日叁服

大補益當歸圓 治產後虛羸不足胸中少氣腹中拘急疼痛
或引腰背痛或產後所下過多不止虛竭乏氣腹中痛晝夜
不得眠及崩中面目失色脣口乾燥亦主男子傷絕或從高
墮下內有所傷之處或損血吐下及金瘡等方
當歸　芎藭　續斷　乾薑
阿膠炙　甘草炙各肆兩　附子炮去皮　白芷
吳茱萸　白朮各叁兩　乾地黃拾兩　桂心貳兩
赤芍藥貳兩

右壹拾叁味擣篩爲末鍊蜜和圓如梧子酒服貳拾圓日
叁夜壹漸加至伍拾圓若有真蒲黃可加壹升爲善

白芷圓 治婦人產後所下過多及崩中傷損虛竭少氣面目
失色腹中痛方
白芷　續斷　乾薑　當歸各叁兩　附子壹兩炮去皮
乾地黃伍兩　阿膠炙叁兩
右柒味擣篩爲末鍊蜜和圓如梧子酒服貳拾圓日四五
服無當歸用芎藭代之亦可加蒲黃壹兩爲善無續斷用
大薊根代之

甘草圓 主婦人產後心虛不足虛悸少氣心神不安或若恍
恍惚惚不自覺方
甘草炙叁兩　人參　澤瀉　桂心各壹兩　大棗伍拾枚
遠志去心　茯苓　麥門冬去心　菖蒲　乾薑各貳兩

右壹拾味擣篩爲末鍊蜜和圓如大豆許酒服貳拾圓日四五服夜貳服不知稍增若無澤瀉用朮代之若胷中冷增乾薑

大遠志圓 主婦人產後心虛不足心下虛悸志意不安時復憒憒腹中拘急痛夜卧不安胷中吸吸少氣藥內補傷損益氣安志定心主諸虛損方

遠志去心 茯苓 桂心 麥門冬去心 澤瀉

乾薑 人參 當歸 獨活 阿膠炙

菖蒲 甘草炙 白朮各參兩 乾地黃伍兩 署預貳兩

右壹拾伍味擣篩爲末鍊蜜和圓如梧子空腹溫酒服貳拾圓日參服不知稍加至參拾圓大虛身體冷少津液加鍾乳參兩爲善鍾乳益精氣安心鎭志令人顏色美至良

大茯圓 主產後大虛心悸志意不安恍惚不自覺心中恐畏

夜不得眠虛煩少氣方

人參 茯苓 麥門冬去心 甘草炙各參兩 桂心壹兩

大棗伍拾枚作膏 菖蒲 澤瀉 署預

乾薑各貳兩

右壹拾味擣篩爲末鍊蜜棗膏和圓如梧子大空腹酒下貳拾圓日參夜壹服不知稍增至參拾圓若有遠志得貳兩內之爲善氣絕內當歸獨活各參兩更善此方亦治男子虛心悸不定至良

生地黃煎 治婦人產後虛羸短氣胷脅逆滿風寒方

生地黃捌兩 茯苓 麥門冬去心各壹斤 桃仁半升去皮尖

甘草壹尺炙 人參參兩 石斛 桂心 紫菀各肆兩

右玖味合擣篩以生地黃汁捌升淳清酒捌升合調銅器中炭火上內鹿角膠壹斤數攪之得壹升次內飴參升白

蜜叁升於銅器中釜湯上煎令調藥成先食服如彈丸壹
枚日叁不知稍加至貳圓

地黄羊脂煎 治産後諸病羸瘦欲令肥白食飲平調方

生地黄汁壹斗 生薑汁伍升 白蜜伍升 羊脂貳斤

右肆味先煎地黄汁令得伍升次内羊脂煎令減半内薑
汁復煎令減内蜜著銅器中重湯煎如飴狀取煎如雞子
大壹枚投温酒中飲日叁服

生飲白草汁 治産後勞復及腎勞方

白草壹把

右壹味擣絞取汁頓服差勞復生蟲去滓取汁洗眼中蟲
出又屋漏水洗赤蟲出

盜汗第二 方四首

鯉魚湯 主婦人體虛流汗不止或眠中盜汗方

鯉魚貳斤 葱白切壹升 豉壹升 乾薑 桂心壹兩

右伍味先以水壹斗煮魚取六升去魚内諸藥微火煑取
貳升分再服取微汗即愈

竹皮湯 治婦人汗血吐血尿血下血

竹皮叁升 乾地黄肆兩 人參半兩 芍藥
桔梗 桂心各兩 芎窮 甘草各貳兩 當歸

右玖味㕮咀以水柒升煑取叁升分叁服

吴茱萸湯 治婦人産後虛羸盜汗時濇濇惡寒

吴茱萸叁兩

右壹味以清酒叁升漬之半日所煑令蟻鼻沸減得貳升
分服壹升日再間日飲

猪膏煎 治婦人産後體虛寒熱自汗出

猪膏 生薑汁 白蜜各壹升 清酒伍合

右肆味合煎令調和五上五下膏成隨意以酒服差當用
炭火上煎

下乳第三方一十六首

鍾乳湯 治婦人乳無汁

鍾乳　白石脂　消石各一分　通草　生桔梗各貳分

右伍味㕮咀以水伍升煑三上三下餘壹升去滓内消石令烊絞服無多少若小兒不能乳大人啣之

漏蘆湯 治婦人乳無汁

漏蘆　通草各貳兩　鍾乳壹兩　黍米壹升

右肆味㕮咀黍米宿漬揩撻取汁叁升煑藥叁沸去滓飲之日叁服

鯽魚湯 婦人下乳汁

鯽魚長七寸　猪肪半斤　漏蘆　鍾乳各貳兩

右肆味㕮咀藥切猪脂魚不須洗清酒壹斗貳升合煑魚熟藥成去滓適寒溫分五服即乳下良飲其間相去須臾一飲令藥力相及

又方

通草　鍾乳　栝樓實　漏蘆各叁兩

右肆味㕮咀以水壹斗煑取叁升去滓飲壹升日叁服

又方

通草　鍾乳各肆兩

右貳味切以酒五升漬一宿明旦煑沸去滓服壹升日叁服夏冷服冬溫服之

又方

石膏肆兩碎以水貳升煑叁沸稍稍服一日令盡

又方

栝樓實壹枚青色大者無大者用小者兩枚無青色者黄色者亦好

右一味熟擣以白酒壹斗煑取肆升去滓服壹升日叄服

又方

鬼箭伍兩

右一味切以水陸升煑取肆升壹服捌合日叄服亦可燒灰水服方寸匕

鼠肉臛方 治婦人乳無汁

鼠肉五兩 羊肉陸兩 麞肉半斤

右叄味作臛勿令疾者知之

鮑魚大麻子羮 治婦人産後下乳

鮑魚肉叄斤 麻子人壹升

右貳味與鹽豉葱作羮任意食之

又方

通草 鍾乳

右貳味等分擣篩作麪粥服方寸匕日三服百日後可兼養兩兒通草横心白者是勿取羊桃根色黄者無益

又方

麥門冬去心 鍾乳

通草 理石

右肆味等分擣篩空腹酒服方寸匕日叄服

又方

漏蘆叄分 鍾乳 栝樓根各伍分 蠐螬叄合

右肆味擣篩先食糖水方寸匕日叄服

又方

栝樓根叄兩 鍾乳肆兩 漏蘆 滑石 通草各貳兩

白頭翁壹兩

右陸味擣篩爲散酒服方寸匕日再服

又方

鍾乳　通草各五分　雲母貳兩半　屋上敗草貳把燒作灰

甘草炙壹兩

右五味擣篩爲散食後以温漏蘆水服方寸匕日叄服乳下爲度

又方

麥門冬去心　鍾乳　通草　理石　乾地黄

土瓜根　蟅蟲並等分

右柒味擣篩爲散食後酒服方寸匕日叄服

中風第四 方一十首

甘草湯 治產後在蓐中風背強不能轉動名曰風痓

甘草炙　乾地黄　麥門冬去心　前胡　黄芩

麻黄去節　栝樓根各貳兩　芎藭壹兩　葛根半斤

杏人五十枚去皮尖雙人

右壹拾味㕮咀以水壹斗酒五升合煑葛根取捌升去滓內諸藥煑取貳升分再服一劑不差更作之大良千金無前胡

羌活湯 治產後中風身體痺疼痛

羌活　防風　烏頭炮去皮　桂心　芍藥

乾地黄各叄兩　防己　女萎　麻黄去節各壹兩

葛根半斤　生薑各陸兩　甘草炙貳兩

右壹拾貳味㕮咀以水玖升清酒叄升合煑取叄升服五合日三夜壹服極佳

治產後中風時煩方

知母　石膏碎　芍藥　甘草炙各貳兩　半夏洗壹升

生薑切　防風　白朮各叄兩　獨活肆兩　桂心肆兩

右壹拾味㕮咀以水壹斗清酒五升合煑取叄升分叄服

獨活湯 治產後中風口噤不得言

獨活五兩　防風　秦艽　桂心　當歸

附子炮去皮　白术　甘草炙各貳兩　木防己一兩

葛根　生薑各叄兩

右壹拾壹味㕮咀以水壹斗貳升煑取叄升分叄服

竹葉湯 治產後中風發熱面正赤喘氣頭痛

淡竹葉　葛根各叄兩　人參壹兩　防風貳兩　大附子壹枚炮去皮

生薑五兩　大棗拾伍枚擘　桔梗　桂心　甘草炙各壹兩

右壹拾味㕮咀以水壹斗煑取貳升半分貳服溫覆使汗出頸項強用大附子煎藥揚去沫若嘔者加半夏半升洗

防風湯 治產後中風裏急短氣

防風　葛根　當歸　芍藥　人參

乾薑　甘草炙各貳兩　獨活五兩

右捌味㕮咀以水玖升煑取叄升分爲叄服

治產後魘寐言鬼語由內虛未定外客風邪所干方

羊心壹枚　遠志去心　芍藥　黃芩　牡蠣熬

防風　甘草炙各貳兩　乾地黃　人參各叄兩

右玖味㕮咀以水壹斗煑羊心取五升去心內諸藥煎取叄升分爲叄服

鹿肉湯 治產後風虛頭痛壯熱言語邪僻

鹿肉叄斤　半夏壹升洗去滑　乾地黃　阿膠炙　芎藭各貳兩

芍藥　獨活　生薑切　黃耆　黃芩

人參　甘草炙各叄兩　桂心貳兩　秦艽五兩　茯神肆兩一云茯苓

右壹拾伍味㕮咀以水貳斗煑肉得壹斗貳升去肉下藥煎取叄升內膠令烊分肆服日叄夜壹服

防風酒 治產後中風

防風　獨活各壹斤　女萎　桂心各貳兩

茵芋壹兩　石斛伍兩

右陸味、㕮咀以清酒貳斗漬叁宿初服壹合稍加至叁肆
合日叁服

木防已膏 治產後中風

木防已半斤　茵芋五兩

右貳味切以苦酒玖升漬壹宿豬膏肆升煎三上三下膏
成炙手摩之千遍佳

獨活壹斤　桂心叁兩　秦艽伍兩

右叁味、㕮咀以酒壹斗伍升漬叁日飲伍合稍加至壹升
不能飲隨性多少

心悸第五 方四首

治產後忽苦心中衝悸或志意不定恍恍惚惚言語錯謬心
虛所致方

人參　茯苓各叁兩　茯神肆兩　大棗叁拾枚擘　生薑捌兩

芍藥　當歸　桂心　甘草各貳兩

右玖味、㕮咀以水壹斗煑取叁升分服日叁

治產後忽苦心中衝悸不定志意不安言語誤錯惚惚憒憒
不自覺方

遠志去心　人參　麥門冬去心　當歸　桂心

甘草各貳兩　茯苓伍兩　芍藥壹兩　生薑陸兩　大棗貳拾枚擘

右壹拾味、㕮咀以水壹斗煑取叁升分叁服日叁羸者分
肆服產後得此是心虛所致無當歸用芎藭若其人心胷
中逆氣則加半夏叁兩洗去滑

治產後暴苦心悸不定言語謬誤恍恍惚惚心中憒憒此是

心虛所致方

茯苓五兩　芍藥　桂心　當歸　甘草炙各叄兩

生薑陸兩　大棗三十枚擘　麥門冬去心壹升

右捌味㕮咀以水壹斗煮取叄升分叄服無當歸用芎藭代若苦心不定加人參遠志各貳兩若苦煩悶短氣加生竹葉壹升先以水壹斗叄升煮竹葉取壹斗內藥若有微風加獨活叄兩麻黃貳兩桂心貳兩用水壹斗五升若頸項苦急背中強者加獨活葛根麻黃桂心各叄兩生薑捌兩以水壹斗五升煮取叄升半分四服日叄夜壹服

治產後心衝悸不定恍恍惚惚不自知覺言語錯誤虛煩短氣志意不定此是心虛所致方

遠志去心貳兩　人參　茯神　當歸　芍藥

甘草炙各叄兩　大棗叄拾枚擘　麥門冬去心壹升

右捌味㕮咀以水壹斗煮取叄升分叄服若苦虛煩短氣者加生淡竹葉壹升以水壹斗貳升煮取壹斗乃用諸藥胸中少氣者益甘草壹兩爲善

下痢第六 方一十七首

阿膠湯 治產後下痢

阿膠　當歸　黃蘗　黃連各壹兩　陳廩米壹升

蠟如碁子叄枚

右陸味㕮咀以水捌升煮米蟹目沸去米內藥煮取貳升去滓內膠蠟令烊分肆服一日令盡

桂心湯 治產後餘寒下痢便膿血赤白日數十行腹痛時時下血

桂心　甘草各貳兩　白蜜壹升　乾薑貳兩　當歸叄兩

赤石脂拾兩綿裹　附子壹兩炮去皮破

右柒味㕮咀以水陸升煑取叄升內蜜再沸分叄服

羊脂湯 治產後下痢諸療不斷

羊脂五两 當歸 乾薑 黃蘗 黃連各叄两

右伍味㕮咀以水玖升煑取叄升去滓內脂令烊分叄服

治產後下痢虛乏羸瘦方

黃雌雞一隻治如食法去藏勿中水 赤小豆貳升 吳茱萸

獨活 人參 黃連 甘草各貳两 黃耆

麥門冬去心 當歸各叄两 大棗叄拾枚擘

右壹拾壹味㕮咀以水貳斗煑雞豆令餘壹斗去雞豆澄

清內藥煑取叄升分叄服雞肉貫成死者

治產後寒熱下痢方

鹿肉叄斤 葱白壹把 人參 當歸 黃芩

桂心 甘草各壹两 芍藥貳两 豉壹升 生薑切

乾地黃各三两

右壹拾壹味㕮咀以水貳斗煑肉取壹斗內諸藥煑取叄

升分叄服

當歸湯 治產後下痢腹痛

當歸 龍骨各叄两 乾薑 白朮各貳两 芎藭貳两

熟艾 附子炮去皮 甘草炙各壹两

右捌味㕮咀以水陸升煑取叄升分叄服一日令盡

甘草湯 治產後下痢兼虛極白頭翁加阿膠

白頭翁貳两 黃連 秦皮 黃蘗各叄两 加阿膠

甘草各貳两

右陸味㕮咀以水柒升煑取叄升去滓內膠令烊分叄服

鼈甲湯 治產後早起中風冷泄痢及帶下

鼈甲如手大炙令黃 白頭翁壹两 當歸 黃連

乾薑各貳兩 黃蘗長壹尺廣三寸

右陸味㕮咀以水柒升煑取叁升分叁服千金無白頭翁

乾地黃湯 治產後下痢

乾地黃各壹兩 白頭翁 乾薑 黃連各壹兩 蜜蠟方寸

阿膠如手掌大一枚

右陸味㕮咀以水五升煑取貳升半去滓內膠蠟令烊分叁服相去一炊頃千金無乾薑

生地黃湯 治產後忽著寒熱下痢

生地黃五兩 黃連 桂心 甘草各壹兩 淡竹皮貳升

大棗貳拾枚擘 赤石脂貳兩

右柒味㕮咀以水壹斗煑竹皮取柒升去滓內藥煑取貳升伍合分為叁服

藍青丸 治產後下痢

藍青熬 鬼臼各壹兩半 附子炮壹兩 蜀椒汗壹兩半 黃連去毛五兩

龍骨 當歸各叁兩 黃蘗 人參 茯苓各壹兩

厚朴炙 阿膠炙 艾 甘草炙各貳兩

一方用赤石脂肆兩

右壹拾肆味擣篩為末鍊蜜和丸如梧子空腹以飲服貳拾圓

赤石脂圓 治產後下痢

赤石脂叁兩 當歸 黃連 乾薑 秦皮

白朮 甘草炙各貳兩 蜀椒汗 附子炮去皮各壹兩

右玖味擣末鍊蜜和圓如梧子大飲服貳拾圓日叁服

治產後下痢赤散方

赤石脂叁兩 桂心壹兩 代赭貳兩

右叁味擣篩為散酒服方寸匕日叁夜壹服拾日當愈

治産後下痢黒散方

麻黄去節 貫衆 桂心各壹兩 乾漆熬

細辛各貳兩 甘草參兩炙

右陸味擣篩爲散麥粥服伍指撮日再五日當愈

治産後下痢黄散方

黄連 大黄各貳兩 黄芩 䗪蟲熬 乾地黄各壹兩

右伍味擣篩爲散酒服方寸匕日參服拾日愈千金無大黄

治姙娠及産後寒熱下痢方

黄蘗壹斤 黄連壹升 梔子貳拾枚

右參味㕮咀以水五升漬一宿煑三沸服壹升壹日壹夜令盡嘔者加橘皮壹把生薑貳兩

治婦人痢欲痢輙先心痛腹服滿日夜五六十行方

神麴熬 石榴皮各捌兩 黄蘗切 黄連切

烏梅肉 艾葉各壹升 防已貳兩 附子五兩炮 乾薑

阿膠各參兩炙

右壹拾味擣篩爲末鍊蜜和丸如梧桐子大飲服貳拾圓日參漸加至參拾肆拾圓

淋渴第七方一十首

桑螵蛸湯 治産後小便數

桑螵蛸參拾枚炙 鹿茸炙 黄耆各參兩 生薑肆兩

人參 牡蠣熬 甘草各貳兩炙

右柒味㕮咀以水陸升煑取貳升半分參服

栝樓湯 治産後小便數兼渴

栝樓根 黄連 麥門冬各貳兩去心 桑螵蛸貳拾枚炙

人參 生薑切 甘草各參兩炙 大棗拾伍枚擘

右捌味㕮咀以水柒升煑取貳升半分參服

雞肶胵湯 治產後小便數

雞肶胵貳拾具 雞腸叁具洗 厚朴炙 人參各貳兩 生薑五兩

麻黃肆兩去節 大棗貳拾枚擘 當歸 乾地黃 甘草炙各貳兩

右壹拾味㕮咀以水壹斗煑雞肶胵腸棗子柒升去滓內藥煎取叁升半分叁服

治婦人結氣成淋小便引痛上至少腹或時溺血或如豆汁或如膠飴每發欲死食不生肌面目萎黃師所不能療方

貝齒肆枚燒 葵子壹升 滑石叁兩 石膏五兩

右肆味㕮咀以水柒升煑取貳升去滓內猪肪一合更煎三沸適寒溫分叁服病不差更合服

石韋湯 治產後卒淋血淋氣淋

石韋去毛 黃芩 通草各壹兩 榆皮五兩 大棗叁拾枚擘

葵子貳升 生薑切 白朮各叁兩一方用芍藥 甘草炙壹兩

右玖味㕮咀以水捌升煑取貳升半分叁服

葵根湯 治產後淋澀

葵根壹升切乾者貳兩 一云 車前子 亂髮燒 大黃

桂心 滑石各壹兩 通草三兩 生薑陸兩切

右捌味㕮咀以水柒升煑取貳升半分爲叁服千金有冬瓜汁柒合

茅根湯 治產後淋

白茅根壹斤 桃膠 甘草炙各壹兩 鯉魚齒壹伯枚擘

生薑叁兩切 人參 地麥各貳兩 瞿麥 茯苓各肆兩

右玖味㕮咀以[illegible]煑取貳升半分叁服

鼠婦散 治產後小[illegible]

鼠婦七枚熬[illegible]服之

滑石散 治產後淋[illegible]

滑石五分 通草[illegible] 車前子 葵子各壹[illegible]

右肆味擣篩爲散以酢漿水服方寸匕稍加至貳匕

竹葉湯 治產後虛渴少氣力

竹葉　人參　茯苓　甘草炙各壹兩　大棗拾肆枚擘

麥門冬五兩去心　小麥伍合　生薑切　半夏洗各叁兩

右玖味㕮咀以水[illegible]斗煑竹葉小麥取柒升去滓內藥更

煑取貳升半服三合日叁夜壹服

栝樓湯 治產後渴不止

栝樓根肆兩　人參　麥門冬各叁兩去心　大棗叁拾枚擘

土瓜根伍兩　乾地黃　甘草炙各貳兩

右柒味㕮咀以水捌升煑取貳升半分叁服

千金翼方卷第七

千金翼方卷第八

婦人四

崩中第一 方三十六首

治婦人五崩身體羸瘦欬逆煩滿少氣心下痛面上生瘡腰大痛不可俛仰陰中腫如有瘡之狀毛中癢時痛與子藏相通小便不利常頭眩頸項急痛手足熱氣逆衝急煩不得臥腹中急痛食不下吞酢噫苦腸鳴漏下赤白黃黑汁大臭如膠污衣狀熱即下赤寒即下白多飲即下黑多食即下黃多藥即下青喜怒心中常恐一身不可動搖大惡風寒

鼈甲散方

鼈甲炙　乾薑各叁分　芎藭　雲母　代赭各壹兩

烏賊魚骨　龍骨　伏龍肝　白堊

蝟皮炙各壹分　生鯉魚頭　桂心　白朮各半兩

白殭蠶半分

右壹拾肆味擣篩爲散以淳酒內少蜜服方寸匕日三夜貳服以病者十日差新病者五日差若頭風小腹急加芎藭桂心各壹兩佳忌生冷猪雞魚肉

治婦人崩中漏下赤白青黑腐臭不可近令人面黑無顏色皮骨相連月經失度往來無常小腹弦急或苦絞痛上至於心兩脅腫脹令人倚坐氣息乏少食不生肌膚腰背疼痛連兩脚不能久立但欲得臥神驗大慎火草散方

慎火草　白石脂　鼈甲炙　黃連　細辛

石斛　芎藭　乾薑　芍藥　當歸

熟艾　牡蠣熬　禹餘粮各貳兩　桂心壹兩

薔薇根皮　乾地黃各肆兩

右壹拾陸味擣篩爲散空腹酒服方寸匕日叁服稍增至貳匕若寒多加附子及椒用椒當汗去目閉口者熬多加知母黃芩加石斛兩倍白多加乾薑白石脂赤多一方云青黑加桂心代赭各貳兩

治婦人崩中及痢一日夜數十起大命欲死多取諸根煎丸得入腹即活若諸根難悉得者第一取薔薇根令多多乃合之遇有酒以酒服無酒以飲服其種種根當得貳斛爲佳

薔薇根煎方

薔薇根　柿根　菝葜　懸鉤根各壹斛

右肆味皆剉合著釜中以水淹使上餘肆伍寸水煮使叁分減壹去滓無大釜稍稍煮如初法都畢會汁煎如飴可爲丸如梧桐子大服拾丸日叁服

治婦人崩中去赤白或如豆汁伏龍肝湯方

伏龍肝如彈丸大柒枚　赤石脂　桂心　艾

甘草貳兩各炙 生地黃切肆升 生薑貳兩
右柒味㕮咀以水壹斗煮取叁升分肆服日叁夜壹服
治婦人崩中血出不息逆氣虛煩熟艾湯方
熟艾壹升 蟹爪壹升 淡竹茹壹把 伏龍肝半斤 蒲黃貳兩
當歸壹兩 乾地黃 芍藥 桂心 阿膠
茯苓各貳兩 甘草伍寸炙
右壹拾貳味㕮咀以水壹斗玖升煮艾取壹斗去滓內藥
煮取肆升內膠令烊盡壹服壹升日令盡羸人以意消
息之可減伍陸合
治婦人崩中漏血不絕地榆湯方
地榆根 柏葉各捌兩 蟹爪 竹茹各壹升 漏蘆叁兩
茯苓壹兩 蒲黃叁合 伏龍肝半斤 乾薑 芍藥
當歸 桂心 甘草各貳兩炙

右壹拾叁味㕮咀以水壹斗伍升煮地榆根減叁升內諸
藥更煮取肆升分服日叁夜壹服
治婦人產後崩中去血逆氣盪心胷生瘡煩熱甘草芍藥湯方
甘草炙 芍藥 當歸 人參 白朮各壹兩
橘皮壹把 大黃半兩
右柒味㕮咀以水肆升煮取貳升分再服相去一炊頃
治婦人崩中下血櫸柳葉湯方
櫸柳葉叁斤 麥門冬去心 乾薑各貳兩 大棗拾枚擘 甘草壹兩炙
右伍味㕮咀以水壹斗煮櫸柳葉取捌升去滓內諸藥又
煮取叁升分叁服
治婦人暴崩中去血不止薊根酒方
大小薊根各壹斤切
右二味以酒壹斗漬五宿服之隨意多少

治婦人崩中赤白不絕困篤禹餘粮圓方
禹餘粮伍两 烏賊魚骨叁两 白馬蹄拾两炙令黄
龍骨叁两 鹿茸貳两炙
右伍味擣篩鍊蜜和丸如梧子酒服貳拾丸日貳服不知
稍加至叁拾丸
治婦人積冷崩中去血不止腰背痛四肢沈重虛極大牛角
中人散方
牛角中人壹枚燒 防風貳两 乾地黄 桑耳
蒲黄 乾薑 赤石脂 禹餘粮 續斷
附子炮去皮 白术 龍骨 礬石燒 當歸各叁两
人參壹两
右壹拾伍味擣篩爲散温酒服方寸匕日叁服不知漸加之
治婦人崩中下血虛羸少力調中補虛止血方
澤蘭熬玖分 蜀椒去目閉口者汗柒分 代赭 藁本
桂心 細辛 乾薑 防風各壹两 乾地黄
牡蠣熬各壹两半 栢子仁 厚朴炙各叁分 當歸
芎藭 甘草炙各柒分 山茱萸 蕪荑各半两
右壹拾柒味擣篩爲末鍊蜜和丸如梧子空腹酒服拾丸
日叁服漸加至貳拾丸神效一方用白芷龍骨各叁分人參柒分爲貳拾味
治婦人崩中下血切痛不止方
桑耳赤色 牡蠣熬令變色各叁两 龍骨貳两 黄芩
芍藥 甘草炙各壹两
右陸味擣篩爲散酒服方寸匕日叁服稍增以知爲度
治婦人傷中崩中絕陰使人怠惰不能動作脊膂心腹四肢
滿而身寒熱甚溺血桑根煎方
桑根白皮細切壹㪷麻子仁叁升淳清酒叁㪷煑得壹

㪷絞去滓大棗百枚去皮核飴伍升阿膠伍两白蜜叁升復煎得玖升下乾薑末厚朴闊貳寸長貳尺末蜀椒末叁味各壹升桂心長壹尺貳寸甘草捌两糵米末壹升乾地黄肆两芍藥陸两玄參伍两丸如彈丸日叁枚

又方

小薊根葉 剉　祥母 各拾斤剉

右壹味以水伍㪷合釜中煑爛熟去滓内銅器中煎餘肆升分肆服壹日令盡 祥字未詳不敢刪正

治婦人崩中方

白茅根 貳斤　小薊根 伍斤

右貳味切以水伍㪷合煎取肆升分稍稍服之

治婦人崩中去血及產後餘病丹參酒方

丹參　地黄　忍冬　地榆　艾 各伍斤

右五味先爆熟舂之以水漬三宿去滓煑取汁以黍米壹斛釀如酒法熟初服肆合稍增之神良

治婦人崩中去赤白方

取倚死竹蛭燒末飲服半方寸匕神良

治婦人崩中漏下方

取梧桐木長壹尺燒作灰擣篩爲散以温酒服方寸匕日叁服

治婦人白崩中方

芎藭 貳两　乾地黄　阿膠　赤石脂　桂心

小薊根 各貳两

右陸味㕮咀以酒陸升水四升合煑取叁升去滓内膠令烊盡絞去滓分叁服 千金有伏龍肝如雞子大柒枚

治婦人白崩中馬通汁方

白馬通汁貳升 乾地黃肆兩 芎藭

阿膠 小薊根 白石脂 桂心各貳兩 伏龍肝如雞子大七枚

右捌味㕮咀以酒柒升合馬通汁煑取叁升去滓內膠令烊盡分叁服

治婦人帶下五賁一曰熱病下血二曰寒熱下血三曰月經未斷爲房室即漏血四曰經來舉重傷妊脉下血五曰產後藏開經利五賁之病外實內虛小牛角䚡散方

小牛角䚡伍枚燒令赤 龍骨壹兩 禹餘粮 乾薑

當歸各貳兩 阿膠炙 續斷各叁兩

右柒味擣篩爲散空腹酒服方寸匕日叁服千金有赤小豆鹿茸烏賊魚骨爲拾味

治婦人緩下十二病絕產一曰白帶二曰赤帶三曰經水不利四曰陰胎五曰子藏堅六曰子藏僻七曰陰陽患痛八曰

腹強一作內強九曰腹寒十曰五藏閉十一曰五藏酸痛十二曰夢與鬼爲夫婦龍骨散方緩下千金作淳下

龍骨叁兩 白殭蠶伍枚 烏賊魚骨 代赭各肆兩

半夏洗 桂心 伏龍肝 乾薑 黃蘗各貳兩

石韋去毛 滑石各壹兩

右壹拾壹味擣篩爲散溫酒服方寸匕日三服多白加烏賊魚骨白殭蠶各貳兩多赤加代赭伍兩小腹寒加黃蘗貳兩子藏堅加乾薑桂各貳兩各隨疾增之服藥三月有子住藥藥太過多生兩子當審方取藥寡婦童女不可妄服

治產後下血不止方

菖蒲伍兩剉

右壹味以清酒伍升煑取貳升分貳服

治婦人下血阿膠散方

阿膠捌兩炙　烏賊魚骨貳兩　芍藥肆兩　當歸壹兩

右肆味擣篩爲散以蜜溲如麥飯先食以葱羹汁服方寸匕日叁夜壹服一方桑耳壹兩

治諸去血蠱方

鹿茸炙　當歸各叁兩　瓜子伍合　蒲黃伍合

右肆味擣篩爲散酒服方寸匕日叁服不知稍增

治婦人漏血崩中鮑魚湯方

鮑魚　當歸各叁兩切　阿膠炙肆兩　艾如雞子大叁枚

右肆味以酒叁升水貳升合煮取貳升伍合去滓內膠烊令盡壹服捌合日叁服

治婦人叁拾陸疾胞中病漏下日不絕白堊丸方

邯鄲白堊　牡蠣熬　禹餘粮　白芷

烏賊魚骨　乾薑　龍骨　白石脂

桂心　瞿麥　大黃　石韋去毛　白斂

細辛　芍藥　黃連　附子炮去皮　鍾乳

茯苓　當歸　蜀椒汗去目閉口者　黃芩

甘草炙各半兩

右貳拾叁味擣篩爲末鍊蜜和丸如梧桐子大酒服伍丸日貳不知漸加至拾丸

治婦人漏血不止大崩中方

龍骨　芎藭　附子炮去皮　芍藥　禹餘粮

乾薑各叁兩　赤石脂肆兩　當歸　桂心各壹兩　甘草炙伍分

右壹拾味擣篩爲散以溫酒服方寸匕日叁服稍加至貳匕白多更加赤石脂壹兩

治婦人漏血積月不止馬通湯方

赤馬通汁壹升取新馬矢絞取汁乾者水浸絞取無赤馬凡馬亦得　當歸

阿膠炙 乾薑各壹兩 生艾壹把 書墨半彈丸大

右陸味㕮咀以水捌升清酒貳升合煑取叁升去滓内馬通汁及膠微火煎取貳升適寒温分再服相去壹炊頃飲之

治婦人白漏不絶馬蹄屑湯方

白馬蹄炙令黄 赤石脂各伍兩 禹餘粮

烏賊魚骨 龍骨 牡蠣熬 乾地黄

當歸各肆兩 附子叁兩炮去皮 白殭蠶壹兩熬 甘草貳兩炙

右壹拾壹味㕮咀以水壹斗陸升煑取叁升半分肆服日叁夜壹服

治婦人漏血不止方

乾地黄 大黄各陸兩 芎藭四兩 阿膠伍兩 人參

當歸 甘草各叁兩炙

右柒味㕮咀以酒壹斗水伍升合煑取陸升去滓内膠烊令盡壹服壹升日叁夜壹服

治婦人白漏不絶馬蹄丸方

白馬蹄肆兩炙令黄 烏賊魚骨 白殭蠶

赤石脂各貳兩 禹餘粮 龍骨各叁兩

右陸味擣篩爲末錬蜜和丸如梧子酒服拾丸不知漸加至貳拾丸

治婦人漏下慎火草散方

慎火草拾兩熬令黄 當歸 鹿茸一作鹿角

阿膠各肆兩炙 龍骨貳分

右伍味擣篩爲散先食酒服方寸匕日叁服

治婦人漏下不止蒲黄散方

蒲黄半斤 鹿茸炙 當歸各貳兩

右叁味擣篩爲散酒服半方寸匕日叁服不知漸加至壹

方寸匕

治婦人胞落不安血漏下相連月水過度往來或多或少小腹急痛上搶心脅脹食不生肌方

蟬甲(炙參兩) 禹餘粮 乾地黃(各陸兩) 蜂房(炙)

蛇皮(炙各壹兩) 蝟皮(壹具炙) 乾薑 防風 烏賊魚骨

桑螵蛸(炙) 䗪蟲(熬) 甘草(炙各貳兩)

右壹拾貳味擣篩爲末鍊蜜和丸如梧桐子大空腹酒服拾丸日參服漸加至貳拾丸

月水不利第二(方參拾肆首)

治婦人月水不利閉塞絶産十八年服此藥二十八日有子金城太守白薇丸方

白薇 細辛(各伍分) 人參 杜蘅 半夏(洗)

厚朴(炙) 白殭蠶 牡蒙(各參分) 牛膝 沙參

乾薑(各半兩) 附子(炮壹兩半) 秦艽(半兩) 當歸(參分)

蜀椒(壹兩半去目閉口者汗) 紫菀(參分) 防風(壹兩半)

右壹拾柒味擣篩鍊蜜和爲丸如梧桐子先食酒服參丸不知稍增至肆伍丸此藥不用長服覺有身則止(崔氏有桔梗册)

參(各參分)

治經年月水不利胞中有風冷故須下之大黃朴消湯方

大黃 牛膝(各伍兩) 代赭 乾薑 細辛(各壹兩)

水蛭(熬) 䖟蟲(去翅足熬) 芒消(各貳兩) 桃仁(參升去皮尖雙人者)

麻子仁(伍合) 牡丹皮 紫葳(各參兩一云紫菀) 甘草(炙參兩)

朴消(參兩)

右壹拾肆味㕮咀以水壹斗煮取參升去滓內消烊令盡分參服五更即服相去壹炊頃自下之後將息勿見風

治婦人月水不利小腹堅急大便不通時時見有物下如鼻

淨或如雞子白皆胞中風冷也方

大黃肆兩 吳茱萸貳升 芍藥叁兩 當歸 乾地黃

黃芩 乾薑 芎藭 桂心 牡丹皮

芒消 人參 細辛 甘草各貳兩炙 水蛭熬

蝱蟲各伍拾枚去翅足熬 桃仁伍拾枚去皮尖 黃雌雞壹隻治如食法勿令中水

右壹拾捌味㕮咀以清酒伍升漬藥壹炊久又別以水貳㪷煮雞取壹㪷去雞下藥合煮取叁升絞去滓內芒消烊令盡攪調適寒温服壹升日叁服

治月水不利小腹痛方

牡丹皮 當歸 芎藭 黃芩 大黃

乾薑 人參 細辛 消石 芍藥

桂心 甘草各貳兩炙 水蛭熬 蝱蟲去翅足熬 桃仁各伍拾枚去皮尖

蠐螬拾叁枚熬 乾地黃叁兩 黃雌雞壹隻治如食法

右壹拾捌味㕮咀以清酒伍升漬壹宿別以水貳㪷煮雞取壹㪷去雞內藥煮取叁升去滓內消石烊令盡適寒温服壹升日叁服

治久寒月水不利或多或少方

吳茱萸叁升 生薑壹斤 桂心壹尺 大棗貳拾枚擘 桃仁伍拾枚去皮尖

人參 芍藥各叁兩 小麥 半夏洗各壹升 牡丹皮肆兩

牛膝貳兩 水蛭熬 䗪蟲熬 蝱蟲去翅足熬 甘草炙各壹兩

右壹拾伍味㕮咀以清酒叁升水壹㪷煮取叁升去滓適寒温服壹升日叁服不能飲酒者以水代之湯臨欲成乃內諸蟲不耐藥者則飲粢合

治婦人月水不利腹中滿時自減并男子膀胱滿急抵党湯

(方) 大黃貳兩 桃仁叁拾枚去皮尖兩炙 水蛭貳拾枚熬 虎杖貳兩炙一云虎掌

右肆味㕮咀以水叁升煮取壹升頓服之當即下血

又方

當歸 桂心 乾漆熬 大棗擘 䗪蟲去翅足熬

水蛭各貳兩熬 芍藥 細辛 黃芩 萎蕤

甘草炙各壹兩 吳茱萸 桃仁各壹升去皮尖兩仁

右壹拾叁味㕮咀以酒壹斗漬壹宿明旦煑之取叁升分叁服

治婦人月水不利方

當歸 芍藥 乾薑 芒消 吳茱萸各貳兩

大黃肆兩 桂心叁兩 甘草炙壹兩 桃仁去皮尖叁拾枚

右玖味㕮咀以水玖升煑取叁升去滓內芒消烊令盡分叁服

溫經丸方

治婦人胸脅滿月水不利時繞臍苦痛手足煩熱兩脚酸

乾薑 吳茱萸 附子炮去皮 大黃 芍藥各叁兩

黃芩 乾地黃 當歸 桂心 白朮各貳兩

人參 石韋各壹兩去毛 蜀椒壹合去目及閉口汗 桃仁柒拾枚去皮尖及雙仁熬

薏苡仁壹升

右壹拾伍味擣篩為末鍊蜜和丸如梧桐子先食酒服壹丸日叁服不知稍加之以知為度

治婦人月水不利手足煩熱腹滿不欲寐心煩柒熬丸方

大黃半兩熬 前胡 芒消各伍分 乾薑叁分 茯苓貳分半

杏仁去皮尖雙仁壹分半熬 蜀椒去目及閉口汗 葶藶各貳分熬

桃仁貳拾枚去皮尖雙仁熬 水蛭半合熬 䗪蟲半合去翅足熬

右壹拾壹味擣篩為末鍊蜜和丸如梧桐子飲服柒丸日叁服漸加至拾丸治寒先食服之千金有芎藭叁分

治婦人帶下寒氣血積腰腹痛月水時復不調手足厥逆氣

上盪心害飲食方

茯苓 枳實炙 乾薑各半兩 芍藥 黃芩

桂心 甘草炙各壹兩

右柒味㕮咀以水肆升煑取貳升分貳服服別相去壹炊頃諸月水不調皆悉主之

治婦人月水不調或月前或月後或如豆汁腰痛如折兩脚疼胞中風冷牡丹大黃湯方

牡丹皮叁兩 大黃 朴消各肆兩 桃仁壹升去皮尖雙仁者

陽起石 人參 茯苓 水蛭熬 蝱蟲去翅足熬

甘草炙各貳兩

右壹拾味㕮咀以水玖升煑取叁升去滓內朴消令烊盡分叁服服別相去如壹炊頃

治婦人月水不調或在月前或在月後或多或少乍赤乍白

陽起石湯方

陽起石貳兩 附子壹兩炮去皮 伏龍肝伍兩 生地黃切壹升

乾薑 桂心 人參 甘草炙各貳兩 續斷

赤石脂各叁兩

右壹拾味㕮咀以水壹斗煑取叁升貳合分肆服日叁夜壹服

治月水不調或一月再來或兩月三月一來或月前或月後閉塞不通宜服杏仁湯方

杏仁去皮尖雙仁 桃仁去皮尖雙仁 蝱蟲去翅足熬

水蛭熬各叁拾枚 大黃叁兩

右伍味㕮咀以水陸升煑取貳升伍合分爲叁服壹服其病當隨大小便有所下若下多者止勿服若少者則盡貳服

治婦人產生餘疾月水時來腹中絞痛方

朴消　當歸　薏苡仁　桂心各貳兩　大黃肆兩
代赭　牛膝　桃仁去皮尖兩仁熬各壹兩
右捌味擣篩爲末鍊蜜和丸如梧桐子先食酒服伍丸日
叁服不知稍增之
治婦人經水來繞臍痛上搶心胷往來寒熱如瘧狀方
薏苡仁　代赭　牛膝各貳兩　大黃捌兩
䗪蟲貳拾枚熬　桃仁伍拾枚去皮尖雙仁熬　茯苓壹兩　桂心伍寸
右捌味擣篩爲散宿不食明朝空腹温酒服壹錢匕
治婦人月事往來腰腹痛方
䗪蟲肆枚熬　女青　芎藭各壹兩　蜀椒去目及閉口汗
乾薑　大黃各貳兩　桂心半兩
右柒味擣篩爲散先食酒服壹刀圭服之拾日微去下善
養之佳

治婦人月事不通小腹堅痛不得近乾漆湯方
乾漆熬　大黃　黃芩　芒消
桂心各壹兩　附子壹枚炮去皮　吳茱萸壹升　當歸
萎蕤　芍藥　細辛　甘草炙各壹兩
右壹拾貳味㕮咀以清酒壹斗漬壹宿煑取叁升絞去滓
內芒消烊令盡分叁服服別相去壹炊頃
又方
大黃叁兩　桃仁壹升去皮尖及雙仁　芒消　土瓜根
當歸　芍藥　丹砂研各貳兩
右柒味㕮咀以水玖升煑取叁升去滓內丹砂末及芒消
烊令盡爲叁服服別相去壹炊頃千金有水蛭貳兩
治月水不通心腹絞痛欲死通血止痛嚴蜜湯方
吳茱萸　大黃　當歸　乾薑　䗪蟲去足翅熬

水蛭熬　乾地黄　芎藭各貳兩　梔子仁拾肆枚
桃仁去皮尖壹升熬　芍藥參兩　細辛　甘草炙各壹兩
桂心壹兩　牛膝參兩　麻仁半升
右壹拾陸味㕮咀以水玖升煑取貳升半分參服日參服
服相去壹炊頃
治瘕月水瘀血不通下病散方
大黄　細辛　朴消各壹兩　消石　附子炮去皮
䗪蟲去翅足熬各參分　黄芩　乾薑各壹兩　芍藥
土瓜根　代赭　丹砂研各貳兩　牛膝壹斤
桃仁貳升去皮尖雙仁　蠐螬貳枚炙
右壹拾伍味㕮咀水酒各伍升漬藥壹宿明旦乃煑取肆
升去滓內朴消消石烊令盡分肆服服別相去如壹炊頃
去病後宜食黄鴨羹

又方
水蛭熬　土瓜根　芒消　當歸各貳兩　桃仁壹升去皮尖
大黄　桂心　麻子　牛膝各參兩
右玖味㕮咀以水玖升煑取參升去滓內芒消烊令盡分
參服服別相去壹炊頃
治月水不通結成癥堅如石腹大骨立宜破血下癥物方
大黄　消石熬令沸定各陸兩　蜀椒去目閉口汗壹兩
代赭　乾漆熬　芎藭　茯苓　乾薑
䗪蟲去翅足熬各貳兩　巴豆貳拾枚去皮心熬
右壹拾味擣篩爲末別治巴豆令如脂鍊蜜丸如梧桐子
大酒服參丸漸加至伍丸空腹爲始日貳服千金有丹砂柴胡水蛭土
瓜根爲壹拾肆味
治產後月水往來乍多乍少仍不復通裏急下引腰身重牛

膝丸方

牛膝　桂心　大黃　芎藭（各叁兩）　當歸

芍藥　人參　牡丹皮（各貳兩）　水蛭（熬）

䗪蟲（去翅足熬）　蝱蟲（熬各拾枚）　蠐螬（熬）　蜚蠊蟲（各肆拾枚壹方無）

右壹拾叁味擣篩爲末鍊蜜和丸如梧桐子大空腹溫酒下伍丸日叁服不知漸增至拾丸

治月水閉不通洒洒往來寒熱方

䗪蟲（壹兩去翅足熬）　桃仁（拾兩去皮尖雙仁熬）　桑螵蛸（半兩）

代赭　水蛭（熬）　蠐螬（熬各貳兩）　大黃（叁兩）

右柒味擣篩爲末別擣桃仁如膏乃合藥鍊蜜和爲丸如梧桐子大酒服伍丸日貳服

治月水不通手足煩熱腹滿默默不欲寐心煩方

芎藭（伍兩半）　芒消　柴胡（各伍兩）　茯苓（貳兩）　杏仁（伍合去皮尖雙仁熬）

大黃（壹斤）　蜀椒（壹升去目閉口者汗）　水蛭（熬）

䗪蟲（去翅足熬各半兩）　桃仁（壹百枚去皮尖雙仁熬）　蝱蟲（熬）

牡丹皮（各貳兩）　乾薑（陸兩）　葶藶子（伍合熬令紫色）

右壹拾肆味擣篩爲末別擣桃仁杏仁如泥鍊蜜和爲丸如梧桐子大空腹酒服柒丸日叁服不知稍增之（此方與前柒熬丸同多叁味）

治腰腹痛月水不通利方

當歸（肆兩）　芎藭　人參　牡蠣（熬）　土瓜根

水蛭（熬各貳兩）　䗪蟲（去翅足熬）　丹砂（研）　烏頭（炮去皮）　乾漆（熬各壹兩）

桃仁（伍拾枚去皮尖兩仁熬別擣如泥）

右壹拾壹味擣篩爲末鍊蜜和丸如梧桐子大空腹酒服叁丸日叁服

治月閉不通不欲食方

大黃壹斤 柴胡 芒消各伍兩 牡蠣壹兩熬
葶藶子貳兩熬令紫色別擣 芎藭貳兩半 乾薑叁兩
蜀椒汗壹拾兩去目及閉口者 茯苓叁兩半 杏仁伍合熬別擣如膏
䗪蟲熬去翅足 水蛭熬各半兩 桃仁柒拾枚去皮尖雙仁熬別擣如膏
右壹拾叁味擣篩爲末和前件葶藶桃仁杏仁等脂鍊蜜
和爲丸如梧桐子大飲服七丸日再服亦與七熬丸同多少試
治月水不通六七年或腫滿氣逆腹脹瘕痛服此方數有神
效大䗪蟲丸方
䗪蟲肆百枚去翅足熬 水蛭叁百枚熬 蠐螬壹升熬 乾地黃
牡丹皮 乾漆熬 土瓜根 芍藥 牛膝
桂心各肆兩 黃芩 牡蒙 桃仁熬去皮尖雙仁各叁兩
茯苓 海藻各伍兩 葶藶伍合熬令紫色 吳茱萸貳兩
右壹拾柒味擣篩爲末別擣桃仁葶藶如脂鍊蜜和爲丸

如梧桐子大酒服柒丸日叁服千金有芒消人參
治月水不通閉塞方
牛膝壹斤 麻子仁叁升蒸之 土瓜根叁兩 桃仁貳升熬去皮尖雙仁
右肆味以酒壹斗伍升漬伍宿壹服伍合漸增至壹升日
壹服多飲益佳
治婦人產後風冷留血不去停結月水閉塞方
菴䕡子 桃仁去皮尖雙人熬 麻子仁碎各貳升
右叁味以酒叁斗合煑至貳斗壹服伍合日叁服稍加至
壹升佳
治月水閉不通結瘕腹大如甌短氣欲死虎杖煎方
虎杖壹伯斤去頭腦洗去土暴燥切 土瓜根汁 牛膝汁各貳斗
右叁味以水壹斛漬虎杖壹宿明旦煎餘貳斗內土瓜牛
膝汁攪令調於湯器中煎使如飴糖酒服壹合日貳夜壹

服當下若病去但令服盡

治帶下月經閉不通方

大黃（肆兩） 朴消（伍兩） 桃仁（去皮尖及雙仁） 䗪蟲（去翅足並熬各壹升）

右肆味擣篩爲末別擣桃仁如膏以淳苦酒肆升以銅鐺著火上煎減壹升內藥參校之又減壹升內朴消煎如餳可止丸如雞子投壹升美酒中當宿不食服之至日西下或如豆汁或如雞肝凝血蝦蟇子或如膏此是病下也

治月水不通陰中腫痛菖蒲湯方

菖蒲 當歸（各貳兩） 葱白（切小壹升） 吳茱萸 阿膠（熬各壹兩）

右伍味㕮咀以水玖升煮取參升內膠烊令盡分爲參服

損傷第三（方七首）

治婦人因其夫陰陽過度玉門疼痛小便不通白玉湯方

白玉（貳兩半） 白朮 澤瀉（各貳兩） 肉蓯蓉 當歸（各伍兩）

右伍味㕮咀先以水壹斗煮玉伍拾沸去玉內藥煎取貳升分參服每服相去壹炊頃

治婦人傷丈夫苦頭痛欲嘔心悶桑白皮湯方

桑白皮（半兩） 乾薑（壹累） 桂心（伍寸） 大棗（貳拾枚擘）

右肆味㕮咀以水貳大升煮取捌合分貳服（千金一云以酒壹斗煮參肆沸去滓分溫服之適衣無令汗出）

治婦人嫁痛單行方

大黃（參分）

右壹味切以好酒壹升煮十沸頓服

治婦人小戶嫁痛連日方

芍藥（半兩） 生薑（切） 甘草（炙各參分） 桂心（壹分）

右肆味㕮咀以酒貳升煮參沸去滓適寒溫分服

治婦人小戶嫁痛單行方

牛膝伍兩

右壹味切以酒叁升煑再沸去滓分叁服

治婦人小户嫁痛方

烏賊魚骨燒

右壹味燒成屑以酒服方寸匕日叁服立差

治婦人姙身爲夫所動欲死單行竹瀝汁方

取淡竹斷兩頭節留中節以火燒中央以器承兩頭得汁飲之立差

千金翼方卷第八

千金翼方卷第九

傷寒上

論曰傷寒熱病自古有之名賢濬哲多所防御至於仲景特有神功尋思旨趣莫測其致所以醫人未能鑽仰嘗見太醫療傷寒惟大青知母等諸冷物投之極與仲景本意相反湯藥雖行百無一效傷其如此遂披傷寒大論鳩集要妙以為其方行之以來未有不驗舊法方證意義幽隱乃令近智所迷覽之者造次難悟中庸之士絕而不思故使閭里之中歲致夭枉之痛遠想令人慨然無已今以方證同條比類相附須有檢討倉卒易知夫尋方之大意不過三種一則桂枝二則麻黃三則青龍此之三方凡療傷寒不出之也其柴胡等諸方皆是吐下發汗後不解之事非是正對之法術數未深而天下名賢止而不學誠可悲夫又有僕隸卑下冒犯風寒

天行疫癘先被其毒憫之酸心聊述茲意爲之救法方雖是
舊弘之惟新好古君子嘉其博濟之利無嗤誚焉

太陽病用桂枝湯法第一 伍拾柒證 方伍拾首

論曰傷寒與痓病濕病及熱暍相濫故叙而論之

太陽病發熱無汗而反惡寒是爲剛痓

太陽病發熱汗出而不惡寒是爲柔痓 一云惡寒

太陽病發熱其脉沈細是爲痓

太陽病發其汗因致痓

病者身熱足寒頸項強惡寒時頭熱面赤目脉赤獨頭動搖
是爲痓

右件痓狀

太陽病而關節疼煩其脉沈緩爲中濕

病者一身盡疼煩日晡即劇此爲風濕汗出所致也

濕家之爲病一身盡疼發熱而身色似熏黃也

濕家之爲病其人但頭汗出而背強欲得被覆若下之早即
噦或胷滿小便利舌上如胎此爲丹田有熱胷上有寒渴
欲飲則不能飲而口燥也

濕家下之額上汗出微喘小便利者死下利不止者亦死

問曰病風濕相搏身體疼痛法當汗出而解值天陰雨溜下
不止師云此可發汗而其病不愈者何故荅曰發其汗汗
大出者但風氣去濕氣續在是故不愈若治風濕者發其
汗微微似欲出汗者則風濕俱去也

病人喘頭痛鼻窒而煩其脉大自能飲食腹中獨和無病病
在頭中寒濕故鼻窒內藥鼻中即愈

右件濕狀

太陽中熱暍是也其人汗出惡寒身熱而渴也

太陽中暍身熱疼重而脉微弱此以夏月傷冷水水行皮膚中也

太陽中暍發熱惡寒身重而疼痛其脉弦細芤遲小便已洗然手足逆冷小有勞熱口前開板齒燥若發其汗惡寒甚則甚加温針發熱益甚數下之淋復甚

右件暍狀

太陽之爲病頭項強痛而惡寒

太陽病其脉浮

太陽病發熱汗出而惡風其脉緩爲中風

太陽中風發熱而惡寒

太陽病三四日不吐下見芤乃汗之

夫病有發熱而惡寒者發於陽也不熱而惡寒者發於陰也發於陽者七日愈發於陰者六日愈以陽數七陰數六故也

太陽病頭痛至七日以上自愈者其經竟故也若欲作再經者針足陽明使經不傳則愈

太陽病欲解時從巳盡未

風家表解而不了了者十二日愈

太陽中風陽浮而陰濡弱浮者熱自發濡弱者汗自出濇濇惡寒淅淅惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔者桂枝湯主之

太陽病發熱汗出此爲榮弱衛強故使汗出以救邪風桂枝湯主之

太陽病頭痛發熱汗出惡風桂枝湯主之

太陽病項背強几几而反汗出惡風桂枝湯主之（本論云桂枝加葛根湯）

太陽病下之其氣上衝可與桂枝湯不衝不可與之

太陽病三日已發汗吐下温針而不解此爲壞病桂枝湯復不中與也觀其脉證知犯何逆隨證而治之

桂枝湯本為解肌其人脉浮緊發熱無汗不可與也常識此勿令誤也

酒客不可與桂枝湯得之則嘔酒客不喜甘故也

喘家作桂枝湯加厚朴杏仁佳

服桂枝湯吐者其後必吐膿血

太陽病初服桂枝湯而反煩不解者當先刺風池風府乃却與桂枝湯則愈

太陽病外證未解其脉浮弱當以汗解宜桂枝湯

太陽病下之微喘者表未解故也宜桂枝湯（一云麻黄湯）

太陽病有外證未解不可下之下之為逆解外宜桂枝湯

太陽病先發汗不解而下之其脉浮不愈浮為在外而反下之故令不愈今脉浮故在外當解其外則愈宜桂枝湯

病常自汗出此為榮氣和衛氣不和故也榮行脉中衛行脉外復發其汗衛和則愈宜桂枝湯

病人藏無他病時發熱自汗出而不愈此衛氣不和也先其時發汗愈宜桂枝湯

傷寒不大便六七日頭痛有熱與承氣湯其大便反青此為不在裏故在表也當發其汗頭痛者必衄宜桂枝湯

傷寒發汗已解半日許復煩其脉浮數可復發其汗宜服桂枝湯

傷寒醫下之後身體疼痛清便自調急當救表宜桂枝湯

太陽病未解其脉陰陽俱停必先振汗出而解但陽微者先汗之而解宜桂枝湯

太陽病未解熱結膀胱其人如狂其血必自下下者即愈其外未解尚未可攻當先解其外宜桂枝湯

傷寒大下後復發汗心下痞惡寒者不可攻痞當先解表宜

桂枝湯

桂枝湯方

桂枝　芍藥　生薑各貳兩切　甘草貳兩炙　大棗拾貳枚擘

右伍味㕮咀叁味以水柒升微火煮取叁升去滓溫服壹升須臾飲熱粥壹升餘以助藥力溫覆令汗出壹時許益善若不汗再服如前復不汗後服小促其間令半日許叁服病重者壹日壹夜乃差當晬時觀之服壹劑湯病證猶在當復作服之至有不汗出當服叁劑乃解

太陽病發其汗遂漏而不止其人惡風小便難四肢微急難以屈伸桂枝加附子湯主之桂枝中加附子壹枚炮即是

太陽病下之其脉促胷滿者桂枝去芍藥湯主之若微寒者桂枝去芍藥加附子湯主之桂枝去芍藥中加附子壹枚即是

太陽病得之八九日如瘧發熱而惡寒熱多而寒少其人不嘔清便欲自可一日再三發其脉微緩者為欲愈脉微而惡寒者此為陰陽俱虛不可復吐下發汗也面色反有熱者為未欲解以其不能得汗出身必癢桂枝麻黃各半湯主之

桂枝壹兩拾陸銖　芍藥　生薑切　甘草炙

麻黃去節各壹兩　大棗肆枚擘　杏仁貳拾肆枚去皮尖兩仁者

右柒味以水伍升先煮麻黃壹貳沸去上沫內諸藥煮取壹升捌合去滓溫服陸合本云桂枝湯叁合麻黃湯叁合併為陸合頓服

服桂枝湯大汗出若脉洪大與桂枝湯其形如瘧壹日再發汗出便解宜桂枝貳麻黃壹湯方

桂枝壹兩拾柒銖　麻黃拾陸銖　生薑切　芍藥各壹兩陸銖

甘草壹兩貳銖炙　大棗伍枚擘　杏仁拾陸枚去皮尖兩仁者

右柒味以水柒升煮麻黃壹貳沸去上沫內諸藥煮取貳升去滓溫服壹升日再服本云桂枝湯貳分麻黃湯壹分合爲貳升分貳服今合爲一方

太陽病發熱惡寒熱多寒少脉微弱則無陽也不可發汗桂枝二越婢一湯主之方

桂枝　芍藥　甘草炙　麻黃去節各拾捌銖

生薑壹兩參銖切　石膏貳拾肆銖碎　大棗肆枚擘

右柒味以水伍升先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煮取貳升去滓溫服壹升本云當裁爲越婢湯桂枝湯合之飲壹升今合爲壹方桂枝湯貳分

服桂枝湯或下之頸項強痛翕翕發熱無汗心下滿微痛小便不利桂枝去桂加茯苓白朮湯主之方

茯苓　白朮各叁兩

右於桂枝湯中惟除去桂枝壹味加此貳味爲湯服壹升小便即利本云桂枝湯今去桂枝加茯苓白朮

太陽病用麻黃湯法第二壹拾陸證肆首

太陽病或已發熱或未發熱必惡寒體痛嘔逆脉陰陽俱緊爲傷寒

傷寒一日太陽脉弱至四日太陰脉大

傷寒一日太陽受之脉若靜者爲不傳頗欲嘔若躁煩脉數急者乃爲傳

傷寒其二陽證不見此爲不傳

太陽病頭痛發熱身體疼腰痛骨節疼惡風無汗而喘麻黃湯主之

太陽與陽明合病喘而胸滿不可下也宜麻黃湯

病十日已去其脉浮細嗜臥此爲外解設胷滿脅痛與小柴胡湯浮者麻黄湯主之

太陽病脉浮緊無汗而發熱其身疼痛八九日不解其表證仍在此當發其汗服藥微除其人發煩目瞑增劇者必衄衄乃解所以然者陽氣重故也宜麻黄湯

脉浮而數者可發其汗宜麻黄湯

傷寒脉浮緊不發其汗因致衄宜麻黄湯

脉浮而緊浮則爲風緊則爲寒風則傷衛寒則傷榮榮衛俱病骨節煩疼可發其汗宜麻黄湯

太陽病下之微喘者外未解故也宜麻黄湯（壹云桂枝湯）

麻黄湯方

麻黄（去節參兩） 桂枝（貳兩） 甘草（壹兩炙） 杏仁（柒拾枚去皮尖兩仁者）

右肆味以水玖升煑麻黄減貳升去上沫內諸藥煑取貳升半去滓温服捌合覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝法

太陽病項背強几几無汗惡風葛根湯主之方

葛根（肆兩） 麻黄（參兩去節） 桂枝 芍藥 甘草（炙各貳兩）

生薑（參兩切） 大棗（拾壹枚擘）

右柒味以水壹斗煑麻黄葛根減貳升去上沫內諸藥煑取參升去滓分温參服不須與粥取微汗

太陽與陽明合病而自利葛根湯主之（用上方一云用後葛根黄芩黄連湯）

不下利但嘔葛根加半夏湯主之葛根湯中加半夏半升洗即是

太陽病桂枝證醫反下之遂利不止其脉促表未解喘而汗出宜葛根黄芩黄連湯方

葛根（半斤） 甘草（貳兩炙） 黄芩 黄連（各參兩）

右肆味以水捌升先煑葛根減貳升內諸藥煑取貳升去

滓分溫再服

太陽病用青龍湯法第三 肆證 方貳首

太陽中風脈浮緊發熱惡寒身體疼痛不汗出而煩大青龍
湯主之若脈微弱汗出惡風者不可服之服之則厥筋惕肉
瞤此爲逆也方

麻黄 去節陸兩 桂枝 貳兩 甘草 貳兩炙 杏仁 肆拾枚去皮尖兩仁者
生薑 叁兩切 大棗 拾枚擘 石膏 如雞子大碎綿裹

右柒味以水玖升先煑麻黄減貳升去上沫內諸藥煑取
叁升去滓溫服壹升取微似汗汗出多者溫粉粉之壹服
汗者勿再服若復服汗出多亡陽逆虛惡風躁不得眠

傷寒脈浮緩其身不疼但重乍有輕時無少陰證者可與大
青龍湯發之 用上方

傷寒表不解心下有水氣欬而發熱或渴或利或噎或小便
不利少腹滿或喘者小青龍湯主之方

麻黄 去節叁兩 芍藥 細辛 乾薑 甘草 炙
桂枝 各叁兩 五味子 半夏 各半升洗

右捌味以水壹斗先煑麻黄減貳升去上沫內諸藥煑取
叁升去滓溫服壹升渴則去半夏加栝樓根叁兩微利者
去麻黄加蕘花壹雞子大熬令赤色噎者去麻黄加附子
壹枚炮小便不利少腹滿去麻黄加茯苓肆兩喘者去麻
黄加杏仁半升去皮

傷寒心下有水氣欬而微喘發熱不渴服湯已而渴者此爲
寒去爲欲解小青龍湯主之 用上方

太陽病用柴胡湯法第四 壹拾伍證 方柒首

血弱氣盡腠理開邪氣因入與正氣相搏在於脅下正邪分
爭往來寒熱休作有時嘿嘿不欲食飲藏腑相連其痛必

下邪高痛下故使其嘔小柴胡湯主之服柴胡而渴者此
爲屬陽明以法治之
得病六七日脉遲浮弱惡風寒手足温醫再三下之不能食
其人脅下滿痛面目及身黄頸項強小便難與柴胡湯後
必下重本渴飲水而嘔柴胡復不中與也食穀者噦
傷寒四五日身體熱惡風頸項強脅下滿手足温而渴小柴
胡湯主之
傷寒陽脉濇陰脉弦法當腹中急痛先與小建中湯不差與
小柴胡湯小建中湯見雜療門中
傷寒中風有柴胡證但見一證便是不必悉具也凡柴胡湯
證而下之柴胡證不罷復與柴胡湯解者必蒸蒸而振却
發熱汗出而解傷寒五六日中風往來寒熱胷脅苦滿嘿
嘿不欲飲食心煩喜嘔或胷中煩而不嘔或渴或腹中痛
或脅下痞堅或心下悸小便不利或不渴外有微熱或欬
小柴胡湯主之
柴胡八兩　黄芩　人參　甘草炙　生薑各三兩切
半夏半升洗　大棗拾貳枚擘
右柒味以水壹斗貳升煮取陸升去滓再煎温服壹升日
叁若胷中煩不嘔者去半夏人參加栝樓實壹枚渴者去
半夏加人參合前成四兩半腹中痛者去黄芩加芍藥三
兩脅下痞堅者去大棗加牡蠣陸兩心下悸小便不利者
去黄芩加茯苓肆兩不渴外有微熱者去人參加桂叁兩
温覆微發其汗欬者去人參大棗生薑加五味子半升乾
薑貳兩
傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便
堅其脉細此爲陽微結必有表復有裏沈則爲病在裏汗出

亦爲陽微假令純陰結不得有外證悉入在於裏此爲半在外半在裏脉雖沉緊不得爲少陰所以然者陰不得有汗今頭大汗出故知非少陰也可與柴胡湯設不了了者得屎而解用上方

傷寒十三日不解胷脅滿而嘔日晡所發潮熱而微利此本當柴胡下之不得利今反利者故知醫以丸藥下之非其治也潮熱者實也先再服小柴胡湯以解其外後以柴胡加芒消湯主之方

柴胡貳兩拾陸銖　黄芩　人參　甘草炙

生薑壹兩切　半夏壹合洗　大棗肆枚擘　芒硝貳兩

右柒味以水肆升煑取貳升去滓温分再服以解其外不解更作

柴胡加大黄芒消桑螵蛸湯方

右以前柒味以水柒升下芒消叁合大黄肆分桑螵蛸伍枚煑取壹升半去滓温服伍合微下即愈本云柴胡湯再服以解其外餘貳升加芒消大黄桑螵蛸也

傷寒八九日下之胷滿煩驚小便不利譫語一身不可轉側柴胡加龍骨牡蠣湯主之方

柴胡肆兩　黄芩　人參　生薑切　龍骨

牡蠣熬　桂枝　茯苓　鈆丹各壹兩半　大黄貳兩

半夏壹合半洗　大棗陸枚擘

右壹拾貳味以水捌升煑取肆升内大黄切如棊子大更煑壹兩沸去滓温服壹升本云柴胡湯今加龍骨等

傷寒六七日發熱微惡寒支節煩疼微嘔心下支結外證未去者宜柴胡桂枝湯

發汗多亡陽狂語者不可下以爲可與柴胡桂枝湯和其榮

衛以通津液後自愈方

柴胡肆兩 黃芩 人參 生薑切 桂枝

芍藥各壹兩半 半夏貳合半洗 甘草壹兩炙 大棗陸枚擘

右玖味以水陸升煮取貳升去滓溫服壹升本云人參湯作如桂枝法加柴胡黃芩復如柴胡法今用人參作半劑

傷寒五六日其人已發汗而復下之胷脅滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱而煩此為未解柴胡桂枝乾薑湯主之方

柴胡捌兩 桂枝參兩 乾薑貳兩 栝樓根肆兩 黃芩參兩

牡蠣貳兩熬 甘草貳兩炙

右柒味以水壹斗貳升煮取陸升去滓更煎溫服壹升日貳服初服微煩汗出愈

太陽病過經十餘日反再三下之後四五日柴胡證續在先與小柴胡湯嘔止小安其人鬱鬱微煩者為未解與大柴胡湯下者止

傷寒十餘日邪氣結在裏欲復往來寒熱當與大柴胡湯

傷寒發熱汗出不解心中痞堅嘔吐下利者大柴胡湯主之

病人表裏無證發熱七八日雖脉浮數可下之宜大柴胡湯

方

柴胡捌兩 枳實肆枚炙 生薑伍兩切 黃芩參兩 芍藥參兩

半夏半升洗 大棗拾貳枚擘

右柒味以水壹斗貳升煮取陸升去滓更煎溫服壹升日參服壹方加大黃貳兩若不加恐不名大柴胡湯

太陽病用承氣湯法第五 玖證方肆首

發汗後惡寒者虛故也不惡寒但熱者實也當和其胃氣宜小承氣湯

太陽病未解其脉陰陽俱停必先振汗出而解但陽微者先

汗出而解陰微者先下之而解宜承氣湯（一云大柴胡湯）

傷寒十三日過經而譫語內有熱也當以湯下之小便利者大便當堅而反利其脉調和者知醫以丸藥下之非其治也自利者其脉當微厥今反和者此為內實宜承氣湯

太陽病過經十餘日心下溫溫欲吐而胸中痛大便反溏其腹微滿鬱鬱微煩先時自極吐下者宜承氣湯

二陽併病太陽證罷但發潮熱手足漐漐汗出大便難譫語者下之愈宜承氣湯

太陽病三日發其汗不解蒸蒸發熱者調胃承氣湯主之

傷寒吐後腹滿者承氣湯主之

太陽病吐下發汗後微煩小便數大便因堅可與小承氣湯和之則愈

大承氣湯方

大黃（肆兩） 厚朴（捌兩炙） 枳實（伍枚炙） 芒消（叄合）

右肆味以水壹斗先煮貳味取伍升內大黃更煮取貳升去滓內芒消更煎壹沸分再服得下者止

又方

大黃（肆兩） 厚朴（貳兩炙） 枳實（大者叄枚炙）

右叄味以水肆升煮取壹升貳合去滓溫分再服初服譫語即止服湯當更衣不爾盡服之

又方

大黃（肆兩） 甘草（貳兩炙） 芒消（半兩）

右叄味以水叄升煮取壹升去滓內芒消更壹沸頓服

太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下者即愈其外不解尚未可攻當先解其外外解少腹急結者乃可攻之宜桃核承氣湯方

桃仁伍拾枚去皮尖　大黄肆兩　桂枝貳兩　甘草貳兩炙

芒消貳兩

右伍味以水柒升煮取貳升半去滓内芒消更煎壹沸分溫叁服

太陽病用陷胷湯法第六凡叁拾壹證方壹拾陸首

問曰病有結胷有藏結其狀何如答曰按之痛其脈寸口浮關上自沈爲結胷何謂藏結曰如結胷狀飲食如故時下利陽脈浮關上細沈而緊名爲藏結舌上白胎滑者爲難治藏結者無陽證不往來寒熱其人反靜舌上胎滑者不可攻也

夫病發於陽而反下之熱入因作結胷發於陰而反汗之因作痞結胷者下之早故令結胷結胷者其項亦強如柔痓狀下之即和宜大陷胷丸

結胷證其脈浮大不可下之下之即死

結胷證悉具煩躁者死

太陽病脈浮而動數浮則爲風數則爲熱動則爲痛數則爲虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒其表未解醫反下之動數則遲頭痛即眩胷中空虛客氣動膈短氣躁煩心中懊憹陽氣內陷心下因堅則爲結胷大陷胷湯主之若不結胷但頭汗出其餘無汗齊頸而還小便不利身必發黄

傷寒六七日結胷熱實脈沈緊心下痛按之如石堅大陷胷湯主之

但結胷無大熱此爲水結在胷脅頭微汗出大陷胷湯主之

太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡如小有潮熱從心下至少腹堅滿而痛不可近大陷胷湯主之

若心下滿而堅痛者此爲結胷大陷胷湯主之

大黃捌兩 葶藶子熬 杏仁去皮尖兩仁熬 芒消半升

右肆味和擣取如彈丸壹枚甘遂末壹錢匕白蜜壹兩水貳升合煑取壹升温頓服壹宿乃下

大陷胷湯方

大黃陸兩 甘遂末壹錢匕 芒消壹升

右叄味以水陸升先煑大黃取貳升去滓內芒消煎壹兩沸內甘遂末分再服壹服得快利止後服

小結胷者正在心下按之即痛其脉浮滑小陷胷湯主之

黃連壹兩 半夏半升洗 栝樓實大者壹枚

右叄味以水陸升先煑栝樓取叄升去滓內諸藥煑取貳升去滓分温叄服

太陽病貳叄日不能卧但欲起者心下必結其脉微弱者此本寒也而反下之利止者必結胷未止者四五日復重下之此爲挾熱利

太陽少陽併病而反下之結胷心下堅下利不復止水漿不肯下其人必心煩

病在陽當以汗解而反以水噀之若灌之其熱却不得去益煩皮粟起意欲飲水反不渴宜服文蛤散方

文蛤伍兩

右壹味擣爲散以沸湯伍合和服壹方寸匕若不差與五苓散

五苓散方

猪苓拾捌銖去黑皮 白朮拾捌銖 澤瀉壹兩陸銖 茯苓拾捌銖 桂枝半兩

右伍味各爲散更於臼中治之白飲和服方寸匕日叄服多飲煖水汗出愈

寒實結胷無熱證者與三物小白散方

桔梗拾捌銖 巴豆陸銖去皮心熬赤黑研如脂 貝母拾捌銖

右叁味擣為散內巴豆更於臼中治之白飲和服強人半錢匕羸者減之病在上則吐在下則利不利進熱粥一杯利不止進冷粥一杯一云冷水一杯身熱皮粟不解欲引衣自覆若以水潠之洗之更益令熱却不得出當汗而不汗即煩假令汗出已腹中痛與芍藥叁兩如上法

太陽與少陽併病頭痛或眩冒如結胸心下痞而堅當刺肺俞肝俞大椎第一閒慎不可發汗發汗即譫語譫語則脉弦五日譫語不止當刺期門

心下但滿而不痛者此為痞半夏瀉心湯主之

半夏半升洗 黄芩 乾薑 人參 甘草炙各叁兩

黄連壹兩 大棗拾貳枚擘

右柒味以水壹斗煑取陸升去滓溫服壹升日叁服

脉浮緊而下之緊反入裏則作痞按之自濡但氣痞耳

太陽中風吐下嘔逆表解乃可攻之其人漐漐汗出發作有時頭痛心下痞堅滿引脅下嘔即短氣此為表解裏未和十棗湯主之 方

芫花熬 甘遂 大戟各等分

右叁味擣為散以水壹升伍合先煑大棗拾枚取捌合去棗強人內藥末壹錢匕羸人半錢匕溫服平旦服若下少不利者明旦更服加半錢得快下糜粥自養

太陽病發其汗遂發熱惡寒復下之則心下痞此表裏俱虛陰陽氣併竭無陽則陰獨復加燒鍼因胸煩面色青黄膚瞤此為難治今色微黄手足溫者愈

心下痞按之自濡關上脉浮者大黄黄連瀉心湯主之 方

大黄貳兩 黄連壹兩

右貳味以麻沸湯貳升漬之須臾去滓分溫再服此方必有黃芩

心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯主之方

附子壹枚炮別煑取汁　大黃貳兩　黃連　黃芩各壹兩

右肆味以麻沸湯貳升漬之須臾去滓內附子汁分溫再服

本以下之故心下痞與之瀉心其痞不解其人渴而口燥煩小便不利者五苓散主之一方言忍之一日乃愈方用上

傷寒汗出解之後胃中不和心下痞堅乾噫食臭脅下有水氣腹中雷鳴而利生薑瀉心湯主之方

生薑肆兩切　半夏半升洗　乾薑壹兩　黃連壹兩　人參

黃芩　甘草各參兩炙　大棗拾貳枚擘

右捌味以水壹斗煑取陸升去滓溫服壹升日參服

傷寒中風醫反下之其人下利日數拾行穀不化腹中雷鳴心下痞堅而滿乾嘔而煩不能得安醫見心下痞爲病不盡復重下之其痞益甚此非結熱但胃中虛客氣上逆故使之堅甘草瀉心湯主之方

甘草肆兩炙　黃芩　乾薑各參兩　黃連壹兩　半夏半升洗

大棗拾貳枚擘　一方有人參參兩

右陸味以水壹斗煑取陸升去滓溫服壹升日參服

傷寒服湯藥下利不止心下痞堅服瀉心湯復以他藥下之利不止醫以理中與之而利益甚理中治中焦此利在下焦赤石脂禹餘粮湯主之方

赤石脂壹斤碎　太一禹餘粮壹斤碎

右貳味以水陸升煑取貳升去滓分溫參服若不止當利小便

傷寒吐下發汗虛煩脈甚微八九日心下痞堅脅下痛氣上衝喉咽眩冒經脈動惕者久而成痿

傷寒發汗吐下解後心下痞堅噫氣不除者旋復代赭湯主之方

旋復花 叁兩　人參 貳兩　生薑 伍兩切　代赭 壹兩碎　甘草 叁兩炙

半夏 半升洗　大棗 拾貳枚擘

右柒味以水壹斗煮取陸升去滓溫服壹升日叁服

太陽病外證未除而數下之遂挾熱而利不止心下痞堅表裏不解桂枝人參湯主之方

桂枝 肆兩別切　甘草 肆兩炙　白朮　人參　乾薑 各貳兩

右伍味以水玖升先煮肆味取伍升去滓內桂更煮取叁升去滓溫服壹升日再夜壹服

傷寒大下後復發其汗心下痞惡寒者表未解也不可攻其痞當先解表表解乃攻其痞宜大黃黃連瀉心湯 方用上

病如桂枝證頭項不強痛脈微浮胸中痞堅氣上衝喉咽不得息此為胸有寒當吐之宜瓜蔕散方

瓜蔕 熬　赤小豆 各壹分

右貳味擣為散取半錢匕豉壹合湯柒合漬之須臾去滓內散湯中和頓服之若不吐稍加之得快吐止諸亡血虛家不可與瓜蔕散

太陽病雜療法第七 凡貳拾證 方壹拾叁首

中風發熱六七日不解而煩有表裏證渴欲飲水水入而吐此為水逆五苓散主之 方見結胸中

傷寒二三日心中悸而煩者小建中湯主之方

桂枝 叁兩　甘草 貳兩炙　芍藥 陸兩　生薑 叁兩切　大棗 拾貳枚擘

膠飴 壹升

右陸味以水柒升煮取叁升去滓內飴溫服壹升嘔家不可服以甘故也

傷寒脉浮而醫以火迫刼之亡陽驚狂卧起不安桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯主之方

桂枝　生薑切　蜀漆洗去腥各叁兩　甘草貳兩炙
牡蠣熬伍兩　龍骨肆兩　大棗拾貳枚擘

右柒味以水捌升先煑蜀漆減貳升内諸藥煑取叁升去滓温服壹升一法以水壹斗貳升煑取伍升

燒針令其汗針處被寒核起而赤者必發奔豚氣從少腹上衝者灸其核上一壯與桂枝加桂湯方

桂枝伍兩　芍藥　生薑各叁兩　大棗拾貳枚擘　甘草貳兩炙

右伍味以水柒升煑取叁升去滓温服壹升本云桂枝湯今加桂滿伍兩所以加桂者以能洩奔豚氣也

火逆下之因燒針煩躁者桂枝甘草龍骨牡蠣湯主之方

桂枝壹兩　甘草　龍骨　牡蠣各貳兩熬

右肆味以水伍升煑取貳升去滓温服捌合日叁服

傷寒加温針必驚

太陽病六七日出表證續在脉微而沈反不結胷其人發狂者以熱在下焦少腹堅滿小便自利者下血乃愈所以然者以太陽隨經瘀熱在裏故也宜下之以抵當湯

太陽病身黄脉沈結少腹堅小便不利者爲無血小便自利其人如狂者血證諦也抵當湯主之

傷寒有熱少腹滿應小便不利今反利者爲有血也當須下之不可餘藥宜抵當丸

抵當湯方

大黄貳兩破陸片　桃仁貳拾枚去皮尖熬
水蛭各叁拾枚熬　蝱蟲去足翅熬

右肆味以水伍升煑取叁升去滓温服壹升不下更服

抵當丸方

大黃參兩　桃仁貳拾伍枚去皮尖熬　䗪蟲去足翅熬　水蛭各貳拾枚熬

右肆味擣分為肆丸以水壹升煑壹丸取柒合服晬時當下不下更服

婦人中風發熱惡寒經水適來得七八日熱除而脉遲身涼胷脅下滿如結胷狀譫語此為熱入血室當刺期門隨其虛實而取之

婦人中風七八日續得寒熱發作有時經水適斷者此為熱入血室其血必結故使如瘧狀發作有時小柴胡湯主之方見柴胡湯門

婦人傷寒發熱經水適來晝日了了暮則譫語如見鬼狀此為熱入血室無犯胃氣及上二焦必當自愈

傷寒無大熱口燥渴而煩其背微惡寒白虎湯主之

傷寒脉浮發熱無汗其表不解不可與白虎湯渴欲飲水無表證白虎湯主之

傷寒脉浮滑此以表有熱裏有寒白虎湯主之方

知母陸兩　石膏壹斤碎　甘草貳兩炙　粳米陸合

右肆味以水壹斗煑米熟湯成去滓溫服壹升日參服

又方

知母陸兩　石膏壹斤碎　甘草貳兩炙　人參參兩　粳米陸合

右伍味以水壹斗煑米熟湯成去滓溫服壹升日參服立夏後至立秋前得用之立秋後不可服春三月病常苦裏冷白虎湯亦不可與之與之即嘔利而腹痛諸亡血及虛家亦不可與白虎湯得之則腹痛而利但當溫之

太陽與少陽合病自下利者與黃芩湯若嘔者與黃芩加半夏生薑湯

黃芩湯方

黃芩叁兩 芍藥 甘草各貳兩炙 大棗拾貳枚擘

右肆味以水壹斗煑取叁升去滓溫服壹升日再夜壹服

黃芩加半夏生薑湯方

半夏半升洗 生薑壹兩半切

右貳味加入前方中即是

傷寒胷中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐黃連湯主之方

黃連 甘草炙 乾薑 桂枝 人參各叁兩

半夏半升洗 大棗拾貳枚擘

右柒味以水壹斗煑取陸升去滓溫分伍服晝叁夜貳服

傷寒八九日風濕相搏身體疼煩不能自轉側不嘔不渴下已脉浮而緊桂枝附子湯主之若其人大便堅小便自利朮附子湯主之方

桂枝肆兩 附子叁枚炮 生薑叁兩切 大棗拾貳枚擘 甘草貳兩炙

右伍味以水陸升煑取貳升去滓分溫叁服

朮附子湯方於前方中去桂加白朮肆兩即是壹服覺身痺半日許復服之盡其人如冒狀勿怪即是附子朮併走皮中逐水氣未得除故使之耳法當加桂肆兩以大便堅小便自利故不加桂也

風濕相搏骨節疼煩掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫甘草附子湯主之方

甘草貳兩炙 附子貳枚炮 白朮叁兩 桂枝肆兩

右肆味以水陸升煑取叁升去滓溫服壹升日叁服初服得微汗即止能食汗止復煩者將服伍合恐壹升多者後服陸柒合愈

傷寒脉結代心動悸炙甘草湯主之方

甘草肆兩炙　桂枝　生薑各參兩切　麥門冬半升去心

麻子仁半升　人參　阿膠各貳兩　大棗參拾枚擘　生地黃壹斤

右玖味以清酒柒升水捌升煑取參升去滓內膠消烊盡

温服壹升日參服

陽明病狀第八 凡柒拾伍證 方壹拾壹首

陽明之為病胃中寒是也

問曰病有太陽陽明有正陽陽明有微陽陽明何謂也荅曰太陽陽明者脾約是也正陽陽明者胃家實是也微陽陽明者發其汗若利其小便胃中燥便難是也

問曰何緣得陽明病荅曰太陽病發其汗若下之亡其津液胃中乾燥因為陽明不更衣而便難復為陽明病也

問曰陽明病外證云何荅曰身熱汗出而不惡寒但反惡熱

問曰病有得之一日發熱惡寒者何荅曰然雖二日惡寒自罷即汗出惡熱也曰惡寒何故自罷荅曰陽明處中主土萬物所歸無所復傳故始雖惡寒二日自止是為陽明病

太陽初得病時發其汗汗先出復不徹因轉屬陽明

病發熱無汗嘔不能食而反汗出濈濈然是為轉在陽明

傷寒三日陽明脉大

病脉浮而緩手足温是為繫在太陰太陰當發黃小便自利者不能發黃至七八日而堅為屬陽明

傷寒傳繫陽明者其人濈然後汗出

陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒脉浮若緊下之則腹滿小便難也

陽明病能食為中風不能食為中寒

陽明病中寒不能食而小便不利手足濈然汗出此為欲作堅瘕也必頭堅後溏所以然者胃中冷水穀不别故也

陽明病初爲欲食之小便反不數大便自調其人骨節疼翕翕如有熱狀奄然發狂濈然汗出而解此爲水不勝穀氣與汗共并堅者即愈

陽明病欲解時從申盡戌

陽明病不能食下之不解其人不能食攻其熱必噦所以然者胃中虛冷故也其人本虛攻其熱必噦

陽明病脉遲食難用飽飽即微煩頭眩者必小便難此欲作穀疸雖下之其腹必滿如故耳所以然者脉遲故也

陽明病久久而堅者陽明病當多汗而反無汗其身如蟲行皮中之狀此爲久虛故也

冬陽明病反無汗但小便利二三日嘔而欬手足若厥者其人頭必痛若不嘔不欬手足不厥者頭不痛

冬陽明病但頭眩不惡寒故能食而欬者其人咽必痛若不欬者咽不痛

陽明病脉浮而緊其熱必潮發作有時但浮者必盗汗出

陽明病無汗小便不利心中懊憹必發黄

陽明病被火額上微汗出而小便不利必發黄

陽明病口燥但欲漱水不欲咽者必衄

陽明病本自汗出醫復重發其汗病已差其人微煩不了了此大便堅也必亡津液胃中燥故令其堅當問小便日幾行若本日三四行今日再行者必知大便不久出今爲小便數少津液當還入胃中故知必當大便也

夫病陽多者熱下之則堅汗出多極發其汗亦堅

傷寒嘔多雖有陽明證不可攻也

陽明病當心下堅滿不可攻之攻之遂利不止者利止者愈

陽明病合色赤不可攻之必發熱色黄者小便不利也

陽明病不吐下而煩者可與承氣湯

陽明病其脉遲雖汗出不惡寒其體必重短氣腹滿而喘有潮熱如此者其外爲解可攻其裏手足濈然汗出此爲巳堅承氣湯主之

若汗出多而微惡寒外爲未解其熱不潮勿與承氣湯若腹大滿而不大便者可與小承氣湯微和其胃氣勿令至大下

陽明病潮熱微堅可與承氣湯不堅勿與之

若不大便六七日恐有燥屎欲知之法可與小承氣湯若腹中轉失氣者此爲有燥屎乃可攻之若不轉失氣者此但頭堅後溏不可攻之攻之必腹脹滿不能食欲飲水者即噦其後發熱者必復堅以小承氣湯和之若不轉失氣者慎不可攻之

夫實則譫語虛則鄭聲鄭聲者重語是也直視譫語喘滿者死下利者亦死

陽明病其人多汗津液外出胃中燥大便必堅堅者則譫語承氣湯主之

陽明病譫語妄言發潮熱其脉滑疾如此者承氣湯主之因與承氣湯壹升腹中轉氣者復與壹升如不轉氣者勿與之明日又不大便脉反微濇此爲裏虛爲難治不得復與承氣湯

陽明病譫語有潮熱反不能食者必有燥屎五六枚若能食者但堅耳承氣湯主之

陽明病下血而譫語者此爲熱入血室但頭汗出者當刺期門隨其實而寫之濈然汗出者則愈

汗出而譫語者有燥屎在胃中此風也過經乃可下之下之若早語言必亂以表虛裏實下之則愈宜承氣湯

傷寒四五日脉沉而喘滿沉爲在裏而反發其汗津液越出大便爲難表虛裏實久則譫語

陽明病下之心中懊憹而煩胃中有燥屎者可攻其人腹微滿頭堅後溏者不可下之有燥屎者宜承氣湯

病者五六日不大便繞臍痛躁煩發作有時此爲有燥屎故使不大便也

病者煩熱汗出即解復如瘧狀日晡所發者屬陽明脉實者當下之脉浮虛者當發其汗下之宜承氣湯發汗宜桂枝湯方見桂枝湯門

大下後六七日不大便煩不解腹滿痛者此有燥屎所以然者本有宿食故也宜承氣湯

病者小便不利大便乍難乍易時有微熱怫鬱不能卧有燥屎故也宜承氣湯

得病二三日脉弱無太陽柴胡證而煩心下堅至四日雖能食以小承氣湯少與微和之令小安至六日與承氣湯壹升不大便六七日小便少者雖不大便但頭堅後溏未定成其堅攻之必溏當須小便利定堅乃可攻之宜承氣湯

傷寒七八日目中不了了睛不和無表裏證大便難微熱者此爲實急下之宜承氣湯

陽明病發熱汗多者急下之宜承氣湯

發汗不解腹滿痛者急下之宜承氣湯

腹滿不減減不足言當下之宜承氣湯

陽明與少陽合病而利脉不負者爲順滑而數者有宿食宜承氣湯方並見承氣湯門

陽明病脉浮緊咽乾口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反偏惡熱其身體重發汗即躁心中憒憒而反譫語加温針必怵

憹又煩躁不得眠下之胃中空虛客氣動膈心中懊憹舌上
胎者梔子湯主之
陽明病下之其外有熱手足溫不結胷心中懊憹若飢不能
食但頭汗出梔子湯主之方
梔子拾肆枚擘　香豉肆合綿裹
右貳味以水肆升先煮梔子取貳升半內豉煮取壹升半
去滓分再服溫進壹服得快吐止後服
三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁言語向經譫語遺尿
發汗則譫語下之則額上生汗手足厥冷白虎湯主之按諸本皆云向經不敢刊改
若渴欲飲水口乾舌燥者白虎湯主之方見雜療中
若脉浮發熱渴欲飲水小便不利猪苓湯主之方
猪苓去黑皮　茯苓　澤瀉　阿膠　滑石碎各壹兩

右伍味以水肆升先煮肆味取貳升去滓內膠烊消溫服
柒合日叁服
陽明病汗出多而渴者不可與猪苓湯以汗多胃中燥猪苓
湯復利其小便故也
胃中虛冷其人不能食者飲水即噦
脉浮發熱口乾鼻燥能食者即衄
若脉浮遲表熱裏寒下利清穀四逆湯主之方
甘草貳兩炙　乾薑壹兩半　附子壹枚生去皮破捌片
右叁味以水叁升煮取壹升貳合去滓分溫再服強人可
大附子壹枚乾薑叁兩
陽明病發潮熱大便溏小便自可而胷脅滿不去小柴胡湯
主之
陽明病脅下堅滿不大便而嘔舌上胎者可以小柴胡湯上

焦得通津液得下胃氣因和身濈然汗出而解

陽明中風脉弦浮大而短氣腹都滿脅下及心痛久按之氣不通鼻乾不得汗其人嗜卧一身及目悉黄小便難有潮熱時時噦耳前後腫刺之小差外不解病過十日脉續浮與小柴胡湯但浮無餘證與麻黄湯不溺腹滿加噦不治（方見陽胡湯門）

陽明病其脉遲汗出多而微惡寒表為未解可發汗宜桂枝湯

陽明病脉浮無汗其人必喘發汗即愈宜麻黄湯（方並見上）

陽明病汗出若發其汗小便自利此為內竭雖堅不可攻當須自欲大便宜蜜煎導而通之若土瓜根猪膽汁皆可以導

㊀方

蜜（柒合）

右壹味內銅器中微火煎之稍凝如飴狀攪之勿令焦著欲可丸捻如指許長貳寸當熱時急作令頭銳以內穀道中以手急抱欲大便時乃去之

又方

大猪膽壹枚瀉汁和少法醋以灌穀道中如一食頃當大便出宿食惡物已試甚良

陽明病發熱而汗出此為熱越不能發黄也但頭汗出其身無有劑頸而還小便不利渴引水漿此為瘀熱在裏身必發黄茵蔯湯主之

傷寒七八日身黄如橘小便不利其腹微滿茵蔯湯主之 ㊀方

茵蔯（陸兩）　梔子（拾肆枚擘）　大黄（貳兩）

右叁味以水壹斗貳升先煮茵蔯減陸升內貳味煮取三升去滓分溫叁服小便當利溺如皂莢沫狀色正赤壹宿黄從小便去

陽明證其人喜忘必有畜血所以然者本有久瘀血故令喜

志雖堅大便必黑抵當湯主之

病者無表裏證發熱七八日雖脉浮數可下之假令下巳脉數不解而合熱消穀喜飢至六七日不大便者有瘀血抵當湯主之若數不解而下不止必挾熱便膿血方見雜療中

食穀而嘔者屬陽明茱萸湯主之方

吳茱萸壹升 人參叁兩 生薑切陸兩 大棗擘拾貳枚

右肆味以水柒升煑取貳升去滓溫服柒合日叁服得湯反劇者屬上焦也

陽明病寸口緩關上小浮尺中弱其人發熱而汗出復惡寒不嘔但心下痞此爲醫下之也若不下其人復不惡寒而渴者爲轉屬陽明小便數者大便即堅不更衣十日無所苦也渴欲飲水者但與之當以法救渴宜五苓散方見療痞門

脉陽微而汗出少者爲自和汗出多者爲太過太過者陽絶於内亡津液大便因堅

脉浮而芤浮爲陽芤爲陰浮芤相搏胃氣則生熱其陽則絶

趺陽脉浮而濇浮則胃氣強濇則小便數浮濇相搏大便即堅其脾爲約麻子仁丸主之方

麻子仁貳升 芍藥 枳實炙各捌兩 大黃壹斤 厚朴壹尺炙

杏仁壹升去皮尖兩人者熬別作脂

右陸味蜜和丸如梧桐子大飲服拾圓日叁服漸加以知爲度

傷寒發其汗則身目爲黃所以然者寒濕相搏在裏不解故也傷寒其人發黃梔子蘖皮湯主之方

梔子拾伍枚擘 甘草 黃蘖拾伍分

右叁味以水肆升煑取貳升去滓分溫再服

傷寒瘀熱在裏身體必黃麻黃連軺赤小豆湯主之方

麻黄貳兩去節 連翹貳兩 杏仁叁拾枚去皮尖 赤小豆壹升

大棗拾貳枚擘 生梓白皮切壹升 甘草貳兩炙

一方生薑貳兩

右柒味以水壹斗煮麻黄壹貳沸去上沫内諸藥煮取叁升去滓温服壹升

少陽病狀第九 玖證

少陽之爲病口苦咽乾目眩也

少陽中風兩耳無所聞目赤胷中滿而煩不可吐下吐下則悸而驚

傷寒病脉弦細頭痛而發熱此爲屬少陽少陽不可發汗發汗則譫語爲屬胃胃和即愈不和煩而悸

太陽病不解轉入少陽脅下堅滿乾嘔不能食飲往來寒熱而未吐下其脉沈緊可與小柴胡湯若已吐下發汗温鍼譫語柴胡證罷此爲壞病知犯何逆以法治之

三陽脉浮大上關上但欲寐目合則汗

傷寒六七日無大熱其人躁煩此爲陽去入陰故也

傷寒三日三陽爲盡三陰當受其邪其人反能食而不嘔此爲三陰不受其邪

傷寒三日少陽脉小欲已

少陽病欲解時從寅盡辰

千金翼方卷第九

千金翼方卷第十

傷寒下

太陰病狀第一 捌證 方貳首

太陰之爲病腹滿吐食不下下之益甚時腹自痛胷下堅結

太陰病脉浮可發其汗

太陰中風四肢煩疼陽微陰澀而長爲欲愈

太陰病欲解時從亥盡丑

自利不渴者屬太陰其藏有寒故也當温之宜四逆輩

傷寒脉浮而緩手足温是爲繫在太陰太陰當發黄小便自利利者不能發黄至七八日雖煩暴利十餘行必自止所以自止者脾家實腐穢當去故也

本太陽病醫反下之因腹滿時痛爲屬太陰桂枝加芍藥湯主之其實痛加大黄湯主之方

桂枝叁兩去皮　芍藥陸兩　生薑叁兩切　甘草貳兩炙　大棗拾貳枚擘

右伍味以水柒升煮取叁升去滓分溫叁服

加大黃湯方

大黃貳兩

右於前方中加此大黃貳兩即是

人無陽證脉弱其人續自便利設當行大黃芍藥者減之其人胃氣弱易動故也

少陰病狀第一　四拾伍證　方壹拾陸首

少陰之爲病脉微細但欲寐

少陰病欲吐而不煩但欲寐五六日自利而渴者屬少陰虛故引水自救小便白者少陰病形悉具其人小便白者下焦虛寒不能制溲故白也夫病其脉陰陽俱緊而反汗出爲陽屬少陰法當咽痛而復吐利

少陰病欬而下利譫語是爲被火氣刼故也小便必難爲強責少陰汗也

少陰病脉細沈數病在裏不可發其汗

少陰病脉微不可發其汗無陽故也陽已虛尺中弱澀者復不可下之

少陰病脉緊者至七八日下利其脉暴微手足反溫其脉緊反去此爲欲解雖煩下利必自愈

少陰病下利若利止惡寒而踡手足溫者可治

少陰病惡寒而踡時自煩欲去其衣被不可治

少陰中風其脉陽微陰浮爲欲愈

少陰病欲解時從子盡寅

少陰病八九日而一身手足盡熱熱在膀胱必便血

少陰病其人吐利手足不逆反發熱不死脉不足者灸其少

陰七壯
少陰病但厥無汗强發之必動血未知從何道出或從口鼻
目出是爲下厥上竭爲難治
少陰病惡寒身蜷而利手足逆者不治
少陰病下利止而眩時時自冒者死
少陰病其人吐利躁逆者死
少陰病四逆惡寒而身蜷其脉不至其人不煩而躁者死
少陰病六七日其息高者死
少陰病脉微細沈但欲卧汗出不煩自欲吐至五六日自利
復煩燥不得卧寐者死
少陰病始得之反發熱脉反沈者麻黄細辛附子湯主之方
麻黄(貳兩去節) 細辛(貳兩) 附子(壹枚炮去皮破八片)
右叁味以水貳斗先煑麻黄減壹升去上沫內諸藥煑取
三升去滓温服一升
少陰病得之二三日麻黄附子甘草湯微發汗以二三日無
證故微發汗方
麻黄(二兩去節) 附子(一枚炮去皮破八片) 甘草(二兩炙)
右三味以水七升先煑麻黄一二沸去上沫內諸藥煑取
二升半去滓温服八合
少陰病得之二三日以上心中煩不得卧者黄連阿膠湯主
之方
黄連(四兩) 黄芩(一兩) 芍藥(二兩) 雞子黄(二枚)
阿膠(三挺)
右五味以水六升先煑三味取二升去滓內膠烊盡內雞
子黄攪令相得温服七合日三服
少陰病得之一二日口中和其背惡寒者當灸之附子湯主之

少陰病身體痛手足寒骨節痛脉沈者附子湯主之方
附子二枚炮去皮破八片 茯苓三兩 人參二兩
白术四兩 芍藥三兩
右五味以水八升煑取三升去滓分溫三服
少陰病下利便膿血桃花湯主之
少陰病二三日至四五日腹痛小便下利不止而便膿血者
以桃花湯主之方
赤石脂一斤一半完一半末 乾薑一兩 粳米一升
右三味以水七升煑米熟湯成去滓溫取七合內赤石脂
末一方寸匕一服止餘勿服
少陰病下利便膿血者可刺
少陰病吐利手足逆煩躁欲死者茱萸湯主之方見陽明門
少陰病下利咽痛胷滿心煩猪膚湯主之方

猪膚一斤
右壹味以水壹斗煑取五升去滓內白蜜壹升白粉五合
熬香和令相得溫分六服
少陰病二三日咽痛者可與甘草湯不差可與桔梗湯方
甘草
右壹味以水叁升煑取壹升半去滓溫服七合日再服
桔梗湯方
桔梗一大枚 甘草二兩
右貳味以水叁升煑取壹升去滓分溫再服
少陰病咽中傷生瘡不能語言聲不出苦酒湯主之方
雞子壹枚去黃內好上苦酒於殼中 半夏洗破如棗核十四枚
右貳味內半夏著苦酒中以雞子殼置刀環中安火上令
三沸去滓少少含嚥之不差更作三劑愈

少陰病咽中痛半夏散及湯方

半夏洗　桂枝　甘草炙

右叁味等分各異擣合治之白飲和服方寸匕日三服若不能散服者以水一升煎七沸內散兩方寸匕更煑三沸下火令小冷少少含嚥之半夏有毒不當散服

少陰病下利白通湯主之方

附子壹枚生去皮破八片　乾薑一兩　葱白四莖

右叁味以水叁升煑取壹升去滓分溫再服

少陰病下利脉微服白通湯利不止厥逆無脉乾煩者白通加猪膽汁湯主之方

猪膽汁一合　人尿五合

右貳味內前湯中和令相得溫分再服若無膽亦可用服湯脉暴出者死微續者生

少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不利四肢沉重疼痛而利此爲有水氣其人或欬或小便不利或下利或嘔玄武湯主之方

茯苓　芍藥　生姜各叁兩切　白术貳兩　附子壹枚炮去皮破捌片

右伍味以水捌升煑取叁升去滓溫服柒合欬者加伍味子半升細辛壹兩乾薑壹兩小便自利者去茯苓下利者去芍藥加乾薑貳兩嘔者去附子加生薑足前爲半斤利不止便膿血者宜桃花湯

少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脉微欲絶身反惡寒其人面赤或腹痛或乾嘔或咽痛或利止而脉不出通脉四逆湯主之方

甘草貳兩炙　附子大者壹枚生去皮破捌片　乾薑叁兩強人可肆兩

右叁味以水叁升煑取壹升貳合去滓分溫再服其脉即出者愈面赤者加葱白九莖腹痛者去葱加芍藥貳兩嘔

者加生薑貳兩咽痛者去芍藥加桔梗壹兩利止脉不出者去桔梗加人參貳兩病皆與方相應者乃加減服之

少陰病四逆其人或欬或悸或小便不利或腹中痛或洩利下重四逆散主之方

甘草炙　枳實炙　柴胡　芍藥各拾分

右肆味擣為散白飲和服方寸匕日叁服欬者加五味子乾薑各伍分兼主利悸者加桂伍分小便不利者加茯苓伍分腹中痛者加附子壹枚炮洩利下重者先以水伍升煑薤白三升取三升去滓以散三方寸匕內湯中煑取一升半分溫再服

少陰病不利六七日欬而嘔渴心煩不得眠猪苓湯主之方見陽明門

少陰病得之二三日口燥咽乾急下之宜承氣湯

少陰病利清水色青者心下必痛口乾燥者可下之宜承氣湯一云大柴胡

少陰病六七日腹滿不大便者急下之宜承氣湯方見承氣湯中

少陰病其脉沈者當溫之宜四逆湯

少陰病其人飲食入則吐心中溫溫欲吐復不能吐始得之手足寒脉弦遲此胷中實不可下也當遂吐之若膈上有寒飲乾嘔者不可吐當溫之宜四逆湯方見陽明門

少陰病下利脉微濇者即嘔汗者必數更衣反少當溫其上灸之一云灸厥陰伍拾壯

厥陰病狀第三 伍拾陸證方柒首

厥陰之為病消渴氣上撞心中疼熱飢而不欲食甚者則欲吐蚘下之不肯止

厥陰中風其脉微浮為欲愈不浮為未愈

厥陰病欲解時從丑盡卯

厥陰病渴欲飲水者與水飲之即愈

諸四逆厥者不可下之虛家亦然

傷寒先厥後發熱而利者必止見厥復利

傷寒始發熱六日厥反九日而下利厥利當不能食今反能食恐爲除中食之黍餅不發熱者知胃氣尚在必愈恐暴熱來出而復去也後日脉之其熱續在期之旦日夜半愈所以然者本發熱六日厥反九日復發熱三日并前六日亦爲九日與厥相應故期之旦日夜半愈後三日脉之數其熱不罷此爲熱氣有餘必發癰膿

傷寒脉遲六七日而反與黃芩湯徹其熱脉遲爲寒與黃芩湯復除其熱腹中冷當不能食今反能食此爲除中必死

傷寒先厥發熱下利必自止而反汗出咽中強痛其喉爲痺發熱無汗而利必自止便膿血便膿血者其喉不痺

傷寒一二日至四五日厥者必發熱前熱者後必厥厥深熱亦深厥微熱亦微厥應下之而發其汗者口傷爛赤

凡厥者陰陽氣不相順接便爲厥厥者手足逆者是

傷寒病厥五日熱亦五日設六日當復厥不厥者自愈厥不過五日以熱五日故知自愈

傷寒脉微而厥至七八日膚冷其人躁無安時此爲藏寒蚘上入其膈蚘厥者其人當吐蚘令病者靜而復時煩此爲藏寒蚘上入其膈故煩須臾復止得食而嘔又煩者蚘聞食臭必出其人常自吐蚘蚘厥者烏梅丸主之方 又主久痢

烏梅叁百枚 細辛陸兩 乾薑拾兩 黃連拾陸兩 當歸肆兩

蜀椒肆兩汗 附子陸兩炮 桂枝陸兩 人參陸兩 黃蘗陸兩

右壹拾味異擣合治之以苦酒漬烏梅一宿去核蒸之伍

斗米下擣成泥和諸藥令相得臼中與蜜杵千下丸如梧桐子大先食飲服拾丸日參服少少加至貳拾丸禁生冷滑物臭食等

傷寒熱少微厥稍頭寒嘿嘿不欲食煩躁數日小便利色白者熱除也得食其病爲愈若厥而嘔胷脅煩滿其後必便血（稍頭一作指頭）

病者手足厥冷言我不結胷少腹滿按之痛此冷結在膀胱關元也

傷寒發熱四日厥反三日復發熱四日厥少熱多其病當愈四日至六七日不除必便膿血

傷寒厥四日熱反三日復厥五日其病爲進寒多熱少陽氣退故爲進

傷寒六七日其脉數手足厥煩躁陰厥不還者死

傷寒下利厥逆躁不能卧者死

傷寒發熱下利至厥不止者死

傷寒六七日不利便發熱而利其人汗出不止者死有陰無陽故也

傷寒五六日不結胷腹濡脉虛復厥者不可下之下之亡血死

傷寒發熱而厥七日下利者爲難治

傷寒脉促手足厥逆者可灸之

傷寒脉滑而厥者其表有熱白虎湯主之（表熱見裏方見雜療中）

手足厥寒脉爲之細絕當歸四逆湯主之 方

當歸參两　桂心參两　細辛參两　芍藥參两　甘草貳两

通草貳两　大棗貳拾伍枚擘

右柒味以水捌升煑取參升去滓溫服壹升日參服

若其人有寒當歸四逆加吳茱萸生薑湯主之 方

吳茱萸貳兩　生薑捌兩切

右前方中加此貳味以水肆升清酒肆升和煑取叁升去滓分溫肆服

大汗出熱不去拘急四肢疼若下利厥而惡寒四逆湯主之

大汗出若火下利而厥四逆湯主之方見陽明

病者手足逆冷脉乍緊者邪結在胷中心下滿而煩飢不能食病在胷中當吐之宜瓜蔕散方見痞中

傷寒厥而心下悸先治其水當與茯苓甘草湯却治其厥不爾其水入胃必利茯苓甘草湯主之方

茯苓貳兩　甘草炙壹兩　桂枝貳兩　生薑叁兩

右肆味以水肆升煑取貳升去滓分溫叁服

傷寒六七日其人大下後脉沉遲手足厥逆下部脉不至咽喉不利唾膿血洩利不止爲難治麻黃升麻湯主之方

麻黃去節貳兩半　知母拾捌銖　萎蕤拾捌銖　黃芩拾捌銖

升麻壹兩陸銖　當歸壹兩陸銖　芍藥　桂枝　石膏碎綿裹

乾薑　白朮　茯苓　麥門冬去心　甘草炙各陸銖

右壹拾肆味以水壹斗先煑麻黃貳沸去上沫內諸藥煑取叁升去滓分溫叁服壹炊間當汗出愈

傷寒四五日腹中痛若轉氣下趣少腹爲欲自利

傷寒本自寒下醫復吐之而寒格更逆吐食入即出乾薑黃芩黃連人參湯主之方

乾薑　黃芩　黃連　人參各叁兩

右肆味以水陸升煑取貳升去滓分溫再服

下利有微熱其人渴脉弱者自愈

下利脉數若微發熱汗出者自愈設脉復緊爲未解

下利手足厥無脉灸之不溫反微喘者死少陰負趺陽者爲

順

下利脉反浮數尺中自澀其人必清膿血

下利清穀不可攻其表汗出必脹滿

下利脉沉弦者下重其脉大者爲未止脉微弱數者爲欲自止雖發熱不死

下利脉沉而遲其人面少赤身有微熱下利清穀必鬱冒汗出而解其人微厥所以然者其面戴陽下虛故也

下利脉反數而渴者今自愈設不差必清膿血有熱故也

下利後脉絶手足厥晬時脉還手足温者生不還者死

傷寒下利日十餘行其人脉反實者死

下利清穀裏寒外熱汗出而厥通脉四逆湯主之方見少陰門

熱利下重白頭翁湯主之

下利欲飲水者爲有熱白頭翁湯主之方

白頭翁貳兩 黄蘗參兩 黄連參兩 秦皮參兩

右肆味以水柒升煑取貳升去滓温服壹升不差更服

下利腹滿身體疼痛先温其裏乃攻其表温裏宜四逆湯攻表宜桂枝湯方並見上

下利而譫語爲有燥屎小承氣湯主之方見承氣門

下利後更煩按其心下濡者爲虛煩也梔子湯主之方見陽明門

嘔家有癰膿不可治嘔膿盡自愈

嘔而發熱小柴胡湯主之方見柴胡門

嘔而脉弱小便復利身有微熱見厥難治四逆湯主之方見上

乾嘔吐涎沫而復頭痛吳茱萸湯主之方見陽明門

傷寒大吐下之極虛復極汗者其人外氣怫鬱復與其水以發其汗因得噦所以然者胃中寒冷故也

傷寒噦而滿者視其前後知何部不利利之則愈

傷寒宜忌第四十五章

忌發汗第一

少陰病脉細沈數病在裏忌發其汗

脉浮而緊法當身體疼痛當以汗解假令尺中脉遲者忌發其汗何以知然此爲榮氣不足血氣微少故也

少陰病脉微忌發其汗無陽故也

咽中閉塞忌發其汗發其汗即吐血氣微絶逆冷

厥忌發其汗發其汗即聲亂咽嘶舌萎

太陽病發熱惡寒寒多熱少脉微弱則無陽也忌復發其汗

咽喉乾燥者忌發其汗

亡血家忌攻其表汗出則寒慄而振

衄家忌攻其表汗出必額上促急

汗家重發其汗必恍惚心亂小便已陰疼

淋家忌發其汗發其汗必便血

瘡家雖身疼痛忌攻其表汗出則痓

冬時忌發其汗發其汗必吐利口中爛生瘡欬而小便利若失小便忌攻其表汗則厥逆冷

太陽病發其汗因致痓

宜發汗第二

大法春夏宜發汗

凡發汗欲令手足皆周漐漐一時間益佳不欲流離若病不解當重發汗汗多則亡陽陽虛不得重發汗也

凡服湯藥發汗中病便止不必盡劑也

凡云宜發汗而無湯者丸散亦可用然不如湯藥也

凡脉浮者病在外宜發其汗

太陽病脉浮而數者宜發其汗

陽明病脉浮虛者宜發其汗

陽明病其脉遲汗出多而微惡寒者表爲未解宜發其汗

太陰病脉浮宜發其汗

太陽中風陽浮而陰濡弱浮者熱自發濡弱者汗自出濇濇惡寒淅淅惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔桂枝湯主之

太陽頭痛發熱身體疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘麻黄湯主之

太陽中風脉浮緊發熱惡寒身體疼痛不汗出而煩躁大青龍湯主之

少陰病得之二三日麻黄附子甘草湯微發汗

忌吐第三

太陽病惡寒而發熱今自汗出反不惡寒而發熱關上脉細而數此吐之過也

少陰病其人飲食入則吐心中溫溫欲吐復不能吐始得之手足寒脉弦遲若膈上有寒飲乾嘔忌吐當溫之

諸四逆病厥忌吐虛家亦然

宜吐第四

大法春宜吐

凡服吐湯中病便止不必盡劑也

病如桂枝證其頭項不強痛寸口脉浮胷中痞堅上撞咽喉不得息此爲有寒宜吐之

病胷上諸實胷中鬱鬱而痛不能食欲使人按之而反有涎唾下利日十餘行其脉反遲寸口微滑此宜吐之利即止

少陰病其人飲食入則吐心中溫溫欲吐復不能吐宜吐之

病者手足逆冷脉乍緊邪結在胷中心下滿而煩飢不能食病在胷中宜吐之

宿食在上管宜吐之

忌下第十五

咽中閉塞忌下下之則上輕下重水漿不下諸外實忌下下之皆發微熱亡脉則厥

諸虛忌下下之則渴引水易愈惡水者劇

脉數者忌下下之必煩利不止

尺中弱澀者復忌下

脉浮大醫反下之此為大逆

太陽證不罷忌下下之為逆

結胸證其脉浮大忌下下之即死

太陽與陽明合病喘而胸滿者忌下

太陽與少陽合病心下痞堅頸項強而眩忌下

凡四逆病厥者忌下虛家亦然

病欲吐者忌下

病有外證未解忌下下之為逆

少陰病食入即吐心中温温欲吐復不能吐始得之手足寒脉弦遲此胸中實忌下

傷寒五六日不結胸腹濡脉虛復厥者忌下下之亡血則死

宜下第十六

大法秋宜下

凡宜下以湯勝丸散

凡服湯下中病則止不必盡參服

陽明病發熱汗多者急下之

少陰病得之二三日口燥咽乾者急下之

少陰病五六日腹滿不大便者急下之

少陰病下利清水色青者心下必痛口乾者宜下之

下利三部脉皆浮按其心下堅者宜下之
下利脉遅而滑者實也利未欲止宜下之
陽明與少陽合病利而脉不負者爲順脉數而滑者有宿食
宜下之
問曰人病有宿食何以別之荅曰寸口脉浮大按之反濇尺
中亦微而濇故知有宿食宜下之
下利不欲食者有宿食宜下之
下利差至其時復發此爲病不盡宜復下之
凡病腹中滿痛者爲寒宜下之
腹滿不減減不足言宜下之
傷寒六七日目中不了了睛不和無表裏證大便難微熱者
此爲實急下之
脉雙弦而遅心下堅脉大而緊者陽中有陰宜下之

傷寒有熱而少腹滿應小便不利今反利此爲血宜下之
病者煩熱汗出即解復如瘧日晡所發者屬陽明脉實者當
下之

宜温第七

大法冬宜服温熱藥
師曰病發熱頭痛脉反沈若不差身軆更疼痛當救其裏宜
温藥四逆湯
下利腹脹滿身軆疼痛先温其裏宜四逆湯
下利脉遅緊爲痛未欲止宜温之
下利脉浮大者此爲虚以強下之故也宜温之與水必噦
少陰病下利脉微濇嘔者宜温之
自利不渴者屬太陰其藏有寒故也宜温之
少陰病其人飲食入則吐心中温温欲吐復不能吐始得之

手足寒脉弦遲若膈上有寒飲乾嘔宜温之
少陰病脉沈者宜急温之
下利欲食者宜就温之

忌火第八

傷寒加火針必驚
傷寒脉浮而醫以火迫刼之亡陽必驚狂卧起不安
傷寒其脉不弦緊而弱弱者必渴被火必譫語
太陽病以火熏之不得汗其人必躁到經不解必清血
陽明病被火額上微汗出而小便不利必發黄
少陰病欬而下利譫語是爲被火氣刼故也小便必難爲強責少陰汗也

宜火第九

凡下利穀道中痛宜灸枳實若熬鹽等熨之

忌灸第十

微數之脉慎不可灸因火爲邪則爲煩逆
脉浮當以汗解而反灸之邪無從去因火而盛病從腰以下必重而痺此爲火逆
脉浮熱甚而反灸之此爲實實以虚治因火而動咽燥必唾血

宜灸第十一

少陰病一二日口中和其背惡寒宜灸之
少陰病吐利手足逆而脉不足灸其少陰七壯
少陰病下利脉微濇者即嘔汗者必數更衣反少者宜温其上灸之（一云灸厥陰伍拾壯）
下利手足厥無脉灸之主厥厥陰是也灸不温反微喘者死
傷寒六七日其脉微手足厥煩躁灸其厥陰厥不還者死

脉促手足厥者宜灸之

忌刺第十二

大怒無刺　新内無刺　大勞無刺　大醉無刺
大飽無刺　大渴無刺　大驚無刺　無刺熇熇之
熱無刺漉漉之汗無刺渾渾之脉無刺病與脉相逆者
上工刺未生其次刺未盛其次刺其衰工逆此者是謂伐形

宜刺第十三

太陽病頭痛至七日自當愈其經竟故也若欲作再經者宜
刺足陽明使經不傳則愈
太陽病初服桂枝湯而反煩不解宜先刺風池風府乃却與
桂枝湯則愈
傷寒腹滿而譫語寸口脉浮而緊者此為肝乘脾名曰縱宜
刺期門
傷寒發熱濇濇惡寒其人大渴欲飲截漿者其腹必滿而自
汗出小便利其病欲解此為肝乘肺名曰横宜刺期門
陽明病下血而譫語此為熱入血室但頭汗出者刺期門隨
其實而寫之
太陽與少陽合病心下痞堅頸項強而眩宜刺大椎肺俞肝
俞勿下之
婦人傷寒懷身腹滿不得小便加從腰以下重如有水氣狀
懷身七月太陰當養不養此心氣實宜刺寫勞宮及関元
小便利則愈
傷寒喉痺刺手少陰穴在腕當小指後動脉是也針入叁分
補之
少陰病下利便膿血者宜刺

忌水第十四

發汗後飲水多者必喘以水灌之亦喘
下利其脉浮大此爲虛以強下之故也設脉浮革因爾腸鳴
當溫之與水必噦
太陽病小便利者爲水多心下必悸
宜水第十五
太陽病發汗後若大汗出胃中乾燥煩不得眠其人欲飲水
當稍飲之令胃氣和則愈
厥陰渴欲飲水與水飲之即愈
嘔而吐膈上者必思煑餅急思水者與五苓散飲之水亦得也
發汗吐下後病狀第五 叄拾證 方壹拾伍首
發汗後水藥不得入口爲逆
未持脉時病人手叉自冒心師因敎試令欬而不即欬者此
必兩耳無所聞也所以然者重發其汗虛故也

發汗後身熱又重發其汗胃中虛冷必反吐也
大下後發汗其人小便不利此亡津液勿治其小便利必自
愈
病人脉數數爲熱當消穀引食而反吐者以醫發其汗陽氣
微膈氣虛脉則爲數數爲客熱不能消穀胃中虛冷故吐
也
病者有寒復發其汗胃中冷必吐蚘 一云吐逆
發汗後重發其汗亡陽譫語其脉反和者不死服桂枝湯汗
出大煩渴不解若脉洪大與白虎湯 方見雜療中
發汗後身疼痛其脉沈遲桂枝加芍藥生薑人參湯主之
方 桂枝叄兩 芍藥四兩 生薑四兩切 甘草貳兩炙 大棗拾貳枚擘
人參叄兩
右陸味以水壹斗貳升煑取叄升去滓溫服壹升本云桂

枝湯令加芍藥生薑人參

太陽病發其汗而不解其人發熱心下悸頭眩身瞤而動振振欲擗地者玄武湯主之方見少陰門

發汗後其人臍下悸欲作奔豚茯苓桂枝甘草大棗湯主之

方 茯苓半斤 桂枝四兩 甘草壹兩炙 大棗拾伍枚擘

右肆味以水壹斗先煑茯苓減貳升內諸藥煑取叁升去滓溫服壹升日叁服

發汗過多以後其人叉手自冒心心下悸而欲得按之桂枝甘草湯主之 方

桂枝四兩 甘草貳兩炙

右貳味以水叁升煑取壹升去滓頓服即愈

發汗脉浮而數復煩者五苓散主之方見結胸門中

發汗後腹脹滿厚朴生薑半夏甘草人參湯主之 方

厚朴半斤炙 生薑半斤切 半夏半升洗 甘草貳兩炙 人參壹兩

右伍味以水壹斗煑取叁升去滓溫服壹升日叁服

發其汗不解而反惡寒者虛故也芍藥甘草附子湯主之 方

芍藥 甘草各叁兩炙 附子壹枚炮去皮破六片

右叁味以水叁升煑取壹升貳合去滓分溫叁服

不惡寒但熱者實也當和其胃氣宜小承氣湯方見承氣湯門 一云調胃承氣湯

傷寒脉浮自汗出小便數頗復微惡寒而脚攣急反與桂枝欲攻其表得之便厥咽乾煩躁吐逆當作甘草乾薑湯以復其陽厥愈足溫更作芍藥甘草湯與之其脚即伸而胃氣不和可與承氣湯重發汗復加燒針者四逆湯主之甘草乾薑湯 方

甘草肆兩炙 乾薑貳兩

右貳味以水叁升煑取壹升去滓分温再服

芍藥甘草湯方

芍藥　甘草炙各四兩

右貳味以水叁升煑取壹升半去滓分温再服

凡病若發汗若吐若下若亡血無津液而陰陽自和者必自愈

傷寒吐下發汗後心下逆滿氣上撞胷起即頭眩其脉沈緊發汗即動經身爲振摇茯苓桂枝白术甘草湯主之方

茯苓四兩　桂枝叁兩　白术　甘草炙各貳兩

右肆味以水陸升煑取叁升去滓分温叁服

發汗吐下以後不解煩躁茯苓四逆湯主之方

茯苓四兩　人參壹兩　甘草貳兩炙　乾薑壹兩半　附子壹枚生去皮破八片

右伍味以水伍升煑取貳升去滓温服柒合日叁服

發汗吐下後虚煩不得眠劇者反覆顛倒心中懊憹梔子湯主之若少氣梔子甘草湯主之若嘔者梔子生薑湯主之

梔子湯方見陽明門

梔子甘草湯方

於梔子湯中加甘草貳兩即是

梔子生薑湯方

於梔子湯中加生薑伍兩即是

傷寒下後煩而腹滿卧起不安梔子厚朴湯主之方

梔子拾肆枚擘　厚朴肆兩炙　枳實肆枚炙

右叁味以水叁升半煑取壹升半去滓分貳服温進壹服快吐止後服

下以後發其汗必振寒又其脉微細所以然者内外俱虚故也

發汗若下之煩熱胷中窒者屬梔子湯證

下以後復發其汗者則晝日煩躁不眠夜而安靜不嘔不渴而無表證其脉沈微身無大熱屬附子乾薑湯方

附子壹枚生去皮破捌片　乾薑壹兩

右貳味以水叁升煮取壹升去滓頓服即安

太陽病先下而不愈因復發其汗表裏俱虛其人因冒冒家當汗出自愈所以然者汗出表和故也表和故下之

傷寒醫以丸藥大下後身熱不去微煩梔子乾薑湯主之方

梔子拾肆枚擘　乾薑貳兩

右貳味以水叁升半煮取壹升半去滓分貳服溫進壹服得快吐止後服

脉浮數法當汗出而愈而下之則身體重心悸者不可發其汗當自汗出而解所以然者尺中脉微此裏虛須表裏實津液自和自汗出愈

發汗以後不可行桂枝湯汗出而喘無大熱與麻黃杏子石膏甘草湯

麻黃肆兩去節　杏仁伍拾枚去皮尖　石膏半斤碎　甘草貳兩炙

右肆味以水柒升先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煮取叁升去滓溫服壹升本云黃耳杯

傷寒吐下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升白虎湯主之方見雜療中

傷寒吐下後未解不大便五六日至十餘日其人日晡所發潮熱不惡寒循如見鬼神之狀劇者發則不識人循衣妄撮怵惕不安微喘直視脉弦者生澀者死微者但發熱譫語與承氣湯若下者勿後服

大下後口燥者裏虛故也

霍亂病狀第十八 壹拾證 方叁首

問曰病有霍亂者何也荅曰嘔吐而利此爲霍亂
問曰病者發熱頭痛身體疼痛惡寒而復吐利當屬何病荅
曰當爲霍亂霍亂吐下利止復更發熱也
傷寒其脉微濇本是霍亂今是傷寒却四五日至陰經上轉
入陰當利本素嘔下利者不治若其人即欲大便但反失
氣而不利者是爲屬陽明必堅十二日愈所以然者經竟
故也
下利後當堅堅能食者愈今反不能食到後經中頗能食復
一經能食過之一日當愈若不愈不屬陽明也惡寒脉微
而復利利止必亡血四逆加人參湯主之方
四逆湯中加人參壹兩即是
霍亂而頭痛發熱身體疼痛熱多欲飲水五苓散主之寒多
不用水者理中湯主之方 五苓散見結胷門

人參　乾薑　甘草炙　白术各叁
右肆味以水捌升煑取叁升去滓温服壹升日叁服齊上
築者爲腎氣動去术加桂肆兩吐多者去术加生薑叁兩
下利多者復用术悸者加茯苓貳兩渴者加术至肆兩半
腹中痛者加人參至肆兩半寒者加乾薑至肆兩半腹滿
者去术加附子壹枚服藥後如食頃飲熱粥壹升微自温
暖勿發揭衣被壹方蜜和丸如雞黄許大以沸湯數合和
壹丸研碎温服日叁夜貳腹中未熱益至叁肆丸然不及湯
吐利止而身體痛不休當消息和解其外宜桂枝湯小和之
吐利汗出發熱惡寒四肢拘急手足厥四逆湯主之既吐且
利小便復利而大汗出下利清穀裏寒外熱脉微欲絶四
逆湯主之
吐已下斷汗出而厥四肢不解脉微欲絶通脉四逆加猪膽

湯主之（方）

於通脈四逆湯中加豬膽汁半合即是服之其脈即出

無豬膽以羊膽代之

吐利發汗其人脈平而小煩此新虛不勝穀氣故也

陰易病已後勞復第七 條證壹 方六 四首

傷寒陰易之爲病身躰重少氣少腹裏急或引陰中拘攣熱上衝胷頭重不欲舉眼中生花痂胞赤膝脛拘急燒褌散主之（方）

婦人裏褌近隱處燒灰

右壹味水和服方寸匕日叁小便即利陰頭微腫此爲愈

大病已後勞復枳實梔子湯主之（方）

枳實叁枚炙　豉壹升綿裹　梔子拾肆枚擘

右叁味以酢漿柒升先煎取肆升次內貳味煑取貳升內豉煑五六沸去滓分溫再服若有宿食內大黃如博棊子大五六枚服之愈

傷寒差已後更發熱小柴胡湯主之脈浮者以汗解之脈沉實緊一作者以下解之

大病已後腰以下有水氣牡蠣澤瀉散主之（方）

牡蠣熬　澤瀉　蜀漆洗　商陸　葶藶熬

海藻洗　栝樓根各等分

右柒味擣爲散飲服方寸匕日叁服小便即利

傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐竹葉石膏湯主之（方）

竹葉貳把　半夏半升洗　麥門冬壹升去心　甘草炙

人參貳兩　石膏壹斤碎　粳米半升

右柒味以水壹斗煑取陸升去滓內粳米熟湯成溫服壹升日叁服

大病已後其人喜唾久久不了胷上有寒當温之宜理中丸

病人脉已解而日暮微煩者以病新差人強與穀脾胃氣尚弱不能消穀故令微煩損穀即愈

雜方附

華佗曰時病差後七日内酒肉五辛油麪生冷醋滑房室皆斷之永差

書生丁季受殺鬼丸方

虎頭骨炙 丹砂 真珠 雄黃 雌黃
鬼臼 曾青 女青 皂莢去皮子炙 桔梗
蕪荑 白芷 芎藭 白朮 鬼箭削取皮羽
鬼督郵 藜蘆 菖蒲以上各貳兩

右壹拾捌味擣篩蜜和如彈丸大帶之男左女右

劉次卿彈鬼丸方

雄黃 丹砂各貳兩 石膏肆兩 烏頭 鼠負各壹兩

右伍味以正月建除日執厭日亦得擣為散白蠟伍兩銅器中火上消之下藥攪令凝丸如楝實以赤縠裹壹丸男左女右肘後帶之

度瘴散方

麻黃去節 升麻 附子炮去皮 白朮各壹兩 細辛
乾薑 防己 防風 桂心 烏頭炮去皮
蜀椒汗 桔梗各貳分

右壹拾貳味擣篩為散密貯之山中所在有瘴氣之處旦空腹飲服壹錢匕覆取汗病重稍加之

老君神明白散方

白朮 附子炮去皮各貳兩 桔梗 細辛各壹兩
烏頭炮去皮肆兩

右伍味麤擣篩絳囊盛帶之所居閭里皆無病若有得疫
者温酒朝壹方寸匕覆取汗得吐即差或經三四日者以
叁方寸匕内伍升水中煑令沸分温三服

太一流金散方

雄黄(叁兩)　雌黄　羖羊角(各貳兩)
礬石(壹兩燒令汁盡)　鬼箭(削取皮羽壹兩半)

右伍味擣篩爲散以細密帛裹之作叁角絳囊盛壹兩帶
心前并挂門閤窻牖上若逢大疫之年以朔旦平明時以
青布裹壹刀圭中庭燒之有病者亦燒熏之若遭毒螫者
以唾和塗之

務成子螢火丸主辟疾病惡氣百鬼虎狼蛇虺蜂蠆諸毒五
兵白刃盜賊凶害昔冠軍將軍武威太守劉子南從尹公受
得此方以永平十二年於北界與虜戰敗績士卒略盡子南
被圍矢下如雨未至子南馬數尺矢輒墮地虜以爲神人乃
解圍而去子南以方教子及諸兄弟爲將者皆未嘗被傷累
世秘之漢末青牛道士得之以傳安定皇甫隆隆以傳魏武
帝乃稍有人得之故一名冠軍丸一名武威丸方

螢火　鬼箭(削取皮羽)　蒺藜(各壹兩)　雄黄　雌黄
礬石(各貳兩燒汁盡)　羖羊角　鍜竈灰
鐵鎚柄入鐵處(燒焦各壹兩半)

右玖味擣篩爲散以雞子黄并丹雄雞冠壹具和之如杏
仁大作叁角絳囊盛伍丸帶左臂若從軍繫腰中勿離身
若家挂户上甚辟盜賊絶止也

千金翼方卷第十

千金翼方卷第十一

小兒

養小兒第一 合八十九條方二十首 灸法二首論一首

凡兒在胎一月肧二月胎三月有血脉四月形體成五月能動六月諸骨具七月毛髮生八月藏腑具九月穀入胃十月百神備則生矣生後六十日瞳子成能咳笑應和人百五十日任脉成能自反覆百八十日髖骨成能獨坐二百一十日掌骨成能扶伏三百日臏骨成能立三百六十日膝臏成能行也若不能依期者必有不平之處

兒初生落地口中有血即當去之不去者兒若吞之成痞病死

治兒生落地不作聲法取煖水一盆灌浴之須臾即作聲

小兒始生即當舉之舉之遲晚則令中寒腹中雷鳴先浴之然後乃斷臍斷臍當令長至足趺短則中寒令腹中不調當

下痢若先斷臍後浴之則令臍中水中水則發腹痛若臍中水及中冷則腹絞痛夭糺啼呼面目青黑此是中水之過當灸粉絮以熨之不時治護臍至腫者當隨輕重重者便灸之乃可至八九十壯輕者臍不大腫但出汁時時啼呼者但擣當歸末粉傳之灸粉絮日日熨之至百日乃愈以啼呼止爲候若兒尿清者冷也與臍中水同

凡初生斷兒臍當令長六寸臍長則傷肌臍短則傷藏不以時斷臍若臍汁不盡者即自生寒令兒風臍也

裹臍法

椎治帛令柔軟方四寸新綿厚半寸與帛等合之調其緩急急則令兒吐哯兒生二十日乃解視臍若十許日兒怒啼似衣中有刺者此或臍燥還刺其腹當解之易衣更裹臍時當閉戶下帳然火左右令帳中溫煖換衣亦然仍以溫粉粉之此謂冬之時寒也若臍不愈燒絳帛末作灰粉之若過一月臍有汁不愈燒蝦蟇灰治末粉臍中日三四度若臍未愈乳兒太飽令兒風臍也

兒新生不可令衣過厚熱令兒傷皮膚肌肉血脉發雜瘡及黃

凡小兒始生肌膚未成不可暖衣暖衣則令筋骨緩弱宜時見風日若不見風日則令肌膚脆軟便易中傷皆當以故絮衣之勿用新綿也天和暖無風之時令母將兒於日中嬉戲數令見風日則血凝氣剛肌肉牢密堪耐風寒不致疾病若常藏在幃帳中重衣溫暖譬猶陰地之草不見風日軟脆不堪當風寒也

兒生十日始得哺如棗核大二十日倍之五十日如彈丸大百日如棗大若乳汁少不從此法當用意少少增之若三十日乃哺者令兒無疾兒若早哺之及多者令兒頭面身體喜

生癖差而復發亦令兒尫弱難食

小兒生滿三十日乃當哺之若早哺之兒不勝穀氣令兒病則多肉耗三十日後雖哺勿多若不嗜食勿強與強與不消復成疾病哺乳不進者腹中皆有痰澼也當以四物紫丸微下之節哺乳數日便自愈也

小兒寒熱亦皆當爾要當下之然後乃差

凡乳母乳兒當先以手極接散其熱勿令乳汁奔出令兒咽輒奪其乳令得息息已復乳之如是十反五反視兒飢飽節度知一日之中幾乳而足以為常又常捉去宿乳

兒若臥乳母當臂枕之令乳與兒頭平乃乳之如此令兒不噎母欲寐則奪其乳恐填口鼻又不知飢飽也

兒生有胎寒則當腹痛痛者偃啼時時吐哯或腹中如雞子黃者按之如水聲便沒沒已復出此無所苦爾宜早服當歸圓黃耆散即愈（當歸圓方見千金方中黃耆散方本闕）

凡乳兒不欲大飽飽則令吐凡候兒吐者是乳太飽也當以空乳乳之即消夏若不去熱乳令兒嘔逆冬若不去寒乳令兒欬痢母新房以乳兒令兒羸瘦交脛不能行

母患熱以乳兒令兒變黃不能食

母怒以乳兒令兒喜驚發氣疝又令兒上氣癲狂母新吐下以乳兒令兒虛羸

母醉以乳兒令兒身熱腹滿

凡小兒不能哺乳當服紫丸下之

凡浴小兒湯極須令冷熱調和冷熱失所令兒驚亦致五藏疾

凡兒冬不可久浴浴久則傷寒夏不可久浴浴久則傷熱

凡兒又不當數浴背冷則令發癇若不浴又令兒毛落

小兒生輙死治之法當候視兒口中懸癰前上腭上有赤胞者以指擿取決令潰以少綿拭去勿令血入咽入咽殺兒急急慎之

凡兒生三十二日一變六十四日再變變且蒸九十六日三變百二十八日四變變且蒸百六十日五變百九十二日六變變且蒸二百二十四日七變二百五十六日八變變且蒸二百八十八日九變三百二十日十變變且蒸積三百二十日小蒸畢後六十四日大蒸蒸後六十四日復大蒸蒸後百二十八日復大蒸積五百七十六日大小蒸畢

凡變者上氣蒸者體熱凡蒸平者五日而衰遠者十日而衰先變蒸五日後五日爲十日之中熱乃除爾

兒生三十二日一變二十九日先期而熱便治之如法至三十六七日蒸乃畢爾恐不解了故重說之審計變蒸之日當其時有熱微驚不得灸刺也得服藥及變且蒸之時不欲驚動勿令傍多人兒變蒸時或早或晚不如法者多兒變蒸時壯熱不欲食食輙吐哯若有寒加之即寒熱交爭腹腰夭糺啼不止熨之當愈也

凡小兒身熱脉亂汗出者蒸之候也

兒變蒸時目白者重赤黑者微變蒸畢目精明矣

兒上脣頭小白疱起如死魚目珠子者蒸候也初變蒸時有熱者服黑散發汗熱不止服紫丸熱差便止勿復與丸自當有餘熱變蒸盡乃除爾

兒身壯熱而耳冷髖亦冷者即是蒸候慎勿治之兒身熱髖耳亦熱者病也乃須治之

【紫圓】治小兒變蒸發熱不解并挾傷寒溫壯汗後熱不歇及腹中有痰澼哺乳不進乳則吐哯食癇先寒熱方

代赭石　赤石脂各壹兩　巴豆叁拾枚去皮心熬　杏仁伍拾枚去皮尖熬

右肆味末之巴豆杏仁別擣爲膏和更擣二千杵當自相得若硬入少蜜同擣瓷器中收之三十日兒服如麻子一圓與少乳汁令下食頃後與少乳勿令多至日中當小下熱除若未全除明旦更與一丸百日兒服如小豆一丸以此準量增減夏月多熱喜令發疹二三十日輙一服佳此丸無所不治雖下不虛人

黑散　治小兒變蒸中挾時行溫病或非變蒸時而得時行方

麻黃去節　杏仁去皮尖熬各半兩　大黃壹分

右叁味擣爲散一月兒服小豆大一枚以乳汁和服抱令得汗汗出溫粉粉之勿使見風百日兒服如棗核大小量之

相兒命長短法

兒生枕骨不成者能言而死

膝骨不成者能倨而死

掌骨不成者能扶伏而死

踵骨不成者能行而死

臏骨不成者能立而死

生身不收者死

魚口者死

股間無生肉者死

顖下破者死

陰不起者死

囊下白者死赤者死

相法甚博略述十數條而已

兒初生額上有旋毛者早貴妨父母

兒初生陰大而與身色同者成人

兒初生叫聲連延相屬者壽聲絶而復揚急者不壽
兒初生汗血者多厄不壽
兒初生目視不正數動者大非佳人
兒初生自開目者不成人
兒初生通身軟弱如無骨者不成人
兒初生髮稀少者強不聽人
兒初生臍小者不壽
兒初生早坐早行早語早齒生皆惡性非佳人
兒初生頭四破者不成人
兒初生頭毛不周匝者不成人
啼聲散不成人
啼聲深不成人
汗不流不成人
小便凝如脂膏不成人
常摇手足者不成人
　　無此狀候者皆成人也
兒初生臍中無血者好
卵下縫通達而黑者壽
鮮白長大者壽
論曰兒三歲以上十歲以下觀其性氣高下即可知其夭壽大略兒小時識悟通敏過人者多夭則項託顔回之流是也小兒骨法成就威儀迴轉遲舒稍費人精神雕琢者壽其預知人意迴旋敏速者亦夭則楊脩孔融之流是也由此觀之夭壽大略可知也亦由梅花早發不覩歲寒甘菊晚榮終於年事是知晚成者壽之兆也
凡小兒之癇有三種有風癇有驚癇有食癇然風癇驚癇時

時有爾十人之中未有一二是食癇者凡是先寒後熱發癇者皆是食癇也驚癇當按圖灸之風癇當與豚心湯下之食癇當下乃愈紫丸佳

凡小兒所以得風者緣衣暖汗出風因而入也風癇者初得之時先屈指如數乃發作此風癇也驚癇者起於驚怖先啼乃發作此驚癇也驚癇微者急持之勿復更驚之或自止也其先不哺乳吐而變熱後發癇此食癇也早下之則差四味紫丸逐澼飲最良去病速而不虛人赤丸差駛病重者當用之小兒衣甚寒薄則腹中乳食不消其大便皆酢臭此欲爲癖之漸也便將紫丸以微消之服法先從少起常令大便稀勿使大下也稀後便漸減之矣不酢臭乃止藥驚癇但灸及摩生膏不可下也驚癇心氣不定下之內虛益令甚爾驚癇甚者特爲難治故養小兒常當慎驚勿令聞大聲抱持之間當安徐勿令怖也又天雷時須塞其耳但作餘小聲以亂之也

凡小兒微驚者以長血脉但不欲大驚大驚乃灸驚脉

小兒有熱不欲哺乳卧不安又數驚此癇之初也服紫丸便愈不差更服之兒立夏後有病治之慎勿妄灸不欲吐下但以除熱湯浴之除熱散粉之除熱赤膏摩之又臍中以膏塗之令兒在涼處勿禁水漿常以新水飲之兒眠時小驚者一月輙一以紫丸下之減其盛氣令兒不病癇也

小兒氣盛有病但下之必無所損若不時下則將成病固難治矣

凡下四味紫丸最善雖下不損人足以去疾爾若四味紫丸不時下者當以赤丸下之赤丸不下當更倍之若已下而餘熱不盡當按方作龍膽湯稍稍服之并摩赤膏

凡小兒冬月下無所畏夏月下難差然有病者不可不下下

後腹中當小脹滿故當節哺乳數日不可妄下又乳哺小兒常令多少有常劑兒漸大當稍稍增之若減少者此腹中已有小不調也便微服藥停哺但與乳甚者十許日微者五六日止哺自當如常若不肯哺而欲乳者此是有癖爲疾重要當下之無不差者不下則致寒熱或反吐而發癇或更致下痢此皆病重不早下之所爲也爲難治但先治其輕時兒不耗損而病速愈

凡小兒屎黄而臭者此腹中有伏熱宜微將服龍膽湯若白而酢者此挾寒不消也當服紫圓微者少與藥令内消甚者小增令小下皆須節乳哺數日令胃氣平和若不節乳哺則病易復復下之則傷其胃氣令腹脹滿再三下之尚可過此傷矣

凡小兒有癖其脉大必發癇此爲食癇下之便愈當候掌中與三指脉不可令起而不時下致於發癇則難治也若早下之此脉終不起也脉在掌中尚可早治若至指則病増也

凡小兒腹中有疾生則身寒熱寒熱則血脉動血脉動則心不定心不定則易驚驚則癇發速也

龍膽湯治小兒出腹血脉盛實寒熱温壯四肢驚掣發熱大吐哯者若已能進哺中食實不消壯熱及變蒸不解中客人鬼氣并諸驚癇方悉主之十歲以下小兒皆服之小兒龍膽湯第一此是出腹嬰兒方若日月長大者以次依此爲例若必知客忤及魅氣者可加人參當歸各如龍膽多少也一百日兒加半分二百日加一分一歲兒加半兩餘藥皆準爾

龍膽　鈎藤　柴胡（去苗）　黄芩　桔梗
芍藥　茯神　甘草（炙各壹分）　蜣蜋（貳枚炙）　大黄（壹兩）

右壹拾味㕮咀以水貳升煮取五合爲一劑也取之如後節度藥有虚實虚藥宜足數合水也兒生一日至七日分

一合為三服兒生八日至十五日分一合半為三服兒生
十六日至二十日分二合為三服兒生二十日至三十日
分三合為三服兒生三十日至四十日盡以五合為三服
十歲亦準此皆溏下即止勿復服也
治少小心腹熱除熱丹參赤膏方
丹參　雷丸　芒消　戎鹽　大黃各三兩
右五味切以苦酒半升浸四種一宿以成鍊猪肪一斤煎
三上三下去滓内芒消膏成以摩心下冬夏可用一方但
丹參雷丸
治少小新生肌膚幼弱喜為風邪所中身體壯熱或中大風
手足驚掣五物甘草生摩膏方
甘草炙　防風各壹兩　白朮貳拾銖　雷丸貳兩　桔梗貳拾銖
右伍味切以不中水猪肪壹斤微火煎為膏去滓取彈丸
大一枚炙手以摩兒百過寒者更熱熱者更寒小兒無病
早起常以膏摩顖上及手足心甚辟風寒
礬石圓主小兒胎寒偃啼驚癇臚脹滿不嗜食大便青黃并
治大人虛冷内冷或有實不可吐下方
馬齒礬石壹斤燒半日
右壹味末之棗膏和圓大人服如梧子二枚日三服小兒
減之以意增損以腹中温暖為度有實亦去神良
小兒客忤慎忌法
凡小兒衣裳帛綿中不得令有頭髮履中亦然
凡白衣青帶青衣白帶者皆令兒中忤
諸遠行來馬汗未解行人未澡洗及未易衣而見兒者皆中
客忤見馬及馬上物馬氣皆忌之
小兒中客之為病吐下青黃汁腹中痛及反倒偃側似癇狀

但目不上插少睡面色變五色脉弦急若失時不治小久則難治治之法

以水和豉擣令熟丸如雞子大以轉摩兒顖上及手足心各五遍又摩心腹臍上下行轉摩之食頃破視其中有細毛棄圓道中病愈矣

若吐不止灸手心主間使大都隱白三陰交各三炷

又可用粉丸如豉法並用唾之呪如左 呪曰

摩家公 摩家母 摩家兒若客忤從我始扁鵲雖良不如善唾良唾訖棄丸於道中

又方

取一刀橫著竈上解兒衣撥其心腹訖取刀持向兒呪之唾輙以刀擬向心腹曰咄咄曰煌煌日出東方背陰向陽葛公葛母不知何公子來不視去不顧過與生人忤梁上塵天之神戸下二鬼所經大刀環犀對竈君二七唾客愈兒驚唾咄咄如此二七咄咄每唾以刀擬之呪當三遍乃畢用豉丸一如上法五六遍訖取此丸破看其中有毛棄丸於道中即愈矣

治小兒卒客忤法

取銅鏡鼻燒令赤著少許酒中大兒飲之小兒不能飲者含哺之愈

又方

取馬矢三升燒令煙絕以酒三升煑三沸去滓浴兒即愈

(千金方)主小兒暴驚啼絕死或有人從外來邪氣所逐令兒得病衆醫不治方

蜀漆壹分壹一云蜀椒 左顧牡蠣壹分熬

右貳味㕮咀以酢漿水壹升煑取伍合一服一合良

治小兒新生客忤中惡發癎發熱乳哺不消中風反折口吐舌并注忤面青目上插腹滿癲癎羸瘦疰及三歲不行雙丸方

上麝香貳兩 牛黄貳兩 黄連貳兩宣州者 丹砂壹兩 特生礜石壹兩燒

附子壹兩炮去皮 雄黄壹兩 巴豆陸拾枚去皮心熬 桂心壹兩

烏賊魚骨壹兩 赤頭蜈蚣壹枚熬

右壹拾壹味各異擣篩別研巴豆如膏乃內諸藥鍊蜜和擣三千杵密塞之勿洩氣生十日二十日至一月日服如黍米大二丸四十日至百日服如麻子大二丸一歲以上以意增加有兒雖小而病重者增大其丸不必依此丸小兒病客忤率多耐藥服藥當汗出若汗不出者不差也一日一夜四五服以汗出爲差凡候兒中人者爲人乳子未了而有子者亦使兒客忤口中銜血即月客也若有此者當尋服此藥即兒可全也口聚唾腹起熱者當灸臍中不過二七壯并勤服此藥若喜失子者産訖兒墮落地聲未絶便即以手指刮舌上當得所銜血如韭葉者便以藥二丸如粟米大服之作七日乃止無不痊也若無赤頭蜈蚣赤足者亦得三枚皆斷取前兩節其後分不可用也

小兒雜治第二 方五十七首 論一首

竹葉湯 主五六歲兒温壯腹中急滿氣息不利或有微腫亦主極羸不下飲食堅痞手足逆冷方

竹葉切壹升 小麥半升 甘草炙 黄芩 栝樓根

澤瀉 知母 人參 茯苓 白朮

大黄各壹兩 生薑壹兩半切 麥門冬貳兩去心 桂心貳銖

半夏貳兩洗 當歸叁兩分

右壹拾陸味㕮咀以水柒升煑麥竹葉取四升去滓內諸藥煑取一升六合分四服

治小兒連壯熱實滯不去寒熱往來微驚方

大黃　黃芩各壹兩　栝樓根參分　甘草炙　牡蠣熬

人參各半兩　桂心貳兩　龍骨　凝水石　白石脂各半兩

滑石碎貳兩　消石半兩

右壹拾貳味㕮咀加紫石英半兩以水四升煑取一升半分服三合一日令盡

治小兒寒熱欬逆膈中有澼乳若吐不欲食方

乾地黃肆兩　麥門冬半升去心　五味子半升　大黃壹兩

消石壹兩　蜜半升

右陸味㕮咀以水三升煑取一升去滓內消石蜜更煑令沸服二合日三肖中當有宿乳一升許出兒大者服五合

射干湯 主小兒欬逆喘息如水雞聲方

射干貳兩　麻黃去節貳兩　紫菀壹兩　甘草炙壹兩　桂心伍寸

半夏伍枚洗去滑　生薑壹兩切　大棗肆枚擘

右捌味㕮咀以水柒升煑取一升半去滓內蜜半斤更煑一沸飲三合日三服

又方

半夏肆兩洗　桂心貳兩　生薑貳兩切　紫菀貳兩　細辛貳兩

阿膠貳兩　甘草炙貳兩　蜜壹合　款冬花貳合

右玖味㕮咀以水一斗煑半夏取六升去滓內諸藥更煑取壹升伍合伍歲兒飲一升貳歲兒服六合量大小加減之

治小兒欬逆短氣胷中吸吸呵出涕唾欬出臭膿亦治大人

燒淡竹瀝煑二十沸小兒一服一合日五服大人服一升亦日五服不妨食息乳哺

杏仁圓 主小兒大人欬逆上氣方

杏仁三升去尖皮兩人熬令黃

右一味熟擣如膏蜜一升爲三分以一分内杏仁擣令強
更内一分擣之如膏又内一分擣熟止先食已含之咽汁
多少自在量之
治小兒火灼瘡一身皆有如麻子小豆戴膿乍痛乍痒熱方
甘草生用 芍藥 白歛 黃芩各叁分
黃連 黃蘗各半兩
右六味擣篩以白蜜和塗上日再亦可作湯浴之千金有苦參
治小兒火瘡方
熟煑大豆濃汁溫浴之亦令無瘢
又方
以蜜塗之日十遍
苦參湯主小兒頭面熱瘡方
苦參捌兩 大黃叁兩 蛇牀子壹升 芍藥叁兩 黃芩貳兩
黃蘗伍兩 黃連叁兩 菝葜壹斤
右捌味切以水叁斗煑取壹斗半洗之日三度大良千金云治
上下遍身生瘡
又方
大黃 黃芩 黃蘗 澤蘭 礬石
石南各壹兩 戎鹽貳兩 蛇牀子叁合
右捌味切以水柒升煑取三升以絮内湯中洗拭之日三度
又方
熬豉令黃末之以傅瘡上不過三度愈
治二百日小兒頭面瘡起身體大熱方
黃芩叁分 升麻壹兩 柴胡壹兩去苗 石膏壹兩碎 甘草貳分半炙
大黃叁兩 當歸半兩
右柒味㕮咀以水四升煑取貳升分爲四服日三夜一多
煑洗瘡佳
治小兒身體頭面悉生瘡方

取榆白皮灼令燥下篩酢和塗綿覆上蟲出自差

治小兒手足身體腫方

以小便溫煖漬之良

又方并治癮疹

巴豆五拾枚（去皮心）

右壹味以水三升煑取一升以綿內湯中拭病上隨手滅神良

治小兒風瘙癮疹方

蒴藋壹兩　防風壹兩　羊桃根壹兩　石南壹兩　茵芋壹兩

茺蔚壹兩　礬石壹兩　蒺藜壹兩

右捌味切以酢漿水壹斗煑取伍升去滓內礬石煎令小沸溫浴之（千金有秦椒苦參蛇牀枳實升麻爲十三味）

治小兒丹數十種皆主之搨湯方

大黃壹兩　甘草壹兩炙　當歸壹兩　芎藭壹兩　白芷壹兩

獨活壹兩　黃芩壹兩　芍藥壹兩　升麻壹兩　沈香壹兩

青木香壹兩　芒消叁兩　木蘭皮壹兩

右壹拾叁味切以水壹斗貳升煑取四升去滓內芒消令烊以綿搵湯中適寒溫搨之乾則易取差止

治小兒丹發方

生慎火草擣絞取汁以拭丹上日十遍夜三四

治小兒丹腫方

棗根　升麻　白斂　黃蘗　黃連

大黃　梔子　甘草（生用各貳兩）　生地黃汁壹升

右玖味切以水壹斗肆升煑取柒升去滓內地黃汁煎三沸以故帛兩重內湯中以搨丹上小煖即易之常令溫

澤蘭湯主丹胗入腹殺兒方

澤蘭　芎藭　附子炮去皮　莽草　藁本

細辛　茵芋各半兩

右柒味㕮咀以水叁升煑取壹升半分四服服此湯然後作餘湯洗之

治小兒半身皆紅赤漸漸長引者方

牛膝　甘草生用

右貳味細剉各得伍升以水貳斗煑取叁伍沸去滓和竈下黃土塗之

治小兒頭髮不生方

取楸葉中心擣絞取汁塗之生

治小兒禿瘡無髮苦痒方

野葛末壹兩　猪脂　羊脂各壹兩

右叁味合煎略盡令凝塗之不過三數傳即愈

治小兒禿瘡方

取雄雞矢陳醬清和洗瘡了傳之三兩遍差

治小兒白禿方

取芫花末臘月猪肪脂和如泥先以灰汁洗拭塗之日二遍

治小兒頭瘡方

胡粉壹兩　黃連貳兩

右貳味擣爲末洗瘡去痂拭乾傳之即愈發即如前再傳亦治陰瘡

又方

胡粉貳兩　水銀壹兩　白松脂貳兩　猪肪脂肆兩

右肆味合煎去滓内水銀胡粉攪令和調塗之大人亦同

治小兒頭無髮方

燒鯽魚作末醬汁和傳之即生

治小兒顱開不合方

防風壹兩半 白及半兩 柏子仁半兩

右叁味擣爲散乳汁和以塗顱上日一度十日知二十日合

治小兒臍瘡方

燒甑帶灰傅之愈

治小兒鼻塞不通有涕出方

杏仁半兩去皮尖 椒壹分 附子壹分半炮去皮 細辛壹分半

右肆味切以酢伍合漬一宿明旦以豬脂五兩煎之附子色黃膏成去滓以塗絮導於鼻中日再又摩顱上

治小兒口瘡不能取乳方

大青叁分 黃連貳兩

右貳味㕮咀以水貳升煑取一升二合一服一合日再夜一

又方

取礬石如雞子大置酢中研塗兒足下二七遍立愈

治小兒重舌方

取三家屠肉各如指許大切摩舌兒立能乳便啼

又方

衣魚燒作灰以傅舌上

又方

重舌舌強不能收唾者取鹿角末如大豆許安舌上日三即差

又方

取蛇皮燒灰末和大酢以雞毛取之以掠舌上日三遍

治小兒重舌舌生瘡涎出方

以蒲黃傅舌上不過三度愈

又方

取田中蜂房燒之以淳酒和傅喉咽下立愈

治小兒咽痛不得息若毒氣哽咽及毒攻咽喉方

生薑切貳兩 橘皮壹兩 升麻貳兩 射干貳兩

右肆味㕮咀以水陸升煑取貳升分爲三服亦治大人

治小兒喉痺咽腫方

以魚膽二七枚和竈底黃土以塗咽喉立差

雀矢丸 主小兒卒中風口噤不下一物方

取雀矢如麻子大丸之飲服即愈大良雞矢白亦良

治小兒數歲不行方

葬家未閉户時盜取其飯以哺之不過三日即行勿令人知之

治小兒食土方

取肉壹斤

右壹味以繩繫肉曳地行數里勿洗火炙噉之不食土矣

治小兒遺尿方

瞿麥 龍膽 石韋 皂莢炙去皮子 桂心各半兩

人參壹兩 雞腸草壹兩 車前子伍分

右捌味末之鍊蜜和先食服如小豆五圓日三加至六七丸

治小兒羸瘦有蚘蟲方

雚蘆伍兩 黍米泔貳升

右貳味切以內泔中以水三升五合煑取二升五歲兒服五合日三服兒大者服一升

治小兒三蟲方

雷丸 芎藭

右貳味等分爲散服一錢匕日三服

治小兒陰瘡膿水出方

煑狼牙汁洗之愈

治小兒氣癩方

土瓜根壹兩　芍藥壹兩　當歸壹兩

右叁味㕮咀以水貳升煑取一升服五合日二服

治小兒狐疝傷損生㿗方

桂心叁分　地膚子貳兩半　白朮伍分

右叁味末之鍊蜜和白酒服如小豆七丸日三服亦治大人

又方

芍藥叁分　茯苓叁分　大黃半兩　防葵半兩

半夏壹分洗　桂心壹分　椒壹分汗　乾薑壹分

右捌味末之鍊蜜和如大豆每服一丸日五服可加至三丸千金無乾薑

治小兒核腫壯熱有實方

甘遂叁分　麝香叁銖　大黃　前胡各壹兩

黃芩半兩　甘草半兩炙　青木香叁分　石膏叁分碎

右捌味㕮咀以水柒升煑取壹升玖合服三合日四夜二服

治小兒誤吞針方

吞磁石如棗核大針立下

論曰文王父母有胎教之法此聖人之道未及中庸是以中庸養子十歲以下依禮小學而不得苦精功程必令兒失心驚懼及不得苦行杖罰亦令兒得癲癎此事大可傷怛但不得大散大漫令其志蕩亦不得稱讚聰明尤不得誹毀小兒十一以上得漸加嚴教此養子之大經也不依此法令兒損傷父母之殺兒也不得怨天尤人

眼病第三　合一百三十三方　灸法二首　論一首

眞珠散　主目瞖覆瞳睛不見物方

上光明朱砂半兩　貝子五枚炭火燒末之　白魚七枚炙

乾薑半分末

右肆味研之如粉以熟帛三篩爲散仰卧遣人以小指爪挑少許付眼中差亦主白膚瞖

七寶散 主目瞖經年不愈方

琥珀壹分 白眞珠壹分 珊瑚壹分 紫貝壹分 馬珂壹分

朱砂貳分 蕤仁半兩 決明子壹分 石膽壹分

右玖味下篩極細付目中如小豆日三大良

礬石散 主目瞖及努肉方

礬石上上白者末内如黍米大於瞖上及努肉上即令淚出以綿拭之令得惡汁盡日一其病逐惡汁出盡日日漸自薄便差好上上礬石無過絳礬色明淨者慎如療眼當法也

去瞖方

貝子拾枚燒末

右壹味擣篩取如胡豆著瞖上日再正仰卧令人傳之如炊一石米久乃拭之息肉者加珍珠如貝子等分研如粉

治眼漠漠無所見決明洗眼方

決明子貳拾伍枚千金作壹合 蕤仁 秦皮

黃連宣州者佳各半兩千金作拾捌銖 螢火蟲柒枚

右伍味以水捌合微火煎取叁合冷以綿注洗目日叁度

治五藏客熱上熏一作衝眼外受風寒令眼病不明方

地膚子半兩千金作貳合 柏子仁壹合半 大黃貳兩 決明子伍合

藍子 瓜子仁 蕤仁 茺蔚子 青葙子

蒺藜子各貳合千金作壹合 菟絲子壹合千金作貳合 黃連壹兩半宣州者

細辛伍合千金壹兩陸銖 桂心柒分 螢火壹合千金作陸銖

右壹拾伍味擣篩煉蜜和丸如梧子每服拾伍丸食後日叁服

治肝膈上大熱目暗不明方

升麻　大青　黃蘗各叁兩　射干

生玄參肆兩　薔薇根白皮各肆兩　蜜壹升

右柒味㕮咀以水柒升煮取壹升半去滓下蜜兩沸細細含咽之

治眼暮無所見方

豬肝壹具

右細切以水壹斗煮取熟置小口器中及熱以目臨上大開勿閉也冷復溫之取差為度

治熱病差後百日內食五辛目暗方

以鯽魚作臛熏之如前法良

兔肝散　主失明方

兔肝炙　石膽　貝齒　芒硝

蕤仁　黃連　礬石燒　松葉

螢火　菊花　地膚子　決明子各壹分

右壹十貳味食後為散服半錢匕不知稍稍加服藥不可廢若三日停則與不服等愈後仍可常服之

治風痰胷滿眼赤闇方

決明子　竹葉千金貳兩　杏仁去皮尖雙仁熬　防風　黃芩

枳實炙千金作貳兩　澤瀉各叁兩　芍藥　柴胡去苗

梔子仁各肆兩一方無千金作貳兩　細辛　芒硝各貳兩

千金有大黃肆兩升麻貳兩無芒硝防風細辛名瀉肝湯

右壹拾貳味㕮咀以水玖升煮取貳升半去滓分三服

眼暗方

蔓菁子壹斗

右壹味淨淘以水肆斗煮自旦至午去汁易水又煮至晚去汁易水又煮至旦暴乾以布袋貯之一度擣三升以粥

汁服三方寸匕日三服美酒等任性所便

補肝湯 主肝氣不足方

甘草炙 黃芩 人參 桂心各貳兩

右肆味㕮咀以水陸升煑取貳升去滓分叄服

瀉肝湯 主臟中痰實熱衝眼漠漠闇方

苦竹根捌兩 半夏洗肆兩 乾薑 茯苓 枳實

白朮各叄兩 杏仁去皮尖兩仁 乾地黃各壹兩 細辛 甘草炙各貳兩

右壹拾味㕮咀以水壹斗貳升煑取貳升柒合去滓分參服

瀉肝湯 主漠漠無所見或時痛赤腹有痰飲令人眼闇方

大黃 白朮各貳兩 甘草炙 芍藥

當歸 茯苓 桂心 人參

黃芩 細辛各壹兩半 生薑切叄兩 半夏洗肆兩

右壹拾貳味㕮咀以水壹斗煑取叄升分肆服

補肝湯 主肝氣不足兩脅拘急痛寒熱目不明并婦人心痛乳癰膝脛熱消渴爪甲枯口面青方

甘草炙叄兩 柏子仁貳兩 防風叄兩 大棗貳拾枚擘 烏頭炮貳兩

細辛貳兩 茯苓壹兩 蕤仁壹兩 桂心壹兩

右玖味㕮咀以水捌升煑取三升分爲三服

蕪菁子主明目病益肌膚方

蕪菁子叄升

右壹味淘高著水煑二十沸出著水盆中淘之令水清接取以別釜煑之水盡即添益時宜看味美漉出暴乾擣篩酒飲等任意和服三方寸匕日惟服七合飽食任性酒服服無限時慎生冷百日身熱瘡出不久自差

治青盲方

長尾蛆淨洗暴乾作末內眼中差

決明圓主眼風虛勞熱暗運內起方

石決明燒 石膽 光明砂 芒消蒸 空青

黃連不用漬 青葙子 決明子以苦酒漬經三日暴乾 蕤仁

防風 鯉魚膽 細辛

右壹拾貳味等分擣蜜絹篩石研令極細以魚膽和圓如梧子暴乾研碎銅器貯之勿洩每取黃米粒大內眥中日一夜一稍稍加以知為度

補肝圓主明目方

地膚子貳合 藍子貳合 蒺䔧子貳合 細辛伍合 桂心伍分

車前子貳合 菟絲子貳合 瓜子貳合 螢火蟲伍合 黃連壹兩半

茺蔚子貳合 青葙子貳合 大黃貳兩 決明子伍合

右壹拾肆味擣篩鍊蜜和飲服如梧子十五丸可加至二十丸慎熱麪食生冷酢滑油蒜豬雞魚蕎麪黃米眼暗神方也

治目赤痛方

雄黃壹銖 細辛壹銖 乾薑壹銖 黃連肆銖

右肆味細篩綿裹以唾濡頭注藥內大眥必閉目目中淚出須臾自止勿手近勿用冷水洗

又方

雄黃壹分 乾薑壹分 黃連壹分 礬石壹分燒半日

右肆味合用之如前方可加細辛壹分

治目赤口乾脣裂方

石膏壹斤碎 生地黃汁壹升 赤蜜壹升 淡竹葉切伍升

右肆味以水壹斗二升煮竹葉取六升去滓澄清煮石膏取壹升半去滓下地黃汁兩沸下蜜取三升細細服之

治赤眼方

取杏仁肆拾玖顆末之絹袋裹飯底蒸之熟絞取脂以銅青胡粉各如大豆乾薑鹽各如半大豆熟研之以雞毛沾取掠眼中眥頭日二不過三差

赤眼方

杏仁脂壹合 鹽緑如棗核大 印成鹽三顆

右叁味取杏仁脂法先擣杏仁如脂布袋盛蒸熟絞取脂置瓷器中内諸藥直坐著其中密蓋二七日夜臥注目四眥不過七度差止

治赤眼不問久遠方

硇砂叁兩

右壹味以酢漿垍器中浸日中暴之三日藥著器四畔乾者取如粟米大夜著兩眥頭不過三四度永差并石鹽石膽等尤佳

治眼赤運白膜瞖方

麻燭一尺薄批猪脂裹使匝然燭以銅器承取脂内蕤仁叁拾枚研胡粉少許合和令熟夜内兩眥中

又方

枸杞汁洗目日五度良黄用亦得

治赤眼方

石膽 蕤仁 鹽緑 細辛各壹兩 生驢脂壹合

右伍味爲末以乳汁和夜點兩眥

治眯目不明方

椎羊鹿筋擘之如披筋法内筋口中熟嚼擘眼内著瞳子瞼上以手當瞼上輕挼之若有眯者二七過挼便出之視眯當著筋出來即止未出者復爲之此法常以平旦日未出時爲之以差爲度出訖當以好蜜注四眥頭鯉魚膽亦佳若數挼目痛可間日挼之

鼻病第四 方八首 論一首

治鼻不利香膏方

當歸 薰草（一方用木香） 通草 細辛

蕤仁（各叁分） 芎藭 白芷（各半兩） 羊髓（肆兩）

右捌味切合煎微火上三上三下以白芷色黃膏成去滓取如小豆大內鼻中日三大熱鼻中赤爛者以黃芩梔子代當歸細辛

治鼻中窒塞香膏方

白芷 芎藭（各半兩） 通草（壹分） 當歸 細辛

薰草（各三分 作莽草 千金） 辛夷仁（伍分）

右柒味切以苦酒漬一宿以不中水豬肪一升煎三上三下以白芷色黃膏成去滓綿裹取棗核大內鼻中日三（一方加桂心十八銖）

治鼻齆方

通草（壹分） 細辛（壹分） 附子（壹分炮去皮）

右叁味下篩蜜和綿裹內鼻中良

治鼻中息肉通草散方

通草（半兩） 礬石（壹兩燒） 真珠（壹銖）

右叁味下篩褁綿如棗核取藥如小豆內綿頭入鼻中日三度（一方有桂心細辛各壹兩）

治齆鼻鼻中息肉不得息方

礬石（燒） 藜蘆（各半兩） 瓜蔕（貳柒枚） 附子（半兩炮）

右肆味各擣下篩合和以小竹管取藥如小豆大內鼻孔中吹之以綿絮塞鼻中日再以愈為度（一方加葶藶半兩）

治鼻中息肉塞鼻不得喘息方

取細辛以口濕之蝨頭內鼻中傍內四畔多著日十易之

滿二十日外以葶藶子壹兩松蘿半兩二味擣篩以綿裹薄如棗核大內鼻中日五六易之滿二十日外以吴白礬上上者貳兩內瓦杯裏相合令密置窑中燒之待瓦熟取擣篩以面脂和如棗核大內鼻中日五六易盡更和不得頓和二十日外乃差愼行作勞及熱食并蒜麪百日

治齆鼻有息肉不聞香臭方

瓜蔕 細辛各半兩

右貳味爲散絮裹豆大塞鼻中須臾即通

羊肺散 主鼻中息肉梁起方

羊肺一具乾之 白朮肆兩 蓯蓉貳兩 通草貳兩

乾薑貳兩 芎藭貳兩

右陸味爲散食後以粥汁服伍分匕日貳服加至方寸匕

論曰凡人往往有鼻中肉塞眠食皆不快利得鼻中出息而俗方亦衆而用之皆無成效惟見本草云雄黄主鼻中息肉此言不虛但時人不知用雄黄之法醫者生用故致困斃曾有一人患鼻不得喘息余以成鍊雄黄日內一大棗許大過十日肉塞自出當時即得喘息更不重發其鍊雄黄法在仙冊方中具有之宜尋求也斯有神驗

口病第五 論二首 方十七首

凡口瘡忌食鹹膩及熱麪乾棗等宜純食甜粥勿食鹽菜三日即差

凡口中面上生息肉轉大以刀決潰去膿愈

治積年口瘡不差薔薇湯方

薔薇根壹升

右壹味以水柒升煮取三升去滓含之久久極即吐之定更含少少入咽亦佳夜未睡已前亦含之三日不差更令

含之差爲度驗祕不傳也

治口中瘡身體有熱氣痱瘰薔薇丸方

薔薇根壹兩　黄芩壹兩　鼠李根壹兩　當歸壹兩

葛根壹兩　白斂壹兩　栝樓根貳兩　石龍芮壹兩

黄蘗壹兩　黄耆壹兩　芍藥壹兩　續斷壹兩

黄連壹兩

右壹拾叁味末之鍊蜜和服如梧子拾圓日三服千金無黄連

治熱病口爛咽喉生瘡水漿不得入膏方

當歸壹兩　射干壹兩　升麻壹兩　附子半兩炮去皮　白蜜肆兩

右伍味切以豬膏肆兩先煎之令成膏下著地勿令大熱内諸藥微火煎令附子色黄藥成絞去滓内蜜復火上令相得盛器中令凝取如杏子大含之日四五輒咽之差

治口中瘡咽喉塞不利口燥膏方

豬膏壹斤　白蜜壹斤　黄連壹兩切

右叁味合煎去滓令相得含如半棗日四五夜二

治口吻生白瘡名曰鷰口方

取新炊甑下飯訖以口兩吻銜甑唇乗熱柱兩口吻二七下差

口傍惡瘡方

亂髮灰　故絮灰　黄連末　乾薑末各等分

右肆味合和爲散以粉瘡上不過三度

治口臭方

濃煑細辛含汁久乃吐却三日當愈

又方

井華水三升漱口吐厠中

又方

橘皮伍分　木蘭皮壹兩　桂心叁分　大棗四十枚去核蒸之去皮

右肆味末之以棗肉丸如梧子服貳拾圓日貳服稍稍至三十九（一方有芎十八銖）

又方

桂心　甘草（炙等分）

右貳味細末三指撮酒服二十日香

又方

蜀椒（汗）　桂心（各壹兩）

右貳味服如前方

治口乾方

猪脂若羊脂如雞子大擘之苦酒半升中漬一宿絞取汁含之

又方

石膏（五合碎）　蜜（貳升）

右貳味以水叁升煮石膏取貳升內蜜煮取壹升去滓含如棗核大咽汁盡即含之

又方　含一片梨即愈夜睡當時即定

又方

羊脂（雞子大）　酒（半升）　大棗（柒枚）

右叁味合漬七日取棗食之差

又方　禁夜勿食酸食及熱麪

治口卒噤不開方

擣附子末內管中開口吹口中良

脣病第六（方四首）

緊脣方

以亂髮蜂房及六畜毛燒作末傅瘡上猪脂和亦佳

又方

緊卷故青布燒令然斧上柱取斧上熱汁塗之并治瀋脣

治脣黑腫痛痒不可忍方

取四文大錢於磨石上以臘月豬脂磨取汁塗之不過數

遍即愈

又方　以竹弓彈之出其惡血立差

齒病第七方二十七首

含漱湯主齒痛方

獨活參兩　黃芩參兩　芎藭參兩　當歸參兩

細辛　畢撥各壹兩　丁香壹兩

右柒味㕮咀水五升煑取貳升半含漱之食頃乃吐更含

之一方有甘草貳兩

又方　含白馬尿隨左右含之不過三口差

治裂齒痛方

腐棘針二百枚

右壹味以水貳升煑取一升含漱之日四五差止

又方　取死曲蟮末傅痛處即止

治齒痛方

夜向北斗手拓地灸指頭地呪曰蝎蟲所作斷木求風蟲

所作灸便休疼痛疼痛北斗收即差

又方

人定後向北斗呪曰北斗七星三合口尚書某甲患齗若是

風齗閉門户若是蟲齗盡收取急急如律令再拜三夜作

治牙疼方

蒼耳子伍升

右壹味以水壹斗煑取伍升熱含之疼則吐吐復含不過

二劑愈無子莖葉皆得用之

又方

莽草伍兩

右壹味切以水壹斗煮水伍升含漱之一日令盡

又方 內藜蘆末於牙孔中勿咽汁神良

又方 取門上桃橛燒取瀝汁少少內孔中以蠟固之

針牙疼方

隨左右邊疼手大指次指掌間入一寸得氣絶補三十九息

灸牙疼方

取桑東南引枝長一尺餘大如匙柄齊兩頭口中柱著痛牙上以三姓火灸之呪曰 南方赤帝子教我治蟲齒三姓灸桑條條斷蝎蟲死急急如律令大效

治蟲食齒疼痛方

閉氣細書曰南方赤頭蟲飛來入某姓名裂衣齒裏今得蝎蟲孔安置耐居止急急如律令小戕紙內著屋柱北邊蝎蟲孔中取水一盃禹步如禁法還誦上文以水沃孔以淨黃土泥之勿令洩氣永愈

治蟲食齒根內黑方

燒腐棘取瀝塗之十遍雄黃末傅即愈若齒黑者以松木灰揩之細末雄黃塗斷百日日再塗之七日慎油猪肉神效

治齒蟲方

以檐一枚令病人存坐橫檐於膝上引兩手尋使極住手伸中指灸中指頭檐上三壯兩頭一時下火病人口誦呪曰啖牙蟲名字鶴莫啖牙莫啖骨灸人亦念之

齒根腫方

松葉壹握 鹽壹合 好酒叁升

右叁味煎取一升含之

齒根動痛方

生地黃 叁兩 獨活 叁兩

右貳味切以酒漬一宿含之

又方

常以白鹽末封齒齗上日三夜二

又方 扣齒三百下日一夜一即終身不發至老不病齒

治齒牙根搖欲落方

生地黃大者一寸綿裹著牙上嚼咽汁汁盡去之日三

即愈可十日含之更不發也

治齒根空腫痛困弊無聊賴方

獨活 肆兩 酒 叁升

右貳味於器中漬之塘火煨之令煖稍稍沸得半去滓熱

含之不過四五度

又方

取地黃如指大長一寸火炙令大熱著木椎之以綿裹著

齒上嚼之咽汁盡即三易差止

又方 燒松柏槐枝令熱柱病齒孔須臾蟲緣枝出

治牙齗疼痛方

杏仁 壹百枚去皮尖兩仁者 鹽末 方寸匕

右貳味以水壹升煑令沫出含之味盡吐却更含不過再

三差

治牙車急口眼相引舌不轉方

牡蠣 熬 伏龍肝 附子 炮去皮 礬石 燒

右肆味等分末之以白酒和為泥傅其上乾則塗之取差止

治齒䘌方

切白馬懸蹄可孔塞之不過三度

治齒血出不止方

刮生竹茹貳兩酢漬之令其人解衣坐乃別令一人含噀其背上三過并取竹茹濃煑取汁勿與塩適寒温含漱之終日爲度

治失欠頰車脫臼開張不合方

以一人捉頭著兩手指牽其頤以漸推之令復入口中安竹筒如指許大不爾嚙傷人指

舌病方

治舌卒腫如吹胞滿口溢出氣息不得通須臾不治殺人方

急以指刮破潰去汁即愈亦可以鈹刀於前決破之（千金云兩邊破之）

又方

以苦酒壹升煑半夏一十枚令得八合稍稍含漱吐之半夏戟人咽須熟洗去滑盡用之勿咽汁也加生薑一兩佳

治舌上黑有數孔出血如涌泉此心藏病也方

戎鹽伍兩　黄芩伍兩　黄蘗伍兩　大黄伍兩　人參貳兩
桂心貳兩　甘草壹兩炙

右柒味末之鍊蜜和圓飲服拾圓如梧子日三服仍燒鐵烙之

治舌卒腫起如吹胞狀滿口塞喉氣息欲不復須臾不治殺人治之方

以刀鋒決兩邊第一大脉出血勿使刺著舌下中央脉血出不止殺人血出數升以燒鐵令赤熨瘡數過以絶血也

又方　含甘草汁佳

喉病第九　方十四首

治喉卒腫不下食方

韭一把擣熬傅之冷即易之佳

又方　含荊瀝稍稍咽之

又方　含上好酢口舌瘡亦佳

治喉痺嚥唾不得方

半夏

右壹味細破如棊子拾肆枚雞子一枚和其頭如粟大出却黃白內半夏於中內酢令滿極微火上煎之取半小冷飲之即愈

喉痺方

取附子壹枚去皮蜜塗火炙令乾復塗蜜炙須臾含之咽汁愈

又方　含蜀升麻壹片立愈

治喉痺方

以繩纒手大指刺出血一大豆以上差小指亦佳

治馬喉痺方

燒馬藺根灰一方寸匕燒桑枝瀝汁和服

治咽痛不得息若毒氣哽咽毒攻咽喉方

桂心半兩　杏仁壹兩去尖皮熬之

右貳味為散以綿裹如棗大含咽其汁

又方　刺小指爪文中出血即差左右刺出血神秘立愈

治尸咽語聲不出方

酒壹升　乾薑拾兩末之　酥壹升

右叁味酒二合酥一匙薑末一匕和服之日三食後服之亦治肺病

治尸咽咽中癢痛吐之不出咽之不入如中蠱毒方

含生薑五十日差

治咽中腫垂肉不得食方

先以竹筒內口中熱燒鐵從竹中拄之不過數度愈

治懸癰垂下暴腫長方

乾薑半夏等分末少少著舌本半夏洗之如法用

又方

鹽末筯頭張口柱之日五自縮

噎病第十方二首

酥蜜生薑汁合一升微火煎二沸每服兩棗許內酒中溫服

又方

以手巾布裹舂杵頭糠拭齒

耳病第十一方二十四首

治耳聾方

生地黃（極麁大者長壹寸半） 杏仁（柒枚燒令黑） 印成鹽（兩顆）

巴豆（柒枚去皮熬令紫色） 頭髮（雞子大灸之）

右伍味擣作末以髮薄裹內耳中一日一夜若少損即却之直以髮塞耳耳中黃水及膿出漸漸有效不得更著若未損一宿後更內一日一夜還去藥一依前法

治勞聾氣聾風聾虛聾毒聾如此久聾耳中作聲補腎治五聾方

山茱萸（貳兩） 乾薑 巴戟天 芍藥

澤瀉 桂心 菟絲子 黃耆

乾地黃 遠志（去心） 蛇牀子 茯苓

石斛 當歸 細辛 蓯蓉

牡丹皮 人參 甘草（炙） 附子（炮去皮各貳兩）

防風（壹兩半） 昌蒲（壹兩） 羊腎（貳枚）

右貳拾叁味擣篩鍊蜜和爲圓如梧子大服十五丸日三加至三十四十丸

又方

草麻（伍分） 杏仁（壹兩去尖皮） 桃仁（肆分去皮尖） 巴豆仁（壹分去心皮熬）

石鹽（叁分） 附子（半兩炮） 昌蒲（壹兩） 磁石（壹兩）

薰陸香壹分 松脂貳兩半 蠟貳兩 通草半兩

右壹拾貳味先擣諸石等令細別擣諸物等加松脂及蠟合擣數千杵令可丸乃止取如棗核大綿裹塞耳一日四五度出之轉捻不過三四度日一易之

又湯方

磁石肆兩 牡荆子貳兩一云牡蠣 石昌蒲叄兩

山茱萸貳兩 芎藭貳兩 茯神貳兩 白芷貳兩

枳實貳兩炙 地骨皮叄兩 天門冬叄兩去心 甘草叄兩炙

橘皮貳兩 生薑貳兩 竹瀝貳升

右壹拾肆味㕮咀以水捌升煑取減半下竹瀝煑取貳升半分為三服五日服一劑三劑後著散

又散方

石昌蒲貳兩 山茱萸貳兩 磁石肆兩 土瓜根貳兩

白歛貳兩 牡丹皮貳兩 牛膝貳兩

右柒味擣篩為散綿裹塞耳日一易仍服大三五七散一劑

又方

硫黃 雌黃一云雄黃

右貳味等分末之綿裹塞耳數日聞聲

又方

以童子尿灌耳中三四度差

赤膏主耳聾齒痛方

丹參伍兩 蜀椒貳升 大黃壹兩 白朮壹兩

大附子拾枚炮去皮 細辛壹兩 乾薑貳兩 巴豆拾枚去皮

桂心肆寸 芎藭壹兩

右壹拾味切以淳苦酒漬一宿內成煎豬膏三斤著火上煎三上三下藥成去滓可服可摩耳聾者綿裹膏內耳中齒冷痛著齒間諸痛皆摩若腹中有病以酒和服如棗許

大咽喉痛吞如棗核一枚

治二十年聾方

成煎雞肪伍兩　桂心　野葛各半兩

右叁味切膏中銅器內微火煎三沸去滓密貯勿泄以葦筒盛如棗核大火炙令少熱仰傾耳灌之如此十日耵聹自出大如指長一寸久聾不過三十日以髮裹膏深塞勿使泄氣五日乃出之

又方　以器盛石鹽飯底蒸令消以灌耳中驗

治亭耳出膿汁方

礬石燒叁兩　龍骨壹兩　黃連壹兩　烏賊魚骨壹兩

右肆味下篩取如棗核大綿裹塞耳日三易一方用赤石脂無龍骨

治底耳方

礬石燒之　石鹽末之

右貳味先以紙繩絍之展却汁令乾以鹽末粉耳中令通次下礬石末粉上須臾卧勿起日再

治耳疼痛方

附子炮去皮　菖蒲

右貳味等分裹塞之

治蟲入耳方

末蜀椒一撮內半升酢中灌之行二十步蟲出差

治百蟲入耳方

擣韭汁灌之耳中立出

又方　灌葱涕須臾蟲出差

又方　以木葉裹鹽炙令熱以掩耳冷即易之出

又方　薑汁滴耳中　又灌牛乳良　又桃葉塞耳

治蚰蜒入耳方

牛乳灌之蚰蜒自出若入腹者空腹服酢酪一升不出更服仍以和麪燒餅乘熱坐上須臾出

又方　以油灌之

又方　灌驢乳於耳中即變成水入腹飲之即差

又方　桃葉汁灌之

又方　打銅椀於耳邊

又方　炒胡麻以布袋盛枕頭

千金翼方卷第十一

養性

養性禁忌第一

論曰張湛稱養性繕寫經方在於代者甚衆嵇叔夜論之最精然辭旨遠不會近余之所言在其義與事歸實録以貽後代不違情性之歡而俯仰可從不棄耳目之好而顧眄可行使旨約而贍廣業少而功多所謂易則易知簡則易從故其大要一曰嗇神二曰愛氣三曰養形四曰導引五曰言論六曰飲食七曰房室八曰反俗九曰醫藥十曰禁忌過此已往未之或知也

列子曰一體之盈虛消息皆通於天地應於物類故陰氣壯則夢涉大水而恐懼陽氣壯則夢涉大火而燔焫陰陽俱壯則夢生殺甚飽則夢與甚飢則夢取是以浮虛為疾者則夢

揚沈實爲疾者則夢溺藉帶而寢者則夢蛇飛鳥銜髮者則夢飛心躁者夢火將病者夢飲酒歌舞將衰者夢哭是以和之於始治之於終靜神滅想此養生之道備也

彭祖曰每施寫訖輒導引以補其虛不爾血脉髓腦日損犯之者生疾病俗人不知補寫之義故也飲酒吐逆勞作汗出以當風卧濕飽食大呼疾走舉重走馬引強語笑無度思慮太深皆損年壽是以爲道者務思和理焉口目亂心聖人所以閉之名利敗身聖人所以去之故天老曰丈夫處其厚不處其薄當去禮去聖守愚以自養斯乃德之源也

彭祖曰上士别牀中士異被服藥百裹不如獨卧色使目盲聲使耳聾味使口爽苟能節宣其宜適抑揚其通塞者可以增壽 一日之忌者暮無飽食 一月之忌者暮無大醉 一歲之忌者暮須遠内 終身之忌者暮常護氣 夜飽損一日之壽夜醉損一月之壽 一接損一歲之壽 慎之 清旦初以左右手摩交耳從頭上挽兩耳又引髮則面氣通流如此者令人頭不白耳不聾又摩掌令熱以摩面從上向下二七過去皯氣令人面有光又令人勝風寒時氣寒熱頭痛百疾皆除眞人曰欲求長生壽考服諸神藥者當須先斷房室肅齋沐浴熏香不得至喪孝家及産乳處慎之慎之古之學道者所以山居者良以此也

老子曰人欲求道勿起五逆六不祥凶大小便向西一逆向北二逆向日三逆向月四逆仰視日月星辰五逆夜半裸形一不祥旦起瞋心二不祥向竈駡詈三不祥以足内火四不祥夫妻晝合五不祥盜師父物六不祥旦起常言善事天與之福勿言奈何及禍事名請禍慎勿牀上仰卧大凶卧伏地大凶飽食伏地大凶以匙筯擊盤大凶大勞行房室露卧發

癲病醉勿食熱食畢摩腹能除百病熱食傷骨冷食傷肺熱無灼脣冷無氷齒食畢行步踟躕則長生食勿大言大飽血脉閉卧欲得數轉側冬温夏凉愼勿冒之大醉神散越大樂氣飛揚大愁氣不通久坐傷筋久立傷骨凡欲坐先解脫右靴履大吉用精令人氣乏多睡令人目盲多唾令人心煩貪美食令人泄痢沐浴無常不吉沐與浴同日凶夫妻同日沐浴凶說婁者凶

凡日月蝕救之吉活千人除殃活萬人與天地同功日月薄蝕大風大雨虹蜺地動雷電霹靂大寒大霧四時節變不可交合陰陽愼之

凡夏至後丙丁日冬至後庚辛日皆不可合陰陽大凶

凡大月十七日小月十六日此名毀敗日不可交會犯之傷血脉

凡月二日三日五日九日二十日此生日也交會令人無疾

凡新沐遠行及疲飽食醉酒大喜大悲男女熱病未差女子月血新產者皆不可合陰陽熱疾新差交者死

老子曰凡人生多疾病者是風日之子生而早死者是晦日之子在胎而傷者是朔日之子生而母子俱死者是雷霆霹靂日之子能行步有知而死者是下旬之子兵血死者是月水盡之子又是月蝕之子雖胎不成者是弦望之子命不長者是大醉之子不癡必狂者是大勞之子生而不成者是平曉之子意多恐悸者是日出之子好爲盜賊貪慾者是禺中之子性行不良者是日中之子命能不全者是日昳之子好詐反妄者是晡時之子不盲必聾者是人定之子天地閉氣不通其子死夜半合陰陽生子上壽賢明夜半後合會生子中壽聰明智惠雞鳴合會生子下壽尅父母此乃天地之常

理也

天老曰人稟五常形皃而尊卑貴賤不等皆由父母合會稟氣壽也得合八星陰陽各得其時者上也即富貴之極得合八星陰陽不得其時者中也得中宮不合八星陰陽得其時者下也得下宮不合此宿不得其時者則爲凡人矣合宿交會者非惟生子富貴亦利身大吉已八星者室參井鬼柳張房心一云九宿也是月宿所在此星可以合陰陽

老子曰人生大限百年節護者可至千歲如膏用小炷之與大炷衆人大言而我小語衆人多繁而我小記衆人悖暴而我不怒不以不事累意不臨時俗之儀淡然無爲神氣自滿以此爲不死之藥天下莫我知也勿謂闇昧神見我形勿謂小語鬼聞我聲犯禁滿千地收人形人爲陽善人自報之人爲陰善鬼神報之人爲陽惡人自治之人爲陰惡鬼神治之

故天不欺人示之以影地不欺人示之以響人生天地氣中動作喘息皆應於天爲善爲惡天皆鑒之人有修善積德而遭凶禍者先世之餘殃也爲惡犯禁而遇吉祥者先世之餘福也故善人行不擇日至凶中得凶中之吉入惡中得惡中之善惡人行動擇時日至吉中反得吉中之凶入善中反得善中之惡此皆自然之符也

老子曰謝天地父母法常以辰巳日黃昏時天晴日淨掃宅中甲壬丙庚之地燒香北向稽首三過口勿語但心中言耳舉家皆到謝嘿云曾孫某乙數負黃天之氣象上帝之始願合家男女大小前後所犯罪過請爲削除凶惡在後進善人某家大小身神安生氣還常以此道大吉利除禍殃

老子曰正月朔曉亦可於庭中向寅地再拜呪曰洪華洪華受大道之恩太清玄門願還某去歲之年男女皆三過自呪

常行此道可以延年

論曰神仙之道難致養性之術易崇故善攝生者常須慎於忌諱勤於服食則百年之内不懼於夭傷也所以具錄服餌方法以遺後嗣云

養性服餌第二 方叁拾柒首

茯苓酥主除萬病久服延年方

取山之陽茯苓其味甘美山之陰茯苓其味苦惡揀得之勿去皮去皮刀薄切暴乾蒸令氣溜以湯淋之其色赤味苦淋之不已候汁味甜便止暴乾擣篩得茯苓三斗取好酒大斗一石蜜一斗和茯苓末令相得内壹石伍斗瓮中熟攪之百遍密封之勿令洩氣冬月五十日夏月二十一日酥浮於酒上接取酥其味甘美如天甘露可作餅大如手掌空屋中陰乾其色赤如棗飢食一餅終日不飢此仙人度荒世藥取酒封閉以下藥名茯苓酥

杏人酥主萬病除諸風虚勞冷方

取家杏仁其味甜香特忌用山杏仁山杏仁慎勿用大毒害人也

家杏仁（壹石去尖皮兩人者揀完全者若微有缺壞一顆不得用微火炒擣作細末取美酒兩石研杏仁取汁壹石五斗）

右一味以蜜壹㪷拌杏仁汁煎極令濃與乳相似内兩碩瓮中攪之密封泥勿令洩氣與上茯苓酥同法三十日看之酒上出酥也接取酥内瓮器中封之取酥下酒別封之團其藥如梨大置空屋中作閣安之皆如飴餔狀甚美服之令人斷穀

地黄酒酥令人髮白更黑齒落更生髓腦滿實還年却老走及奔馬久服有子方

篦肥地黃拾石切擣取汁叄石麻子壹石擣作末以地黃汁研取汁貳石柒㪷杏仁壹石去皮尖兩仁者擣作末以麻子汁研取汁貳石伍斗　麯末叄㪷

右四味以地黃等汁浸麯七日候沸以米叄石分作叄分投下饋一度以藥汁伍㪷和饋釀酒如家醞酒法三日一投九日三投熟訖密封三七日酥在酒上其酥色如金以物接取可得大升玖升酥然後下篘取酒封之其糟令服藥人食之令人肥悅百病除愈食糟盡乃服藥酒及酥一服酒壹升壹匙酥温酒和服之惟得喫白飯蕪菁忌生冷酢滑猪雞魚蒜其地黃滓暴使乾更以酒叄升和地黃滓擣之暴乾作餅服之

造草酥方

杏仁(壹㪷去皮尖兩人者 / 以水一斗研絞取汁) 篦肥地黃(拾斤熟擣絞 / 取汁壹斗)

麻子(壹斗末之以水 / 壹斗研絞取汁)

右三味汁凡叄斗著麯壹斤米叄㪷釀如常酒味是正熟出以瓮盛之即酥凝在上每服取熱酒和之令酥消盡(服之 / 弥佳)

眞人服杏子丹玄隱士學道斷穀以當米糧方

上粳米(叄斗淨淘沙炊作飯 / 乾暴碓紗篩下之) 杏仁(叄斗去尖皮兩仁者暴乾擣 / 以水伍升研之絞取汁味及止)

右二味先煎杏仁汁令如稀麪糊置銅器中内粳米粉如稀粥以煻火煎自旦至夕攪勿停手候其中水氣盡則出之陰乾紙貯欲用以暖湯貳升内藥如雞子大置於湯中停一炊久敢食任意取足服之

服天門冬丸方

凡天門冬苗作蔓有鈎刺者是採得當以酢漿水煑之濕去心皮暴乾擣篩以水蜜中半和之仍更暴乾又擣末水蜜中半和之更暴乾每取一丸含之有津液輙咽之常含

勿絶行亦含之久久自可絶穀禁一切食惟得喫大麥

服黄精方

凡採黄精須去苗下節去皮取一節隔二日增一節十日服四節二十日服八節空腹服之服訖不得漱口百日以上節食二百日病除二年四體調和忌食酒肉五辛酥油得食粳米糜粥淡食除此之外一物不得入口山居無人之地法服時卧食勿坐食坐服即入頭令人頭痛服訖經一食頃乃起即無所畏

凡服烏麻忌棗栗胡桃得食淡麪餘悉忌行道持誦作勞遠行端坐三百日一切病除七日内宜數見穢惡於後即不(畏損人矣)

服蕪菁子主百疾方

蕪菁子(壹斗肆升)　薤白(拾兩)

右二味煮蕪菁子㬥乾擣篩切薤白和蒸半日下擣一千丸捻作餅重八兩欲絶穀先食乃服三日後食三餅以爲常式盡更合食勿使絶也

華佗雲母圓子三人九方

雲母粉　石鍾乳(鍊)　白石英　肉蓯蓉　石膏
天門冬(去心)　人參　續斷　昌蒲　菌桂
澤瀉　秦艽　紫芝　五加皮　鹿茸
地膚子　署蕷　石斛　杜仲(炙)　桑上寄生
細辛　乾地黄　荊花　柏葉　赤箭
酸棗仁　五味子　牛膝　菊花　遠志(去心)
萆解　茜根　巴戟天　赤石脂　地黄花
枸杞　桑螵蛸　菴蕳子　茯苓　天雄(炮去皮)
山茱萸　白朮　菟絲子　松實　黄耆
麥門冬(去心)　柏子仁　薺子　冬瓜子　蛇牀子

決明子　菥蓂子　車前子

右伍拾叁味皆用眞新好者並等分隨人多少擣下細篩鍊白蜜和爲丸如梧子先食服十丸可至二十丸日三藥無所忌當勤相續不得廢闕百日滿愈疾久服延年益壽身體輕強耳目聰明流通榮衛補養五藏調和六腑顏色充壯不知衰老茜根當洗去土陰乾地黄荆花至時多採暴乾欲用時相接取二石許乃佳也吾嘗服壹兩劑大得力皆家貧不濟乃止又時無藥足闕十五味仍得服之此藥大有氣力常須預求使足服而勿闕又香羙易服不比諸藥

周白水侯散 主心虛勞損令人身輕目明服之八十日百骨間寒熱除百日外無所苦氣力日益老人宜常服之大驗方

遠志 伍分去心　白术 柒分　桂心 壹兩　人參 叁分　乾薑 壹兩

續斷 伍分　杜仲 伍分炙　椒 半兩汗　天雄 叁分炮　茯苓 壹兩

蛇牀人 叁分　附子 叁分炮去皮　防風 伍分　乾地黄 伍分　石斛 叁分

肉蓯蓉 叁分　栝樓根 叁分　牡蠣 叁分熬　石韋 叁分去毛　鍾乳 壹兩鍊

赤石脂 壹兩　桔梗 壹兩　細辛 壹兩　牛膝 叁分

右貳拾肆味擣篩爲散酒服錢五匕服後飲酒壹升日二不知更增壹錢匕三十日身輕目明

濟神圓方

茯神　茯苓　桂心　乾薑 各肆兩　昌蒲

遠志 去心　細辛　白术　人參 各叁兩　甘草 貳兩炙

棗膏 捌兩

右壹拾壹味皆擣篩鍊蜜和更擣萬杵每含壹丸如彈丸有津咽之盡更含之若食生冷宿食不消增一丸積聚結氣嘔逆心腹絞痛口乾脹酢咽吐嘔皆含之絶穀者服之

學仙道士含之益心力神驗

彭祖松脂方

松脂伍斤灰汁煑三十遍漿水煑三十遍清水煑三十遍　茯苓伍斤灰汁煑十遍漿水煑十遍清水煑十遍

生天門冬伍斤去心皮暴乾擣作末　眞牛酥叁斤鍊三十遍

白蜜叁斤煎令沫盡　蠟叁斤鍊三十遍

右陸味擣篩以銅器重湯上先內酥次下蠟次下蜜候消訖次下諸藥急攪之勿住手務令大勻訖內瓷器中密封勿令洩氣先一日不食欲食須喫好羙食令大飽然後絕食即服貳兩二十日後服四兩又二十日服八兩細丸之以得咽中下爲度第二度服四兩爲初二十日又服八兩又二十日服二兩第三度服八兩爲初以後二十日服二兩又二十日服四兩合二百八十日藥成自餘服三丸將補不服亦得常以酥蜜消息羙酒一升爲佳又合藥須取四時王相特忌刑殺厭及四激休廢等日大凶

守中方

白蠟壹斤鍊之凡貳升酒爲度煎卻惡物凡煎伍遍　丹砂肆兩細研　蜜壹斤鍊之極淨

右叁味合圓之如小棗大初一日服三丸三日服九丸如此至九日止

茅山仙人服質多羅方出益州導江縣并茂州山中

此有三種一者紫花根八月採　二者黃花根亦黃四月採

三者白花九月採

右三種功能一種不別依法採根乾已擣篩且煖一合酒和方寸匕空腹服之待藥消方食日一服不可過之忌蕫日眠睡三十匕爲一劑一月服

第二方

蜜半合　酥半合

右貳味煖之和方寸匕服之一法蜜多酥少一方以三指
撮爲定主療諸風病禁豬肉豉等食之即失藥力

第三方

取散五两生胡麻脂三升半投之微火煖之勿令熱旦接
取上油一合煖空肚服之日一服油盡取滓服之主偏風
半身不遂并諸百病延年不老

第四方

煖水一合和三指撮空腹日一服主身羸瘦及惡瘡癬疥
并諸風

第五方

煖牛乳一升和方寸匕服之日一服主女人絕産無子髮
白更黑

第六方

煖濃酪漿一合和方寸匕服之日一服主膈上痰飲水氣
諸風

第七方

以牛尿一合煖和方寸匕服之遣四人搦脚手令氣息
通流主五種癩若重者從少服漸加至一匕若候身作
金色變爲少年顔若桃李延年益壽

右件服藥時皆須平旦空腹服之以靜密室中不得傷風
及多語戲笑作務等事所食桃李粳米及新春粟禁一切
魚肉豉陳臭等物得食乳酪油其藥功說不能盡久服神
仙八十老人狀如少年若觸藥發時身體脹滿四肢強直
俱赤脫却衣裳向火炙身得汗出差

服地黄方

生地黄伍十斤

右壹味擣之以水三升絞取汁澄去滓微火上煎減半即內好白蜜五升棗脂壹升攪令相得乃止每服雞子大一枚日三服令人肥白美色

又方

生地黃 拾斤

右壹味細切以淳酒貳斗浸經三宿出暴令乾又浸酒中直令酒盡又取甘草巴戟天厚朴乾漆覆盆子各一斤各擣下篩和之飯後酒服方寸匕日三服加至二匕使人老者還少強力無病延年 千金無甘草

作熟乾地黃法

別採地黃去鬚葉及細根擣絞取汁以漬肥者著甑中土及米無在以蓋其上蒸之一時出暴燥更內汁中又蒸之一時出暴以汁盡止便乾之亦可直切地黃蒸之半日數數以酒灑之使周匝至夕出暴乾可擣蜜丸服之

種地黃法 并造

先擇好肥地黃赤色虛軟者選取好地深耕之可於臘月預耕凍地彌佳擇肥大地黃根切斷長三四分至一二寸許一斛可種一畝二月三月種之作畦時相去一尺生後隨後鋤壅及數芸之至九月十月視其葉小衰乃掘取一畝得二十許斛擇取大根水淨洗其細根及翦頭尾輩亦洗之日暴令極燥小皺乃以刀切長寸餘白茅覆甑下蒸之密蓋上亦可囊盛土填之從旦至暮當日不盡者明日又擇取蒸之先時已擣其細碎者取汁於銅器中煎之可如薄飴將地黃內汁中周匝出暴乾又內之汁盡止率百斤生者合得三十斤取初八月九月中掘者其根勿令太老強蒸則不消盡有筋脉初以地黃內甑中時先用銅器

承其下以好酒淋灑地黄上令匝汁後下器中取以併和煎汁最佳也

王喬輕身方

茯苓(壹斤) 桂心(壹斤)

右貳味擣篩鍊蜜和酒服如雞子黄許大一服三九日服

不老延年方

雷丸 防風 柏子仁

右叁味等分擣篩為散酒服方寸匕日三六十以上人亦可服二匕久服延年益精補腦年未六十太盛勿服

餌黄精法

取黄精以竹刀剔去皮自仰臥生服之盡飽為度則不頭痛若坐服則必頭痛難忍少食鹽及一切鹹物佳

餌朮方

取生朮削去皮炭火急炙令熟空肚飽食之全無藥氣可以當食不假山粮得飲水神仙秘之勿傳

服齊州長石法主羸瘦不能食療百病方

馬牙石(一名乳石一名牛腦石本草名長石)

右取黄白明淨無瑕纇者擣密絹下勿令極篩恐太麤以壹石米合內一石水中於銅器中極攪令濁澄少時接取上汁如清漿水色置一大器中澄如水色去水內滓於白練袋中盛經一宿瀝却水如造烟脂法出日中暴之令乾仍白練袋盛之其袋每一如掌許大厚薄亦可於三斗斗米下蒸之再遍暴乾以手挼之令衆手研之即成擊出每以酒服一大匙日三服即覺患差若覺觸以米汁煑滓石一雞子大煑三沸去滓頓服之夏月不能服散者服湯亦佳石出齊州歷城縣藥療氣痰飲不下食百病羸瘦皆差

服杏仁法主損心吐血因即虛熱心風健忘無所記憶不能食食則嘔吐身心戰掉痿黃羸瘦進服補藥入腹嘔吐並盡不服餘藥還吐至死乃得此方服一劑即差第二劑色即如初也

杏仁 壹升去尖皮及兩仁者熬令色黃末之　茯苓 壹斤末之　人參 伍兩末之

酥 貳斤　蜜 壹升半

右伍味內銅器中微火煎先下蜜次下杏仁次下酥次下茯苓次下人參調令均和則內於瓷器中空肚服之一合稍稍加之以利爲度日再服忌魚肉

有因讀誦思義坐禪及外物驚恐狂走失心方

酥 貳兩　薤白 壹握切

右貳味擣薤千杵溫酥和攪以酒一盞服之至三七日服之佳得食枸杞菜羹薤白亦得作羹服訖而仰臥至食時乃可食也忌麫得力者非一

鎮心圓主損心不能言語心下懸急苦痛舉動不安數數口中腥客熱心中百病方

防風 伍分　人參 伍分　龍齒 伍分　芎藭 壹兩　鐵精 壹兩

當歸 壹兩　乾地黃 伍分　黃耆 壹兩　麥門冬 伍分去心

柏子仁 壹兩　桂心 壹兩　遠志 伍分去心　白鮮皮 參分　白朮 伍分

雄黃 壹兩研　菖蒲 壹兩　茯苓 壹兩　桔梗 壹兩　乾薑 伍分

光明砂 壹兩研　鍾乳 半兩研

右貳拾壹味擣篩鍊蜜和飲服梧子大五丸漸加至十五丸日貳服稍加至三十丸慎腥臭等常宜小進食爲佳宜喫酥乳倍日將息先須服湯湯方如左

玄參 參兩　乾地黃 參兩　黃耆 參兩　地骨皮 參兩　茯苓 參兩

丹參 伍兩　牛膝 參兩　五味子 參兩　麥門冬 參兩去心

杏仁貳兩去尖皮

茯苓叄兩 橘皮貳兩 韭子半升 柴胡貳兩去苗 細辛叄兩 磁石伍兩 生薑叄兩切

右壹拾柒味㕮咀以水三斗煑取三升分為三服後三日

乃更進丸時時食後服服訖即仰卧少時即左右卧及數

轉動須腰底安物令高亦不得過久甚酌得所不得勞役

身心氣力服藥時乾食即且停一日食訖用兩三口漿水

飲壓之服藥時有異狀貌起勿怪之服丸後二日風動藥

氣衝頭兩眼赤痛久而不差者依狀療之法取棗根直入

地二尺者白皮一握水一升煑取半升一服即愈

五參圓一主治心虛熱不能飲食食即嘔逆不欲聞人語方

人參壹兩 苦參壹兩半 沙參壹兩 丹參叄分

玄參半兩

右五味擣篩鍊蜜和為丸食訖飲服十丸如梧子大日二

漸加至二十丸

治損心吐血方

芎藭貳兩 葱白貳兩 生薑貳兩切 油伍合 椒汗貳合

桂心壹兩 豉叄合 白粳米肆合

右捌味㕮咀芎桂貳味以水四升煑取二升內米油又煎

取一升去滓頓服慎麪

正禪方

春桑耳 夏桑子 秋桑葉

右叄味等分擣篩以水一斗煑小豆一升令大熟以桑末

一升和煑微沸著鹽豉服之日三服飽服無妨三日外稍

去小豆身輕目明無眠睡十日覺遠智通初地禪服二十

日到二禪定百日得三禪定累一年得四禪定萬相皆見

壞欲界觀境界如視掌中得見佛性

服昌蒲方

二月八日採取肥實白色節間可容指者多取陰乾去毛距擇吉日擣篩百日一兩爲一劑以藥四分蜜一分半酥和如稠糜柔弱令極匀内瓷器中密封口埋穀聚中一百日欲服此藥須先服瀉藥吐利訖取王相日旦空肚服一兩含而咽之有力能消漸加至三二兩服藥至辰巳間藥消訖可食粳米乳糜更不得喫飲食若渴惟得飲少許熟湯每日止一服藥一頓食若直治病差止若欲延年益壽求聰明益智者宜須勤久服之修合服食須在靜室中勿喜出入及晝睡一生須忌羊肉熟葵又主癥癖欬逆上氣痔漏病最良又令人膚體肥充老者光澤髮白更黑面不皺身輕目明行疾如風填骨髓益精氣服一劑壽百歲天竺摩揭陀國王舍城邑陀寺三藏法師跋摩米帝以大業八年與突厥使主至武德六年七月二十三日爲洛州大德護法師淨土寺主矩師筆譯出

養老大例第三 論三首

論曰人之在生多諸難遘兼少年之時樂遊馳騁情敦放逸不至於道倏然白首方悟虛生終無所益年至耳順之秋乃希餐餌然將欲頤性莫測據依追思服食者於此二篇中求之能庶幾於道足以延齡矣語云人年老有疾者不療斯言失矣緬尋聖人之意本爲老人設方何則年少則陽氣猛盛食者皆甘不假醫藥悉得肥壯至於年邁氣力稍微非藥不救譬之新宅之與故舍斷可知矣

論曰人年五十以上陽氣日衰損與日至心力漸退忘前失後興居怠惰計授皆不稱心視聽不穩多退少進日月不等萬事零落心無聊賴健忘瞋怒情性變異食飲無味寢處不

安子孫不能識其情惟云大人老來惡性不可諮諫是以為孝之道常須慎護其事每起速稱其所須不得令其意負不快故曰為人子者不植見落之木淮南子曰木葉落長年悲夫栽植卉木尚有避忌況俯仰之間安得輕脫乎

論曰人年五十以去皆大便不利或常苦下痢有斯二疾常須預防若祕澀則宜數食葵菜等冷滑之物如其下痢宜與薑韭溫熱之菜所以老人於四時之中常宜溫食不得輕之老人之性必恃其老無有藉在率多驕恣不循軌度忽有所好即須稱情既曉此術當宜常預慎之故養老之要耳無妄聽口無妄言身無妄動心無妄念此皆有益老人也又當愛情每有誦念無令耳聞此為要妙耳又老人之道常念善無念惡常念生無念殺常念信無念欺養老之道無作博戲強用氣力無舉重無疾行無喜怒無極視無極聽無大用意無大思慮無吁嗟無叫喚無吟吃無歌嘯無啈啼無悲愁無哀慟無慶弔無接對賓客無預局席無飲興能如此者可無病長壽斯必不惑也又常避大風大雨大寒大暑大露霜霰雪旋風惡氣能不觸冒者是大吉祥也凡所居之室必須大周密無致風隙也夫善養老者非其書勿讀非其聲勿聽非其務勿行非其食勿食非其食者所謂猪豘雞魚蒜鱠生肉生菜白酒大酢大鹹也常學淡食至如黃米小豆此等非老者所宜食故必忌之常宜輕清甜淡之物大小麥麪粳米等為佳又忌強用力齩齧堅硬脯肉反致折齒破齗之弊人凡常不飢不飽不寒不熱善行住坐臥言談語笑寢食造次之間能行不妄失者則可延年益壽矣

養老食療第四 方二十七首 論五首

論曰衛汜稱扁鵲云安身之本必須於食救疾之道惟在於

藥不知食宜者不足以全生不明藥性者不能以除病故食
能排邪而安臟腑藥能恬神養性以資四氣故為人子者不
可不知此二事是故君父有疾期先命食以療之食療不愈
然後命藥故孝子須深知食藥二性其方在千金方第二十六卷中
論曰人子養老之道雖有水陸百品珍羞每食必忌於雜雜
則五味相撓食之不已為人作患是以食敢鮮肴務令簡少
飲食當令節儉若貪味傷多老人腸胃皮薄多則不消彭亨
短氣必致霍亂夏至已後秋分已前勿進肥濃羮臛酥油酪
等則無他矣夫老人所以多疾者皆由少時春夏取涼過多
飲食太冷故其魚膾生菜生肉腥冷物多損於人宜常斷之
惟乳酪酥蜜常宜溫而食之此大利益老年雖然卒多食之
亦令人腹脹泄痢漸漸食之
論曰非但老人須知服食將息節度極須知調身按摩搖動
肢節導引行氣行氣之道禮拜一日勿住不得安於其處以
致壅滯故流水不腐戶樞不蠹義在斯矣能知此者可得一
二百年故曰安者非安能安在於慮亡樂者非樂能樂在於
慮殃所以老人不得殺生取肉以自養也
耆婆湯主大虛冷風羸弱無顏色方 一云酥蜜湯
酥壹斤煉 生薑壹合切 薤白貳握炙令黃 酒貳升
白蜜壹斤煉 油壹升 椒壹合汗 胡麻仁壹升
橙葉壹握炙令黃 豉壹升 糖壹升
右壹拾壹味先以酒漬豉一宿去滓內糖蜜油酥於銅器
中煑令勻沸次內薤薑煑令熟次下椒橙葉胡麻煑沸下
貳升豉汁又煑一沸出內瓷器中密封空腹吞一合如人
行十里更一服冷者加椒
服烏麻方

純黑烏麻及稱擅色者任多少與水拌令潤勿使太濕蒸
令氣遍即下暴乾再蒸往反九蒸九暴訖擣去皮作末空
肚水若酒服二方寸匕日二服漸漸不飢絶穀久服百病
不生常服延年不老耐寒暑

蜜餌主補虛羸瘦乏氣力方

白蜜貳升　臘月猪肪脂壹升　胡麻油半升　乾地黃末壹升

右四味合和以銅器重釜煎令可丸下之服如梧桐子三
丸日三稍加以知爲度久服肥充益壽

服牛乳補虛破氣方

牛乳叁升　蓽撥半兩末之綿裹

右二味銅器中取叁升水和乳合煎取叁升空肚頓服之
日一二七日除一切氣愼麪猪魚雞蒜生冷　張澹云波斯
國及大秦甚重此法謂之悖散湯

猪肚補虛羸之氣力方

肥大猪肚壹具洗如食法　人參伍兩　椒壹兩
乾薑壹兩半　葱白細切柒兩　粳米熟煑半升

右六味下篩合和相得内猪肚中縫合勿令洩氣以水壹
㪷半微火煑令爛熟空腹食之兼少與飯一頓令盡可服
四五劑極良

論曰牛乳性平補血脉益心長肌肉令人身體康強潤澤面
目光悅志氣不衰故爲人子者須供之以爲常食一日勿闕
常使恣意充足爲度也此物勝肉遠矣

服牛乳方

鍾乳壹斤上者細研之如粉　人參叁兩　甘草伍兩炙
乾地黃叁兩　黃耆叁兩　杜仲叁兩炙　蓯蓉陸兩
茯苓伍兩　麥門冬肆兩去心　薯蕷陸兩　石斛貳兩

右壹拾壹味擣篩爲散以水伍升先煑粟米柒升爲粥內
散柒两攪令勻和少冷水半渴飮之令足不足更飮水日
一餘時患渴可飮清水平旦取牛乳服之生熟任意牛須
三歲以上七歲以下純黃色者爲上餘色者爲下其乳常
令犢子飮之若犢子不飮者其乳動氣不堪服也其乳牛
淨潔養之洗刷飮飼須如法用心看之慎蒜猪魚生冷陳
臭等物
有人頻遭重病虛羸不可平復以此方補之甚效其方如左
生枸杞根細切一大斗以水一大石煑取六斗五升澄清　白羊骨壹具
右二味合之微火煎取伍大升溫酒服之五日令盡不是
小小補益一方單用枸杞根慎生冷酢滑油膩七日
補五勞七傷虛損方
白羊頭蹄壹具以草火燒令黃赤以淨綿急塞鼻　胡椒壹两　蓽撥壹两

乾薑壹两　葱白壹升切　香豉貳升
右陸味先以水煑羊頭蹄骨半熟內藥更煑令大爛去骨
空腹適性食之日食一具滿柒具止禁生冷鈆丹瓜果肥
膩及諸雜肉濕麪白酒粘食大蒜一切畜血仍慎食大酢
滑五辛陳臭猪雞魚油等七日
療大虛羸困極方
取不中水猪肪一大升內葱白壹莖煎令葱黃止候冷暖
如人體空腹平旦頓服之令盡暖蓋覆卧至日晡後乃食
白粥稠糜過三日後服補藥其方如左
羊肝壹具細切　羊脊骨膂肉壹條細切　麴末半升
枸杞根十斤切以水三大斗煑取一大斗去滓
右四味合和下葱白豉汁調和羮法煎之如稠糖空腹飽
食之三服時慎食如上

補虛勞方

羊肝肚腎心肺壹具以熱湯洗肚餘細切之 胡椒壹兩 蓽撥壹兩

豉心半升 葱白兩握去心切 犂牛酥壹兩

右陸味合和以水陸升緩火煎取三升去滓和羊肝等并汁皆內羊肚中以繩急繫肚口更別作一絹袋稍小於羊肚盛肚煮之若熟乘熱出以刀子并絹袋刺作孔瀝取汁空肚頓服令盡餘任意分作食之若無羊五臟羊骨亦可用之其方如左

羊骨壹具碎之

右以水一大石微火煎取三斗依食法任性作羹粥麪食

不食肉人油麪補大虛勞方

生胡麻油壹升 浙粳米泔清壹升

右貳味微火煎盡泔清乃止出貯之取三合鹽汁七合先以鹽汁和油令相得溲麪一斤如常法作餺飥煮五六沸出置冷水中更漉出盤上令乾乃更一葉葉擲沸湯中煮取如常法十度煮之麪熟乃盡以油作臛澆之任飽食

烏麻脂主百病虛勞久服耐寒暑方

烏麻油壹升 薤白參斤

右貳味微火煎薤白令黃去滓酒服一合百日充肥二百日老者更少三百日諸病悉愈

服石英乳方

白石英拾伍兩擣石如米粒以綿裹密帛盛

右壹味取牛乳三升水三升煎取三升頓服之日一度可二十遍煮乃一易之擣篩以酒三升漬二七日服之常令酒氣相接勿至於醉以補人虛勞更無以加也有力能多服一二年彌益○凡老人舊患眼暗者勿以酒服藥當用

飲下之目暗者能終不與酒蒜即無所畏耳

論曰上篇皆是食療而不愈然後命藥藥食兩攻則病無逃矣其服餌如左

大黃耆圓 主人虛勞百病夫人體虛多受勞黃耆至補勞是以人常宜將服之方

黃耆 柏子仁 天門冬去心 白朮 乾地黃

遠志去心 澤瀉 署預 甘草炙 人參

石斛 麥門冬去心 牛膝 杜仲炙 薏苡仁

防風

茯苓 五味子 茯神 乾姜 丹參

肉蓯蓉 枸杞子 車前子 山茱萸 狗脊

萆薢 阿膠炙 巴戟天 菟絲子 覆盆子

右三拾壹味各壹兩擣篩鍊蜜丸酒服十丸日稍加至四十圓性冷者加乾薑桂心細辛貳兩去車前子麥門冬澤瀉多忘者加遠志昌蒲二兩患風者加獨活防風芎藭二兩老人加牛膝杜仲萆薢狗脊石斛鹿茸白馬莖各二兩無問長幼常服勿絕百日以內慎生冷酢滑豬雞魚蒜油膩陳宿鬱浥百日後惟慎猪魚蒜生菜冷食五十以上雖暑月三伏時亦忌冷飯依此法可終身常得藥力不退藥有三十一味合時或少一味兩味亦得且服之

彭祖延年柏子仁圓 久服強記不忘方

柏子仁伍合 蛇牀子 菟絲子 覆盆子各半升

石斛 巴戟天各貳兩半 杜仲炙 茯苓

天門冬去心 遠志各參兩去心 天雄壹兩炮去皮 續斷

桂心各壹兩半 昌蒲 澤瀉 署預

人參 乾地黃 山茱萸各貳兩 五味子伍兩

鍾乳 叁兩成鍊者 肉蓯蓉 陸兩

右貳拾貳味擣篩鍊蜜和丸如桐子大先食服二十丸稍加至三十丸先齋五日乃服藥服後二十日齒垢稍去白如銀四十二日面悅澤六十日瞳子黑白分明尿無遺瀝八十日四肢偏潤白髮更黑腰背不痛一百五十日意氣如少年藥盡一劑藥力周至乃入房內忌猪魚生冷酢滑

紫石英湯 主心虛驚悸寒熱百病令人肥健方

紫石英 拾兩 白石英 拾兩 白石脂 叁拾兩 赤石脂 叁拾兩

乾薑 叁拾兩

右伍味㕮咀皆完用二石英各取一兩石脂等三味各取三兩以水叁升合以微火煎宿勿食分為四服日三夜一服後午時乃食日日依前秤取昨日藥乃置新藥中共煑乃至藥盡常然水數一準新藥盡訖常添水去滓服之滿四十日止忌酒肉藥水皆用大升秤取汁亦用大升服湯訖即行勿住坐卧須令藥力遍身百脉中行若大冷者春秋各四十九日服令疾退盡極須澄清服之

論曰此湯補虛除固冷莫過於此能用之有如反掌恐斈者謂是常方輕易而侮之若一劑得差即止若服多令人大熱即須服冷藥壓之宜審而用之

千金翼方卷第十二

辟穀

服茯苓第一 方六首

服茯苓方

茯苓粉伍斤 白蜜叁斤 柏脂柒斤鍊法在後

右叁味合和圓如梧桐子服拾圓飢者增數服之取不飢乃止服吞壹圓不復服穀及他果菜也永至休粮飲酒不得但得飲水即欲求升仙者常取杏仁伍枚㕮咀以水煑之爲湯令沸去滓以服藥亦可和丹砂藥中令赤服之又若却欲去藥食穀者取消石葵子等熟治之以粥服方寸匕日一四日內日再服藥去稍稍食穀葵羮大良

又方

茯苓叁斤 白蠟貳斤 大麻油三升 松脂叁斤

右肆味微火先煎油三沸內松脂令烊次內蠟蠟烊內茯苓熟攪成圓乃止服如李核大壹圓日再一年延年千歲不飢

又方

茯苓貳斤　雲母粉貳斤　天門冬粉貳斤　羊脂伍斤

麻油叁斤　蜜伍斤　白蠟叁斤　松脂拾斤白者

右捌味內銅器中微火上煎令相得下火和令凝紫色乃止欲絕穀先作五肉稻粮食五日乃少食三日後圓此藥大如彈圓日三服一日玖圓不飢飢則食此止却百二十日復食九圓却三歲復食九圓却十二年復食九圓如此壽無極可兼食棗脯飲水無苦還下藥取消石壹升葵子壹升以水叁升煑取壹升日三服八合亦可壹升藥下乃食一合米粥日三三日後日中三合

又方

茯苓去皮

右以淳酒漬令淹密封十日出之如餌可食甚美服方寸匕日三令人肥白除百病不飢渴延年

又方

茯苓粉伍斤　白蜜叁升

右貳味漬銅器中甕器亦得重釜煎之數數攪不停候蜜竭出以鐵臼擣叁萬杵日壹服三十圓如梧子百日病除二百日可夜書二年後役使鬼神久服神仙

辟穀延年千歲方

松脂　天門冬去心　茯苓　蠟　蜜各壹升

右伍味以酒伍升先煎蜜蠟三沸內羊脂三沸內茯苓三沸內天門冬相和服三圓如李子養色還白以杏仁壹升

内之爲良

服松柏脂第二 方貳拾首 論一首

採松脂法

常立夏日伐松横枝指東南者圍二三尺長一尺許即日便倒頓於地以器其下承之脂自流出三四過使以和藥此脂特與生雄黄相宜若堅強者更著酒中火上消之汁出著冷酒中引之乃煖和雄黄衡山松脂膏常以春三月入衡山之陰取不見日月之松脂鍊而食之即不召自來服之百日耐寒暑二百日五藏補益服之五年即王母見諸名山所生三百六十五山其可食者獨滿谷陰懷中耳其谷正從衡山嶺直東肆百八十里當横捷正石横其嶺東北行過其南入谷五十里窮穴有石城白鶴其東方有大石四十餘丈狀如白松松下二丈有小穴可入山有丹砂可食也其南方陰中有大松大三十餘圍有三十餘株不見日月皆可服也

取破松脂法

以日入時破其陰以取其膏破其陽以取其脂等分食之可以通神靈鑿其陰陽爲孔令方寸深五寸還以皮掩其孔無令風入風入不可服也以春夏時取之取之訖封塞勿洩以泥塗之東北行至丹砂穴下有陰泉水可飲之此洪農車君以元封元年入此山食松脂十六年復下居長安東市又在上谷牛頭谷時往來至秦嶺上年常如三十者

取松脂法

斫取老枯肥松細擘長尺餘置甑中蒸之滿甑脂下流入釜中數數接取脂置水中凝之盡更爲一日可得數十斤枯節益佳

又法

取枯肥松細破於釜中煮之其脂自出接取置冷水中凝之引之則成若以五月就木取脂者對刻木之陰面爲二三刻刻可得數升秋冬則依煮法取勿煮生松者少脂

鍊松脂法

松脂貳拾斤爲一劑以大釜中著水加甑其上塗際勿洩加茅甑上爲藉復加生土茅上厚一寸乃加松脂於上炊以桑薪湯減添水接取停於冷水中凝更蒸之如前法三蒸畢止脂色如白玉狀乃用和藥可以圓菊花茯苓服之每更蒸易土如前法以銅鑼承甑下脂當入鑼中如膠狀下置冷水中凝更蒸欲出銅器於釜中時預置小繩於脂中乃下停於水中凝之復停於炭須臾乃四過皆解乃可舉也盡更添水以意斟酌其火勿太猛常令不絶而已

又方

治松脂以灰汁煮之寫置盆水中須臾凝斷取復置灰中煮之如此三反皆易水成矣

一法鍊松脂十二過易湯不能者五六過亦可服之

鍊松脂法

薄淋桑灰汁以煮脂一二沸接取投冷水中引之凝復更煮凡十過脂則成若強者復以酒中煮三四過則柔矣先食服一兩日三十日不復飢飢更服之一年後夜如白日久服去百病禁一切肉鹹菜魚醬鹽等

又方

松脂拾斤

右用桑薪灰汁貳石內釜中加甑於上甑中先鋪茅次鋪黃砂土可三寸蒸之脂少間流入釜中寒之凝接取復蒸

如前三上更以清水代灰汁復如前三上去水更以陰深水壹石伍斗煑甘草叁斤得壹石汁去滓內牛酥貳斤加甑釜上復炊如前令脂入甘草汁中凝接取復烝夕下如此三上即成苦味皆去甘美如飴膏服如彈丸日三久服神仙不死

又方

好松脂壹石　石灰汁叁石

右貳味於淨處爲竈加大釜斬白茅爲藉令可單止以脂內甑中炊之令脂自下入釜盡去甑接取內冷水中以扇扇之兩人引之三十過復蒸如前滿三遍三易灰汁復以白酢漿三石鍊之三過三易酢漿也復以酒鍊之一過亦如上法訖以微火煎之令如飴狀服之無少長

又方

松脂貳斤半水伍升煎之汁黃濁出投冷水中如是百二十上不可以爲率四十入湯輙一易湯凡三易湯且成軟如泥其色白乃可用治下茯苓一斤內藥中攪令相得藥成置冷地可圓圓如杏核日吞叁圓拾日止自不欲飲食當鍊松脂無令苦乃用耳

又方

松脂柒斤以桑灰汁壹石煑脂三沸接置冷水中凝復煑之凡十徧脂白矣爲散叁兩分爲三服十兩以上不飢飢復服之一年以後夜視目明久服不死

論曰鍊松脂春夏可爲秋冬不可爲絶穀治癩第一欲食即勿服亦去三尸

粉松脂法

松脂拾斤

丹黍灰汁煑沸接置冷水中二十過即末矣亦可雜雲母
拚丸以蜜服之良

服松脂法

欲絶穀服叁两飢復更服取飽而止可至壹斤不絶穀者服食壹两先食須藥力盡乃餘食錯者即食不安而吐也久服延年百病除

又方

松脂拾斤 松實叁斤 柏實叁斤 菊花伍升

右肆味下篩蜜和服如梧子叁拾圓分爲叁服一百日以上不復飢服之一年百歲如三十四十者久服壽同天地

又方

桑寄生蒸之令熟調和以鍊松脂大如彈丸日一丸即不飢

服法

以夏至日取松脂日食壹升無食他物飲水自恣令人不飢長服可以終身不食河南少室山有大松取陰處斷之置器中蒸之膏自流出鍊出去苦氣白蜜相和食之日壹升三日後服如彈丸渇飲水令人不老取無時

又方

松脂伍斤 羊脂叁斤

右貳味先鍊松脂令消内羊脂日服博棊一枚不飢久服神仙

守中方與前別

白松脂鍊柒斤叁徧 白蠟伍斤 白蜜叁升 茯苓粉叁斤

右叁味合蒸一石米頃服如梧子拾圓飢復取服日一丸不得食一切物得飲酒不過一合齋戒咬咀五香以水煑一沸去滓以藥投沸中又欲致神女者取茅根治取汁以和之蒸服之神女至矣

又方

松脂桑灰鍊百遍色正白復内之飴蜜中數反出之服二圓如梧子百日身輕一年玉女來侍

取柏脂法

五月六日刻其陽二十株株可得半升鍊服之欲絶穀者增之至陸兩不絶穀者壹兩半禁五辛魚肉菜鹽醬治百病久服鍊形延年鍊脂與鍊松脂法同

服松柏實第三 方一十九首

凡採柏子以八月過此零落又喜蠹蟲頓取之又易得也當水中取沈者八月取并房暴乾末服方寸匕稍增至五合或日壹升半欲絶穀恣口取飽渴飲水一方柏子服不可過五合

凡採松實以七月未開時採之纔開口得風便落不可見也

松子宜陳者佳

絶穀升仙不食法

取松實末之服三合日三則無飢渴飲水勿食他物百日身輕日行五百里絶穀升仙

服松子法

治下篩服方寸匕日三四或日壹升半升能多爲善二百日以上日行可五百里一法服松子不過三合

松子圓

松子味甘酸益精補腦久服延年不老百歲以上顏色更少令人身輕悅澤方

松子菊花等分以松脂若蜜丸服如梧子十丸日三可至二十丸亦可散服二方寸匕日三功能與前同

又方

松柏脂及實各等分丸以松脂服之良

服松葉令人不老身生毛皆綠色長一尺體輕氣香還年變白久服以絶穀不飢渴飲水服松葉亦可粥汁服之初服如惡久自便亦可乾末然不及生服

服松葉法

細切飡之日三合令人不飢

又方

細切之如粟使極細日服三合四時皆服生葉治百病輕身益氣還白延年

又方

四時採春東夏南秋西冬北方至治輕身益氣令人能風寒不病痺延年

高子良服柏葉法

採無時以葉切置甑中令滿覆盆甑著釜上蒸之三石米頃久久益善蒸訖水淋百餘過訖陰乾若不淋者蒸訖便陰乾服壹合後食日三服勢力少稍增從壹合始至壹升令人長生益氣可辟穀不飢以備厄還山隱無穀昔龐伯寧嚴君平趙德鳳唐公房等脩道佐時也世遭飢運又避世隱峨眉山中飢窮欲死適與仙人高子良五馬都相遭以此告之皆如其言盡共服之卒賴其力皆度厄後以告道士淮同得其方遂共記之

又方

取大盆內柏葉著盆中水漬之一日一易水易水者狀麁出水也如是七日以上若二七日爲佳訖覆盆蒸之令氣徹便止暴乾下篩末一石以一斗棗膏溲如作乾飯法服方寸匕日三以水送不飢飢即服之渴飲水以山居讀誦氣力不衰亦可濟凶年

仙人服柏葉減穀方

柏葉取近上者但取葉勿雜枝也三十斤為一劑常得好不津器內柏葉於中以東流水漬之使上有三寸以新盆覆上泥封之三七日出陰乾勿令塵入中乾便治之下篩以三升小麥淨擇內著柏葉汁中須封五六日乃出陰乾燥復內之封五六日出陰乾令燥磨之下篩又取大豆三升炒令熟取黃磨之下篩合三物攪調相得內韋囊中盛之一服五合用酒水無在日三食飲無妨治萬病病自然消冬不寒顏色悅澤齒脫更生耳目聰明腸實服此食不食無在

又方

取柏葉三石熟蒸暴乾下篩大麥一升熬令變色細磨之都合和服多少自任亦可作粥服之可稍稍飲酒

又方

取柏葉二十斤著盆中以東流水漬三七日出暴乾以小麥一斗漬汁三四日出暴乾熬令香柏葉亦然鹽一升亦熬之令黃三味擣下篩以不中水豬膏二斤細切著末中攪復篩之先食服方寸匕日三七不用食良亦可兼服之

又方

取陰地柏葉又取陰面皮㕮咀蒸之以釜下湯灌之如是至三陰乾百日下篩大麥末大豆末三味各一斤治服方寸匕日三以絕穀不食除百病延年

又方

柏葉三石熟煮之出置牛筥中以汰之令水清乃止暴乾以白酒三升溲葉微火蒸之熟一石米頃息火復暴乾治大麥三升熬令變色細治暴擣葉下篩合麥屑中日服三

升以水漿水若酒送之止穀療病辟温癘悪鬼久久可度世

又方

柏葉拾斤以水四斗漬之一宿煑四五沸漉出去汁別以器閣之乾以小麥一升漬柏葉汁中一宿出暴燥復内之令汁盡取鹽一升柏葉一升麥一升熬令香合三味末之以脂肪一片合溲酒服方寸匕日三病自消滅十日以上便絶穀若乗騎取一升半水飲之可以涉道路不疲

休粮散方

側柏壹斤生　烏豆　麻子各半升炒

右叁味擣拌空心冷水服方寸匕

酒膏散第四　方六首　論一首

仙方凝靈膏

茯苓叁拾六斤　松脂貳拾四斤　松仁拾貳斤　柏子仁拾貳斤

右肆味鍊之擣篩以白蜜兩石四斗内銅器中微火煎之一日一夜次第下藥攪令相得微微火之七日七夕止可取丸如小棗服七丸日三若欲絶穀頓服取飽即不飢身輕目明老者還少十二年仙矣

初精散方

茯苓叁拾陸斤　松脂貳拾肆斤　鍾乳壹斤

右叁味爲粉以白蜜伍斗攪令相得内埴器中固其口陰乾百日出而粉之一服三方寸匕日三服一劑大佳不同餘藥

論曰凡欲服大藥當先進此一膏一散然後乃服大藥也

五精酒主萬病髮白反黑齒落更生方

黄精肆斤　天門冬叁斤　松葉陸斤　白朮肆斤　枸杞伍斤

右伍味皆生者内釜中以水叁石煑之一日去滓以汁漬

麴如家醞法酒熟取清任性飲之一劑長年

白朮酒方

白朮 貳拾伍斤

右壹味㕮咀以東流水兩石伍斗不津器中漬之二十日去滓內汁大盆中夜候流星過時抄已姓名置盆中如是五夜汁當變如血取以漬麴如家醞法酒熟取清任性飲之十日萬病除百日白髮反黑齒落更生面有光澤久服長年

枸杞酒方

枸杞根 壹百斤

右壹味切以東流水肆石煑之一日一夕去滓得一石汁漬麴釀之如家醞法酒熟取清置不津器中取

乾地黃末 壹升 桂心末 壹升 乾薑末 壹升 商陸根末 壹升 澤瀉末 壹升 椒末 壹升

右陸味盛以絹袋內酒中密封口埋入地三尺堅覆上三十日沐浴整衣冠向仙人再拜訖開之其酒當赤如金色平旦空肚服半升為度十日萬病皆愈二十日瘢痕滅惡疾人以一升水和半升酒分五服服之即愈若欲食石者取河中青白石如棗杏仁者貳升以水叁升煑一沸以此酒半合置中須臾即熟可食

靈飛散方

雲母粉 壹斤 茯苓 捌兩 鍾乳 柒兩 柏仁 柒兩 桂心 柒兩 人參 柒兩 白朮 肆兩 續斷 柒兩 菊花 拾伍兩 乾地黃 拾貳兩

右壹拾味擣篩以生天門冬拾玖斤取汁溲藥著銅器中蒸之壹石貳斗黍米下出暴乾擣篩先食服方寸匕日壹服三日力倍五日血脉充盛七日身輕十日面色悅澤十

五日行及奔馬三十日夜視有光七十日頭髮盡落故齒皆去更取二十七白蜜和擣二百杵丸如梧子作八十一丸皆映徹如水精珠欲令鬚齒時生者日服七九三日即生若鬚未白不落者且可服散如前法已白者餌藥至七年乃落入山日服七九則絶穀不飢

服雲母第五 方三首 論一首

雲母粉法

雲母取上上白澤者細擘以水淨淘漉出蒸之一日一夜下之復更淨淘如前去水令乾率雲母壹斤鹽三升消石一斤和雲母擣之一日至暮取少許掌上泯著不見光明爲熟出安盆甕中以水漬之令相得經一炊久澄去上清水徐徐去之盡更添水如前凡三十遍易水令淡如水味即漉出其法一如研粉澄取淀然後取雲母淀徐徐坐絹袋中濾著單上暴令乾即成矣雲母味甘平無毒主治死肌中風寒熱如在船車上除邪氣安五藏益子精明目下氣堅肌續絶補中五勞七傷虛損少氣止利久服輕身延年強筋脉填髓滿可以負重經山不乏落齒更生瘢痕消滅光澤人面不老耐寒暑志高可至神仙此非古法近出東海賣鹽女子其女子年三百歲貌同笄女常自負一籠鹽重五百餘斤如斯得効者其數不一可驗神功矣

又方

雲母擘薄淘淨去水餘濕沙盆中研萬萬遍以水淘澄取淀見此法即自保愛修而服之勿泄之勿泄之

凡服雲母祕澀不通者以蕪菁菹汁下之即通祕之

用雲母粉法

熱風汗出心悶水和雲母浴之不過再差

勞損汗出以粉摩之即定以粳米粥和三方寸匕服之

瘑濕慝瘡月蝕粳米粥和三方寸匕服之以一錢匕内下部中取差

止下膿病粳米粥和三方寸匕服之七日慎血食五辛房室重作務

赤白痢積年不差服三方寸匕不過一兩即差寸白蟲者服一方寸匕不過四服

帶下服三方寸匕三五服差

金瘡一切惡瘡粉塗之至差止

疽疥癬亦然

風癩者服三方寸匕取差

痔病服三方寸匕慎房室血食油膩

淋病服三方寸匕

又一切惡瘡粉和豬脂塗之

頭瘡禿癬酢酒洗去痂以粉塗之水服三方寸匕百日慎如前

論曰凡服粉治百病皆用粳米粥和服之慎房室五辛油膩血食勞作若得雲母水服之壹升長年飛仙

雲母水主除萬病久服長年神仙方

雲母貳拾斤細擘　芒消拾斤　露水壹石　崖蜜貳斤

右肆味先取露水捌斗作沸湯分半洮汰雲母再遍漉出以露水二斗温之内芒消令消置木器中内雲母訖經三七日出之令燥以水漬之麤皮令軟作袋内雲母袋中急繫口兩人挼挺之從寅至午勿住出之密絹篩末餘不下者更内袋中挼挺如初篩下捴可得五斤以崖蜜和攪令如粥内薄削筩中漆固口理舍北陰中深六七尺築土令

平一百二十日出之皆成水且温水一合和雲母一合向東服日三水寒温自任服十日小便當黄此先除勞氣風疥也二十日腹中寒澼皆消三十日齲齒除者更生四十日不畏風寒伍十日諸病皆愈顔色日少久服不巳長年神仙

服水第六 論一首 法七首

論曰夫天生五行水德最靈浮天以載地高下無不至潤下爲澤升而爲雲集而爲霧降而爲雨故水之爲用其利博哉可以滌蕩滓穢可以浸潤焦枯尋之莫測其涯望之莫覩其際故含靈受氣非水不生萬物禀形非水不育大則包禀天地細則隨氣方圓聖人方之以爲上善余嘗見真人有得水仙者不覩其方武德中龍齋此一卷服水經授余乃披翫不捨晝夜其書多有蠹壞文字頗致殘缺因暇隙尋其義理集成一篇好道君子勤而脩之神仙可致焉

第一服水法

凡服水之法先發廣大心仍救三塗大苦普度法界含生然後安心服之

經曰服水以死爲期決得不疑然後辦一瓦杯受一升擇取四時王相甲子開除滿之日并與身本命相生之日候天地大時無一雲氣日未出時清淨沐浴服鮮淨衣燒香禮十方諸佛及一切聖賢仙人天眞乞大鴻恩乃向東方取水以水置器中候日出地令水與日同時得三杯杯各受一升呪之三遍向日以兩手捧水當心面向正東方並脚而立先扣齒鳴天鼓三通乃以口臨水上密誦呪一三五七遍極微微用力乃細細咽之想三咽在左廂下三咽在右廂下三咽處中央下周而復始但是服即作此法咽水服一杯踟蹰消息徐徐

行二十步乃迴更服一杯訖更徐徐行四十步乃迴更飲一杯復行八十步乃止勿煩多飲亦不得少也常燒衆名香至心念佛凡有所證悟境界一切狀貌不得執著乃宜專向人道說此則是初起首服水法柸用桑杯瓦亦得其呪曰

乾元亨利正九種吾生日月與吾并吾復不飢復不渴賴得水以自活金木水火土五星之氣六甲之精三真天倉濁雲上盈黃父赤子守中無傾急急如律令每服皆用此呪呪之三杯杯各三遍乃細緩緩徐徐服之

細服五色水法

經曰白黃黑水服法如前唯有青水一法服滿三七日中思食鬼神遍在身中從人索食當如法與之絶中五穀多食棗栗詐稱鬼親附說人慎勿信之但當以法調和以時及節

服赤水方

赤向生氣所宜之方三杯三呪拱手心念口言誦偈曰金木水火土五精六府一切識藏欲服之時專心注下初服之時如似漿氣三七日如甘露味亦當食棗栗一升七日食蟲漸發三尸亦盛思美飲食遍緣一切世間當發善念相續五七日中二食棗栗水方漸強增長顔色悅懌氣力異常更須加口水當漸少日月漸盈膚體汗穢漸漸剝落眼目精明亦少睡眠心開意解但如法慎護心若不至誠內連六識外爲鬼神侵繞其心念青帝神守護水精五七日脚弱心意不定但當正念重加神司土父神后五藏君名衆邪雜鬼如法而去六七日後獨善解音樂不得禮拜省習誦養氣力勿嗔怒嫉妬勿調氣省睡眠

却鬼呪法

呪曰然摩然摩波悉諦蘇若摩竭狀闍提若夢若想若聰明

易解常用此呪法去之

服水禁忌法

經曰凡服水忌用銅鐵器唯用㘶器初起手時忌陰雲大雨大風大霧天地不明皆凶

凡服水禁陳米臭豉生冷酢滑椒薑一切衆果悉不得食又不得至喪孝産乳之家五辛之氣亦不得聞一切脂膩血食菜茹悉不得食也

凡服水四七日後乃聞琴聲歌嘯悉不得容受資身悅樂音聲博戲皆不得執漸漸通泰以洪大道五色水法皆同於此也世閒之法音聲觸五穀觸喪孝觸産婦觸射利觸善友觸惡人名聞觸惡名觸皆當謹慎之

服水節度法

經曰凡服水七日中漸止酢滑亦漸省食七日滿取棗栗食

經二日後乃更服之二七日後食蟲漸發更食棗栗一升三七日後思食更服栗棗貳升四七日後食蟲思食欲死脚弱不能行步五七日水力漸盈顔色更好氣力異常六七日中能步不止隨意東西七七日中心解異義耳聞異聲必不得貪著義亦有悲欣慈旨八七日中守尸九七日中尸臭自然遠離不樂世閒五藏諸病悉得除愈十七日中髓腦衆脉皮膚汗類一切悉愈眼目精明心想分別無事不知千日後中表内外以五藏漸縮漸小衆毒不害入精水神漸來附人七年腸化爲筋髓化爲骨火不能燒水不能漂居在水中與水同色在水底與地無異居山澤閒遠視之者獨如山雷此服黄黒水法用水法井泉清流悉得用之 雷字疑

服水大例法

經曰凡服水以死爲期必得無疑信因信果正眞其心聞法

歡喜不生疑惑

又曰凡服水訖男先舉左足向陽左行女先舉右足向陰右行男奇女偶

凡服水法

立飲之不得坐飲欲細細而緩不得麤麤而急杯受壹升每一服必三杯服輒一迴徐行三杯三廻若少兼食者杯受一升如是三杯

凡服水上行一百三十步中行一百二十步下行六十步水重難得氣力善將其宜而不失其所者一百日水定周年水盈四十年氣二百倍遊形自在高原陸地與水等無差異顔色皎然四十年腸化為筋髓化為骨

凡服水八十以下十歲以上皆得服之若小者當加棗栗棗栗法上根者從初七至四七止中根者從初七至八七止下根者從初七至十七乃至十七十二七止後有中下根者一周晬將補乃始休息

上利根之人一服如甘露中根之人再服如甘露下根之人四服如甘露極下根者六服如甘露上利根者一服二七日中根者過七日乃至十日下根者服日再服七日

又有上利根者延日二倍中利根者延日一倍下利根者纔不當日

又有上品人脩戒定過去業強中品人見在脩業強下品人以死為期必得無疑信向三寶

中根有三品中上品當聞知此寶法欲長年服大升一石二石即得不死中中品脩習其行比智殖業當服此藥廣行誓願中下品少有嫉妬及以憧慢亦具五蓋三毒起罪心因國土荒亂人民饑饉刀兵劫起思服此藥以免

下根有三品睡眠無覺想不善音樂亦翫博戲又無聰惠瞪瞢不了須人敎呵中品人小復遠人下品人居大深山乃得服耳

千金翼方卷第十三

千金翼方卷第十四

退居

論曰人生一世甚於過隙役役隨物相視俱盡不亦哀乎就中養衛得理必免夭橫之酷若知進而不知退知得而不知喪嗜慾煎其內權位牽其外其於過分內熱之損胡可勝言況乎身滅覆宗之禍不絕於世哉今撰退居養志七篇庶無禍敗夭橫之事若延年長生則存乎別錄高人君子宜審思之

擇地第一

山林深遠固是佳境獨往則多阻數人則喧雜必在人野相近心遠地偏背山臨水氣候高爽土地良沃泉水清美如此得十畝平坦處便可構居若有人功可至二十畝更不得廣廣則營為關心或似產業尤為煩也若得左右映帶岡阜形勝最為上地地勢好亦居者安非他望也

締剏第二

看地形向背擇取好處立一正屋三間內後牽其前梁稍長
柱令稍高椽上著棧棧訖上著三四寸泥泥令平待乾即以
瓦蓋之四面築墻不然塹壘務令厚密泥飾如法須斷風隙
拆縫門牕依常法開後門若無瓦草蓋令厚二尺則冬溫夏
涼於簷前西間作一格子房以待客客至引坐勿令入寢室
及見藥房恐外來者有穢氣損人壞藥故也若院外置一客
位最佳堂後立屋兩間每間為一房修泥一準正堂門令牢
固一房著藥藥房更造一立櫃高脚為之天陰霧氣櫃下安
少火若江北則不須火也一房著藥器地上安厚板板上安
之著地土氣恐損正屋東去屋十步造屋三間脩飾準上二
間作廚北頭一間作庫庫內東牆施一棚兩層高八尺長一
丈濶四尺以安食物必不近正屋近正屋則恐煙氣及人兼

慮火燭尤宜防慎於廚東作屋二間弟子家人寢處於正屋
西北立屋二間通之前作格子充料理曬暴藥物以籬院隔
之又於正屋後三十步外立屋二間椽梁長壯柱高間闊以
安藥鑪更以籬院隔之外人不可至也西屋之南立屋一間
引簷中隔著門安功德充念誦入靜之處中門外水作一池
可半畝餘深三尺水常令滿種芰荷菱芡繞池岸種甘菊既
堪採食兼可閱目怡閑也

服藥第三

人非金石況犯寒熱霧露既不調理必生疾癘常宜服藥辟
外氣和藏府也平居服五補七宣丸鍾乳丸量其性冷熱虛
實自求好方常服其紅雪三黃丸青木香丸理中丸神明膏
陳元膏春初水解散天行茵蔯丸散皆宜先貯之以防疾發
忽有卒急不備難求臘日合一劑烏膏楸葉膏以防癰瘡等

若能服食尤是高人世有偶學合鍊又非眞好或身嬰朝紱
心迫名利如此等輩亦何足言今退居之人豈望一不死羽化
之事但免外物逼切庶幾全其夭年然小小金石事又須閑
解神精丹防危救急所不可闕耳伏火丹砂保精養魂尤宜
長服伏火石硫黃救脚氣除冷癖理腰膝能食有力小還丹
愈疾去風伏火磁石明目堅骨火鍊白石英紫石英療結滯
氣塊強力堅骨伏火水銀壓熱鎮心金銀膏養精神去邪氣
此等方藥固宜留心功力各依本草其餘丹火以冀神助非
可卒致有心者亦宜精懇儻遇其眞

飲食第四

身在田野尤宜備贍須識罪福之事不可爲食損命所有資
身在藥菜而已料理如法殊益於人枸杞甘菊朮牛膝苜蓿
商陸白蒿五加服石者不宜喫商陸以上藥三月已前苗嫩
時採食之或煮或虀或炒或否悉用土蘇鹹豉汁加米等色
爲之下飯甚良蔓菁作虀最佳不斷五辛者春秋嫩韭四時
採薤甚益蒜雖擁熱甚益氣力但不可多食致令悶憒料理
有法節而食之白沸餺飥蒸餅及糕索餅起麪等法在食經
中白粳米白粱黃粱青粱米常須貯積支料一年炊飯煑粥
亦各有法並在食經中菉豆紫蘇烏麻亦須宜貯俱能下氣
其餘豉醬之徒食之所要皆須貯蓄若肉食者必不得害物
命但以錢買猶愈於殺第一戒愼勿殺若得肉必須新鮮似
有氣息則不宜食爛藏損氣切須愼之戒之料理法在食經

中食後將息法

平旦點心飯訖即自以熱手摩腹出門庭行五六十步消息
之中食後還以熱手摩腹行一二百步緩緩行勿令氣急行
訖還牀偃臥四展手足勿睡頃之氣定便起正坐喫五六顆

蘇煎棗㕮半升以下人參茯苓甘草等飲覺似少熱即㕮麥門冬竹葉茅根等飲量性將理食飽不得急行及飢不得大語遠喚人嗔喜卧睡覺食散後隨其事業不得勞心勞力覺肚空即須索食不得忍飢必不得食生硬粘滑等物多致霍亂秋冬間暖裹腹腹中微似不安即服厚朴生薑等飲如此將息必無橫疾

養性第五

雞鳴時起就卧中導引導引訖櫛漱即巾巾後正坐量時候寒温喫點心飯若粥等若服藥者先飯食服喫藥酒消息訖入靜燒香靜念不服氣者亦可念誦洗雪心源息其煩慮良久事訖即出徐徐步庭院間散氣地濕即勿行但屋下東西步令氣散家事付與兒子不得關心所營退居去家百里五十里但時知平安而已應緣居所要並令子弟支料頓送勿令數數往來憒鬧也一物不得在意營之平居不得嗔不得大語大叫大用力飲酒至醉並爲大忌四時氣候和暢之日量其時節寒温出門行三里二里及三百二百步爲佳量力行但勿令氣乏氣喘而已親故鄰里來相訪問攜手出遊百步或坐量力宜談笑簡約其趣纔得歡適不可過度耳人性非合道者焉能無悶悶則何以遣之還須蓄數百卷書易老莊子等悶來閱之殊勝悶坐衣服但麁麁縵可禦寒暑而已第一勤洗浣以香霑之身數沐浴務令潔淨則神安道勝也浴法具養生經中所將左右供使之人或得清淨弟子精選小心少過謙謹者自然事閑無物相惱令人氣和心平也凡人不能絕嗔得無理之人易生嗔喜妨人道性

種造藥第六

種枸杞法

揀好地熟斸加糞訖然後逐長開壟深七八寸令寛乃取枸杞連莖剉長四寸許以草為索慢束束如羹椀許大於壟中立種之每束相去一尺下束訖別調爛牛糞稀如麪糊灌束子上令滿減則更灌然後以肥土擁之滿訖土上更加熟牛糞然後灌水不久即生乃如剪韭法從一頭起首割之得半畝料理如法可供數人其割時與地面平高留則無葉深翦即傷根割仍避熱及雨中但早朝為佳

又法

但作束子作坑方一尺深於束子三寸即下束子訖著好糞滿坑填之以水澆糞下即更著糞填以不減為度令糞上束子一二寸即得生後極肥數鋤擁每月加一糞尤佳

又法

但畦中種子如種菜法上糞下水當年雖瘦二年以後悉肥勿令長苗即不堪食如食不盡即翦作乾菜以備冬中常使如此從春及秋其苗不絕取甘州者為真葉厚大者是有刺葉小者是白棘不堪服食慎之

又法

枸杞子於水盆挼令散訖暴乾斸地作畦畦中去却五寸土勾作壟縛草作稕以臂長短即以泥塗稕上令遍以安壟中即以子布泥上一面令稀稠得所以細土蓋上令遍又以爛牛糞蓋子上令遍又布土一重令與畦平待苗出時時澆溉及堪採即如翦韭法更不要煑鍊每種用二月初一年但五度翦不可過此也凡枸杞生西南郡谷中及甘州者其子味過於蒲桃今蘭州西去鄯城靈州九原並多根莖尤大

種百合法

上好肥地加糞熟斸訖春中取根大者擘取瓣於畦中種如蒜法五寸一瓣種之直作行又加糞灌水苗出即鋤四邊絶令無草春後看稀稠得所稠處更别移亦得畦中乾即灌水三年後甚大如芋然取食之又取子種亦得或一年以後二年以来始生甚遲不如種瓣

種牛膝法

秋間收子至春種如種菜法上加糞水澆苗出堪採即如翦韭法常須多留子秋中種亦好其收根者别留子取三畝肥地熟耕更以長鍬深掘取其土虛長也土平訖然下子荒即芸旱則澆至秋子成髙刈取莖收其子九月末間還用長鍬深掘取根如法料理

種合歡法 萱草也

移根畦中稀種一年自稠春翦苗食如枸杞夏秋不堪食

種車前子法

收子春中取土地加糞熟斸水澆翦取如上法此物宿根但芸灌而已可數歲也

種黃精法

擇取葉叅差者是真取根擘破稀種一年以後極稠種子亦得其苗甚香美堪喫

種牛蒡法

取子畦中種種時乘雨即生若有水不要候雨也地須加糞灼然肥者旱即澆水翦如上法菜中之尤吉但多種食苗及根並益人

種商陸法

又取根紫色者白色者良赤及黄色者有毒根擘破畦中作行種種子亦得根苗並堪食色紫者味尤佳更勝白者

淨洗熟蒸不用灰汁煑鍊並無毒尤下諸藥服丹砂乳石
等人不宜服
種五加法
取根深掘肥地二尺埋一根令沒舊痕甚易活苗生從一
頭剪取每剪訖鋤土擁之
種甘菊法
移根最佳若少時折取苗乘雨中濕種便活一年之後子
落遍地長服者及冬中收子剪如韭法
種苜蓿法
老圃多解但肥地令熟作壠種之極益人還須從一頭剪
每一剪加糞鋤土擁之
種蓮子法
又八月九月取堅黑子瓦上磨尖頭直令皮薄取墐土作
熟泥封如三指大長二寸使帶頭兼重令磨須尖泥欲乾
時擲置池中重頭向下自能周正薄皮上易生數日即出
不磨者卒不可生
種藕法
春初掘取根三節無損處種入深泥令到硬土當年有花
種青蘘法 即胡麻苗也
取八稜者畦中如菜法種之苗生採食秋閒依此法種之
甚滑美
種地黃法
十二月耕地至正月可止三四遍細把訖然後作溝溝闊
一尺兩溝作一畦畦闊四尺其畦微高而平硬甚不受雨
水苗未生閒得水即爛畦中又撥作溝溝深三寸取地黃
切長二寸種於溝中訖即以熟土蓋之其土可厚三寸以

上每種一畝用根五十斤蓋土訖即取經冬爛穰草覆之候稍芽出以火燒其草令燒去其苗再生者葉肥茂根葉益壯自春至秋凡五六遍芸不得用鋤八月堪採根至冬尤佳至時不採其根大盛春二月當宜出之若秋採訖至春不須更種其種生者猶得三四年但採訖耙之明年耨芸而已參驗古法此為最良按本草二月八月採殊未窮物性也八月殘葉猶在葉中精氣未盡歸根二月新葉已生根中精氣已滋於葉不如正月九月採殊妙又與蒸暴相宜古人云二月八月非為種者將謂野生當須見苗耳若食其葉但露散後摘取傍葉勿損中心正葉甚益人勝諸菜

造牛膝法

八月中長鍬掘取根水中浸一宿密置篩中手挼去上皮齊頭暴令稍乾壓令直即作束子又暴令極乾此者端正若自用者不須去皮但洗令淨便暴殊有氣力

造乾黃精法

九月末掘取根揀取肥大者去目熟蒸微暴乾又蒸暴乾食之如蜜可停

造生乾地黃法

地黃一百斤揀擇肥好者六十斤有鬚者去之然後淨洗漉乾暴三數日令微皺乃取揀退四十斤者淨洗漉乾於柏木臼中熟擣絞取汁汁如盡以酒投之更擣絞即引得餘汁盡用拌前六十斤乾者於日中暴乾如天陰即於通風處薄攤之夜亦如此以乾為限此法比市中者氣力數倍頗取汁恐損隨日擣絞用令當日盡佳

造熟乾地黃法

斤數揀擇一準生法浸訖候好晴日便早蒸之即暴於日

中夜置汁中以物蓋之明朝又蒸古法九遍止今但看汁盡色黑熟蒸三五遍亦得每造皆須春秋二時正月九月緣冷寒氣方可宿浸二月八月拌而蒸之不可宿浸也地黃汁經宿恐醋不如日日擣取汁用凡暴藥皆須以牀架上置薄簟等以通風氣不然日氣微弱則地氣止津也於漆盤中暴最好簟多汗又損汁

藕粉法

取麤藕不限多少灼然淨洗截斷浸三宿數換水看灼然淨洗漉出碓中碎擣絞取汁重擣絞取濃汁盡爲限即以密布濾麤惡物澄去清水如稠難澄以水攪之然後澄看水清即瀉去一如造米粉法

雞頭粉取新熟者去皮熟擣實如上法

菱角粉去皮如上法

葛根粉去皮如上法開胃口止煩熱也

蒺藜粉擣去上皮簸取實如上法此粉去風輕身

茯苓粉剉如彈子以水浸去赤汁如上法

栝樓根粉去皮如上法

種樹法須望前種十五日後種少實

種杏法

杏熟時并肉核埋糞中凡薄地不生生且不茂至春生後即移實地栽之不移即實小味苦樹下一歲不須耕耕之即肥而無實也

種竹法

欲移竹先掘坑令寬下水調細土作泥如稀煎餅泥即掘竹須四面鑿斷大作土科連根以繩周下拌舁之勿令動著竹動則損根多不活掘訖舁入坑泥中令泥周匝搦滿

如泥少更添土著水以物勻攪令實其竹根入坑不得埋過本根若竹稍長者以木深埋入土架縛之恐風搖動即死種樹亦如此竹無時樹須十二月以後三月以前宜去根尺五寸留栽來年便生笋泥坑種動搖必不活

種梔子法

臘月折取枝長一尺五寸以來先鑿坑一尺闊五寸取枝屈下拗處如毬杖却向上令有葉處坑向上坑口出五寸一邊約著土實訖即下肥土實築灼然堅訖自然必活二年間即有子

作籬法

於地四畔掘坑深二尺闊二尺坑中熟斸酸棗熟時多收取子坑中穊種之生後護惜勿令損一年後高三尺間去惡者一尺以下留一莖稀稠行伍端直來春剝去橫枝留距一不留距恐瘡大至冬凍損剝訖編作笆籬隨宜夾縛務令緩密明年更編高七尺便定種榆柳並同法木槿木芙蓉更堪看

種枳法

秋收取枳實破作四片於陰地熟斸加糞即稠種之至春生隔一冬高一尺然後移栽每一尺種一栽至高五尺以物編之甚可觀也

雜忌第七

屋宇宅院成後不因崩損輙有脩造及妄動土二尺以下即有土氣慎之為佳初造屋成恐有土木氣待泥乾後於庭中醮祭訖然後擇良日入居居後明日燒香結界發願願心不退轉早悟道法成功德藥無敗壞結界如後平旦以清水漱口從東南方左轉誦言堅沙迦羅又到西南角言你自受殃

又從東南角言緊沙迦羅又到西南角言你自受殃一一如是滿七遍盜賊皆便息心不能爲害矣或入山野亦宜作此法或在道路逢小賊作障難即定心作降伏之意呪言緊沙迦羅緊沙迦羅一氣盡爲度亦自壞散也此法秘妙是釋門深秘可以救護衆生大慈悲故不用令孝子弋獵魚捕之人入宅不用輙大叫喚每栽樹木量其便利不須等閑漫種無益柴炭等並年支不用每日令人出入門巷惟務寂然論曰看此論豈惟極助生靈亦足以誡於貪榮之士無敗禍之釁庶忠義烈士味之而知止足矣

千金翼方卷之十四

千金翼方卷第十五

補益

敘虛損論第一

論曰凡人不終眉壽或致夭殁者皆由不自愛惜竭情盡意邀名射利聚毒攻神內傷骨髓外敗筋肉血氣將亡經絡便壅皮裏空疎惟招蠹疾正氣日衰邪氣日盛不異舉滄波以注爝火頹華嶽而斷涓流語其易也又甚於此然疾之所起生自五勞五勞既用二藏先損心腎受邪腑藏俱病故彭祖論別牀異被之戒李耳陳黃精鉤吻之談斯言至矣洪濟實多令具錄來由并貫病狀庶智者之察微防未萌之疾也五勞者一曰志勞二曰思勞三曰心勞四曰憂勞五曰疲勞即生六極一曰氣極氣極令人內虛五藏不足外受邪氣多寒濕痺煩滿吐逆驚恐頭痛二曰血極血極令人無色澤恍惚

喜忘善驚少氣舌強喉乾寒熱不嗜食苦睡眩冒喜瞋三曰
筋極筋極令人不能久立喜倦拘攣腹脹四肢筋骨疼痛四
曰骨極骨極令人酸削齒不堅牢不能動作厥逆黄疸消渴
癰腫疽發膝重疼痛浮腫如水狀五曰精極精極令人無髮
髮膚枯落悲傷喜忘意氣不行六曰肉極肉極令人發疰如
得擊不復得言甚者致死復生七傷者一曰陰寒二曰陰痿
三曰裏急四曰精連連而不絶五曰精少囊下濕六曰精清
七曰小便苦數臨事不卒名曰七傷七傷爲病令人邪氣多
正氣少忽忽喜忘而悲傷不樂奪色黧黑飲食不生肌膚色
無潤澤髮白枯槁牙齒不堅目黄淚出遠視䀮䀮見風淚下
咽焦消渴鼻衄唾血喉中介介不利胷中噎塞食飲不下身
寒汗出肌肉痠痟四肢沉重不欲動作膝脛苦寒不能遠行
上重下輕久立腰背苦痛難以俛仰繞臍急痛飢則心下虛
懸脣乾口燥腹裏雷鳴胷背相引痛或時嘔逆不食或時變
吐小便赤熱乍數時難或時傷多或如針刺大便堅澀時泄
下血身體瘙癢陰下常濕黄汗自出陰痿消小臨事不起精
清而少連連獨泄陰端寒冷莖中疼痛小便餘瀝卵腫而大
縮入腹中四肢浮腫虛熱煩疼乍熱乍寒臥不安席心如杵
舂驚悸失脉呼吸乏短時時惡夢夢與死人共食入塚此由
年少早娶用心過差接會汗出藏皆浮滿當風臥濕久醉不
醒及墜車落馬僵仆所致也故變生七氣積聚堅牢如杯留
在腹内心痛煩冤不能飲食時来時去發作無常寒氣爲病
則吐逆心滿熱氣爲病則恍惚悶亂長如眩冒又復失精喜
氣爲病則不能疾行不能久立怒氣爲病則上氣不可當熱
痛上衝心短氣欲死不能喘息憂氣爲病則不能苦作卧不
安席恚氣爲病則聚在心下不能飲食愁氣爲病則平居而

忘置物還取不記處所四肢浮腫不能舉止五勞六極力乏
氣畜變成寒熱氣疰發作有時受邪為病凡有十二種風風
入頭則耳聾風入目則遠視䀮䀮風入肌膚則身體癮瘮筋
急風入脈則動上下無常風入心則心痛煩滿悸動喜腹䐜
脹風入肺則欬逆短氣風入肝則眼視不明目赤淚出發作
有時風入脾則脾不磨腸鳴脇滿風入腎則耳鳴而聾脚疼
痛腰尻不隨甚者不能飲食入膽則眉間疼痛大小便不利
令人疼痺五勞六極七傷七氣積聚變為病者甚則令人得
大風緩急濕痺不仁偏枯筋縮四肢拘攣關節隔塞經脉不
通便生百病羸瘦短氣令人無子病欲及人便即夭逝勞傷
血氣心氣不足所致也若或觸勞風氣則令人角弓反張舉
身皆動或眉鬚頻落惡氣腫起魂去不足夢與鬼交通或悲
哀不止恍惚恐懼不能飲食或進或退痛無常處至此為療

不亦難乎十二種風二元不足

大補養第二 論一首 方八首

論曰病患已成即須勤於藥餌所以立補養之方此方皆是五石三石大寒食丸散等藥自非虛勞成就偏枯著牀惟向死近無所控告者乃可用之斯誠可以起死人耳平人無病不可造次著手深宜慎忌

張仲景紫石寒食散治傷寒已愈不復方

紫石英 白石英 赤石脂 鍾乳錬 栝樓根
防風 桔梗 文蛤 鬼臼 太一餘粮各貳兩半
人參 乾薑 附子炮去皮 桂心各壹兩

右壹拾肆味擣篩為散酒服三方寸匕

損益草散 常用之佳主男子女人老少虛損及風寒毒冷下痢癖飲欬嗽消穀助老人胃氣可以延年又主霍亂酒服二

方寸匕愈又主衆病休息下痢垂命欲死服之便差治人最爲神驗方

人參 附子炮去皮 乾薑 桂心各伍分

防風壹兩半 牡蠣熬各參分 黃芩 細辛各參分 桔梗

椒去目閉口者汗 茯苓 秦艽 白朮各壹兩

右壹拾參味各擣篩爲散更秤如分乃合之治千杵旦以温酒服方寸匕老人頻服三劑良兼主虚勞

草寒食散 治心腹脇下支滿邪氣衝上又心胷喘悸不得息腹中漉漉雷鳴吞酸噫生食臭食不消化時洩時閉心腹煩悶不欲聞人聲好獨臥常欲得熱恍惚喜忘心中怵惕如恐怖狀短氣嘔逆腹中防響五藏不調如此邪在於內而作衆病皆生於勞苦若極意於爲樂從風寒起治之皆同服此藥旦未食時以淳美酒服二方寸匕不耐者減之去巾帽薄衣、

力行方

鍾乳鍊 附子炮去皮 栝樓根 茯苓 牡蠣各壹分熬

桔梗 乾薑 人參 防風各壹兩 細辛

桂心各伍分 白朮參兩半

右壹拾貳味各擣篩治千杵以酒服之二匕建日服之至破日止周而復始

又方說狀所主同前

鍾乳鍊粉 人參 茯苓 附子炮各參分 栝樓根

牡蠣熬 細辛各半兩 乾薑 桂心各伍分 白朮

防風 桔梗各壹兩

右壹拾貳味擣篩爲散服之一如前方有冷加椒有熱加黃芩各參分

大草烏頭圓 主寒冷虛損五十年心腹積聚百病邪氣往來

厥逆搶心痺頑羸瘦骨立不能食破積聚方

烏頭拾伍分炮去皮　人參伍分　生薑貳兩　前胡
蜀椒去目閉口者汗　黄芩　白朮　半夏洗
黄連　吳茱萸　龍骨　白頭翁　乾薑
細辛　桔梗　紫菀　芎藭　厚朴炙
女萎　礬石燒　桂心　甘草炙各壹兩

右貳拾貳味擣篩爲末鍊蜜和圓如梧子大酒服拾圓日三夜一以知爲度

草烏頭圓　破積聚治積結冷聚陽道弱大便有血婦人産後出血不止方

烏頭拾伍分炮去皮　大黄　乾薑　厚朴炙
吳茱萸　芍藥　前胡　芎藭　當歸
細辛　桂心各伍分　蜀椒叁分去目閉口者汗　白薇半兩
黄芩　白朮　人參　紫菀　甘草炙各壹兩

右壹拾捌味擣篩爲末鍊蜜和圓如梧子大酒服拾圓日叁服漸漸加之

大理中露宿圓　主風勞四十年癖絶冷幷主欬逆上氣方

人參　桂心　吳茱萸　烏頭炮去皮　礬石燒等分

右伍味擣篩爲末鍊蜜和圓如梧子大酒服三圓日再以知爲度

匈奴露宿圓　主毒冷方

礬石燒　桔梗　皂莢炙去皮子　乾薑　附子炮去皮
吳茱萸等分

右陸味擣篩爲末鍊蜜和丸如梧子大飲服叁圓日再稍加以知爲度

解散發動第三　論一首　方二十五首　與第一十二卷通

論曰既得藥力諸病併遣石忽發動須知解方故次立解散方焉一一依其診候而用之萬不失一夫脉或洪或實或斷絶不足欲似死脉或細數或弦駃其所犯非一故也脉無常投醫不能識也熱多則弦駃有澼則洪實急痛則斷絶凡寒食藥熱率常如是自無所苦非死候也動從節度則不死矣不從節度則死矣欲服散者宜診脉審正其候爾乃畢愈脉沉數者難發難發當數下之脉浮大者易發也人有服散兩三劑不發者此人脉沉難發發不令人覺藥勢已行不出形於外但以藥治於內欲候知其力人進食多一候也顏色和悅二候也頭面身體瘙癢三候也濇濇惡風四候也厭厭欲寐五候也諸有此證候者皆藥內發五藏但如方法服藥宜數下之內虛自當發也

人參湯 主散發諸氣逆心腹絞痛不得氣息命在轉燭方

人參　枳實炙　甘草炙　栝樓根各玖分　乾薑

白朮各壹兩半

右陸味㕮咀以水玖升煑取三升分三服若短氣者稍稍數服無苦也能如方者佳冬月溫食宵腹熱者便冷食夏月冷食以水服藥冷食過多腹冷者作湯即自解便止

鴨通湯 主散發熱攻胷背嘔逆煩悶臥輙大睡乘熱覺四肢不快寒熱往來大小便難方

白鴨通新者　大黃貳兩　石膏碎　知母各壹兩　豉壹升

麻黃叁兩去節　葱白貳柒莖　梔子仁貳拾枚　黃芩壹兩半　甘草叁分炙

右壹拾味㕮咀以湯壹斗貳升淋鴨通乃以汁煑藥取三升半去滓然後內豉更煑三沸去豉未食前服一升

治氣湯 主散家患氣不能食若氣逆方

人參　茯苓　桂心　厚朴炙　半夏洗

甘草炙各壹兩 麥門冬去心 生薑各叁兩切 大棗貳拾枚擘

右玖味㕮咀以水捌升煑取貳升陸合分服柒合

主散發頭欲裂眼疼欲出惡寒骨肉痛狀如傷寒皐中清涕出方

以香豉五升熬令煙出以酒壹斗投之濾取汁任性飲多少欲令小醉便解更飲之取解爲度亦主時行寒食散發或口噤不可開腸滿脹急欲決此久坐温衣生食所爲皇甫云口不開去齒下此酒五合熱飲之須史開能者多飲至醉益佳不能者任性腹脹滿不通導之令下

善服散家痰飲心胷客熱悶者吐之方

甘草伍兩生用

右壹味㕮咀以酒五升煑取二升半空腹分再服之服别相去如行伍六里快吐止

主散發黃肓中熱氣悶方

胡荽壹把切

右壹味以水柒升煑取貳升半分再服便愈如不差更作亦主通身發黃者濃煑大黃葉令温自洗漬尤良并主熱毒及胷中毒氣相攻若不盡復煩悶或痛飲如故亦主新熱下痢

解散主諸石熱毒方

白鴨通伍升新者

右壹味湯壹斗漬之澄清候冷飲之任性多少以差爲度

三黃湯 主解散發腹痛脹滿卒急方

大黃 黃連 黃芩各叁兩

右叁味㕮咀以水柒升煑取三升分爲三服一方作九

散發時行兼有客熱下血痢不止而煩者黃連湯方

黃連 黃蘗各肆兩 梔子拾伍枚擘 阿膠壹兩炙 乾薑

芍藥 石榴皮各貳兩方用壹枚實

右柒味㕮咀以水壹斗煮取三升分三服一方以水六升煮之

乳石發頭痛寒熱胷中塞日晡手足煩疼方

生麥門冬肆兩去心 葱白切半斤 豉三升

右叁味熟湯捌升煮取三升分三服

散發虛羸不能食飲大便不通調藏腑方

麥門冬去心 黃芩 人參各貳兩 竹筎壹升 大棗拾肆枚擘

茯神 半夏洗 生薑切 甘草各叁兩炙 桂心半兩

右壹拾味㕮咀以水壹斗煮取叁升分三服

散發四肢腫方

甘遂壹兩 木防已 茯苓 人參 白朮各叁

麻黃貳兩去節 甘草壹兩半炙

右柒味㕮咀以水柒升煮取二升捌合分三服

散發口瘡方

龍膽叁兩 子蘗肆兩 黃連貳兩 升麻壹兩

右肆味㕮咀以水四升先煮龍膽黃連取二升別取子蘗

冷水淹浸投湯中令相得絞取汁熱含冷吐差止

散發如淋熱方

葵子叁升 茯苓 大黃 通草各叁兩 葱白半莖

當歸 石韋去毛 芒消各貳兩 桂心壹兩

右玖味㕮咀以水壹斗煮葵子取六升去滓內藥更煮取

叁升去滓內芒消更煮一沸令消盡分爲四服日三夜一

散發大便秘澀不通方

大黃肆兩 桃仁叁拾枚去皮尖雙仁碎

右貳味切以水陸升煮取貳升分再服

又大便不通方

生地黃汁五合 大黃 甘草炙各半兩

右叁味㕮咀以水叁升煑取壹升下地黃汁又煑三沸分二服

單服硫黃發爲瘡方

以大醋和豉研熟如膏以塗瘡上燥輒易之甚良

礜石發亦作瘡狀如癩子紫石多發於腹背或著四肢宜以酥摩便差仍用薺苨湯方

薺苨 麥門冬去心各叁兩 乾薑叁兩半 麻黃去節

人參 黃芩 桔梗 甘草炙各貳兩

右捌味㕮咀以水玖升煑取叁升分三服從旦至晡乃盡日日合服以差爲度非但礜石凡諸石發皆用此方

散發痢血方

黃連 乾薑各叁兩 黃芩半兩 鹿茸貳兩 瓜子壹升

芍藥 芎藭 生竹皮 桂心 甘草炙各壹兩

右壹拾味以水壹斗煑竹皮取捌升去滓內藥煑取貳升分三服一日盡

蘄邵大黃圓 主寒食散成痰飲澼水氣心痛百節俱腫方一名細丸

大黃 葶藶熬 豉各壹兩 巴豆去心皮熬 杏仁去皮尖雙仁熬各叁拾枚

右伍味各擣大黃豉爲末別擣巴豆杏仁如脂鍊蜜相和令相得又更擣壹阡杵空腹以飲服如麻子一丸日再不知增至貳圓強人服丸如小豆大

消石大圓 主男子女人驚厥口乾心下堅羸瘦不能食喜臥墜墮血瘀久欬上氣胷痛足脛不仁而冷少腹滿而痛身重目眩百節疼痛上虛下實又主女人乳餘疾帶下五藏散癖伏熱大如桃堅腫在心下胷中津液內結浮腫膝寒蠱毒淫

躍苦瀉大虗等方

消石拾貳兩熬　蜀椒壹升貳合去目閉口汗　水蛭壹百枚熬

䗪蟲貳兩半去翅足熬　大黃壹斤　茯苓陸兩　柴胡捌兩去苗

芎藭伍兩　蠐螬叁拾枚熬

右玖味擣篩爲末鍊蜜和更擣萬杵圓如梧子大空腹以飲服伍圓日三服五日進十丸此皆不下自此以後任意加之一日可數十丸與羊臛自補若利當以盆下之勿於圊尤慎風冷若女人月經閉加桃仁三十枚去皮尖雙仁熬一方以酒服十伍丸日二不知可稍增當下如豆汁長蟲腹中有病皆除

解散雷氏千金丸方

消石叁分熬　大黃肆兩　巴豆壹分去心皮熬

右叁味擣篩爲末鍊蜜和丸如小豆許飲服一丸日二以利爲度

細辛圓主散發五藏六腑三焦冷熱不調痰結胷中強飲百處不安久服強氣方

細辛　杏仁去皮尖雙仁熬　澤瀉　乾薑　白朮

茯苓　桂心　甘草炙各貳兩　附子炮去皮　蜀椒去目閉口者汗

附子炮去皮　大黃　木防己各伍分　芫花　甘遂各壹兩

右壹拾伍味各擣篩爲末別治杏仁如脂合擣百杵鍊白蜜和更擣五千杵丸如梧子大以酒服貳丸日再服不能者如大豆二丸以知爲度散家困於痰澼服藥患困者參服此丸暨相發助又不令越逸消飲去結澼令胷膈無痰無逆寒之患又令人不眩滿迷悶

大青圓主積年不解不能食羸瘦欲死方

大青　麥門冬去心　香豉各肆兩　石膏研　葶藶子熬

梔子　栝樓根　枳實炙　芍藥　知母

茯苓　大黃　黃耆　黃芩　甘草貳兩略

右壹拾伍味擣篩爲末鍊蜜和丸如梧子大以飲服五丸日二九五日不知則更服之以知爲度

下藥法

凡散數發熱無賴當下去之諸丹及金石等用此方下之黍米叁升作糜以成煎猪脂一斤合和之使熟宿不食明旦早食之令飽晚當下藥随下出神良下藥盡者後不復發若發更服之

又方

肥猪肉伍斤　葱白　薤白各半斤

右叁味合煑之旦不食噉之一頓令盡爲度

壓藥發動數數患熱用求下却之方

取猪腎脂勿令中水盡取以火炙之承取脂適寒温一服二三合一日一夜可五六升藥稍稍随大便去甚良

又方

肥猪肉作臛一升調和如常法平旦空腹一頓食之須臾間腹中雷鳴鳴定便下藥随下出以器承取以水淘汰取石不盡更作如前服之

凡散發瘡腫膏方

生胡粉　蕪菁子熬別擣　杏仁去皮尖雙人別擣　黃連擣末

水銀　猪脂

右陸味並等分惟水銀倍之以脂和研令相得更以水銀治瘡上日三

有發赤腫者當摩之以膏方

生地黃伍兩　大黃壹兩　杏仁貳拾枚去皮尖兩仁　生商陸根貳兩

右肆味切以醋漬一宿以猪脂一升煎商陸黑去滓膏成

日三摩之

散發有生細瘡者此藥主熱至捷方

黃連　芒消 各伍兩

右貳味以水捌升煑黃連取四升去滓內芒消令烊以布塗貼著上多少皆著之

洗瘡湯方

黃連　黃芩　苦參 各捌兩

右叁味切以水三斗煑取一斗去滓極冷乃洗瘡日三

治發瘡痛癢不可堪忍方

取冷石擣下篩作散粉之日五六度乃燥瘡中自淨無不差良

凡服散之後身體浮腫多是取冷所致宜服檳榔湯方

大檳榔 叁拾伍枚

右壹味先出子擣作末細篩然後㕮咀其皮以湯柒升煑取貳升內子末分爲再服服盡當下即愈

解散大麥𪍿方

取大麥炒令汗出燥便止勿令太焦舂去皮淨淘蒸令熟暴乾熬令香細末絹下以冷水和服三方寸匕日再有赤腫者當摩之入蜜亦佳

補五藏第四 方四十五首

補心湯 主心氣不足驚悸汗出心中煩悶短氣喜怒悲憂悉不自知咽喉痛口脣黑嘔吐舌本強水漿不通方

紫石英　紫蘇　茯苓　人參　當歸

茯神　遠志 去心　甘草 炙各貳兩　赤小豆 五合　大棗 叁拾枚擘

麥門冬 壹升去心

右壹拾壹味㕮咀以水壹升煑取叁升分四服日二夜一

補心湯主心氣不足多汗心煩喜獨語多夢不自覺喉咽痛
時吐血舌本強水漿不通方

麥門冬叁兩去心 茯苓 紫石英 人參
桂心 大棗叁拾枚擘 赤小豆貳拾枚 紫菀
甘草炙各壹兩

右玖味㕮咀以水捌升煑取貳升伍合分爲三服宜春夏
服之

遠志湯主心氣虛驚悸喜忘不進食補心方

遠志去心 黄耆 鐵精 乾薑 桂心各叁兩
人參 防風 當歸 芎藭 紫石英
茯苓 茯神 獨活 甘草炙各貳兩 五味子叁合
半夏洗 麥門冬各肆兩去心 大棗拾貳枚擘

右壹拾捌味㕮咀以水壹斗叁升煑取叁升伍合分爲伍
服日三夜二

定志補心湯主心氣不足心痛驚恐方

遠志去心 昌蒲 人參 茯苓各肆兩

右肆味㕮咀以水壹斗煑取叁升分叁服

傷心湯主心傷不足腰脊腹背相引痛不能俛仰方

茯苓 遠志去心 乾地黄各貳兩 大棗叁拾枚擘
飴糖壹升 黄芩 半夏洗 附子炮去皮 生薑切
桂心各貳兩 石膏碎 麥門冬各肆兩去心 甘草炙
阿膠炙各壹兩

右壹拾肆味㕮咀以水壹斗伍升煑取三升半去滓內飴
糖阿膠更煎取三升二合分三服

鎮心圓主男子女人虛損夢寐驚悸失精女人赤白注漏或
月水不通風邪鬼疰寒熱往來腹中積聚憂恚結氣諸疾皆

悉主之方

紫石英　茯苓　昌蒲　蓯蓉　遠志去心

麥門冬去心　當歸　細辛　巻柏　乾薑

大豆巻　防風　大黄各伍分　䗪蟲貳拾枚熬　大棗伍拾枚擘

乾地黄三兩　人參　澤瀉　丹參　秦艽各壹兩半

芍藥　石膏研　烏頭炮去皮　柏子仁　桔梗

桂心各參分　半夏洗　白朮各貳兩　鐵精　白歛

銀屑　前胡　牛黄各半兩　署蕷　甘草炙各貳兩半

右參拾伍味擣篩爲末錬蜜及棗膏和之更擣五千杵丸如梧子飲服五丸日三稍稍加至貳拾圓以差爲度

大鎮心圓所主與前方同凡是心病皆悉服之方

乾地黄壹兩半　牛黄伍分　杏仁去皮尖兩仁熬　大棗三拾伍枚

蜀椒去目閉口者汗各三分　桑螵蛸拾貳枚

白歛　當歸各半兩　澤瀉　大豆卷　黄耆

鐵精　柏子仁　前胡　茯苓各壹兩　獨活

秦艽　芎藭　桂心　人參　麥門冬去心

遠志去心　丹參　阿膠炙　防風　紫石英

乾薑　銀屑　甘草炙各壹兩

右貳拾玖味擣篩爲末錬蜜及棗膏和更擣五千杵丸如梧子酒服柒圓日三加至二十九千金有署蕷茯神爲三十一味

補肝湯主肝氣不足兩脇滿筋急不得太息四肢厥寒熱偏癩淋溺石沙腰尻少腹痛婦人心腹四肢痛乳癰膝脛熱轉筋遺溺消渴爪甲青枯口噤面青太息疝瘕上搶心腹中痛兩眼不明悉主之方後面注內貳兩字疑

蕤仁　柏子仁各壹兩　茯苓貳兩半　烏頭炮去皮四枚

大棗參拾枚擘　牛黄、　石膽　桂心各壹兩　細辛

防風　白朮　甘草炙各三兩

右壹拾貳味㕮咀以水壹斗煑取二升八合分三服一方用細辛二兩茯苓二兩強人大棗二十枚無牛黃白朮石膽各壹兩

補肝湯主肝氣不足兩脇下滿筋急不得太息四厥疝瘕上搶心腹痛目不明方

茯苓壹兩肆銖　烏頭肆枚炮去皮　大棗貳拾肆枚擘

蕤仁　柏子仁　防風　細辛各貳兩　山茱萸

桂心各壹兩　甘草捌寸炙中者

右壹拾味㕮咀以水捌升煑取二升分三服常用

瀉肝湯主肝氣不足目暗四肢沉重方

人參　半夏洗　白朮各三兩　生薑陸兩切　細辛壹兩

茯苓　黃芩　前胡　桂心　甘草炙各貳兩

右壹拾味㕮咀以水捌升煑取三升分三服三五日後次

服後湯方

茯苓叁兩　吳茱萸壹兩　大棗叁拾枚擘　桃仁去皮尖及雙仁者

人參　防風　烏頭炮去皮　柏子仁　橘皮

桂心　甘草炙各貳兩

右壹拾壹味㕮咀以水壹斗煑取貳升半分三服千金有細辛貳兩

補肺湯主肺氣不足病苦氣逆胷腹滿欬逆上氣搶喉喉中閉塞欬逆短氣氣從背起有時而痛惕然自驚或笑或歌或怒無常或乾嘔心煩耳聞風雨聲面色白口中如含霜雪言語無聲劇者吐血方

五味子叁兩　麥門冬肆兩去心　白石英貳兩玖銖

粳米叁合　紫菀　乾薑　款冬花各貳兩

桑根白皮　人參　鍾乳研　竹葉切各壹兩

大棗肆拾枚擘　桂心陸兩

右壹拾叁味以水壹斗貳升煑桑白皮及捌升去滓内藥煑取三升分三服

平肺湯 主肺氣虛竭不足乏氣胷中乾口中碎碎乾方

麻黄 去節 橘皮 各貳兩 小麥 壹升

右叁味㕮咀以水伍升煑取壹升半分再服

肺傷湯 主肺氣不足而短氣欬唾膿血不得卧方

人參 生薑 切 桂心 各貳兩 阿膠 炙 紫菀 各壹兩

乾地黄 肆兩 桑根白皮 飴糖 各壹斤

右捌味㕮咀以水壹斗伍升煑桑根白皮貳拾沸去滓内藥煑取貳升伍合次内飴糖令烊分三服

傷中湯 主傷中肺氣不足脇下痛上氣欬唾膿血不欲食惡風目視䀮䀮足脛腫方

生地黄 半斤切 桑根白皮 叁升切 生薑 五累

白膠 伍挺 麻子仁 芎藭 各壹升 紫菀 叁兩 麥種

飴糖 各壹斤 桂心 貳尺 人參 甘草 炙各壹兩

右壹拾貳味㕮咀以水貳斗煑桑根白皮取柒升去滓内藥煑取伍升澄去滓内飴糖煎取三升分爲三服

温液湯 主肺痿涎唾多心中温温液液方

甘草 叁兩

右壹味㕮咀以水叁升煑取壹升半分三服

治肺癰欬胷中滿而振寒脉數咽乾不渴時時出濁唾腥臭久久吐膿如粳米粥者方

桔梗 叁兩 甘草 貳兩

右貳味㕮咀以水三升煑取一升服不吐膿也

補肺散 主肺氣不足胷痛牽背上氣失聲方

白石英 五味子 各伍分 桂心 貳兩 大棗 伍枚擘

麥門冬去心 款冬花 桑白皮 乾薑 甘草炙各壹兩
右玖味擣篩爲散以水壹升煮棗取捌合及熱投一方寸
匕服日三亦可以酒煮以知爲度

補肺圓 主肺氣不足失聲胷痛上氣息鳴方
麥門冬去心 款冬花 白石英 桑根白皮 桂心各貳兩
五味子參合 鍾乳伍分研爲粉 乾薑壹兩 大棗壹伯枚
右玖味擣篩爲末以棗膏和爲圓如梧子大以飲下拾伍
圓日三

瀉肺散 主醉酒勞窘汗出當風胷中少氣口乾喘息胷痛甚
者吐逆致吐血方
款冬花 桂心 附子炮去皮 蜀椒去目閉口者汗
五味子 紫菀 蓯蓉 杏仁去皮尖双仁熬
桃仁去皮尖双仁各五分熬 當歸 續斷 遠志去心

茯苓 石斛各壹兩 細辛 乾薑各壹兩半 百部
甘草炙各貳兩
右壹拾捌味擣篩爲散酒服方寸匕日三

瀉脾湯 主脾藏氣實胷中滿不能食方
茯苓肆兩 厚朴炙肆兩 桂心伍兩 生薑捌兩切 半夏壹十洗去滑
人參 黄芩 甘草炙各貳兩
右捌味㕮咀以水壹斗煮取叁升分三服又主冷氣在脾
藏走在四肢手足流腫亦逐水氣

治脾氣實其人口中淡甘臥憒憒痛無常處及嘔吐反胃並
主之方
大黄陸兩
右壹味破以水陸升煮取壹升分再服又主食即吐并大
便不通者加甘草貳兩煮取貳升半分三服

瀉脾湯主脾氣不足虛冷注下腹痛方

當歸　乾薑　黃連　龍骨　赤石脂

人參各參兩　橘皮　附子炮去皮　秦皮　大黃各貳兩

半夏伍兩洗

右壹拾壹味㕮咀以水壹斗煑取三升一合分四服

補脾湯主不欲食留腹中或上或下煩悶得食輙嘔欲吐已即脹滿不消噫腥臭發熱四肢腫而苦下身重不能自勝方

麻子仁參合　禹餘粮貳兩　桑根白皮壹斤　大棗壹百枚擘

黃連　乾薑　白朮　甘草各參兩炙

右捌味㕮咀以水壹斗煑取半去滓得二升九合日壹服三日令盡老小任意加減

建脾湯主脾氣不調使人身重如石欲食即嘔四肢酸削不收方

生地黃　黃耆　芍藥　甘草各壹兩炙　生薑貳兩

白蜜壹升

右陸味㕮咀以水玖升煑取參升去滓內蜜攪令微沸服捌合日三夜一

柔脾湯主脾氣不足下焦虛冷胷中滿塞汗出脇下支滿或吐血及下血方

乾地黃參兩　黃耆　芍藥　甘草各壹兩炙

右肆味切以酒三升漬之三斗米下蒸以銅器承取汁隨多少服之

溫脾湯主脾氣不足虛弱下痢上入下出方

乾薑　大黃各參兩　人參　附子炮去皮　甘草各貳兩炙

右伍味㕮咀以水捌升煑取貳升半分三服

溫脾湯主脾氣不足水穀下痢腹痛食不消方

半夏肆兩洗　乾薑　赤石脂　白石脂　厚朴炙

桂心各參兩 當歸 芎藭 附子炮去皮 人參
甘草炙各貳兩
右壹拾壹味㕮咀以水玖升煑取三升分三服

瀉脾圓主脾氣不調有熱或下閉塞調五藏治嘔逆食飲方
大黃陸兩 杏仁肆兩去皮尖雙仁熬 蜀椒去目閉口汗
半夏洗 玄參 茯苓 芍藥各參分 細辛
黃芩各半兩 人參 當歸 附子炮去皮 乾薑
桂心各壹兩
右壹拾肆味擣篩爲末鍊蜜和丸如梧子飲服六九日三
增至十圓

瀉脾圓主毒風在脾中流腫腹滿短氣食輙防嘔不消時時
微下方
乾薑 當歸 桂心 葶藶各參分熬 狼毒

大黃 芎藭 蜀椒去目及閉口汗 白薇
附子炮去皮 甘遂 吳茱萸各半兩
右壹拾貳味擣篩爲末鍊蜜和圓如梧子飲服三九日三

大溫脾圓主脾中冷水穀不化脹滿或時寒極方
法麴 大麥糵 吳茱萸各五合 枳實參枚炙
乾薑參兩 細辛參兩 桂心五兩 桔梗參兩 附子炮去皮貳兩
人參 甘草炙各參兩
右壹拾壹味擣篩爲末鍊蜜和圓如梧子酒服柒圓日三
加至拾伍圓

轉脾圓主大病後至虛羸瘦不能食食不消化方
小麥麴肆兩 蜀椒壹兩去目及閉口汗 乾薑 吳茱萸
大黃各參兩 附子炮去皮 厚朴炙 當歸 桂心
甘草炙各貳兩

右壹拾味擣篩爲末鍊蜜和圓如梧子酒服十五圓日三

温脾圓主胃氣弱大腹冷則下痢小腹熱即小便難防嚮腹滿喘氣虛乏乾嘔不得食温中消穀治脾益氣方

法麴　小麥蘖各五合　吳茱萸叁合　枳實叁枚炙

人參　桔梗　麥門冬去心　乾薑　附子炮去皮

細辛各貳兩　桂心　厚朴炙　當歸　茯苓

甘草各叁兩炙

右壹拾伍味擣篩爲末鍊蜜和圓如梧子空腹飲服七丸日三亦可加大黃二兩

平胃湯主胃中寒熱嘔逆胷中微痛吐如豆羹汁或吐血方

阿膠炙　芍藥各貳兩　乾地黃　乾薑　石膏碎

人參　黃芩　甘草各壹兩炙

右捌味㕮咀以水酒各叁升煑取三升分三服

胃脹湯主胃氣不足心氣少上奔胷中憒悶寒冷腹中絞痛吐痢宿汁方

人參壹兩　茯苓　橘皮　乾薑　甘草各貳兩炙

右伍味擣篩爲末鍊蜜和更擣五百杵丸如梧子以水二升銅器中火上煑二十丸一沸不能飲者服一升日三可長將服一名胃服丸又名補藏湯

和胃圓主胃痛悁煩噫逆胷中氣滿腹脇下邪氣寒壯積聚大小便乍難調六腑安五藏導達腸胃令人能食并主女人絕産方

大黃　細辛　黃連　蜀椒去目閉口者汗

皂莢去皮子炙　當歸　桂心各壹分　杏仁去皮尖双仁熬

黃芩各壹兩半　葶藶熬　阿膠炙　芒消各半兩　厚朴貳分炙

甘遂壹兩　半夏伍分洗

右壹拾伍味擣篩爲末鍊蜜和丸如梧子空腹酒服伍丸日三稍加至拾圓

試和圓 主嘔逆腰以上熱惕惕驚恐時悲淚出時復喜怒妄語夢寤洒洒淅淅頭痛少氣時如醉狀不能食噫聞食臭欲嘔大小便不利或寒熱小便赤黃惡風目視䀮䀮耳中光光方

防風　澤瀉　白朮　蛇牀子　吳茱萸

細辛　菖蒲　烏頭炮去皮　五味子各壹分

當歸　遠志去心　桂心各半兩　乾薑叁分

右壹拾叁味擣篩爲末鍊蜜和丸空腹吞五圓如梧子日三加至十九華佗方

補腎湯 主腎氣不足心中忙忙而悶目視䀮䀮心懸少氣陽氣不足耳聾目前如星火痟渴疽痔一身悉癢骨中疼痛小弱拘急乏氣難咽咽乾唾如膠色黑方

磁石　生薑切　五味子　防風　牡丹皮

玄參　桂心　甘草炙各貳兩　附子壹兩炮去皮　大豆貳拾肆枚

右壹拾味㕮咀以水壹斗貳升銅器中揚之三百遍內藥煑取六升去滓更煎得二升八合分爲三服

腎著湯 主腰以下冷痛而重如帶五千錢小便不利方

茯苓　白朮各肆兩　乾薑貳兩　甘草壹兩炙

右肆味㕮咀以水六升煑取三升分三服

治腎間有水氣腰脊疼痛腹背拘急絞痛方

茯苓　白朮　澤瀉　乾薑各肆兩

右肆味㕮咀以水捌升煑取叁升分三服

又方

茯苓　白朮各肆兩　飴糖捌兩　乾薑　甘草炙各貳兩

右伍味㕮咀以水壹斗煑取三升內飴糖煎之令烊分爲

四服

大補腎湯 主腎氣腰背疼重方

磁石 石斛 茯苓 橘皮 麥門冬(去心)

芍藥 牛膝 棘刺 桂心(各叁兩) 地骨皮(三升)

人參 當歸 五味子 高良薑 杜仲(各伍兩炙)

紫菀 乾薑(各肆兩) 遠志(壹兩半去心) 乾地黃(陸兩) 甘草(貳兩炙)

右貳拾味㕮咀以水肆升煑取壹斗分十服

腎氣圓 主五勞七傷藏中虛竭腎氣不足陰下癢小便餘瀝忽忽喜忘悲愁不樂不嗜食飲方

署預 石斛(各叁分) 蓯蓉 黃耆(各叁兩) 羊腎(壹具)

茯苓 五味子 遠志(去心) 當歸 澤瀉

人參 巴戟天 防風 附子(炮去皮) 乾薑

天雄(炮去皮) 乾地黃 獨活 桂心 棘刺

杜仲(炙) 菟絲子(各貳兩)

右貳拾貳味擣篩為末鍊蜜和丸如梧子空腹酒服十丸日三稍加至貳拾圓

腎瀝散 主五勞男子百病方

防風 黃芩 山茱萸 白斂 厚朴(炙)

芍藥 署預 麥門冬(去心) 天雄(炮去皮) 甘草(炙各伍分)

獨活 菊花 秦艽 細辛 白朮

枳實(炙) 柏子仁(各壹兩) 當歸 芎藭 菟絲子

蓯蓉 桂心(各柒分) 石斛 乾薑 人參(各貳兩)

鍾乳(研) 蜀椒(汗去目閉口者) 附子(炮去皮) 白石英(各壹兩)

烏頭(叁分炮去皮) 羊腎(壹具) 黃耆(貳兩半)

右叁拾貳味擣篩為散酒服方寸匕日二加至二匕日三

瀉腎散 主男女諸虛不足腎氣乏方

消石　礬石各捌分

右貳味擣篩爲散以粳米粥汁一升内一方寸匕攪令和調頓服之日三不知稍增

五藏氣虛第五　方九首

五補湯主五藏内虛竭短氣欬逆傷損鬱鬱不足下氣復通津液方

麥門冬去心　小麥各壹升　粳米叁合　地骨皮　薤白各壹斤

人參　五味子　桂心　甘草炙各貳兩　生薑捌兩切

右壹拾味㕮咀以水壹斗貳升煑取三升分三服口乾先煑竹葉一把減一升去滓内藥煑之

人參湯主男子五勞七傷胷中逆滿害食乏氣嘔逆兩脇下脹少腹急痛宛轉欲死調中平藏氣理傷絶方

人參　茯苓　芍藥　當歸　白糖

桂心　甘草炙各貳兩　蜀椒去目及閉口汗　生薑

前胡　橘皮　五味子各壹兩　枳實炙叁分

麥門冬去心叁合　大棗拾伍枚擘

右壹拾伍味㕮咀以東流水壹斗伍升漬藥半日以三歲陳蘆微微煑取四升去滓内糖令消二十以上六十以下服一升二十以下六十以上服柒捌合久羸者服七合日三夜一

治手足厥寒脉爲之細絶其人有寒者當歸茱萸四逆湯方

當歸　芍藥　桂心各叁兩　吳茱萸貳升　生薑半斤切

細辛　通草　甘草炙各貳兩　大棗貳拾伍枚擘

右玖味㕮咀以酒水各四升煑取三升分四服

治下痢清穀内寒外熱手足厥逆脉微欲絶身反惡寒其人面赤或腹痛乾嘔或咽痛或痢止脉不出通脉四逆湯方

甘草壹兩炙　大附子壹枚生去皮破捌片　乾薑叁兩強人可肆兩

右叁味㕮咀貳味以水三升煑取一升二合分再服脉即出也面赤者加葱白九莖腹痛者去葱白加芍藥貳兩嘔者加生薑貳兩咽痛者去芍藥加桔梗壹兩痢止脉不出者去桔梗加人參貳兩

復脉湯 主虛勞不足汗出而悶脉結心悸行動如常不出百日危急者二十一日死方

生地黄壹斤細切　生薑叁兩切　麥門冬去心　麻子仁各叁兩

阿膠叁兩炙　大棗叁拾枚擘　人參　桂心各貳兩　甘草肆兩炙

右玖味㕮咀以水壹斗煑取陸升去滓分陸服日三夜三若脉未復隔日又服一劑力弱者三日一劑乃至五劑十劑以脉復爲度宜取汗越公楊素因患失脉七日服五劑而復仲景名炙甘草湯一方以酒七升水八升煑取三升見傷寒中

大建中湯 主五勞七傷小腸急臍下彭亨兩脇脹滿腰脊相引鼻口乾燥目暗䀮䀮憒憒不樂胷中氣逆不下食飲莖中策策然痛小便赤黄尿有餘瀝夢與鬼神交通失精驚恐虛乏方

人參　龍骨　澤瀉　黄耆各叁兩　大棗貳拾枚

芍藥肆兩　遠志去心　甘草炙各貳兩　生薑切　飴糖各捌兩

右壹拾味㕮咀以水一斗煑取二升半去滓內飴糖令消一服八合相去如行十里久千金有當歸叁兩

小建中湯 所主與前方同

芍藥陸兩　桂心叁兩　生薑叁兩切　飴糖壹升　甘草貳兩炙

大棗拾貳枚擘

右陸味㕮咀以水七升煑取三升去滓內飴糖一服一升日三服巳載傷寒中此再見之

茯苓湯 主虛損短氣喉咽不利唾如稠膠凝塞方

茯苓　前胡　桂心各貳兩　麥門冬伍兩去心
大棗肆拾枚擘　人參　乾地黃　芍藥　甘草各壹兩炙
右玖味㕮咀以水壹斗煑麥門冬及捌升除滓內藥煑取
三升分三服三劑永差一名凝唾湯
黃耆湯主虛勞不足四肢煩疼不欲食飲食即汗出方
黃耆　當歸　細辛　五味子　生薑切
人參　桂心　甘草各貳兩炙　芍藥叁兩　前胡壹兩
茯苓肆兩　半夏捌兩洗　麥門冬貳兩去心　大棗貳拾枚擘
右壹拾肆味㕮咀以水壹斗四升煑取叁升去滓一服八
合日三

補虛圓散第六方二十二首

菴䕡散主風勞濕痺痿厥少氣筋攣關節疼痛難以屈伸或
不能行覆精衰目瞑陰陽不起腹中不調乍寒乍熱大小便
或澀此是腎虛所致主之方
菴䕡子　酸棗仁　大豆卷　薏苡仁　車前子
蔓荊子　菥蓂子　冬瓜子　菊花　秦椒汗子并閉口者各壹升
阿膠炒壹斤
右壹拾壹味各擣絹下為散合和擣令相得食後服三合
日再若苦筋攣骨節痛難以屈伸倍酸棗仁菴䕡菥蓂瓜
子各三升久服不老益氣輕身耳目聰明
大五補圓主五藏勞氣七傷虛損不足冷熱不調飲食無味
署預　石龍芮　覆盆子　乾地黃　五味子各貳兩
石南　秦艽　五加皮　天雄炮去皮　徇脊
人參　黃耆　防風　山茱萸　白朮
杜仲炙　桂心各壹兩　麥門冬去心　巴戟天各壹兩半
遠志貳兩半去心　石斛　菟絲子　天門冬各叁分去心

蛇牀子　萆薢各半兩　茯苓伍分　乾薑叁分　肉蓯蓉叁兩

右貳拾捌味擣篩爲末鍊蜜和圓如梧子空腹以酒服十圓日三稍加至叁拾圓

翟平署蕷圓補諸虛勞損方

署蕷　牛膝　菟絲子　澤瀉　乾地黄

茯苓　巴戟天　赤石脂　山茱萸　杜仲各貳兩

蓯蓉肆兩　五味子壹兩半

右壹拾貳味擣篩爲末鍊蜜和圓如梧子酒服貳拾圓日一夜一瘦者加燉煌石膏貳兩健忘加遠志貳兩少津液加柏子仁貳兩愼食蒜醋陳臭等物

署蕷散補虛風勞方

署蕷　牛膝　續斷　巴戟天　菟絲子

茯苓　枸杞子　五味子　杜仲各壹兩炙　蛇牀子

山茱萸各叁分　蓯蓉壹兩

右壹拾貳味擣篩爲散酒服方寸匕日二夜一惟禁蒜醋健忘加遠志茯神體澀加柏子仁各貳兩服三劑益肌肉亦可爲圓

署蕷散主頭面有風牽引眼睛疼痛偏視不明方

署蕷伍兩　細辛壹兩半　天雄炮去皮　秦艽各貳兩　桂心

羌活　山茱萸各貳兩半

右柒味擣篩爲散酒服方寸匕日三

十味腎氣圓主補虛方

桂心　牡丹皮　澤瀉　署蕷　芍藥各肆兩

玄參　茯苓　山茱萸各伍兩　附子叁兩炮去皮

乾地黄捌兩

右壹拾味擣篩爲末鍊蜜和丸如梧子以酒服二十丸稍

加至三十九以知爲度

張仲景八味腎氣丸方

乾地黃捌兩 澤瀉貳兩 桂心貳兩 署預肆兩

山茱萸肆兩 牡丹皮 茯苓各叁兩 附子炮去皮貳兩

右捌味擣篩爲末鍊蜜和丸如梧子以酒服七丸日三稍

加至十九乆長可服

常服大補益散方

肉蓯蓉 乾棗肉 石斛各捌兩 枸杞子壹升 菟絲子

續斷 遠志去心各伍兩 天雄炮去皮叁兩 乾地黃拾兩

右玖味擣篩爲散酒服方寸匕日二無所忌

補虛主陽氣斷絕不起方

白石英 陽起石 磁石 蓯蓉 菟絲子

乾地黃各貳兩半 五味子 石斛 桔梗

白朮各貳兩 巴戟天 防風各伍分 蛇牀子兩半 桂心

右壹拾肆味擣篩爲末鍊蜜和丸如梧子酒服十五丸日

三稍加至二十九以知爲度

又方

小秦艽散 主風虛疥瘙癢方

秦艽叁兩 茯苓 牡蠣熬 附子炮去皮 黃芩各半兩

人參叁分 乾薑 細辛各伍分 白朮叁兩半 蜀椒去目閉口者汗

桔梗 防風 桂心各壹兩

右壹拾叁味擣篩爲散酒服方寸匕日再

治陽氣衰微終日不起方

蛇牀子叁分 菟絲子貳合草汁

右貳味和如泥塗上日五遍三日大驗

又方

車前根葉

右壹味暴乾擣爲散酒服方寸匕日三服

又方

原蠶蛾（未連者壹升）

右壹味陰乾去頭足翅擣篩爲末鍊蜜和丸如梧子夜臥服一丸

又方

蛇牀子　菟絲子　杜仲（各伍分炙）　五味子（壹兩）　肉蓯蓉（各貳兩）

右伍味擣篩爲末鍊蜜和丸如梧子酒服十四丸日二夜一

又方

陽起石

右壹味以酒叁斗漬二七日服三合日三夜一

又方

特生礜石（火鍊一伏時）

右壹味擣末酒漬二七日服五合日三夜一

淮南八公石斛散主風濕痺疼腰脚不遂方

石斛　防風　茯苓　乾薑　細辛

雲母　杜仲（炙）　遠志（去心）　菟絲子　天雄（炮去皮）

人參　蓯蓉　萆薢　桂心　乾地黃

牛膝　蛇牀　署預　巴戟天　續斷

山茱萸　白朮（各壹兩）　菊花　附子（炮去皮）　蜀椒（去目閉口者汗）

五味子（各貳兩）

右貳拾陸味擣篩爲散酒服方寸匕日再

琥珀散主虛勞百病陰痿精清力不足大小便不利如淋腦間寒氣結在關元強行陰陽精少餘瀝治腰脊痛四肢重咽乾口燥飲食無味乏氣少力遠視䀮䀮驚悸不安五藏氣虛上氣悶滿方

琥珀貳两 石韋 乾薑 滑石 牡丹皮
茯苓 芎藭 石斛 續斷 當歸
人參 遠志去心 桂心各叁两 蓯蓉 千歲松脂
牡蒙 橘皮各肆两 菘子 柏子仁 荏子各叁升
車前子 菟絲子 菴蕳子各壹升 枸杞子壹两
牛膝叁两 通草拾肆两 胡麻子 蕪菁子 蛇牀子
麥門冬各壹升去心

右叁拾味各異擣合擣貳千杵重絹下合和盛以韋囊先食服方寸匕日三夜一用牛羊乳煎令熟長服令人志性強輕身益氣力消穀能食耐寒暑百病除愈久服老而更少髮白更黑齒落更生矣

秃雞散方

蛇牀子 菟絲子 遠志去心 五味子 巴戟天

防風各半两 蓯蓉叁分 杜仲壹分炙

右捌味擣篩為散酒服方寸匕日一服

三人九子圓 主五勞七傷補益方

酸棗仁 柏子仁 薏苡仁 蛇牀子 枸杞子
五味子 菟絲子 菊花子 菴蕳子 蔓荊子
地膚子 烏麻子 乾地黃 署預 桂心

右壹拾伍味各貳两加蓯蓉貳两擣篩為末鍊蜜和圓如梧子酒服二十九日二大主腎虛勞

療氣及虛方千金方一云治氣及補五勞七傷無所不治明目利小便

白石英拾两成鍊者 石斛 蓯蓉各壹两半 菟絲子叁两
茯苓 澤瀉 橘皮各壹两

右柒味先取白石英無多少以鐵搥碪上細打去闇者及惡物黶翳惟取向日看明澈者擣絹篩於銅盤中水研之

如米粉法三度研訖澄之漸漸却水暴令浥浥然着上有不淨之物去之取中心好者在下有惡物亦去之所得好者更研令熟以帛練袋盛置甕甕合上以叁斗米下蒸之飯熟下懸袋日中乾之取出更研然後擣諸藥下篩捴於瓷器中研令相得酒服方寸匕日二不得過之忌猪魚鵝鴨蒜生冷酢滑

治腰痛方

鹿角末酒服方寸匕日二服

千金翼方卷第十六

中風上

諸酒第一　方二十首

獨活酒 主八風十二痺方

獨活　石南各肆兩　防風叁兩　茵芋

附子去皮　烏頭去皮　天雄去皮各貳兩

右柒味切以酒貳斗漬六日先食服壹服半合以知爲度

牛膝酒 主八十三種風著人頭面腫痒眉髮墮落手脚拘急不得行步夢與鬼神交通或心煩恐怖百脉自驚轉加羸瘦略出要者不能盡說方

牛膝　石南　烏頭去皮　天雄去皮

茵芋各貳兩　細辛伍分

右陸味切以酒壹斗貳升漬之春秋五日夏三日冬七日

初服半合治風癩宿澼服之即吐下強人日三老小日一
不知稍加惟禁房室及豬肉等

茵芋酒 主新久風體不仁或垂曳或拘急腫或枯焦施連方

茵芋　狗脊　烏頭去皮　附子各貳兩去皮
躑躅　天雄去皮各壹兩

右陸味切以酒壹斗漬八九日服半合以知爲度

金牙酒 主積年八風五注舉身嚲曳不得轉側行步跛躃不能收攝又暴口噤失音言語不通利四肢脊筋皆急肉疽血脉曲攣掣瘲腷起腫痛流走無常勮勞冷積聚少氣或寒或熱三焦脾胃不磨飲澼結實逆害飲食醋咽嘔吐食不生肌醫所不能治者悉主之方

金牙燒碎之如粳米大　細辛　地膚子若無子用莖代之
地黃　附子去皮　防風　蜀椒去目閉口者汗
茵芋　蒴藋根各肆兩　羌活壹斤

右壹拾味切以甕罌中清酒四斗漬之密泥封勿洩春夏三四宿秋冬六七宿去滓服一合此酒無毒及可小醉不盡一劑病無不愈矣又令人肥健盡自可加諸藥各叁兩惟蜀椒五兩用酒如法勿加金牙也此酒勝針灸治三十年諸風嚲曳神驗冷加乾薑四兩一方用升麻四兩人參叁兩石斛牛膝伍兩又一方用莨菪四兩黃耆叁兩又一方有續斷四兩千金用莽草無茵芋

馬灌酒 主除風氣通血脉益精氣定六腑明耳目悅澤顏色頭白更黑齒落更生服藥二十日力勢倍六十日志氣充強八十日能夜書百日致神明房中盈壯如三十時力能引弩有人服藥年七八十有四男三女隴西韓府君筋急兩膝不得屈伸手不得帶衣起居增劇惡風寒冷通身流腫生瘡藍田府君背痛不能立面目萎黃服之二十日身輕目明房室

盈壯病在腰膝藥悉主之常山太守方

天雄去皮 茵芋各叁兩 蜀椒去目閉口者汗 躑躅各壹升

白斂叁兩 烏頭去皮 附子去皮 乾薑各貳兩

右捌味切以酒叁斗漬之春夏五日秋冬七日去滓初服半合爲始稍加至三合暴滓爲散服方寸匕日三以知爲度夏日恐酒酸以油單覆下垂井中近水不酸也千金有桂心商陸爲十味

芫青酒

主百病風邪狂走少腹腫癥瘕霍亂中惡飛尸遁注暴癥傷寒中風濕冷頭痛身重諸病寒熱風虛及頭風服酒當從少起藥發當吐清汁一二升方

芫青 巴豆去皮心熬 斑貓去翅足熬各叁拾枚

躑躅 細辛 烏頭去皮 附子去皮

蜀椒去目閉口者汗 天雄去皮 黃芩各壹兩 乾薑 桂心

右壹拾貳味切以酒壹斗漬十日每服半合日貳夜苦煩悶飲壹升水解之以知爲度

蠻夷酒

主久風枯攣三十年著牀及諸惡風眉毛墮落方

獨活 烏頭去皮 乾薑 地黃 礜石燒

丹參各壹兩 白芷貳兩 蕪荑 芫花 柏子仁各壹兩

人參 甘遂 狼毒 蓯蓉 蜀椒去目閉口者汗

防風 細辛 礬石燒汁盡 牛膝 寒水石

茯苓 金牙燒 麻黃去節 芍藥 當歸

柴胡 枸杞根千金作狗脊 杜仲炙 天雄去皮 烏喙去皮各半兩

附子去皮貳兩 署預 石南 牡蠣熬

山茱萸 桔梗 牡荊子 款冬各叁兩 白朮叁分

石斛貳分 桂心壹分 蘇子壹升 赤石脂貳兩半

右肆拾叁味切以酒貳斗漬之夏三日春秋六日冬九日

壹服半合當密室中合藥勿令女人六畜見之三日清齋乃合藥加麥門冬貳兩大棗四十枚更佳也（千金有芎藭）

又蠻夷酒 主八風十二痺偏枯不隨宿食虛冷五勞七傷及女人產後餘疾月水不調方

遠志去心　礬石（燒汁盡各貳兩）　石膏（貳兩半）　蜈蚣（貳枚炙）
狼毒　礜石燒　白朮　附子去皮　半夏洗
桂心　石南　白石脂　續斷　龍膽
芫花　玄參　白石英　代赭　蕳茹
石韋去毛　天雄去皮　寒水石　防風　桔梗
藜蘆　卷柏　山茱萸　細辛　烏頭去皮
躑躅　蜀椒（去目閉口者汗）　秦艽　菖蒲　白芷（各壹兩）

右叁拾肆味切以酒貳斗漬四日一服一合日再十日後漉去滓暴乾擣篩爲散酒服方寸匕日再以知爲度

魯公酒 主一百病風眩心亂耳聾目瞑淚出鼻不聞香臭口爛生瘡風齒瘰癧喉下生瘡煩熱厥逆上氣胷脇肩髀痛手不上頭不自帶衣腰脊不能俛仰脚酸不仁難以久立八風十二痺五緩六急半身不遂四肢偏枯筋攣不可屈伸賊風咽喉閉塞哽哽不利或如錐刀所刺行人皮膚中無有常處久久不治入人五藏或在心下或在膏肓遊行四肢偏有冷處如風所吹久寒積聚風濕五勞七傷虛損萬病方

細辛半兩　茵芋　烏頭去皮　躑躅（各伍分）　木防己
天雄去皮　石斛（各壹兩）　柏子仁　牛膝　山茱萸
通草　秦艽　桂心　乾薑　乾地黃
黃芩（一作黃耆）　茵蔯　附子去皮　瞿麥　王蓀（一作王不留行）
杜仲炙　澤瀉　石南　防風　遠志（各叁分去心）

右貳拾伍味切以酒伍斗漬十日一服一合加至四五合

以知爲度一方加甘草三分

附子酒 主大風冷淡澼脹滿諸痺方

大附子壹枚重貳兩者亦云貳枚去皮破

右壹味用酒伍升漬之春伍日一服一合以痺爲度日再服無所不治勿用蛀者陳者幷者不差病

紫石酒 主久風虚冷心氣不足或時驚怖方

紫石英壹斤 鍾乳研 防風 遠志去心 桂心各肆兩

麻黄去節 茯苓 白朮 甘草炙各叁兩

右玖味切以酒叁斗漬如上法服肆合日三亦可至醉常令有酒氣

丹參酒 主惡風疼痺不仁惡瘡不差無瘢鬚眉禿落方

丹參 前胡 細辛 卷柏 天雄去皮

秦艽 茵芋 乾薑 牛膝 芫花

白朮 附子去皮 代赭 續斷 防風

桔梗 藺茹 礬石燒汁盡 半夏洗 白石脂

石南 狼毒 桂心 菟絲子 芍藥

龍膽 石韋 恒山 黄連 黄芩

玄參 礜石燒 遠志去心 紫菀 山茱萸

乾地黄 蘇 甘草炙各壹兩 石膏貳兩 杏仁貳拾枚去皮尖雙人

麻黄去節 大黄各伍分 昌蒲壹兩半 白芷壹兩 蜈蚣貳枚赤頭者炙

右肆拾伍味切以酒肆斗漬五宿一服半合增至一二合日二以差爲度

杜仲酒 主腰脚疼痛不遂風虚方

杜仲炙捌兩 羌活肆兩 石南貳兩 大附子叁枚去皮

右肆味切以酒壹斗漬三宿服二合日再

杜仲酒 主腕傷腰痛方

杜仲炙捌兩　乾地黃肆兩　當歸　烏頭去皮　芎藭各貳兩

右伍味切酒壹斗貳升漬服之如上法

枳茹酒主諸藥不能差者方

枳茹枳上青皮刮取其末欲至心止得茹五升微火熬去濕氣以酒壹斗漬微火煖令得藥味隨性飲之主口僻眼急神驗主緩風急風並佳

杜仲酒主風勞虛冷腰脚疼屈弱方

杜仲炙　乳床各八兩　當歸　芎藭　乾薑

附子去皮　秦艽　石斛　桂心各叁兩　蜀椒去目閉口者汗

細辛　茵芋　天雄去皮各貳兩　獨活　防風各五兩

右壹拾伍味切以酒叁斗漬伍宿一服三合日三一方加紫石英五兩

菊花酒主男女風虛寒冷腰背痛食少羸瘦無色噓吸少氣去風冷補不足方

菊花　杜仲各壹斤炙　獨活　鍾乳研　萆薢各八兩

茯苓貳兩　紫石英伍兩　附子去皮　防風　黃耆

蓯蓉　當歸　石斛　桂心各肆兩

右壹拾肆味切以酒柒斗漬五宿一服二合稍漸加至五合日三千金有乾薑

麻子酒主虛勞百病傷寒風濕及女人帶下月水往來不調手足疼痹著牀方

麻子壹石　法麴壹斗

右貳味先擣麻子成末以水兩石著釜中蒸麻子極熟炊壹斛米頃出去滓隨汁多少如家醞法酒熟取清任性飲之令人肥健

黃耆酒主大風虛冷淡澼偏枯脚腫滿百病方

黃耆　獨活　山茱萸　桂心　蜀椒去目閉口者汗

白朮　牛膝　葛根　防風　芎藭
細辛　附子去皮　甘草炙各叁兩　大黄壹兩　乾薑貳兩半
秦艽　當歸　烏頭去皮各貳兩

右壹拾捌味切以酒叁斗漬拾日一服一合日三稍加至五合夜二服無所忌大虛加蓯蓉二兩萎蕤貳兩石斛貳兩多忘加菖蒲貳兩紫石英貳兩心下水加茯苓貳兩人參貳兩署預叁兩服盡復更以酒叁斗漬滓不爾可暴乾作散酒服方寸匕日三

地黄酒 生地黄汁壹石煎取伍斗冷漬麴發先淘米暴乾欲釀時別煎地黄汁如前法漬米一宿漉乾炊釀一如家醖法拌饋亦以餘汁酘酘皆然其押出地黄乾滓亦和米炊釀之酒熟訖封七日押取温服一盞常令酒氣相接

慎豬魚服之百日肥白疾愈

諸散第二　方九首　論一首

九江太守散 主男女老少未有不苦風者男子五勞七傷婦人產後餘疾五藏六腑諸風皆悉主之方

知母　人參　茯苓各叁分　蜀椒半兩汗去目閉口者
栝樓壹兩　防風　白朮各叁兩　澤瀉貳兩　乾薑
附子炮去皮　桂心各壹兩　細辛壹兩

右壹拾貳味擣篩爲散以酒服方寸匕日再飲酒常令有酒色勿令大醉也禁房室豬魚生冷無病常服益佳延年益壽輕身明目強筋骨愈折傷

吴茱萸散 主風跛蹇偏枯半身不遂晝夜呻吟醫所不能治方

吴茱萸　乾薑　白斂　牡桂　附子炮去皮
署預　天雄炮去皮　乾漆熬　秦艽各半兩　狗脊壹分

防風壹兩

右壹拾壹味擣篩爲散以酒服方寸匕日三服

山茱萸散 主風跛痺治法如前方

山茱萸 附子炮去皮 署預 王蓀 牡桂

乾地黃 乾漆熬 秦艽 天雄炮去皮 白朮各半兩

狗脊

右壹拾壹味擣篩爲散先食酒服方寸匕日三藥走皮膚中淫淫服之一月愈

萬金散 主頭痛眩亂耳聾兩目淚出鼻不聞香臭口爛惡瘡鼠漏瘰癧喉咽生瘡煩熱欬嗽胸滿脚腫半身偏枯不遂手足筋急緩不能屈伸賊風猥退蜚尸蠱注江南惡氣在人心下或在膏肓遊走四肢針灸不及積聚僻戾五緩六急濕痺女人帶下積聚生產中風男女五勞七傷皆主之方

石斛 防風 巴戟天 天雄炮去皮 乾地黃

石南 遠志去心 躑躅 烏頭炮去皮 乾薑

桂心各壹兩半 蜀椒半升汗去目閉口者 瞿麥 茵蔯

秦艽 茵芋 黃耆 薔薇 獨活

細辛 牛膝各壹兩 柏子 澤瀉 杜仲各半兩炙

山茱萸 通草 甘草各叁分

右貳拾柒味擣篩爲散雞未鳴時冷酒服伍分七日三加至一匕

人參散 主一切諸風方

人參 當歸各伍分 天雄炮去皮 前胡 吳茱萸

白朮 秦艽 烏頭炮去皮 細辛各貳分 附子壹兩炮去皮

獨活壹分 防風 麻黃去節 莽草 蜀椒去目閉口者汗

莽草 桔梗 天門冬去心 五味子 白芷各叁兩

芎藭壹兩

右貳拾味擣篩爲散酒服方寸匕日三服中熱者加減服之若卒中風傷寒鼻塞者服訖覆取汗即愈

防風散主風所爲卒起眩冒不知人四肢不知痛處不能行步或身體偏枯不遂口吐涎沫出手足拘急方

防風　蜀椒（去目閉口者汗）　麥門冬（各壹兩去心）　天雄（炮去皮）
附子（炮去皮）　人參　當歸（各伍分）　五味子　乾薑
烏頭（炮去皮）　細辛　白朮（各叄兩）　柴胡　山茱萸
莽草　麻黃（去節）　桔梗　白芷（各半兩）

右壹拾捌味擣篩爲散酒服方寸匕日三不知稍增之以知爲度

八風十二痺散主五勞七傷風入五藏手脚身體沉重或如邪氣時悶汗出又蜚尸遁注相染易或少氣腹滿或皮膚筋痛項骨相牽引無常處或咽中有氣吞之不入吐之不出皆主之方

細辛　巴戟　黃耆　礜石（燒）　厚朴（炙）
白斂　桂心　黃芩　牡荊　山茱萸
白朮　女萎　菊花　人參　天雄（炮去皮）
防風　萆薢　石斛　蜀椒（各壹兩汗去目閉口者）
芎藭　龍膽　芍藥　蓯蓉（各半兩）　紫菀
秦艽　茯苓　昌蒲　烏頭（炮去皮）　乾薑（各壹兩）
附子（炮去皮）　署預　五味子（各壹兩半）　桔梗
遠志（各貳兩半去心）

右叄拾肆味擣篩爲散酒服方寸匕日二稍增至二匕主萬病

又八風十二痺散主風痺嘔逆不能飲食者心痺也欬滿腹

痛氣逆唾涕白者脾痺也津液唾血腥臭者肝痺也陰瘘下濕者痿痺也腹中雷鳴食不消食即氣滿小便數起胃痺也兩膝寒〻不能行者濕痺也手不能舉腫痛而逆骨痺也煩滿短氣涕唾青黑腎痺也並悉主之方

遠志去心 黃耆 黃芩 白歛 附子炮去皮

龍膽 署預 厚朴炙 蜀椒各半兩去目及閉口者汗

牡荊子 天雄炮去皮 細辛 菊花 徇脊

山茱萸 防風 芎藭 桂心各叁分 五味子

巴戟天各壹分 茯苓 芍藥 秦艽

烏頭炮去皮 蕪荑 昌蒲 萎蕤各壹兩

右貳拾柒味擣篩爲散食後飲服方寸匕日三寧從少起稍漸增之

秦王續命大八風散 主諸風五緩六急或浮腫噓吸微痺風虛不足并補益藏氣最良其說甚多略取其要方

秦艽貳兩主風不仁 防風貳兩去風痎除濕痺 附子貳兩炮去皮主風濕堅肌骨止痛

昌蒲貳兩主風濕痺拘急 茯苓貳兩主安中下氣消水 牛膝貳兩去脛虛損煩疼填骨髓

桔梗貳兩主驚悸和腸胃 細辛壹兩主留飲逐風邪 烏頭貳兩炮去皮主逐風上氣除邪

署預壹兩主益氣補五藏 芎藭壹兩主風寒溫中 遠志貳兩半去心主益氣力定心志

天雄壹兩炮主留飲逐風邪 石龍芮壹兩主風補氣除滿 蜀椒壹兩去目及閉口者汗主溫中逐風邪

石斛貳兩主風益氣嗜食 白芷壹兩主風邪除虛滿 龍膽壹兩主風腫除風熱

白朮壹兩主風腫消水氣 山茱萸壹兩主風邪濕氣 桂心壹兩主溫筋利血脉除邪氣

菊花壹兩主風濕補藏益氣 女萎壹兩主溫中逐風邪 厚朴壹兩炙主溫中除冷益氣除滿

巴戟天壹兩主下氣堅肌膚 萆薢壹兩主風濕止悸痛 牡荊子壹兩主風益氣無用柏子仁

乾漆壹兩熬主堅體和少腹 肉蓯蓉壹兩主虛續傷腰背痛 五味子壹兩半主益氣除寒熱

芍藥壹兩止痛散血氣 黃芩壹兩主除虛熱止痛 白礬壹兩燒汁盡主除寒熱破積下氣

續斷壹兩主風虛傷絕 白歛壹兩主風益氣力 黃耆壹兩半主虛羸風邪目黃

右叁拾陸味皆新好以破除日合擣篩為散溫清酒和服方寸匕日叁服不知稍增之可至二三匕以知為度若苦心悶者飲少冷水禁生魚豬肉菘菜能斷房室百日甚善此方療風消脹滿調和五藏便利六腑男女有患悉可合服常用甚良患心氣不足短氣內人參甘草各壹兩若腹痛是腎氣不足內杜仲羊腎各貳兩隨病增減

論曰此等諸散天下名藥然熱人不可用惟舊冷者大佳

諸膏第三 方三首

蒼梧道士陳元膏 主風百病方

當歸 丹砂各叁兩研 細辛 芎藭各貳兩 附子去皮貳拾貳銖
桂心壹兩貳銖 天雄去皮叁兩貳銖 乾薑叁兩柒銖 烏頭去皮叁兩柒銖 雄黃叁兩貳銖研
松脂半斤 大醋貳升 白芷壹兩 豬肪脂拾斤 生地黃貳斤取汁

右壹拾伍味切以地黃汁大醋漬藥一宿豬肪中合煎之十五沸膏成去滓內丹砂等末熟攪無令小兒婦人及六畜見之合藥切須禁之

有人苦胷脇背痛服之七日所出如雞子汁者貳升即愈

有人脇下積氣如杯摩藥十五日愈

有人苦臍傍氣如手摩之去如爪中黃纔壹升許愈

有人患腹切痛時引脇痛數年摩膏下如蟲三十枚愈

有女人苦月經內塞無子數年膏摩少腹并服如杏子大一枚十日下崩血貳升愈其年有子

有患風瘙腫起累累如大豆摩之五日愈

有患膝冷痛摩之五日亦愈

有患頭項寒熱瘰癧摩之皆愈

有患面目黧黑消瘦是心腹中疾服藥下如酒糟者貳升愈

丹參膏 主傷寒時行賊風惡氣在外肢節痛攣不得屈伸項

頸咽喉痺塞噤閉入腹則心急腹脹胷中嘔逆藥悉主之病在腹內服之在外摩之緩風不遂濕痺不仁偏枯拘屈口面喎斜耳聾齒痛風頸腫痺腦中風痛石癰結核瘰癧堅腫未潰傅之取消及赤白癮㾮諸腫無頭作癰疽者摩之令消風結核在耳後風水遊腫疼痛㿏㿏針之黄汁出時行温氣服之如棗大一枚小兒以意減之方

丹參 蒴藋根各肆兩 秦艽叁兩 羌活

蜀椒去目閉口者 牛膝 烏頭去皮 連翹

白术各貳兩 躑躅 菊花 莽草各壹兩

右壹拾貳味切以苦酒伍升麻油柒升合煎苦酒盡去滓用豬脂煎成膏凡風冷者用酒服熱毒單服齒痛綿沾嚼之

赤膏 主一切火瘡灸瘡金瘡木石傷損不可差者醫所不能療令人憂懼計無所出以塗上一宿生肌肉即差方

生地黄汁貳升 生烏麻脂貳兩 薫陸香末 丁香末各貳錢匕

黄丹肆錢 蠟如雞子黄貳枚

右陸味先極微火煎地黄汁烏麻脂叁分減一乃下丁香薫陸香煎叁拾沸乃下黄丹次下蠟煎之使消以匙攪之數千迴下之停凝用之

喎僻第四 方肆首

治心虛寒風半身不遂骨節離緩弱不用便利無度口面喎斜乾薑附子湯方

乾薑 附子各八兩炮去皮 芎藭叁兩 麻黄去節 桂心各肆兩

右伍味㕮咀以水壹斗煑取叁升分三服三日復進一劑

治中風面目相引偏僻牙車急舌不轉方

牡蠣熬 礬石燒 附子生去皮 伏龍肝等分

右肆味擣篩爲散以三歲雄雞血和藥傅上預候看勿令

太過偏右塗左偏左塗右正則洗去之

烏頭膏　主賊風身體不遂偏枯口僻及傷寒其身強直方

烏頭伍枚去皮　野葛　莽草各壹斤

右叁味切以好酒貳斗伍升淹漬再宿三日以豬膏伍斤煎成膏合藥作東向露竈以葦火煎之三上三下膏藥成有病者向火摩三千過汗出即愈若觸寒霧露鼻中塞向火膏指頭摩入鼻孔中即愈勿令入口眼

治風著人面引口偏著耳牙車急舌不得轉方

生地黃汁　竹瀝各壹升　獨活叁兩切

右叁味合煎取壹升頓服之即愈

心風第五　方一十四首

茯神湯　主五邪氣入人體中見鬼妄語有所見聞心悸跳動恍惚不定方

茯神　人參　茯苓　昌蒲各貳兩　赤小豆肆拾枚

右伍味㕮咀以水壹斗煮取貳升半分叁服

人參湯　主風邪鬼氣往來發作有時或無時節方

人參　防風　烏頭炮去皮　黃芩　附子炮去皮

遠志去心　桔梗　秦艽　五味子　前胡

牡蠣熬　細辛　石膏碎　芎藭　蜀椒汗去目閉口者

牛膝　澤瀉　桂心　山茱萸　竹皮

橘皮　桑根白皮各叁兩　乾薑　澤蘭

狗脊　石南各半兩　白朮壹兩半　大棗拾陸枚擘　麻黃壹兩去節

茯苓　獨活　甘草炙各伍分

右叁拾貳味㕮咀以水陸升酒陸升合煮取肆升分伍服日三夜二服

補心湯　主奄奄忽忽朝差暮劇驚悸心中憧憧胷滿不下食

飲陰陽氣衰脾胃不磨不欲聞人聲定志下氣方

人參　茯苓　龍齒炙　當歸　遠志去心

甘草炙各叁兩　桂心　半夏洗各伍兩　生薑六兩切　大棗貳拾枚擘

黄耆肆兩　枳實炙　枳梗　茯神各貳兩半

右壹拾肆味㕮咀以水壹斗貳升先煑粳米伍合令熟去

滓内藥煑取肆升每服八合日三夜二服

鎮心圓主風虛勞冷心氣不足喜忘恐怖神志不定方

防風伍分　甘草貳兩半炙　乾薑半兩　當歸伍分　澤瀉壹兩

紫菀半兩　茯神貳分　大黄伍分　秦艽壹兩半　昌蒲叁兩

白朮貳兩半　桂心叁兩　白斂壹兩　遠志去心貳兩　附子貳兩炮去皮

桔梗叁分　大豆卷肆兩　署預貳兩　石膏叁兩研　茯苓壹兩

人參伍分　大棗伍拾枚擘　麥門冬去心伍兩

右貳拾叁味末之鍊蜜和爲圓酒服如梧子大拾圓日叁

服加至貳拾圓

續命湯治大風風邪入心心痛達背背痛達心前後痛去來

上下或大腹脹滿微痛一寒一熱心中煩悶進退無常面或

青或黄皆是房内太過虛損勞傷交會後汗出汗出未除或

因把扇或出當風而成勞五俞大傷風因外入下有水因變

成邪雖病如此然於飲食無退坐起無異至卒不知是五内

受氣故也名曰行尸宜預備此方

麻黄六分去節　大棗拾枚擘　桂心　防風　細辛

芎藭　甘草炙　芍藥　人參　秦艽

獨活　黄芩　防已　附子炮去皮　白朮各叁分

生薑伍分

右壹拾陸味切以水壹斗叁升先煑麻黄一沸去上沫内

諸藥煑取伍升去滓内棗煎取叁升分爲三服老小久病

服五合取汗忌生葱海藻菘菜生菜豬肉冷水桃李雀鞹

鎮心圓 治胃氣厥實風邪入藏喜怒愁憂心意不定恍惚喜忘夜不得寐諸邪氣病悉主之方

秦艽 柏實 當歸 乾漆熬 白歛

杏仁去皮尖雙仁熬 芎藭各叁分 澤瀉壹兩 乾地黃六分 防風

人參各肆分 甘草壹兩炙 白术 署預 茯苓

乾薑各貳分 麥門冬去心貳兩 前胡肆分

右壹拾捌味擣下篩鍊蜜和爲圓如桐子先食飲服拾圓日叁不知稍增之忌海藻菘菜蕪荑桃李雀肉酢物等

定志小圓 主心氣不定五藏不足憂悲不樂忽忽遺忘朝差暮極狂眩方

遠志去心 昌蒲各貳兩 茯苓

人參各叁兩

右肆味擣篩爲末鍊蜜和圓如梧子飲服貳圓日三加茯神爲茯神圓散服亦佳

補心治遺忘方

昌蒲 遠志去心 茯苓 人參 通草

石決明各等分

右陸味擣篩爲散食後水服方寸匕日一服酒亦佳

槐實益心智方

以十月上辛日令童子於東方採兩斛槐子去不成者新瓦盆貯之以井華水漬之令淹藏合頭密封七日去黃皮更易新盆仍以水漬之密封二七日去其黑肌擇取色黃鮮者以小盆隨藥多少以密布次其黃夏密布其上以盆合頭密封內暖馬糞中三七日開視結成擣圓如梧子日服三圓大月加三圓小月減三圓先充齋二七日乃服三十日有驗百日日行二百里目明視見表

裏白髮更黑齒落再生面皺却展日記千言尋本知末
除六十四種風去九瘺冷癥癖蟲毒魔魅

開心肥健方

人參伍兩 大豬肪捌枚

右貳味擣人參為散豬脂煎取凝每服以人參一分豬脂十分以酒半升和服之一百日骨髓充溢日記千言身體潤澤去熱風冷風頭心風等月服二升半即有大效

孔子枕中散方

龜甲炙 龍骨 昌蒲 遠志去心各等分

右肆味為散食後水服方寸匕日三常服不忘

鎮心省睡益智方

遠志伍拾兩去心 益智子 昌蒲各捌兩

右叁味擣篩為散以淳糯米酒服方寸匕一百日有效秘不令人知

止睡方

龍骨 虎骨炙 龜甲炙

右叁味擣篩為散水服方寸匕日二以睡定即止

治多睡欲合眼則先服以止睡方

麻黃去節 白朮各伍兩 甘草炙壹兩

右叁味以日中時南向擣篩為散食後以湯服方寸匕日三服

風眩第六 方二十七首

治風眩屋轉眼不得開人參湯方

人參 防風 芍藥 黃耆各貳兩 獨活

桂心 白朮各叁兩 當歸 麥門冬去心各壹兩

右玖味㕮咀以水壹斗煑取叁升伍合分肆服

治風眩倒屋轉吐逆惡聞人聲茯神湯方
茯神肆兩 黃耆 生薑切 遠志各叄兩去心 附子壹枚炮去皮
防風伍兩 人參 獨活 當歸 牡蠣熬
蓯蓉 白朮 甘草炙各貳兩
右壹拾叄味㕮咀以水壹斗貳升煑取叄升分陸服毋服
五合日三夜三一方無白朮

防風散主頭面風在眉間得熱如蟲蟻行或頭眩目中淚出
防風伍兩 天雄炮去皮 細辛 乾薑 烏頭炮去皮
朱砂研 桂心各叄兩 莽草 茯苓茯壹兩 附子炮去皮
人參 當歸各貳兩
右壹拾貳味擣篩爲散酒服方寸匕日三服

防風散主頭眩惡風吐冷水心悶方
防風 乾薑各貳兩 桂心壹兩半 澤蘭 附子炮去皮
茯苓 人參千金作天雄 細辛 署預 白朮各壹兩
右壹拾味擣篩爲散酒服方寸匕常令有酒氣醺醺則脫巾帽解髮前却梳頭一百遍復投一升酒便洗手足須臾頭面熱解髮以粉粉之快臥便愈可洗頭行步如服寒食散十日愈

治頭風方
擣葶藶子末以湯淋取汁洗頭良

治卒中惡風頭痛方
擣生烏頭去皮以醋和塗故布上薄痛上須臾痛止日夜五六薄之

防風散主頭面身腫方
防風貳兩 白芷壹兩 白朮叄兩
右叄味擣篩爲散酒服方寸匕日二服

小三五七散主頭面風目眩耳聾亦隨病所在兩攻方

天雄炮去皮參兩　山茱萸　署預柒兩

右參味擣篩爲散以酒服伍分匕日三不知稍增以知爲度

大三五七散主口喎目斜耳聾面骨疼風眩痛方

天雄炮去皮　細辛各參兩　山茱萸　乾薑各伍兩

署預　防風各柒兩

右陸味擣篩爲散以酒服伍分匕日再不知稍增以知爲度

治頭面風眼瞤鼻塞眼暗冷淚方

杏仁三升擣末水煑四五沸洗頭冷汗盡三度差

又方

熟煑大豆內飯甕中作漿水日日溫洗頭面髮不淨加少麪勿用水濯不過十洗

治頭中白屑如麩糠方

立截楮木作枕六日一易新者

沐頭主頭風方

五月五日取鹽壹升水壹升合煑并內三七蛇蛻以陳蘆燒之三沸以沐頭訖急結密巾之四五日以水淡之神良

又方

吳茱萸參升

右壹味以水伍升煑取參升以綿拭髮根良

入頂散主三十六種風偏枯不遂方

天雄炮去皮　山茱萸各壹兩半　麻黃去節壹兩　署預貳兩

細辛　石南　牛膝　莽草各半兩　蜀椒去目閉口者汗

白朮　烏頭炮去皮　桔梗　防風　甘草炙各肆兩

右壹拾肆味擣篩爲散以酒服方寸匕日三千金有芎藭獨活附子通草菖蒲爲十九味

治遍身風方

石南（參兩純青黑斑者佳）

右壹味擣篩爲散酒服三大豆日三至食時當覺兩鬢如蟲行狀亦如風吹從頭項向臂脊腰脚至膝下骨中痛遍即齊下頑風盡止若風愈即能飲酒肥健忌如藥法日一服

風痺散 主三十年惡風濕痺髮禿落隱瘮生瘡氣脉不通抓搔不覺痛痒方

附子（炮去皮） 乾薑 白木（各肆兩） 石斛（半兩） 蜀椒（去目壹分汗及閉口者）

天雄（炮去皮） 細辛 躑躅 白斂 烏頭（炮去皮）

石南 桂心（各參分）

右壹拾貳味擣篩爲散酒服五分匕以少羊脯下藥日再勿大飽食飢即更服常令有酒勢先服吐下藥後乃服之以韋袋貯藥勿洩忌冷水房室百日

十六卷終

千金翼方卷第十七

中風下

中風第一（方三十五首論四首） 灸法二首

小續命湯方

麻黃（去節） 防巳 人參 桂心 黃芩

芍藥 芎藭 杏仁（去尖皮兩仁） 甘草（炙各壹兩）

附子（炮壹枚去皮） 防風（壹兩半） 生薑（伍兩切）

右壹拾貳味㕮咀以水壹斗先煮麻黃去上沫內諸藥煮取參升分參服有風預備壹拾劑

大續命湯方

麻黃（去節捌兩） 大杏仁（肆拾枚去皮尖兩仁） 桂心 芎藭（各貳兩）

石膏（肆兩碎） 黃芩 乾薑 當歸 甘草（炙各壹兩）

荊瀝（壹升）

右壹拾味㕮咀以水壹斗先煑麻黄去上沫下藥煑取四升下荊瀝煑取三升入分四服能言未差後服小續命湯

又小續命湯方

麻黄貳兩去節 生薑伍兩切 防風壹兩半 芍藥 白朮

人參 芎藭壹兩 附子炮去皮 黄芩 防已各壹兩

桂心 甘草炙各貳兩

右壹拾貳味㕮咀以水壹斗先煑麻黄去上沫內諸藥煑取三升分三服

西州續命湯方

麻黄陸兩去節 石膏肆兩碎 桂心貳兩 杏仁叁拾枚去皮尖雙仁

芎藭 乾薑 黄芩 當歸 甘草炙各壹兩

右玖味㕮咀以水壹斗貳升先煑麻黄去上沫下諸藥煑取肆升分四服

續命湯主久風臥在牀起死人神方

麻黄去節 人參 桂心 附子炮去皮 茯苓各壹兩

防已 防風 黄芩各壹兩半 生薑陸兩切 半夏伍兩洗

枳實貳兩炙上氣悶者加之 甘草壹兩炙

右壹拾貳味㕮咀以水壹斗先煑麻黄取玖升去上沫停冷去滓內藥煑取叁升分三服若不瘥半夏去之加芍藥叁兩

大續命散主八風十二痺偏枯不仁手足拘急疼痛不得伸屈頭眩不能自舉起止顛倒或臥忽驚如墮樹狀盜汗臨事不興婦人帶下無子風入五藏甚者恐怖鬼來收錄或與鬼神交通悲啼哭泣忽忽欲走方

烏頭炮去皮 防風 麻黄去節 人參 杏仁去皮尖兩仁熬

芍藥 石膏研 乾薑 芎藭 茯苓

黄芩 桂心 蜀椒去目閉口者汗 甘草炙各壹兩 當歸貳兩

右壹拾伍味擣篩爲散酒服方寸匕日二稍增以知爲度

排風湯方

白鮮皮　白术　芍藥　芎藭　當歸

獨活　杏仁去皮尖及雙仁熬　防風　桂心

甘草炙各貳兩　茯神一作茯苓　麻黃去節各叁兩　生薑肆兩切

右壹拾叁味㕮咀以水壹斗先煮麻黃去上沫內諸藥煮取叁升八分三服取汗可服兩三劑

大排風湯主半身不遂口不能言及諸偏枯方

白鮮皮　附子炮去皮　麻黃去節　杏仁去皮尖熬　白术

防風　葛根　獨活　防巳　當歸

人參　茯神　甘草炙各叁兩　石膏陸兩碎　桂心貳兩

白芷壹兩

右壹拾陸味㕮咀以水壹斗柒升先煮麻黃取壹升半去沫澄清內藥煮取四升分四服日三夜一服

又排風湯主諸毒風邪氣所中口噤悶絕不識人身體疼煩面目暴腫手足腫方

犀角屑　羚羊角屑　貝子　升麻

右肆味各壹兩別擣成末合和以水二升半內方寸匕煮取壹升去滓服五合殺藥者以意加之若腫和雞子傅上日三老小以意增減神良

大巖蜜湯主賊風腹中絞痛并飛尸遁注發作無時發則搶心腹脹滿脇下如刀錐刺并主少陰傷寒方

梔子拾伍枚擘　乾地黃　乾薑　細辛　當歸

青羊脂　吳茱萸　茯苓　芍藥　桂心

甘草炙各壹兩

右壹拾壹味㕮咀以水捌升煮取叁升去滓內羊脂令消

分溫三服

小嚴蜜湯 主惡風角弓反張飛尸入腹絞痛悶絕往來有時筋急少陰傷寒口噤不利方

雄黃研 青羊脂各壹兩 大黃貳兩 吳茱萸叁兩

當歸 乾薑 芍藥 細辛 桂心

乾地黃 甘草炙各壹兩

右壹拾壹味㕮咀以水貳斗煮取陸升分六服重者加藥用水三斗煮取九升分十服

烏頭湯 主八風五尸惡氣遊走心胷流出四肢來往不住短氣欲死方

烏頭炮去皮 芍藥 當歸 乾薑 桂心

細辛 乾地黃 吳茱萸 甘草炙各壹兩

右玖味㕮咀以水柒升煮取貳升半分三服

大八風湯 主毒風頑痺嚲曳或手脚不隨身體偏枯或毒弱不任或風入五藏恍恍惚惚多語喜忘有時恐怖或肢節疼痛頭眩煩悶或腰脊強直不得俛仰腹滿不食欬嗽或始遇病時卒倒悶絕即不能語便失瘖半身不隨不仁沈重皆由體虛恃少不避風冷所致方

烏頭炮去皮 黃芩 芍藥 遠志去心 獨活

防風 芎藭 麻黃去節 秦艽 石斛

人參 茯苓 石膏碎 黃耆 紫菀各貳兩

當歸貳兩半 升麻壹兩半 大豆貳合 五味子伍分 杏仁肆拾枚去皮尖雙仁

乾薑 桂心 甘草炙各貳兩半

右貳拾叁味㕮咀以水壹斗叁升酒貳升合煮取四升強人分四服少力人分五六服深師同

芎藭湯 主卒中風四肢不仁喜笑不息方

芎藭壹兩半 杏仁貳拾枚去皮及尖雙仁 麻黃去節 黃芩

桂心 當歸 石膏碎 秦艽 乾薑

甘草炙各壹兩

右壹拾味㕮咀以水九升煮取三升分三服

倉公當歸湯 主賊風口噤角弓反張身體強直方

當歸 細辛 防風各壹兩半 獨活叁分 麻黃貳兩半去節

附子壹枚炮去皮

右陸味㕮咀以酒八升水四升合煮取四升分肆服口不開者挍口下湯一服當開二服小汗三服大汗

芎藭湯 主風癲引脇痛發作則吐耳中如蟬鳴方

芎藭 藁本 䕡茹各伍兩

右叁味切以淳酒五升內藥煮取三升頓服羸者二服取大汗

治風癲狂及百病方

大麻子肆升上好者

右壹味以水陸升猛火煮令牙生去滓煎取柒升旦空肚頓服或不發或多言語勿怪之但使人摩手足須臾即定凡進三劑無不愈令人身輕衆邪皆去

防己湯 主風歷節四肢痛如鎚鍛不可忍者

防己 茯苓 生薑切 桂心各肆兩 烏頭柒枚去皮

人參叁兩 白朮陸兩 甘草叁兩炙

右捌味㕮咀以水壹斗煮取貳升半服捌合日三當熠熠微熱痺勿怪若不覺復更合之以覺乃止凡用烏頭皆去皮熬令黑乃堪用無毒

三黃湯 主中風手足拘攣百節疼痛煩熱心亂惡寒經日不欲飲食方

麻黃伍分去節 獨活壹兩 黃芩叁分 黃耆半兩 細辛半兩

右伍味㕮咀以水伍升煮取貳升去滓分貳服一服小汗兩服大汗心中熱加大黃半兩腹滿加枳實一枚氣逆加人參三分心悸加牡蠣三分渴加栝樓三分先有寒加八角附子一枚此仲景方神秘不傳

黃耆湯 主八風十二痺手脚疼痛氣不和不能食飲方

黃耆 當歸 桂心 甘草炙各叁兩 白朮

烏頭炮去皮 芎藭 防風 乾地黃各貳兩

生薑切肆兩 前胡壹兩半

右壹拾壹味㕮咀以水壹斗壹升煮取叁升半分四服此湯和而補有氣者加半夏四兩

白斂湯 主中風萎躄拘攣不可屈伸方

白斂 乾薑 薏苡仁 酸棗 牛膝

桂心 芍藥 車前子 甘草炙壹升 附子叁枚炮去皮

右壹拾味㕮咀以酒貳斗漬一復時煮三沸服壹升日三服扶杖而起不能酒者服五合

防己湯 主風濕四肢疼痺攣急浮腫方

木防己叁兩 茯苓壹兩 桑白皮切貳升 桂心叁兩

芎藭叁兩 甘草壹兩半炙 大棗拾貳枚擘 芍藥貳兩 麻黃貳兩去節

右玖味㕮咀以水壹斗貳升煮麻黃減壹升內藥煮取三升分三服漸汗出令遍身以粉粉之慎風冷一方茯苓四兩麻黃三兩

治三十年風方

松葉壹斤切以酒壹斗煮取貳升頓服取汗出佳

治一切風虛方常患頭痛欲破者

杏仁玖升去皮尖兩仁者暴乾

右壹味擣作末以水玖升研濾如作粥法緩火煎令如麻

浮上匙取和羹粥酒内一匙服之每食即服不限多少服七日後大汗出二十日後汗止慎風冷猪魚雞蒜大醋一劑後諸風減差春夏恐醋少作服之秋九月後煎之此法神妙可深秘之

治中風發熱方

大戟　苦參等分

右貳味擣篩藥半升以醋漿水壹斗煑三沸洗之從上至下立差寒乃止小兒三指撮醋漿水四升煑如上法

羌活飲　治風方

羌活叁兩　茯神　薏苡仁一用羌活去薏苡仁　防風各壹兩

右叁味㕮咀以水叁升煑取壹升内竹瀝三合煑壹沸分再服

猪苓煑散　主下痢多而小便澀方

猪苓　茯苓　澤瀉　黃連　白术各肆兩

防己　羌活　黃芩　人參　丹參

防風　牛膝　升麻　犀角屑　杏仁去皮尖雙仁熬

秦艽　穀皮　紫菀　石斛　生薑各叁兩切

橘皮貳兩　附子伍兩炮去皮　桑根白皮陸兩

右貳拾叁味擣篩為散以水壹升半煑五方寸匕取壹升頓服日再不能者壹服十月後二月末以來可服之

論曰人不能用心謹慎遂得風病半身不隨言語不正庶事皆廢此為猥退病得者不出十年宜用此方差後仍須將慎不得用未病之前當須絕於思慮省於言語為於無事乃可求愈若還同俗類名利是務財色為心者幸勿苦事醫藥徒勞為療耳宜於此善以意推之凡人忽中生風皆須依此次第用湯即得愈也學者子細尋思明然河見

凡初得風四肢不收心神惛憒眼不識人言不出口凡中風多由熱起服藥當須慎酒麪羊肉生菜冷食猪魚雞牛馬肉蒜乃可差得患即服此竹瀝湯方

竹瀝貳升　生薑汁叁合　生葛汁壹升

右叁味相和溫煖分三服平旦日晡夜各一服服訖若覺四體有異似好以次進後方

麻黃去節　防風各壹兩半　杏仁肆拾枚去皮尖及雙仁　羚羊角貳兩屑

生薑肆兩切　生葛汁五合一云地黃汁　竹瀝壹升　石膏陸兩綿裹

芎藭　防己　附子炮去皮　芍藥　黃芩

人參　桂心　甘草炙各壹兩

右壹拾陸味㕮咀以水柒升煑取壹升半乃下瀝汁煑取貳升柒合分溫三服五日更服一劑頻進三劑慎如上法漸覺稍損次進後方

麻黃去節　防風　升麻　桂心　芎藭

獨活　羚羊角屑各貳兩　竹瀝貳升　防己壹兩

右玖味㕮咀以水四升并瀝煑取叁升分三服兩日進壹劑頻進三劑若手足冷者加生薑五兩白朮貳兩若未除次進後方

麻黃去節　芍藥　防風各壹兩半　羚羊角屑貳兩

生薑貳兩切　附子炮叁分去皮　石膏貳兩碎　防己　黃芩

芎藭　白朮　人參　獨活　升麻

桂心　甘草炙各壹兩　竹瀝壹升

右壹拾柒味㕮咀以水捌升煑減半下瀝煑取貳升半分叁服相去如人行十里再服有氣加橘皮牛膝五加皮各壹兩若除退訖可常將服後煑散方

防風　獨活　秦艽　黃耆　芍藥

人參　茯神　白朮　芎藭　山茱萸
署預　桂心　天門冬去心　麥門冬去心　厚朴炙
升麻　丹參　羚羊角屑　五加皮　防已
牛膝　石斛　地骨皮　甘草炙各肆兩　麻黃去節
附子炮去皮　遠志去心　橘皮各叁兩　生薑切貳兩　甘菊花
薏苡仁各貳升　石膏研　乾地黃各陸兩

右叁拾叁味擣篩為散每煑以水叁升內散三兩煑取壹升綿濾去滓頓服之日別壹服若覺心下煩熱以竹瀝代水煑之千金有黃芩檳榔藁本杜仲犀角無山茱萸署預甘菊麥門冬附子

凡患風人多熱宜服荊瀝方

荊瀝　竹瀝　生薑汁各伍合

右叁味相和溫為壹服每日旦服煑散午後當服此荊瀝常作此將息

論曰夫得風之時則依此次第療之不可違越若不依此當失機要性命必危

防風湯 主偏風甄權處治安平公方

防風　芎藭　白朮　狗脊　萆薢
牛膝　白芷各壹兩　薏苡仁　葛根　杏仁去皮尖兩仁
人參　羌活各貳兩　麻黃去節肆兩　生薑切伍兩　桂心
石膏各叁兩碎

右壹拾陸味㕮咀以水壹斗貳升煑取叁升分三服服一劑覺好更服一劑一劑一度針之服九劑湯九度針之針風池一穴肩髃一穴曲池一穴文溝一穴五樞一穴陽陵泉一穴巨虛下廉一穴合七穴即差○仁壽宮備身患脚奉勑針環銚陽陵泉巨虛下廉陽輔即起行○大理趙卿患風腰脚不隨不得跪起針上窌二穴環銚二穴陽陵泉

二穴巨虛下廉二穴即得跪起

治猥退風方

蒼耳子伍升苗亦得用　羊桃切　蒴藋切　赤小豆各貳升半

鹽貳升

右伍味以水兩石伍斗煑取伍斗適寒温內所患脚漬深至絕骨勿過之一度炊五斗米頃出之慎風冷汗從頭出

論曰聖人以風是百病之長深爲可憂故避風如避矢是以防禦風邪以湯藥針灸蒸熨隨用一法皆能愈疾至於火艾特有奇能雖曰針湯散皆所不及灸爲其最要昔者華佗爲魏武帝針頭風華佗但針即差華佗死後數年魏武帝頭風再發佗當時針訖即灸頭風豈可再發只由不灸其本不除所以學者不得專恃於針及湯藥等望病畢差既不苦灸安能拔本塞源是以雖豐藥餌諸療之要在火艾爲良初得之時當急下火火下即定比煑湯熟已覺眼明豈非大要其灸法先灸百會次灸風池次灸大椎次灸肩井次灸曲池次灸間使各三壯次灸三里五壯其炷如蒼耳子大必須大實作之其艾又須大熟從此以後日別灸之至隨年壯止凡人稍覺心神不快即須灸此諸穴各三壯不得輕之苟度朝夕以致殞斃戒之哉戒之哉

又論曰學者凡將欲療病先須灸前諸穴莫問風與不風皆先灸之此之一法醫之大術宜深體之要中之要無過此術是以常預收三月三日艾擬救急危其五月五日亦好仍不及三月三日者又有卒死之人及中風不得語者皆急灸之夫卒死者是風入五藏爲生平風發強忍怕痛不灸忽然卒死謂是何病所以皆必灸之是大要也

脚氣第二　論一首　方二十一首

論曰治脚氣順四時若春秋二時宜兼補瀉夏則疾成專須汗利十月以後少用補藥雖小變不越此法

治脚氣初發從足起至膝脛腫骨疼者方

取胡麻葉切擣蒸薄裹日二易即消若冬月取蒴藋根切擣和糟三分根一分合蒸令熱裹如前法

遍身腫小便澀者用麻豆湯主之方

大麻貳升熬研 烏豆壹斗以水四斗煮取汁壹斗半去豆 桑白皮切伍升

右叁味以豆汁內藥煮取陸升壹服壹升日二服三日令盡

又方

烏牛尿壹服壹升日二腫消止羸瘦者二分尿一分牛乳合煮乳浮結乃服之

又方

生猪肝一具細切以淡蒜虀食盡不可盡者分再食之

治腰脚疼方

胡麻子壹斗新者

右壹味熬令香擣篩若不數篩當脂出不下日服壹小升日叁服盡藥計壹斗即永差酒飲羹汁蜜湯皆可服之

大下之後而四體虛寒脚中羸弱腰攣痛食飲減少皮肉虛踈石斛酒方

生石斛壹斤 秦艽 遠志各伍兩去心 橘皮 白术各叁兩

丹參 茯神 五加皮各陸兩 桂心肆兩 牛膝捌兩

右壹拾味㕮咀以酒叁斗漬七日一服六合稍加至七八合以知為度

調利之後未平復間為外風傷脚中痛酸轉為脚氣補虛防風湯方

防風 石斛 杜仲炙 前胡各肆分 薏苡仁半斤

秦艽　丹參　五加皮　附子(炮去皮)　橘皮
白朮　白前(各叄分)　防已(貳分)　麻仁(壹升熬取脂)
右壹拾肆味㕮咀以水壹斗貳升煑取叄升分三服
服湯已脚氣仍不止防風圓方
防風(貳兩)　秦艽(貳兩)　石斛(貳兩)　丹參(壹兩)　薏苡仁(叄合)
前胡　橘皮　杜仲(炙)　附子(炮去皮)　白朮(各壹兩)
桂心(壹兩半)　麻仁(壹升熬取脂)
右壹拾貳味擣篩爲末鍊蜜和圓如梧子酒服貳拾圓日
貳服
治脚氣常作穀白皮粥防之法即不發方
穀白皮(伍升切勿取斑者有毒)
右壹味以水壹斗煑取柒升去滓煑米粥常食之
溫腎湯主腰脊膝脚浮腫不隨方

茯苓　乾薑　澤瀉(各貳兩)　桂心(叄兩)
右肆味㕮咀以水陸升煑取貳升分三服
竹瀝湯主兩脚痺弱或轉筋或皮肉脹起如腫而按之不陷
心中惡不欲食或患冷氣方
甘竹瀝(伍升)　葛根　防風(各貳兩)　麻黃(陸兩去節)　升麻(伍分)
桂心(壹兩)　附子(壹枚炮去皮)　秦艽　細辛　木防已
黃芩　乾薑　白朮　甘草(炙各壹兩)
右壹拾肆味㕮咀以水柒升內甘竹瀝五升合煑取叄升
分四服取汗(千金有茯苓杏仁無白朮)
大竹瀝湯主卒中惡風口噤不能言四肢緩縱偏攣急痛風
經五藏恍惚喜怒無常手足不隨皆悉主之方
甘竹瀝(壹斗肆升)　人參　細辛　石膏(各壹兩碎)　生姜(伍兩切)
烏頭(叄枚炮去皮)　防風　獨活　芍藥　黃芩

茵芋 麻黃(去節) 葛根 木防巳 桂心
茯苓 甘草(炙各貳兩) 芎藭(壹兩)
右壹拾捌味㕮咀以竹瀝煮取四升分三服(一方以水五升千金有白术)

又竹瀝湯 主風氣入腹短氣心下煩熱不痛手足煩疼四肢不舉口噤不能言方

竹瀝(壹斗) 當歸 秦艽 防風 葛根(各貳兩)
人參 芍藥 木防巳 附子(炮去皮) 細辛
茯苓(一作茯神) 通草 桂心 白术 甘草(炙各壹兩)
右壹拾伍味㕮咀以竹瀝漬半日煮取四升分三服不能者四服(千金有芎藭生薑黃芩升麻蜀椒麻黃無芍藥防巳通草)

大鼈甲湯 主脚弱風毒攣痺氣上皆主之方

鼈甲(炙) 防風 麻黃(去節) 半夏(洗) 白术
茯苓 芍藥 杏仁(去皮尖雙仁) 麥門冬(去心) 生薑(切)
人參 石膏(碎) 羚羊角(屑) 甘草(炙各壹兩) 犀角(屑壹分)
雄黃(半兩研) 青木香(貳兩) 吳茱萸(半升) 大黃(壹分半) 麝香(叁分)
薤白(拾肆枚切) 烏梅 貝齒(各柒枚) 大棗(貳拾枚擘) 赤小豆(貳拾肆枚)
右貳拾伍味㕮咀以水貳㪷煮取四升分四服日二夜一服

大投杯湯 主脚弱舉體腫滿氣急日夜不得眠方

麻黃(去節) 杏仁(去皮尖及双仁) 桂心 黃芩
橘皮 石膏(各貳兩碎) 生薑(陸兩切) 半夏(洗) 厚朴(炙)
枳實(炙各叁兩) 茯苓(肆兩) 秦艽(壹兩半) 大戟 細辛(各壹兩)
大棗(貳拾枚擘) 甘草(貳兩炙)
右壹拾陸味㕮咀以水壹斗貳升煮取肆升分五服日三夜二

獨活湯 主脚氣風疼痺不仁脚中沉重行止不隨氣上方

獨活 桂心 半夏(洗各肆兩) 麻黃(去節) 芎藭

人參　茯苓(各貳兩)　八角附子(壹枚炮去皮)　大棗(拾貳枚擘)

防風　芍藥　當歸　黃耆　乾薑

甘草(炙各參兩)

右壹拾伍味㕮咀以水壹斗伍升酒貳升煑取參升半分爲五服

硫黃煎 主脚弱連屈虛冷方

硫黃(伍兩)　牛乳(伍升)

右貳味以水伍升合煑及伍升硫黃細篩內之煎取三升一服一合不知至三合

硫黃散 主脚弱大補面熱風虛方

硫黃(研)　鍾乳粉　防風(各伍兩)　乾薑(壹兩)　白朮

人參　蜀椒(汗去目及閉口者)　細辛　附子(炮去皮)　天雄(炮去皮)

茯苓　石斛　桂心　山茱萸(各參分)

右壹拾肆味擣篩爲散旦以熱酒服方寸匕日三加至二匕

青圓 主脚風皮肉身體諸風方

烏頭(壹兩炮去皮)　附子(參兩炮去皮)　麻黃(肆兩去節)

右參味擣篩爲末鍊蜜和圓如梧子大酒服五圓日三服

硫黃圓 主膈淡滯澼逐脚中風水方

硫黃(伍兩)

右壹味細粉以牛乳參升煑令可圓如梧子大暴令乾酒服參拾圓日三不知漸加至一百圓

石硫黃圓 主脚風弱胷腹中冷結方

石硫黃(半兩)　桂心(肆兩)　礜石(燒)　附子(炮去皮)　天雄(炮去皮)

烏頭(各貳兩炮去皮)

右陸味擣篩爲末鍊蜜和圓如梧子大空腹酒服伍圓日參服

癮疹第三 方一十六首 灸法一首

石南湯 主癮疹方

石南 乾薑 黃芩 細辛 人參各壹兩

桂心 當歸 芎藭各壹兩半 甘草貳兩 乾地黃參分

食茱萸伍分 麻黃壹兩半去節

右壹拾貳味㕮咀以酒參升水陸升煑取參升分參服取大汗愼風冷佳

又方

酪和鹽熟煑摩之手下消

又方

白芷根葉煎湯洗之

治風瘙癮疹煩心悶亂方

天雄炮去皮 牛膝 知母各壹兩 栝樓伍分 白朮貳兩

人參半兩 乾薑 細辛 桂心各參分 防風壹兩半

右壹拾味擣篩爲散酒服半錢匕日再夜一以知爲度稍增至壹錢匕

治大人小兒風疹方

白礬貳兩末之

右壹味以酒參升漬令消拭上愈

又方

吳茱萸壹升

右壹味以酒伍升煑取壹升半拭上

治風痹癮疹方

大豆參升 酒陸升

右貳味煑四五沸服壹杯日三

治風痹癮疹洗湯方

蛇牀子貳升 防風 生蒺藜各貳斤

右參味切以水壹斗煑取伍升以綿拭上日四五度

又洗湯方

黃連　黃芩　白术各貳兩　戎鹽　礬石各半兩

細辛貳兩　芎藭　茵芋各壹兩

右捌味切以水壹斗煑取叁升洗之日三度

又洗湯方

馬蘭一作馬蘭子　蒴藋　茺蔚子　礬石

蒺蔾　茵芋　羊桃根　萹蓄各貳兩

右捌味切以醋漿貳斗煑取壹斗貳升內礬石洗之日三度

治暴風氣在上表皮作癮瘮瘡方

煑槐枝葉以洗之灸瘡火瘡亦愈

青羊脂膏主風熱赤瘮癢搔之逐手作瘡方

青羊脂四兩　芍藥　黃芩　黃耆

白芷　寒水石各壹兩　竹葉壹升切　石膏壹斤碎

白及　升麻　防風　甘草炙各叁分

右壹拾貳味切先以水壹斗煑石膏竹葉取伍升合漬諸藥以不中水猪脂貳升合煎白芷黃膏成以傅之

灸法

以一條艾蒿長者以兩手極意尋之著壁立兩手并蒿竿拓著壁伸十指當中指頭以大艾炷灸蒿竿上令蒿竿斷即上灸十十差於後重發更依法灸永差

楓香湯主癮瘮方

楓香壹斤　芎藭　大黃　黃芩　當歸

人參　射干　甘草炙各叁兩　升麻肆兩　蛇牀仁貳兩

右壹拾味切以水貳斗煑取柒升適冷煖分以洗病上日三夜二

地榆湯主癮瘮發瘡方

地榆叄兩 苦參捌兩 大黃 黃芩各肆兩 黃連
芎藭各貳兩 甘草陸兩炙
右柒味切以水陸斗煑取叄斗洗浴之良
又方
大黃 當歸 升麻 防風 芍藥
青木香 黃芩 甘草各貳兩炙 楓香伍兩 黃蘗
芒消各叄兩 地黃汁壹升
右壹拾貳味切以水壹斗煑取叄升半去滓內芒消令烊
帛搨病上一炊久日四五夜二三主癮瘮痛癢良
治癮瘮痛癢搔之逐手腫方
當歸 芎藭 大戟 細辛 芍藥
附子去皮 芫花 躑躅 椒各壹兩 莽草半兩
右壹拾味切以苦酒浸藥一宿以猪膏貳升半煎三上三

下膏成去滓傅病上日三夜
癧瘍第四 方一十四首 灸法一首
治白癜白駮浸淫癧瘍著頸及胷前方
大醋於甌底磨硫黃令如泥又以八角附子截一頭使平
就甌底重磨硫黃使熟夜臥先布拭病上令熱乃以藥傅
之重者三度
又方
硫黃 水銀 礬石 竈墨
右肆味等分擣下篩以葱涕和研之臨臥以傅病上
又方
石硫黃叄兩 附子去皮 鐵精各壹兩
右叄味並研擣以三年醋和內甆器中密封七日以醋泔
淨洗上拭乾塗之乾即塗壹兩日慎風

灸法

五月五日午時灸膝外屈脚當文頭隨年壯兩處灸一時

下火不得轉動

治頭項及面上白駁浸淫漸長有似於癬但無瘡方

乾鰻鱺魚炙脂塗之先洗拭駁上外把刮之令小磣痛拭燥然後以魚脂塗之一塗便愈難者不過三塗之佳

又方　取生木空中水洗之食頃止

又方　桂心末唾和傅駁上日三

又方

白蘞(一作白斂)　當歸　附子(炮各壹兩去皮)　天雄(炮去皮)

黃芩(各壹兩)　乾薑(肆兩)　躑躅(壹升)

右柒味擣篩爲散酒服伍分匕日三服

凡人身有赤疵方

常以銀揩令熱不久漸漸消滅瘢痕

治疵贅疵痣方

雄黃　硫黃　眞朱　礬石(熬)　䕡茹

巴豆(去皮心)　藜蘆(各壹兩)

右柒味擣篩爲散以漆和令如泥塗貼病上須成瘡及去面上黑子點之即去

治皮中紫赤疵痣黶穢方

乾漆(熬)　雌黃　礬石(各參兩)　雄黃(伍兩)　巴豆(伍拾枚去皮)

炭皮(壹斤)

右陸味爲散以雞子白和塗故帛貼病上日二易之即除

九江散　主白癜及二百六十種大風方

當歸(柒分)　石南(壹兩半)　秦艽　躑躅　菊花

乾薑　防風　麝香　雄黃(研)　丹砂(研)

斑猫各壹兩　蜀椒去目及閉口者汗　連翹　知母
鬼箭　石長生各貳兩　附子炮去皮　王不留行
人參　鬼臼　莽草　木防巳　石斛
烏頭炮　天雄炮去皮　獨活各參兩　地膽　䖟蟲各拾枚
蜈蚣參枚　水蛭壹百枚
右參拾味諸蟲皆去足羽熬炙合擣爲散酒服方寸匕日
再服其白癜入頭令髮白服之百日白髮還黑也

芎藭湯主面上及身體風瘙癢方

芎藭　白术　山茱萸　防風　羌活
枳實各參兩炙　麻黃貳兩半去節　署預肆兩　蒺藜子
生薑各陸兩切　烏喙炮　甘草炙各貳兩
右壹拾貳味㕮咀以水玖升煮取貳升柒合分三服

又洗方

蒴藋根　蒺藜子　景天大棗各切貳升　蛇床子伍兩
玉屑半兩
右伍味切以水壹斗半煮取壹斗稍稍洗身面上日參夜
一愼風

大黃湯主風瘙腫癢在頭面方

大黃　芒消各壹兩　莽草　黃芩各貳兩
蒺藜子半升
右伍味切以水柒升煮取參升半去滓內芒消令烊以帛
搨腫上數百遍日五夜三勿令近眼一方有黃連

雜病上

霍亂第一 方二十七首

理中圓 主霍亂臨時方

人參 白术 乾薑 甘草炙各壹兩

右肆味擣篩爲末鍊蜜和圓如彈圓取湯和一丸服之日十服吐多痢少者取枳實三枚炙四破水三升煑取一升和壹圓服之吐少痢多者加乾薑一累吐痢乾嘔者取半夏半兩洗去滑水貳升煑取壹升和壹圓服之若體疼痛不可堪者水三升煑棗三枚取一升和一圓服之若吐痢大極轉筋者以韭汁洗腹腎從胷至足踝勿逆即止若體冷微汗腹中寒取附子一枚炮去皮四破以水貳升煑一升和一圓服吐痢悉止脉不出體猶冷者可服諸湯補之

厚朴湯主霍亂面煩方

厚朴炙　高良薑　桂心各參兩

右參味㕮咀以水陸升煑取二升分再服

四順湯主霍亂吐下腹痛手足逆冷方

大附子壹枚去皮破捌片　乾薑參兩　人參　甘草炙各壹兩

右肆味㕮咀以水伍升煑取壹升半分三服

治霍亂吐痢嘔逆龍骨湯方

龍骨　黃連　乾薑　赤石脂　當歸各參兩

枳實伍枚炙　半夏一升洗　附子炮去皮破　人參　桂心

甘草炙各貳兩

右壹拾壹味㕮咀以水玖升煑取參升分三服

治霍亂困篤不識人方

雞蘇壹大把

右壹味以水壹斗煑取參升分再服

治霍亂轉筋兩臂及脚胷脇諸轉筋並主之方

鹽壹升伍合煑作湯漬洗轉筋上按炙良

又方

大麻子壹升擣以水參升煑取壹升盡服之

又方

香薷壹把水煑令極濃服二三升即差青木香亦佳

治霍亂止吐方

丁香拾肆枚以酒伍合煑取貳合頓服之用水煑之亦佳

治霍亂吐痢心煩不止方

猪糞如雞子大壹枚爲末以沸湯壹升和之頓服良不差

更作

又方

粱米粉伍合水壹升半和之如粥頓服須臾即止

治霍亂轉筋入腹方

雞屎白末以水六合煮取湯服方寸匕

治大便不通噦數口譫語方

厚朴貳兩炙 大黃肆兩 枳實伍枚炙

右叁味㕮咀以水肆升煮取壹升貳合分再服當通不通盡服之

竹茹湯主噦方

竹茹壹升 橘皮 半夏洗各叁兩 生薑肆兩切 紫蘇壹兩

甘草壹兩炙

右陸味㕮咀以水陸升煮取貳升半分叁服

治中風客熱噦方

竹茹肆兩 生米伍合

右貳味以水陸升煮米熟服之

治嘔噦方

蘆根伍兩

右壹味切以水伍升煮取叁升分三服兼服小兒尿二合良

又方 飲大豆汁壹升止

又方 常服白羊乳壹升

治氣厥嘔噦不得息又主霍亂大豉湯方

香豉壹升 半夏洗 生薑各貳兩切 前胡

桂心 人參 甘草各壹兩炙

右柒味㕮咀以水伍升煮取貳升分三服勿使冷

傷寒噦而滿者宜視其前後知在何部不利利之愈噦而不利此湯主之方

橘皮壹升 甘草壹尺

右貳味㕮咀以水伍升煑取壹升頓服之

噦橘皮湯主之方

橘皮　通草　乾薑　桂心　甘草各貳兩炙

人參壹兩

右陸味㕮咀以水陸升煑取貳升分三服

小生夏湯主心下痞堅不能飲食胷中喘而嘔噦微寒熱方

生薑捌兩切以水參升煑取壹升　生夏伍合洗以水伍升煑取壹升

右貳味合煎取壹升半稍稍服之即止

又方

橘皮肆兩　生薑捌兩

右貳味切以水柒升煑取貳升伍合分三服下喉即差方

差更合

又方

羚羊角屑　前胡　人參　橘皮　甘草各壹兩炙

右伍味㕮咀以水陸升煑取貳升分三服

卒噦爪眉頭亦可針此主實噦實噦者醉飽得之虛噦者吐下得之又失血虛後亦得之方

炭末蜜和細細咽少許即差

又方

男噦女人丁壯氣盛者噓其肺俞女子男子噓之

痎瘧第二 方一首 針灸法七首 禳法十二首

蜀漆圓主痎瘧連年不差服三七日定差方

蜀漆　知母　白薇　地骨皮　麥門冬去心

升麻各伍分　恒山壹兩半　石膏貳兩研　香豉壹合　萎蕤

烏梅肉　鱉甲各壹兩炙　甘草參分炙

右壹拾參味擣篩爲末鍊蜜和圓如梧子空腹飲服拾圓

日再加至貳參拾圓

陵鯉湯 主瘧疾江南瘴瘧方

陵鯉甲拾肆枚炙 鼈甲壹枚炙 烏賊魚骨 附子炮去皮各壹兩

恒山參兩

右伍味㕮咀以酒參升漬壹宿未發前稍稍啜之勿絶吐之并塗五心一日斷食過時久乃食

肝瘧令人色蒼蒼然太息其狀若死刺足厥陰見血

心瘧令人心煩甚欲得清水寒多不甚熱刺足少陰是謂神門

脾瘧令人病寒腹中痛熱則腸中鳴鳴已汗出刺足太陰

肺瘧令人心寒甚熱間善驚如有見者刺手太陰陽明

腎瘧令人悽悽腰脊痛宛轉大便難目眴眴然手足寒刺足太陽少陰

胃瘧令人且病寒善飢而不能食支滿腹大刺足陽明太陰

橫脉出血

黃帝問岐伯曰瘧多方少愈者何岐伯對曰瘧有十二種

黃帝曰瘧鬼字何可得聞乎岐伯對曰但得瘧字便愈不得其字百方不愈

黃帝曰瘧鬼十二時願聞之岐伯對曰

寅時發者獄死鬼所爲治之以瘧人著窑上灰火一周不令火滅即差

卯時發者鞭死鬼所爲治之用五白衣燒作灰三指撮著酒中無酒清水服之

辰時發者墮木死鬼所爲治之令瘧人上木高危處以棘塞木奇間即差

巳時發者燒死鬼所爲治之令瘧人坐師以周匝然火即差

午時發者餓死鬼所爲治之令瘧人持脂火於田中無人處

以火燒脂令香假拾新去即差

未時發者溺死鬼所爲治之令瘧人臨發時三渡東流水即差

申時發者自刺死鬼所爲治之令瘧人欲發時以刀刺塚上使得姓字呪曰若差我與汝拔却即差

酉時發者奴婢死鬼所爲治之令瘧人碓梢上捧上卧莫令人道姓字即差

戌時發者自絞死鬼所爲治之左索繩繫其手脚腰頭即差

亥時發者盜死鬼所爲治之以刀子一口箭一隻灰一周刀安瘧人腹上其箭横著底下即差

子時發者寡婦死鬼所爲治之令瘧人脱衣東廂牀上卧左手持刀右手持杖打令聲不絶瓦盆盛水著路邊即差

丑時發者斬死鬼所爲治之令瘧人當戶前卧頭東向血流頭下即差

瘧醫並不能救者方

以繩量病人脚圍繞足跟及五指一匝訖截斷繩取所量得繩置項上著反向背上當繩頭處中脊骨上灸三十壯即定候看復惡寒急灸三十壯即定比至過發一炊久候之雖飢勿與食盡日此法神驗男左女右

黄疸第三 論三首 方二十八首 針灸十法

論曰凡遇時行熱病多必内瘀著黄但用瓜丁散内鼻中令黄汁出乃愈即於後不復病黄矣常須用心警候病人四肢身面微似有黄氣須用瓜丁散不得令散漫失候必大危矣特忌酒麪犯者死

黄疸目黄不除瓜丁散方

瓜丁細末如壹大豆許内鼻中令病人深吸取入鼻中黄水出差

凡人無故忽然振寒便發黃皮膚黃麴塵出小便赤少大便時閉氣力無異食飲不妨已服諸湯餘熱不除久黃者苦參散主之方

苦參　黃連　黃蘗　黃芩　大黃

瓜丁　葶藶（各熬壹兩）

右柒味擣篩爲散飲服方寸匕當大吐吐者日壹服不吐者日再亦得下服藥五日知可消息不知可更服之

小半夏湯 治黃疸小便色不異欲自利腹滿而喘不可除熱熱除必噦噦者

半夏（壹升洗去滑）　生薑（半斤）

右貳味切以水壹斗煑取貳升分再服（壹法以水柒升煑取壹升半）

黃疸身目皆黃皮肉麴塵出方

茵陳（壹把切）　梔子仁（貳拾肆枚）　石膏（壹斤）

右叁味以水伍升煑貳味取貳升半去滓以猛火燒石膏令赤投湯中沸定服壹升覆取汗周身以粉粉之不汗更服

黃疸腹滿小便不利而赤自汗出此爲表和裏實當下之宜大黃湯方

大黃　黃蘗　消石（各肆兩）　梔子（拾伍枚擘）

右肆味㕮咀以水陸升煑取貳升去滓下消石煑取壹升先食頓服之

茵陳湯 主時行黃疸結熱面目四肢通黃乾嘔大便不通小便赤黃似蘗汁腹痛心煩方

茵蔯　半夏（各洗貳兩）　生薑（肆兩切）　大黃（貳兩）　芍藥

白朮（各壹兩半）　梔子（擘）　前胡（各叁兩）　枳實（炙）　厚朴（炙）

黃芩　甘草（各炙壹兩）

右壹拾貳味㕮咀以水四斗煑取九升柒合分十服

又方　黃蒸汁叄升頓服即差

又方　蔓菁子伍升末服方寸匕日三數日驗

又方

黃蒸　麥麲　猪矢各壹升

右叄味以水伍升漬一宿旦絞去滓服一升覆取汗出

大茵蔯湯主內實熱盛發黃黃如金色脉浮大滑實緊數者夫發黃者多是酒客勞熱食少胃中熱或濕毒內熱者故黃如金色方

茵蔯壹兩半　大黃　茯苓　前胡　白朮各三兩

黃蘗壹兩半　梔子仁貳拾枚　黃芩　栝樓

枳實炙　甘草炙各貳兩

右壹拾壹味㕮咀以水玖升煑取叄升分服一升得快下三四日愈

治黃疸病五年以上不差但是湯藥服之即差差已還發者

茵蔯貳斤淨擇去惡草切之

右壹味以水貳斗煑取五升空腹一服二升日三夜一隔日更服之取差止神驗

黃疸變成黑疸醫所不能治方

土瓜根擣取汁壹升

右壹味頓服之病當從小便出

黃黑等疸方

當歸叄兩　桂心陸兩　乾棗壹拾柒枚去核　麥門冬壹升去心

大黃壹兩　茵蔯　黃芩　黃耆壹本無　乾薑

茯苓　芍藥　黃連　石膏碎　人參

甘草炙各貳兩

右壹拾伍味㕮咀以水壹斗煑取叄升半分四服

赤苓散 主黑疸身皮大便皆黑方

赤小豆（參拾枚） 茯苓（陸銖切） 雄黃（壹銖） 瓜丁（肆銖）

女萎（陸銖） 甘草（貳銖炙）

右陸味以水叁升煮豆茯苓取八合擣四味爲散和半錢匕服之須臾當吐吐則愈亦主一切黃

茵蔯圓 主黑疸身體闇黑小便澀體重方

茵蔯（壹兩） 甘遂（壹分） 當歸 蜀椒（汗各半兩去目閉口）

杏仁（去皮尖雙仁熬） 大黃 半夏（洗各叁分） 葶藶（熬）

茯苓 乾薑（各壹兩） 枳實（㕮咀熬黃） 白朮（熬黃各伍分）

右壹拾貳味擣篩爲末鍊蜜和圓如梧子大空腹以飲服叁圓日叁

濕疸之爲病始得之一身盡疼發熱面色黑黃七八日後壯熱熱在裏有血當下去之如豘肝狀其少腹滿者急下之亦

一身盡黃目黃腹滿小便不利方

礬石（伍兩燒） 滑石（伍兩研如粉）

右貳味擣篩爲散以水服方寸匕日三服先食服之便利如血已當汗出愈（千金以麥粥汁服）

風疸小便數或黃或白洒洒惡寒壯熱好睡不欲動方

生艾（三月三日取一束擣取汁銅器中煎如漆密封之勿令泄） 大黃

黃連 凝水石 苦參 葶藶子 栝樓（各等分熬）

右陸味擣篩爲散以艾煎和爲圓如梧子先食飲服伍圓日三可至貳拾圓有熱加苦參渴加栝樓小便澀加葶藶小便多加凝水石小便黃白加黃連大便難加大黃

秦椒散 主膏疸飲少溺多方

秦椒（壹分汗） 瓜丁（半兩）

右貳味擣篩爲散水服方寸匕日三

秦王九疸散方

胃疸食多喜飲梔子人主之

心疸煩心心中熱茜根主之

腎疸脣乾葶藶子主之 熬

脾疸尿赤出少惕惕恐栝樓主之

膏疸飲少尿多秦椒瓜蔕主之 一椒汗膏 術肺

舌疸渴而數便鍾乳主之

肉疸小便白凝水石主之 研

髓疸目眶深多嗜卧牡蠣澤瀉主之

肝疸胃熱飲多水激肝白朮主之

右壹拾壹味等分隨病所在加半兩擣篩爲散飲服伍分匕日三稍稍加至方寸匕

論曰夫酒疸其脉浮者先吐之沈弦者先下之酒疸者或無熱靖言了了腹滿欲吐者宜吐之酒疸心中熱欲嘔者宜吐之酒疸必小便不利其候當心中熱足下熱是其候也酒疸下之久久爲黑疸目青面黑心中如噉蒜虀大便正黑皮革搔之不仁其脉浮弱雖黑微黄故知之也

寒水石散 主肉疸飲少小便多白如泔色此病得之從酒方

寒水石　白石脂　栝樓 各五分　知母　菟絲子

桂心 各叁分

右陸味擣篩爲散麥粥服五分匕日三五日知十日差

酒疸身黄麴塵出牛膽煎方

牛膽 壹枚　大黄 捌兩　芫花 壹升熬　蕘花 半升熬　瓜丁 叁兩

右伍味以酒壹升切肆味漬之一宿煑減半去滓内牛膽微火煎令可圓丸如大豆服壹丸日移六七尺不知更服壹丸膈上吐膈下利或不吐利而瘥

酒疸心中懊憹或痛梔子湯方

梔子（拾肆枚擘） 枳實（參枚炙） 大黃（貳兩） 豉（半升）

右肆味㕮咀以水陸升煑取貳升服柒合日三

（茵蔯湯）主黃疸酒疸身目悉黃方

茵蔯（參兩） 大黃 黃芩 黃連（各貳兩） 人參（半兩）

梔子仁（參柒枚） 甘草（壹兩炙）

右柒味㕮咀以水壹斗煑取參升五合分四服

（半夏湯）主酒癖廕胷心脹滿肌肉沉重逆害飲食小便赤黃此根本虛勞風冷飲食衝心由脾胃客淡所致方

半夏（壹升洗） 生薑（拾兩切） 黃芩（壹兩） 前胡 茯苓（各參兩）

當歸 茵蔯（各壹兩） 枳實（炙） 大戟 白朮

甘草（炙各貳兩）

右壹拾壹味㕮咀以水壹斗煑取參升分參服

（宛轉圓）凡患黃疸足腫小便赤食少羸瘦方

乾地黃 石斛 白朮（各貳兩） 牡蠣（熬） 芍藥

芎藭 大黃 小草 甘草（炙各參兩）

右玖味擣篩爲散鍊蜜和圓如梧子飲服四圓日三

（茯苓圓）主患黃心下縱橫結堅小便赤是酒疸方

茯苓 茵蔯 乾薑（各壹兩） 半夏（洗） 杏仁（去皮尖雙人熬各參分）

商陸（半兩） 甘遂（壹分） 枳實（伍分炙） 蜀椒（貳合汗去目閉口） 白朮（伍分切熬令變色）

右壹拾味擣篩爲末鍊蜜和圓如蜱豆參圓以棗湯下之夫患黃疸常須服此若渴欲飲水即服伍苓散若妨滿宛轉圓治之五苓散見傷寒中

治黃疸小便赤黃方

前胡 茯苓（各壹兩半） 椒目（壹兩熬） 附子（半分炮去皮）

茵蔯（貳兩半） 昌蒲（貳兩半）

右陸味擣篩爲散食以前服一錢匕日三服此劑更參服

上二藥

黃疸之爲病日晡所發熱惡寒少腹急體黃額黑大便黑溏洩足下熱此爲女勞也腹滿者難療方

滑石 研　石膏 研各伍兩

右貳味爲散麥粥汁服方寸匕日三小便極利差

灸黃法 貳拾穴

第十一椎下俠脊兩邊各一寸半灸脾俞百壯

兩手小指端灸手少陰隨年壯

手心中灸七壯

胃管主身體痿黃灸百壯治十差忌針

耳中在耳門孔上橫梁主黃疸

上腭入口裏邊在上縫赤白脉上是針三鍉

舌下俠舌兩邊針鍉

頰裏從口吻邊入往對頰裏去口一寸鍉

上腭裏正當人中及脣針三分鍉

巨闕　上管

右二穴並七壯狂言浪走者灸之差

寅門從鼻頭直入髮際度取通繩分爲三斷繩取一分入髮際當繩頭鍉 鍉字未詳不敢刊正

脊中椎上七壯

盃手大指節理各七壯

中管　大陵　勞宮　三里　然谷　大谿

右八穴皆主黃疸

論曰黃疸之爲病若不急救多致於死所以具述古今湯藥灸鍉方法按據此無不差也有人患之皆昏昧不識好惡與

茵蔯湯一劑不解亦有惺惺如常身形似金色再服亦然滿兩日一劑其黃不變於後與灸諸穴乃差瘡上皆黃水出然此大慎麪肉醋魚蒜韭熱食犯之即死

吐血第四 論三首 方三十首

論曰凡吐血有三種有內衄有肺疽有傷胃內衄者出血如鼻衄但不從鼻孔出是近心肺間津液出還流入胃中或如豆汁或如衃血凝停胃中滿悶便吐或去數升乃至一斗得之於勞倦飲食過常所爲也肺疽者或飲酒之後悶吐血從吐出或一合半升傷胃者因飲食大飽之後胃中冷則不能消化便煩悶強嘔吐之物與氣共上衝蹙傷裂胃口血色鮮赤腹中絞痛白汗出其脉緊而數者爲難治也吐之後體中但奄奄然心中不悶者輒自愈假令煩躁心中悶亂紛紛欲吐顛倒不安醫者又與黃土湯阿膠散益使悶亂卒至不救如此悶者當急吐之

吐方

瓜蔕半兩 杜蘅 人參各壹分

右叁味擣篩爲散服一錢匕水漿無在得下而已羸者小減之吐去青黃或血二三升無苦

生地黃湯 主憂恚嘔血煩滿少氣胷中痛方

生地黃貳斤 大棗伍拾枚擘 阿膠炙 甘草炙各叁兩

右肆味㕮咀以水陸升煑取肆升分爲肆服日叁夜壹

堅中湯 主虛勞內傷寒熱頻連吐血方

糖叁斤 芍藥 半夏洗 生薑各叁兩 大棗伍拾枚擘

生地黃壹斤

右陸味㕮咀以水貳斗煑取柒升分柒服日三夜一 千金有甘草桂心無地黃

治噫止唾血方

石膏碎肆兩　生薑切　麻黃去節　五味子各貳兩

小麥壹升　厚朴炙　半夏洗　杏仁去皮尖雙仁各叁兩

右捌味㕮咀以水壹㪷煑麻黃去上沫內諸藥煑取貳升五合分再服

又方

伏龍肝如雞子大兩枚　乾薑　當歸　桂心

芍藥　白芷　阿膠預漬之　甘草炙各貳兩　細辛半兩

芎藭壹兩　生地黃捌兩　吳茱萸貳升

右壹拾貳味㕮咀以清酒柒升水叁升合煑取叁升半去滓內膠煎取叁升分三服亦治衄血千金名黃土湯主吐血

當歸湯主吐血方

當歸　黃芩各叁兩　乾薑　芍藥　阿膠炙各貳兩

右伍味㕮咀以水陸升煑取貳升分三服日二夜一

伏龍肝湯主吐血幷衄血方

伏龍肝半升　乾地黃　乾薑　牛膝各貳兩　阿膠炙

甘草炙各叁兩

右陸味㕮咀以水壹斗煑取叁升去滓內膠分三服

澤蘭湯主傷中裏急胷脇攣痛頻嘔血時寒時熱小便赤黃此傷於房者方

澤蘭　糖各壹斤　桑白皮叁斤根者　生薑伍兩切

麻仁壹升　人參　桂心各叁兩　遠志貳兩去心

右捌味㕮咀以淳酒壹斗伍升煑取柒升去滓內糖未食服壹升日三夜一勿勞動

竹茹湯主吐血汗血大小便出血方

淡竹茹貳升　當歸　黃芩　芎藭

甘草各兩半炙　人參　芍藥　桂心
白术各壹兩
右玖味㕮咀以水壹斗煑取三升分四服日三夜一
治吐血唾血或勞發或因酒發方
當歸　羚羊角屑　乾地黃　小薊根　柏枝炙
阿膠炙　乾薑各參兩　白芍藥　白术各肆兩　伏龍肝如鷄子研
亂髮如鷄卵燒　竹筎壹升　蒲黃伍合　甘草貳兩炙
右壹拾肆味㕮咀以水貳斗煑取五升五合去滓下膠消
盡下髮灰蒲黃分五服
吐血百治不差療十十差神驗不傳方
地黃汁半升　大黃生末一方寸匕
右貳味煎地黃汁三沸内大黃末調和空腹服之日三血
即止神良

治吐血方
服桂心末方寸匕日夜可二十服
治身體暴血鼻口耳目九孔皮膚中皆漏血方
取新生犢子未食草者有屎暴乾燒末水服方寸匕日四
五服立差
生地黃湯主衄血方
生地黃　黃芩各壹兩　柏葉壹把　阿膠炙　甘草各貳兩炙
右伍味㕮咀以水柒升煑取叁升去滓内膠煎取二升五
合分三服
又方
生地黃參斤切　阿膠貳兩炙　蒲黃陸合
右叁味以水伍升煑取叁升分三服
治鼻口瀝血三升氣欲絕方

龍骨細篩一棗核許微以氣吹入鼻中即斷更出者再
吹之取差止

又方

細切葱白擣絞取汁瀝鼻中一棗許即斷愼酒肉五辛
熱麪生冷等

阿膠散 主衄血不止方

阿膠炙 龍骨 當歸 細辛 桂心各壹兩
蒲黃伍合 亂髮參兩燒灰

右柒味擣篩爲散先食飲服方寸匕日三服三劑差亦可
蜜圓酒服

伏龍肝湯 主鼻衄五藏熱結或吐血衄血方

伏龍肝雞子大壹枚 生地黃切壹斤 生竹茹壹升
芍藥 當歸 黃芩 芎藭 桂心
甘草炙各貳兩

右玖味㕮咀以水壹斗參升煑竹茹減三升內藥煑取三
升分三服千金無桂心

乾地黃圓 主失血虛勞胷腹煩滿痛血來藏虛不受穀嘔逆
不用食補中治血方

乾地黃參兩 厚朴炙 乾漆熬 枳實炙 乾薑
防風 大黃 細辛 白朮各壹兩 前胡壹兩半
人參 茯苓各伍分 蝱蟲去翅足熬 䗪蟲熬各拾伍枚 當歸
黃芩 麥門冬去心 甘草炙各貳兩

右壹拾捌味擣羅爲末鍊蜜和圓如梧子先食酒服五丸
日三

論曰凡下血者先見血後見便此爲遠血宜服黃土湯先見
便後見血此爲近血宜服赤小豆當歸散人病雖一得病之

始不同血氣強弱堪否次第是以用藥制方隨其淺深取其
能堪爲方不一各取所宜也

黃土湯方

竈中黃土半斤 甘草炙 乾地黃 白朮
附子炮去皮 阿膠 黃芩各叁兩

右柒味㕮咀以水捌升煑取貳升分溫三服亦主吐血

赤小豆當歸散方

赤小豆叁升浸令芽出暴乾 當歸叁兩

右貳味擣篩爲散漿服一方寸匕日三

續斷止血湯 主先便後血此爲近血方

續斷 當歸 阿膠炙 桔梗 桂心各叁兩
芎藭 乾薑 乾地黃各肆兩 蒲黃壹升 甘草壹兩炙

右壹拾味㕮咀以水壹斗煑取伍升伍合去滓下膠消盡
入蒲黃分爲三服

伏龍肝湯 主先見血後便轉此爲遠血方

伏龍肝伍合研 乾地黃伍兩 髮燒屑貳合 阿膠叁兩炙
黃芩 乾薑 牛膝 擲脉炙
甘草各貳兩炙

右玖味㕮咀以水壹斗煑取三升去滓下膠及髮屑消盡
分三服

下血方

牛角䚡炙 當歸 龍骨 乾薑 熟艾各叁兩
蜀椒壹兩去目閉口者汗 黃連伍合 升麻壹兩半 大棗貳拾枚擘
附子壹枚炮去皮 黃蘗 芎藭 阿膠炙
厚朴炙 赤石脂 芍藥 石榴皮 甘草炙各貳兩

右壹拾捌味㕮咀以水壹斗伍升煑取四升去滓內牛角
䚡末阿膠消以綿絞去滓分七服日四夜三 千金有橘皮

治小便出血方
龍骨細粉末之温湯服方寸匕日五六服
又方 以酒叄升煑當歸四兩取壹升頓服之
治尿血方
車前葉切伍升水壹斗煑百沸去滓内米煑爲粥服之
凡憂恚絶傷吐血胷痛虚勞地黄煎方
生地黄伍斤擣絞取汁
右壹味微火煎三沸内白蜜壹升又煎三沸服之日三
治亡血脫血鼻頭白色唇白去血無力者方
生地黄拾斤
右壹味擣以酒壹斗絞取汁令極盡去滓微火煎減半内
白蜜伍升棗膏壹升以攪之勿止令可丸下之酒服如雞
子壹圓日叄又服不已老而更少萬病除愈

論曰凡亡血吐血衄血愈後必須用此二方補服三四劑乃
可平復不爾恐有大虚及婦人崩中血亦同此方
胷中熱第五 方二十七首
寒水石湯 主身中大熱胷心煩滿毒熱方
寒水石伍兩 澤瀉 茯苓 前胡 黄芩各叄兩
柴胡 牛膝 白术 甘草炙各貳兩 杏仁貳拾粒去皮尖雙仁
右壹拾味㕮咀以水壹斗煑取貳升分叄服
治熱氣上衝不得息欲死不得眠方
白薇 檳榔 白石英研 枳實炙 白鮮皮
麥門冬去心 郁李仁去皮 貝母各貳兩 天門冬去心 桃仁伍分去皮尖雙仁熬
車前子 茯神各貳兩 人參 前胡 杏仁去皮尖雙仁熬
橘皮各壹兩半 桂心半兩
右壹拾柒味擣篩爲末鍊蜜和圓如梧子大竹葉飲下十

圓日貳服加至叅拾圓

竹葉飲子方

竹葉切 紫蘇各壹升 紫菀 白前 甘草炙各貳兩

百部貳兩 生薑叁兩切

右柒味㕮咀以水壹斗煑取叅升温以下圓盡更合

龍膽圓主身體有熱羸瘦不能食方

龍膽 苦參 黄連

黄蘗 李子仁去皮 栝樓 黄芩各貳兩 大黄叁兩

青葙子各壹兩

右玖味擣篩爲末錬蜜和圓如梧子大先食飲服柒圓日

二不知增之

升麻湯主强壯身有大熱熱毒流四肢骨節急痛不可忍腹

中煩滿大便秘澀無聊賴方

升麻 枳實炙 梔子仁 黄芩各叁兩 香豉壹升

大黄肆兩 杏仁壹升去皮尖雙仁 生薑肆兩切 生地黄拾兩

人參 甘草炙各貳兩

右壹拾壹味㕮咀以水壹斗貳升煑豉三沸去豉内藥煑

取叅升半分四服日三夜一又主歷節腫

又方

升麻 大黄各肆兩 前胡 梔子各叁兩擘

右肆味㕮咀以水玖升煑取叅升分三服

含消圓主胷中熱口乾方

茯苓 五味子 甘草炙各壹兩 烏梅去核 大棗去核各貳柒枚

右伍味擣篩爲散别擣梅棗令熟乃合餘藥更和擣五百

杵圓如彈子大含之咽汁日三夜二任性分作小圓

半夏湯主胷中客熱心下煩滿氣上大小便難方

半夏洗 生薑各捌兩切 前胡 茯苓各肆兩 白术伍兩

黃芩壹兩 杏仁去皮尖雙仁熬 枳實炙各叁兩 人參 甘草炙各貳兩

右壹拾味㕮咀以水壹斗煑取叁升旦服若胷中大煩熱者冷服大便難澀者加大黃叁兩

前胡湯 主胷中逆氣痛徹背少氣不食方

前胡 半夏洗 芍藥 甘草炙各貳兩 桂心各壹兩

生薑三兩切 黃芩 人參 當歸各壹兩 大棗叁拾枚去核

竹葉壹升切

右壹拾壹味㕮咀以水壹斗煑取三升分三服

又方

前胡 人參 生薑切 麥門冬去心 餳各叁兩

桂心 黃芩 當歸各壹兩 大棗叁拾枚去核

半夏洗 茯苓 芍藥 甘草炙各貳兩

右壹拾叁味㕮咀以水壹斗肆升煑取叁升分三服

前胡湯 主寒熱嘔逆少氣心下堅彭亨滿不得食寒熱消渴補不足方

前胡 朴消 大黃 黃芩 甘草炙各貳兩

茯苓 當歸 半夏洗 芍藥 滑石

石膏碎 栝樓 附子炮去皮 麥門冬去心 人參各壹兩

生薑貳兩切

右壹拾陸味㕮咀以水壹斗貳升煑取陸升分陸服

前胡建中湯 主大勞虛劣寒熱嘔逆下焦虛熱小便赤痛客熱上熏頭痛目赤骨內痛及口乾皆悉主之方

前胡叁兩 芍藥 當歸 茯苓 桂心各肆兩

人參 生薑切 白糖 半夏洗 黃耆各陸兩

甘草壹兩炙

右壹拾壹味㕮咀以水壹斗貳升煑取四升去滓內糖分

爲肆服

厚朴湯 主腹滿發熱數十日方

厚朴 炙 捌兩　枳實 炙 伍枚　大黃 肆兩

右叁味㕮咀以水壹斗貳升煑取伍升內大黃煑取三升分三服主腹中熱大便不利

五石湯 主骨間熱熱痛間不除煩悶口中乾渴方

寒水石　滑石　龍骨　牡蠣 熬　括樓

赤石脂　黃芩　甘草 炙 各伍分　知母　桂心

石膏　大黃 各叁分

右壹拾貳味擣麤篩之以水七升煑取叁升分四服日三夜一

竹葉湯 主五心熱手足煩疼口乾脣乾胷中熱方

竹葉 切　小麥 各壹升　人參 壹兩半　石膏 碎 叁兩　生薑 伍兩 切

知母　黃芩　茯苓　麥門冬 去心 各貳兩

括樓　半夏 洗　甘草 炙 各壹兩

右壹拾貳味㕮咀以水壹斗貳升煑竹葉小麥取捌升去滓內諸藥煑取叁升分三服

犀角湯 主熱毒流入四肢歷節腫痛方

犀角 貳兩 屑　羚羊角 壹兩 屑　豉 壹升　前胡

梔子 擘　黃芩　射干 各叁兩　大黃　升麻 各肆兩

右玖味㕮咀以水壹斗煑取三升分三服

承氣湯 主氣結胷中熱在胃管飲食嘔逆方

前胡　梔子 炙　桂心　寒水石　大黃

知母　甘草 炙 各壹兩　消石　石膏　括樓 各貳兩

右壹拾味擣篩爲散以水貳升煑藥五方寸匕取壹升五合分貳服

半夏湯主逆氣心煩滿嘔吐氣方

半夏洗 生姜各壹斤切 茯苓 桂心各伍兩

右肆味㕮咀以水壹升煑取叁升分三服日三服若少氣

加甘草貳兩一名小茯苓湯

療熱骨蒸羸瘦煩悶短氣喘息兩鼻孔張日西即發方

龍膽 黃連 括樓各壹兩 梔子貳拾枚 青葙子

苦參 大黃 黃芩 芍藥 芒消各半兩

右壹拾味擣篩爲末鍊蜜和丸如梧子大飲服十丸日二

以知爲度

療積年久患熱風方

地骨皮 萎蕤 丹參 黃耆 澤瀉

麥門冬各叁兩去心 清蜜 薑汁各壹合 生地黃汁貳升

右玖味㕮咀以水陸升煑藥減壹升內蜜薑汁煑兩沸壹

服三合日再大驗

又方

羚羊角伍兩屑 生葛 梔子各陸兩 豉壹升綿裹

黃芩 乾薑 芍藥各叁兩 鼠尾草貳兩

右捌味㕮咀以水柒升煑取二升半分三服

又方

枳實叁兩炙 黃連貳兩 黃芩 芒消各叁兩

右肆味擣篩爲末鍊蜜和圓如梧子飲服叁拾圓日三稍

加至四十九

生地黃煎主熱方

生地黃汁肆升 生地骨皮 生天門冬去心

生麥門冬汁 白蜜各壹升 竹葉切 生薑汁各叁合

石膏捌兩碎 栝樓伍兩 茯神 萎蕤 知母各肆兩

右壹拾貳味㕮咀以水一斗二升先煑藥取三升去滓內地黃麥門冬汁微火煎五沸次內蜜薑汁煎取六升下之服四合日二夜一稍加至五六合

治膈上熱方

茯苓　麥門冬去心　甘草各壹斤炙　生地黃陸拾斤切

右肆味擣三味爲散內地黃合擣暴乾擣篩爲散酒服方寸匕日三候食了服之久服補益明目

治腹中虛熱舌本強直頸兩邊痛舌上有瘡不得咽食方

柴胡　升麻　梔子仁　芍藥　通草各肆兩

黃芩　大青　杏仁各叁兩　生薑切　石膏各捌兩碎

右壹拾味㕮咀以水壹斗二升煑取六升分六服

頭痛身熱及熱風方

竹瀝　升麻各叁升　防風　生薑切　杏人去皮尖雙仁各叁兩

芍藥　柴胡各肆兩　石膏碎　生葛各捌兩

右玖味㕮咀以水壹斗煑取四升分四服日三夜一服以差爲度

治膈上熱方

苦參拾兩　玄參叁兩　麥門冬去心　車前子各叁兩

右肆味擣篩爲末鍊蜜和圓如梧子以飲服十五圓日二食後服

壓熱第六 方壹拾叁首 論壹首

金石凌主服金石發熱所不制服之立愈方

上朴消壹斤　上芒消壹斤　石膏肆兩　凝水石貳兩

右肆味熟沸水伍升漬朴消芒消令消澄一宿旦取澄消安銅器中麤擣寒水石石膏內其中仍內金五兩微火煎之頻以筋頭柱看著筋成淩雲瀉置銅器中留著水盆中

凝一宿皆成凌停三日以上皆乾也若熱病及石發皆以蜜水和服半雞子大

七水凌主大熱及金石發動金石凌不制者服之方

朴消伍斤 芒消叁斤如雪者佳 滑石壹斤半 玉泉石壹斤

石膏壹斤 鹵鹹伍斤如麥者 凝水石壹斤如雪者

右柒味各別擣簏篩

凍凌水伍升 霜水壹升 雪水壹升 露水伍升半

寒泉水伍升 雨水壹升 東流水伍升半

右柒味澄令清銅器中內上件七味散極微火煎取柒升一宿澄清內瓷坩中淨處貯之以重帛繫口一百二十日皆如凍凌狀成如白石英有八稜成就或大如筋有長一尺者名曰七水凌有人服金石發熱者以井華水和五分匕服之一服極熱即定傷寒發熱服一刀圭小兒發熱與麻子許不可多用神驗買藥不得爭價皆上好者合藥以臘月臘日爲上合時以清淨處先齋七日不得穢汚喪孝產婦之家及不得令雞犬六畜生婦六根不完具及多口饒言人見之不信敬人勿與服之服藥得熱退之後七日乃慎酒肉五辛等物勿復喜惡口刑罰仍七日齋戒持心清淨

紫雪主脚氣毒遍內外煩熱口生瘡狂叫走及解諸石草熱藥毒發卒熱黃等瘴疫毒最良方

金壹斤 寒水石 石膏 磁石各叁斤碎

右肆味以水壹石煑取肆斗去滓內後藥

升麻壹升 玄參壹斤 羚羊角屑 青木香

犀角屑 沈香各伍兩 丁香肆兩 甘草捌兩炙

右捌味㕮咀於汁中煑取一斗去滓內消石四升朴消精

者四升於汁中煎取柒升投木器中朱砂粉三兩麝香粉
半兩攪令相得寒之二日成於霜雪紫色強人服三分匕
服之當利熱毒老小以意增減用之一劑可十年用之
玄霜主諸熱風熱氣熱瘴熱瘧惡瘴毒內入攻心熱悶服諸
石藥發動天行時氣溫疫熱入腑藏變成黃疸蛇螫虎齧狐
狼毒所咬毒氣入腹內攻心熱須利病出用水三四合和一
小兩攪令消服之兩炊久當快利兩行即差小兒熱病服棗
許大即差方
金伍拾兩 寒水石陸斤研如粉 磁石叁斤碎 石膏伍斤碎
右肆味以兩斛水煑取六斗澄清
升麻 玄參各壹斤 羚羊角捌兩 犀角肆兩
青木香肆兩 沈香伍兩
右陸味切內上件汁中煑取二斗澄清
朴消末 芒消各陸升 麝香當門子壹兩後入
右叁味內汁中漬一宿澄取清銅器中微微火煎取壹斗
二升以匙抄看疑即成下經一宿當凝為雪色黑耳若猶
濕者安布上日乾之其下水更煎水凝即可停之如初畢
密器貯之此藥無毒又主毒風脚氣熱悶赤熱腫身上熱
瘡水漬少許綿貼取點上即差頻與兩服病膈上熱食後
服膈下熱空腹服之卒熱淋大小便不通服一兩亦有患
熱者皆宜服之
論曰凡諸霜雪等方皆據曾服金石大藥藥發猛熱非諸草
藥所能制者則用之若非金石發者則用草藥等湯散方制
之不得雷同用霜雪方若用之則傷於太冷於後腰脚疼痛
乃更後為所患宜其消息之 虛煩心悶方
竹葉湯 主胃虛陽氣外蒸泄津液口乾髓吸吸苦渴氣出喘嘔

逆涎沫相連方

竹葉切伍升　小麥壹升　麥門冬去心一升　知母

茯苓各叁兩　石膏碎四兩　芍藥　栝樓

澤瀉　人參　甘草炙各二兩

右壹拾壹味㕮咀以水二斗煮竹葉小麥取一斗去滓内藥煮取肆升分四服

厚朴湯 主久積痰冷胸脇痞滿不受食飲渾渾欲吐血室空虛客陽通之令脉緊數重熱水蒸汗漏如珠四肢煩痛脣口乾燥渴升水漿方

厚朴炙　半夏洗　茯苓　白朮各四兩　枳實四枚炙

芍藥　黄耆各二兩　生薑八兩切　麥門冬去心一升

桂心伍合　人參　甘草炙各二兩

右壹拾貳味㕮咀以水一斗伍升煮取五升分四服

竹葉湯 主下氣胷中煩悶悶亂氣逆補不足方

竹葉壹把　粳米　麥門冬去心　半夏洗各一升　人參

當歸各二兩　生薑壹斤切

右柒味㕮咀以水壹斗伍升煮竹葉生薑取一斗内諸藥煮取八升分十服日三夜二一云水八升煮取三升半服八合

烏梅湯 主下氣消渴止悶方

烏梅二七枚大者　香豉壹升

右貳味以水壹斗煮烏梅取五升去滓内豉煮取三升分三服可常用之

大酸棗湯 主虛勞煩悸奔氣在胷中不得眠方

酸棗仁伍升　人參　茯苓　生薑切

芎藭　桂心各二兩　甘草炙一兩半

右七味㕮咀以水一斗二升煮棗仁取七升去滓内諸藥

煑取叁升分三服

大棗湯主虛煩短氣氣逆上熱下冷胷滿方

大棗叁拾枚擘 石膏叁兩碎 白薇 前胡

人參 防風各二兩 桂心 甘草各壹兩炙

右捌味㕮咀以水柒升煑取三升分三服

竹根湯主短氣欲絶不足以息煩撓益氣止煩方

竹根一斤 小麥 粳米 麥門冬各壹升去心

大棗拾枚擘 甘草一兩炙

右陸味㕮咀以水壹斗煑米麥令熟去之內諸藥煑取二升七合分三服日三不能服者以綿瀝口中

酸棗湯主傷寒及吐下後心煩乏氣不得眠方

酸棗仁四升 麥門冬壹升去心 乾薑 芎藭

茯苓 知母 甘草各貳兩炙

右柒味㕮咀以水壹斗貳升煑棗仁取壹斗去之內諸藥煑取叁升分三服

白薇散主虛煩方

白薇 乾薑 甘草各壹兩 栝樓貳兩

消石叁兩

右伍味各別擣先內甘草臼中次內白薇次內乾薑次內栝樓次內消石擣三千杵篩和冷水服方寸匕日三

千金翼方卷之十八

雜病中

消渴第一 方二十二首

葵根湯主一年渴飲一石以上小便利若飲酒渴傷寒渴皆悉主之方

霜下葵根皮 壹握長肆寸

右一味以水一斗煑取三升分三服取差止

又方

栝樓根 甘草 炙各貳兩 黃連 壹升

右三味㕮咀以水五升煑取二升五合分三服

茯苓湯主胃反吐而渴方

茯苓 捌兩 澤瀉 肆兩 生薑 切 桂心

白朮 各叁兩 甘草 壹兩炙

右六味㕮咀以水一斗煮小麥三升減三升去麥內諸藥煮取二升五合服八合日再

消渴師所不能治之方

生栝樓（玖斤去皮細切擣絞汁令盡） 上好黃連（玖兩擣絹羅為末）

右二味以上件汁溲黃連如硬麪細擘日暴令乾擣之絹篩更溲如前日暴擣一依前法往反汁盡暴乾擣篩鍊蜜和飲服如梧子十丸日三加至三十丸病愈止百日慎生冷醋滑酒五辛肉麪油膩永差無生者乾者九斤切以水二斗煎取一斗和之如生者法

桑根湯主日飲一石水方

桑根白皮（切伍升入地叄尺者良炙令黃黑）

右一味以水與根亦不限多少煮以味濃為度適寒溫飲之任性多少切慎鹽

猪肚圓治消渴方

猪肚（壹枚治如食法） 黃連（伍兩） 栝樓（肆兩） 麥門冬（肆兩去心）

知母（肆兩無以茯神代）

右伍味為散內猪肚中線縫安置甑中蒸之極爛熟接熱木臼中擣可丸若硬加少蜜和丸如梧子飲服叄拾丸日再漸加至肆拾伍拾圓渴即服之

葛根圓主消渴方

葛根 栝樓（各叄兩） 鉛丹（貳兩） 附子（壹兩去皮）

右四味擣篩為末鍊蜜和圓如梧子飲服十圓日三服治日飲壹石水者春夏減附子

大黃圓主消渴小便多大便秘方

大黃（壹斤） 栝樓 土瓜根（各捌兩） 杏人（五合去皮尖雙人熬）

右肆味破大黃如碁子冷水漬一宿蒸暴乾擣篩為末鍊

蜜和圓如梧子大以飲服伍圓日叁以知爲度

酥蜜煎 主消渴方

酥壹升 白蜜叁升 芒消貳兩

右三味合煎欲渴即啜之日六七益氣力神效

羊髓煎 主消渴口乾濡咽方

羊髓貳合無即以酥代之 白蜜貳合 甘草壹兩炙切

右叁味以水叁升煮甘草取壹升去滓內蜜髓煎令如飴含之盡復含

酥蜜煎 主諸渴方

酥壹升 蜜壹升

右貳味合煎令調和一服貳升當令下利藥出明日更服壹升後日更服壹升即瘥慎酒及諸鹹等

茯苓煎 主諸消渴方

茯苓貳斤 白蜜肆升

右貳味於銅器中重釜煎以兩莖薤白爲候黃即煎熟先食服如雞子大日三

防己散 主消渴肌膚羸瘦或乃轉筋不能自止小便不禁悉主之方

木防己壹兩 栝樓 鉛丹 黃連各貳兩

右肆味擣篩爲散先食以苦酒壹升以水貳升合爲漿服方寸匕日三服訖當強飲極令盈溢一日再服則憎水當不欲飲也

大渴百方療之不瘥方

鉛丹 胡粉各半兩 栝樓 甘草炙各貳兩半

澤瀉 石膏 赤石脂 白石脂各伍分

右捌味擣篩爲散水服方寸匕日叁壯人壹匕半壹年病

一日愈二年病二日愈渴甚者夜兩服腹痛者減之圓服
亦佳一服十圓傷多則腹痛也

治口乾燥方

酸棗壹升半去核　酸石榴子伍合末　烏梅伍拾枚去核
麥門冬肆兩去心　茯苓叁兩半　覆盆子　葛根各叁兩
石蜜肆兩　桂心壹兩陸銖　栝樓叁兩

右壹拾味擣篩爲末鍊蜜和圓如酸棗大含之不限時節以口有津液爲度忌如藥治

三黃圓　主男子五勞七傷消渴不生肌肉婦人帶下手足寒熱方　巴郡太守奏

春三月　黃芩肆兩　大黃叁兩　黃連肆兩
夏三月　黃芩陸兩　大黃壹兩　黃連柒兩
秋三月　黃芩陸兩　大黃貳兩　黃連叁兩
冬三月　黃芩叁兩　大黃伍兩　黃連貳兩

右叁味隨時合擣爲末鍊蜜和如大豆飲服伍圓日叁不知稍增至柒圓服一月病愈久服行及奔馬嘗試有驗

鉛丹散　主消渴方

鉛丹貳兩　栝樓捌兩　茯苓　甘草炙各一兩半　麥門冬捌兩去心

右伍味擣篩爲散旦以漿服方寸匕日貳

膀胱冷小便數多每至夜偏甚方

雞腸伍具治如食法　羊腎壹具去脂並乾爲末　赤石脂陸兩
龍骨叁兩　蓯蓉肆兩　黃連伍兩　桂心貳兩

右柒味擣篩爲散酒服方寸匕半日再服伍日中可作羊湯炙一劑十日外可作羊肉臛香味如常食飽與之

尿煮牡蠣主內消小便數方

牡蠣伍兩熬

右壹味以恚人尿叁升煮取貳升分再服

治渴利方

一豆(壹升醋拌蒸暴乾叁拌叁暴叁蒸熬) 黃連(壹斤如金色者)

右貳味擣篩爲末鍊蜜和圓如梧子飲服叁拾圓日貳稍加至肆拾圓神驗

大病後虛羸不足成渴方

取柒歲以上伍歲以下黃牛新者乳壹升以水肆升煎取壹升適寒溫稍稍飲之不得過多拾日服之不住佳一云渴即飲不限多少

又方

取自死雞大者壹枚以叁升半白湯捉脚到細細淋之叁柒遍拔毛置於湯中毛盡去毛取汁澄清湯即任性飲之飲盡即愈其雞故殺作藥不過柒日其病倍發以後百藥不可差愼之愼之

栝樓散 主消渴延年益壽方

栝樓 枸杞根 赤石脂 茯苓(各壹兩半) 天門冬(貳兩半去心)
牛膝 乾地黃(各叁兩) 桂心 菊花
麥門冬(去心) 菖蒲 雲母粉 澤瀉 卷柏
山茱萸 遠志(去心) 五加皮 杜仲(炙) 瞿麥
續斷 石斛 黃連 柏人 石韋(去毛)
忍冬(各壹兩) 菟絲 車前子 蛇牀子 巴戟天
鍾乳(研) 署預 甘草(炙各伍分)

右叁拾貳味擣篩爲散酒服方寸匕日叁肆亦可圓服拾圓日叁

淋病第二 方二十首

治血淋熱淋方

以韭菜莖燒令熱以手熟接熱掩尿處冷即易之可六七
度差

治熱淋方

白茆根肆斤

右壹味切以水壹斗伍升煑取伍升每服壹升日叄夜貳

治石淋方

車前子貳升絹袋貯以水捌升煑取叄升頓服之須臾當
下石子宿勿食服之良

又方

常煑冬葵根作飲服之石出

關格不通方

芒消伍兩　芍藥肆兩　杏仁肆兩雙人去皮尖

麻子仁叄兩　枳實壹兩炙　大黃半斤　乾地黃貳兩

右柒味㕮咀以水柒升煑取叄升分叄服一方用烏梅榆白皮各伍兩無枳實地黃

治淋方

車前子壹把　榆白皮壹握　亂髮如雞子大燒之取灰

右叄味以水陸升煑取叄升分再服

又方

黃芩肆兩

右壹味㕮咀以水伍升煑取貳升分叄服亦主下血

治淋方

榆白皮切壹升　車前子切伍升　葵子壹升　滑石捌兩

通草捌兩　赤蜜壹升

右六味㕮咀以水叄斗煑取柒升去滓下蜜更煎取叄升
分叄服

治尿白稠方

露蜂房燒灰服方寸匕煑汁服亦佳

治小便不通方

滑石貳兩 葵子壹兩 榆白皮壹兩

右叁味爲散濃煑麻子汁壹升半取壹升以貳方寸匕和服兩服即通

治小便不通方

内薑黄末如豆許大小便孔中即通

又方

通草 猪苓去皮 桑白皮略

右叁味㕮咀以水陸升煑取貳升分貳服

治丈夫女人胞轉不得小便八九日方

滑石壹斤 寒水石碎壹兩 葵子壹升

右叁味以水壹斗煑取伍升盡服即利

久房散 主小便多或不禁方

菟絲子貳兩 蒲黄叁兩 黄連叁兩 消石壹兩 肉蓯蓉貳兩

右五味并雞肶胵中黄皮叁兩爲散服方寸匕日叁二行叁肆里又服壹方用五味子叁兩

治小便不利膀胱脹水氣流腫方

水上浮萍乾末服方寸匕日三

治小便不禁多日便壹貳斗或如血方

麥門冬去心捌兩 蒺藜子貳兩 甘草炙壹兩 乾薑肆兩

桂心貳兩 乾地黄捌兩 續斷貳兩

右柒味㕮咀以水壹斗煑取貳升伍合分叁服

又方

鹿茸長叁寸炙 躑躅壹升 桂心壹尺 韭子壹升

附子叁枚炮去皮 澤瀉叁兩

右陸味爲散服伍分匕日三稍加至壹寸匕漿水服之差

治大小便不通

當歸參斤　大戟壹斤　牛膝參斤

右參味切以水伍升煮取貳升以大豆伍升煎令汁盡豆乾初服參枚以通爲度

濡臟湯　主大小便不通六七日腹中有燥屎寒熱煩迫短氣汗出腹滿方

生葛根貳斤　豬膏貳升　大黃壹兩

右參味㕮咀以水柒升煮取伍升去滓內膏煎取三升澄強人頓服羸人再服

霹靂煎方

好濃酒壹大盞　鹽壹大錢

右貳味和於鐺內文火煎攪勿住手可圓得就鐺圓如小荳大內肛腸中不過參必通如不通者數盡也神效（酒當作蜜）

水腫第三　方二十六首并五不治論

凡水腫有五不治

一面腫蒼黑是肝敗不治　二掌腫無文理是心敗不治

三腹腫無文理是肺敗不治　四陰腫不起是腎敗不治

五臍滿腫反者是脾敗不治

豬苓散　主虛滿通身腫利三焦通水道方

豬苓去皮　茯苓　葶藶熬　人參　五味子

防風　澤瀉　狼毒　玄參　乾薑

白朮　桂心　椒目　大戟　遠志去心

甘草炙各半兩　女麴熬參合　小豆貳合　蓯蓉貳分半

右壹拾玖味擣篩爲散酒服方寸匕日參夜壹老小服壹錢匕日參以小便利爲度

治百病諸荒邪狂走氣痞冷病歷年黃黑大腹水腫小兒丁奚瘧疾經年霍亂中惡蜚尸及暴惡疾皆悉主之方

芫青　巴豆去心皮熬　斑猫各叁拾枚去翅足熬　天雄炮去皮

乾薑各半兩　烏頭炮去皮　細辛　蜀椒汗去目閉口者

附子炮去皮　躑躅　黃芩　桂心各壹兩

右壹拾貳味細切以絹袋中盛酒壹斗漬拾日去滓服半合日叁以知爲度暴惡滓作散酒服半錢匕日叁強人壹錢傷寒中溫濕冷頭痛拘急寒熱瘧發頭風皆須服壹錢匕厚覆復取汗初服當吐清汁三四升許又主心疝婦人無子服之煩悶不堪者飲冷水壹升即解

蒲黃酒主通身腫此風虛水氣亦主暴腫方

蒲黃　小豆　大豆各壹升

右叁味以酒壹斗煑取叁升分叁服

商陸酒主風水腫方

取商陸切壹升以酒貳升漬叁宿服壹升當下下者減之從半升起日叁盡更合服

又方

取大豆壹升以水肆升煑取貳升去滓內上酒壹升合煎取壹升隨能杯飲之日叁服常令有酒勢

茯苓圓 主水脹大甄主簿與康公處得效方

茯苓　白朮　椒目各壹兩　葶藶子壹兩半熬

桂心叁分　芒消　澤瀉　木防已各伍分

甘遂叁分　赤小豆　前胡　蕘花各半兩熬千金作芫花

右壹拾貳味擣篩爲末鍊蜜和圓如梧子蜜湯服伍圓日壹稍加以知爲度

漢防已煑散 主水腫上氣方楷澄秘之

漢防已　澤漆葉　石韋去毛　桑白皮

澤瀉　丹參　茯苓　橘皮

白朮各叄兩　生薑切拾兩　郁李仁伍兩　通草壹兩

右壹拾貳味擣篩爲散以水壹升柒合內肆方寸匕煑取捌合頓服日貳小便利爲度

第一之水先從面目腫遍一身名曰青水其根在肝大戟主之

第二之水先從心腫名曰赤水其根在心葶藶主之

第三之水先從腹腫名曰黃水其根在脾甘遂主之

第四之水先從脚腫上氣而欬名曰白水其根在肺藁本主之

第五之水先從足趺腫名曰赤水其根在腎連翹主之

第六之水先從面至足腫名曰玄水其根在膽芫花主之

第七之水先從四肢起腹滿大身盡腫名曰風水其根在胃澤漆主之

第八之水先四肢小其腹腫獨大名曰石水其根在膀胱桑根白皮主之

第九之水先從小腸滿名曰果水其根在小腸巴豆主之

第十之水乍盛乍虛乍來乍去名曰氣水其根在大腸赤小豆主之

右十病皆藥等分與病狀同者則倍之白蜜和先食服壹圓如小豆日叄欲下病者服叄圓弱者當以意節之

治宿食流飲寒熱溫病水腫

郁李仁拾枚熟研　粳米叄合研令中斷

右貳味以水肆升合煑取貳升頓服此粥日叄度作服之人強用十五枚羸者五六枚不知者稍加之以知爲度

炙鯉魚主腫滿方

取鯉魚長壹尺伍寸以尿漬令没宿平旦以木從口貫之

至尾炙令黃熟去皮宿勿食頓服之不能者再服令盡神方
男女新久腫得惡暴風入腹婦人新産上溷清風入藏腹中
如馬鞭者噓吸短氣欬嗽一味大豆煎方
大豆壹斗擇令淨
右以水五斗煑之得壹斗參升澄清去下濁者內釜中以
壹斗半美酒內汁中煎取玖升宿勿食旦服參升溫覆取
汗兩食頃當下去風氣腫減慎風冷十日平復如故除日
服之若急不可待除日逐急令服合時於清淨無人處令
童子壹人視之不用六畜婦人見之自度身中腫未盡更
服參升差了了者勿服也神驗千金不傳
又方
楮皮葉壹大束
右壹味切以水壹斗煑取伍升去滓服之不過參面腫乃

減雖得差常可服之千金楮枝皮葉壹大束切煮取汁隨多少釀酒旦服醉爲佳後同
葶藶圓治水氣腫鼓脹小便不利山連治韋司業得差司業
姪雲表所送云數用神驗
葶藶子壹升　羖羊肺壹具青羊亦佳
右貳味湯微煠肺即薄切之暴乾擣末以三年大醋浸葶藶
子一伏時出之熬令變色熟擣如泥和肺末蜜和擣作
圓食後一食久服如梧子肆圓麥門冬飲服之以喉中乾
口粘浪語爲候數日小便大利即差
麥門冬飲法
麥門冬貳拾伍枚去心　粳米貳拾伍粒
右貳味以大合參合半水煑之米大熟去滓以下圓藥每
服常作
有人虛肌積年氣上似水病眼似腫而脚不腫方

穀楮葉 捌兩

右壹味以水壹斗煮取陸升去滓內米煮粥亦以當水煮羹等皆用之秋時多收以擬經冬用其水多少濃淡任人勿拘此方慎蒜麪猪雞魚油膩重者叄年服之永瘥輕者壹年瘥

治水腫方

葶藶子 陸兩生用 桂心 貳兩

右貳味擣篩爲末鍊蜜和圓如梧子飲服拾圓日二愼如前法忌口味

麻豆煎 主大腹水腫方

大麻 壹石末入窨不鬱浥者 赤小豆 壹石不得壹粒雜

右貳味取新精者仍淨揀擇以水淘暴令乾蒸麻子使熟暴令乾貯淨器中欲服取伍升麻子熬之令黃香惟須緩火勿令焦細擣取末以水五升研取汁令盡淨器密貯之明旦欲服令夜以小豆壹升淨淘漬之至曉乾漉去水以新水煮未及好熟即漉出令乾內麻子汁中煮令大爛熟爲佳空腹恣意食日叄其陳鬱麻子益增其病愼勿用之一切水腫皆忌飽食常須少飢後有灸三里絕骨作魚羹法見千金中

苦瓠圓 主大水頭面遍身大腫滿方

苦瓠白穰實捻如大豆粒

右壹味以麪裹煮一沸空腹吞七枚午後出水壹升叄肆日水自出不止大瘦即差叄年愼口味苦瓠須好無黶翳者不爾有毒不堪用

檳榔圓 主水腫方

檳榔 桂心 栝樓 麻黃 去節 杏仁 去皮尖雙仁熬

茯苓　椒目　白朮各略叁兩　附子炮去皮　吳茱萸伍合
厚朴炙　乾薑　黃耆　海藻一本無　木防已
葶藶熬　甘草炙各略貳兩
右壹拾柒味擣篩為末鍊白蜜和圓如梧子飲服貳圓日
叁加至肆圓不知又加貳圓可至拾貳圓此主老小水腫
虛腫大病客腫作喘者用之佳一云忌海藻必恐無此一味
風水通身腫欲裂利小便方
防風　猪苓去皮　澤瀉去節　茯苓各略肆兩　黃耆叁兩
澤漆　白朮各略伍兩　杏仁去皮尖雙仁　大戟各壹升　獨活捌兩
酒壹斗　大豆貳升以水柒升煑取壹升
右壹拾叁味㕮咀以豆汁及酒合煑取柒升分陸柒服日
壹夜令盡當小便極利為度
澤漆根湯主水通身洪腫四肢無堪或從消渴或從黃疸支
飲內虛不足榮衛不通血氣不化氣實皮膚中喘息不安腹
中響響脹滿眼不得視方
澤漆根拾兩　赤小豆貳升　茯苓叁兩　鯉魚壹枚重伍斤者淨去腸胃
生薑捌兩切　人參　麥門冬去心　甘草炙各貳兩
右八味以水壹斗柒升煑鯉魚豆減柒升去之內藥煑取
肆升伍合去滓壹服三合日三弱人二合日再服氣下喘
止可至肆合晬時小便利腫氣減或小溏下若小便大利
還從壹合始大利止若無鯉魚鮦魚亦可若水甚不得臥
臥不得轉側加澤漆壹斤渴加栝樓貳兩欬加紫菀貳兩
細辛壹兩款冬壹兩桂心叁兩增魚汁貳升
大豆湯主風水通身大腫眼不得開短氣欲絕或欬嗽方
大豆壹斗　烏頭炮去皮　黃耆　澤瀉各略叁兩
杏仁壹升去皮尖雙仁　半夏陸兩洗　茯苓　白朮各略伍兩

生薑柒兩 麻黃去節 豬苓去皮 防風
木防已各肆兩 甘遂 甘草炙各貳兩 酒壹升
右壹拾陸味以水肆斗先煑豆取壹斗去豆內藥及酒合
煑取柒升日肆夜叁得快利小便爲度腫減便任不必盡
劑若不得利小便者加生大戟壹升葶藶貳兩半無不快
也萬不失一

麻黃湯主風濕水疾身體面目腫不仁而重方
麻黃肆兩去節 甘草貳兩炙
右貳味㕮咀以水伍升煑取叁升分叁服重覆日移貳丈
汗出不出更合服之慎護風寒皮水用之良

治水腫方
以苦瓠穰壹枚以水壹石煑壹炊久去滓煎令可圓服如
大豆小便利後作小豆羹乃飲食之

又方
葶藶伍兩熬 牽牛子 澤瀉 昆布洗
海藻洗 豬苓去皮各叁兩
右陸味末之鍊蜜和圓如梧子大飲服拾伍圓日叁

石膽圓主足脛腫小便黃肎痛煩車骨筋解閑痛方
石膽研 吳茱萸 天雄炮去皮
柏仁各壹分 防風 蕘花熬 杜仲炙各叁分
菖蒲 葶藶熬各壹兩 菟絲子叁合
右壹拾壹味擣篩爲末鍊蜜和爲圓如蜱豆以飲服叁圓
日貳

淡飲第四 方一十四首

治淡飲頭痛往來寒熱方
常山壹兩 雲母粉貳兩

右貳味擣篩爲散熱湯服壹方寸匕吐之止吐不盡更服

杜蘅湯主吐百病方

杜蘅　松蘿各叁兩　瓜蔕貳柒枚

右叁味切以水酒各壹升貳合漬貳宿去滓分再服若服已即吐者止不吐者更服之每服相去如人行十里欲令藥力盡飲壹升稀粥便定老小用之亦佳千金云酒壹升貳合漬貳宿

蜜煎主寒熱方

赤蜜伍合　常山肆兩　甘草半兩炙壹法貳兩

右叁味㕮咀以水壹斗煑取貳升去滓內蜜溫服柒合吐則止不吐更服柒合勿飲冷水

又方

蜜貳合　醋捌合

右貳味調和旦頓服須臾猥猥然欲吐擿之若意中不盡明旦更服無毒不大嘔吐其藥安穩

葱白湯主冷熱膈淡發時頭痛悶亂欲吐不得方

葱白貳柒莖切　桃葉壹把　烏頭炮去皮　眞珠

常山　甘草炙各半兩

右陸味㕮咀以酒肆升水肆升合煑取叁升去滓內眞珠服壹升得吐止

松蘿湯主胷中淡積熱皆除之方

松蘿貳兩　烏梅貳柒枚　常山叁兩　梔子貳柒枚擘　甘草伍兩炙壹云壹兩

右伍味㕮咀以酒叁升漬壹宿旦以水叁升合煑取貳升伍合分再服得快吐便止不要頓盡貳服也

又方

松蘿壹兩　烏梅叁柒枚　常山　甘草各貳兩炙

右肆味㕮咀以酒叁升漬壹宿煮取貳升服壹升取吐止

大五飲圓 主五種飲壹曰留飲停水在心下貳曰澼飲水澼在兩脇下叁曰淡飲水在胃中肆曰溢飲水溢在膈上五藏間五曰流飲水在腸間動搖有聲夫伍飲者皆由飲後傷寒飲冷水過多所致方

遠志去心 苦參 藜蘆 白朮 烏賊骨

甘遂 大黃 石膏 半夏洗 紫菀

桔梗 前胡 芒消 栝樓 五味子

蓯蓉 貝母 桂心 芫花熬 當歸

人參 茯苓 芍藥 大戟 葶藶熬

黃芩各一兩 附子炮去皮 常山 厚朴炙 細辛

署預 甘草炙各叁分 巴豆叁拾枚去心皮熬

右叁拾叁味擣篩爲末鍊蜜和圓如梧桐子大酒服叁圓日叁稍加之

前胡湯 主胷中久寒澼實宿淡隔塞胷痛氣不通利三焦冷熱不調食飲減少無味或寒熱體重卧不欲起方

前胡 人參 大黃 當歸

甘草炙各貳兩 黃芩 防風 麥門冬去心

吳茱萸各壹兩 半夏叁兩洗 生薑肆兩切 杏仁叁拾枚去皮尖兩仁

右壹拾貳味㕮咀以水壹斗煑取叁升分叁服日叁

白朮茯苓湯 主胷中結淡飲澼結臍下弦滿嘔逆不得食亦主風水方

白朮 茯苓 橘皮 當歸各叁兩

附子炮去皮貳兩 半夏洗 生薑切 桂心各肆兩

右捌味㕮咀以水壹斗貳升煑取叁升分爲叁服日叁服叁劑佳深師方有細辛壹味一作人參

薑椒湯 主胷中積聚淡飲飲食減少胃氣不足欬逆嘔吐方

生薑汁餘 蜀椒叁合汗去目閉口者 半夏洗叁兩 橘皮貳兩

茯苓 桔梗 桂心 附子炮去皮 甘草炙各壹兩

右玖味㕮咀以水柒升煑取貳升伍合去滓內薑汁煎取貳升分叁服服兩劑佳若欲服大散諸五石圓必先服此方乃進黃耆圓輩必佳

半夏湯主淡飲澼氣吞酸方

半夏洗叁兩 生薑切陸兩 附子壹枚炮去皮 吳茱萸熬叁兩

右肆味㕮咀以水伍升煑取壹升伍合分叁服日叁老小服半合

薑附湯主淡澼氣方

生薑切捌兩 附子肆兩生去皮肆破

右貳味以水捌升煑取貳升分肆服日貳亦主卒風大良

論曰凡淡飲盛吐水無時節其源為冷飲過度遂令痼冷脾胃氣羸不能消於食飲食飲入胃皆變成冷水反吐不停者赤石脂散主之方

赤石脂叁斤

右壹味擣篩為散服方寸匕日叁酒飲並可下之稍稍漸加至叁匕服盡叁斤則終身不吐水又不下利補五藏令肥健有人淡飲服諸藥不瘥惟服此壹斤即愈

澼積第五

方壹拾肆首

大五明狼毒圓主堅澼或在人胷或在心腹方

狼毒 乾地黃熬各肆兩 杏仁叁拾枚去皮尖雙仁

巴豆貳拾枚去皮心熬 乾薑 桂心各壹兩半 旋復花

芫花熬 莽草各半兩 細辛 五味子 蜀椒汗去目閉口者

漆頭藺茹各壹兩 人參 附子炮去皮 大黃

厚朴炙 木防已 蓯蓉 當歸 半夏洗各貳兩

右貳拾壹味擣篩爲末鍊蜜和圓如梧子大以飲服貳圓日貳夜壹以知爲度

小狼毒圓 主病與前方同

狼毒（叁兩） 附子（炮去皮） 半夏（洗） 白附子（各壹兩）

漆頭䕡茹 旋復花（各貳兩）

右陸味擣爲末鍊蜜和更杵伍千杵圓如梧子飲服叁圓日貳稍加至拾圓

礜石圓 主積聚癥堅不能食方

礜石（伍兩鍊） 雄黃（研） 人參（各壹兩） 杜蘅 桂心（各壹兩半）

前胡 藜蘆（各叁分） 大黃（貳兩） 乾薑（貳兩） 皂莢（半兩炙去皮子）

丹參（各貳兩） 半夏（洗） 附子（炮去皮） 巴豆（去皮） 烏頭（炮去皮各陸銖）

右壹拾伍味擣篩爲末鍊蜜和圓如小豆服貳圓日貳可至肆圓

治癥癖乃至鼓脹方

取烏牛尿壹升微火煎如稠糖空腹服大棗許壹枚當鳴轉病出隔日更服忌口味

又方 人尿叁升煎取壹升空腹服如牛尿法

芒消湯 主暴癥堅結方

木防已 白术 鬼臼（各壹兩半） 芒消 芍藥

當歸（各貳兩） 大黃（叁兩） 蜈蚣（炙） 蜥蜴（炙各貳枚） 甘草（壹兩炙）

右壹拾壹味㕮咀以水柒升煑取貳升去滓下芒消分爲叁服日叁

治卒暴癥方

蒜（拾片去皮伍月伍日戶上者） 桂心（壹尺貳寸） 伏龍肝（鴨卵大壹枚）

右叁味合擣以淳苦酒和之如泥塗著布上掩病處叁日消（千金云凡蒜或鮮蒜亦得用也）

又方

取商陸根擣蒸之以新布藉腹上以藥鋪布上以衣覆上冷即易取差止數日之中晝夜勿息爲之妙

三稜草煎 主癥癖方

三稜草 切取壹石

右壹味以水伍石煮取壹石去滓更煎取叁斗於銅器中重釜煎如稠糖出內密器中旦以酒壹盞服壹匕日貳服每服常令酒氣相續

療十年痃癖方

桃仁 去皮尖雙仁熬 豉 乾暴去皮熬擣篩各陸升 蜀椒 去目閉口者生擣篩 乾薑 擣篩各叁兩

右肆味先擣桃仁如膏合擣千杵如乾可入少蜜和擣令可圓如酸棗大空腹酒服三圓日叁仍用熨法○取新盆壹口受壹斗者鑽底上作叁拾餘孔孔上布椒叁合椒上布鹽鹽上安紙兩重上布冷灰壹升冷灰上安熱灰壹升熱灰上安熱炭火如雞子大常令盆大口熱底安薄氈其口以板蓋上以手捉勿令落仰臥安盆於腹上逐痛上及痛處自捉遣移熨之冷氣及癥結皆從下部中作氣出來日壹易鹽滿三七日百病皆差乃止

江寧衍法師破癖方

白术 枳實 炙 柴胡 各叁兩

右叁味㕮咀以水伍升煮取貳升分叁服日叁可至叁拾劑永差

陷胸湯 主胷中心下結堅食飲不消方

大黃 壹兩 栝樓 貳兩 甘草 貳兩 甘遂 壹兩 黃連 陸兩

右伍味㕮咀以水伍升煮取貳升伍合分叁服

三台圓 主五藏寒熱積聚臚脹腸鳴而噫食不作肌膚甚者

嘔逆若傷寒瘧已愈令不復發食後服伍圓飲多者吞拾圓長服令人大小便調和長肌肉方

大黃貳兩熬 熟消石 葶藶各壹升熬 茯苓半兩 厚朴炙

前胡 附子炮去皮 半夏洗 細辛各壹兩 杏仁壹升去皮尖雙仁熬

右壹拾味擣篩爲末別擣杏仁如脂次內藥末鍊蜜相和令得所更擣伍千杵圓如梧子大酒服伍圓稍加以知爲度

大桂湯 主虛羸胷膈滿方

桂心壹斤 半夏壹升洗 黃耆肆兩 生薑壹兩切

右肆味㕮咀以水壹斗肆升煑取伍升分伍服日三夜貳

寒冷第六 方九首

鹿骨湯 主虛勞風冷補諸不足乏惙少氣方

鹿骨壹具剉 茯苓壹兩 防風 橘皮 芍藥

人參 當歸 龍骨 黃耆各貳兩 桂心

厚朴炙 乾薑 獨活 甘草炙各參兩

右壹拾肆味㕮咀以水參斗先煑骨取壹斗澄取清內藥煑取參升伍合分肆服日再

大桂皮湯 主氣逆又胷寒熱往來吸吸短氣惡聞人聲諸煩酸疼欬逆不能飲食飲食不生肌肉嬾黃裏急絞痛氣上衝發欬胃管有熱雷鳴相逐寒冷厥逆傷損五藏語言難喜直視大便難方

桂心陸兩 當歸 細辛 黃芩各貳兩 人參伍兩

厚朴炙 枳實炙 芍藥 芎藭各三兩 黃耆肆兩

麥門冬去心 吳茱萸 半夏洗各壹升 蜜伍合

生薑貳斤 五味子 飴各半斤 甘草陸兩炙 附子壹枚炮去皮

右壹拾玖味㕮咀擣生薑取汁參升以水貳斗煑藥取陸升去滓微火上煎內薑汁蜜飴攪相得煑取陸升壹服壹

升日二

大半夏湯 主胷中虛冷滿塞下氣方

半夏壹升洗 生薑捌两切 桂心伍两 蜀椒叁百粒去目閉口汗

茯苓 枳實各貳两炙 大棗貳拾枚擘 附子炮去皮破

當歸 人參 厚朴炙 甘草各壹两炙

右壹拾貳味㕮咀以水壹斗煑取叁升分叁服

茱萸湯 主風冷氣腹中虛冷急痛飲食不消心滿少腹裏急引痛手足逆冷胃中響響乾噫欲吐吐逆短氣方

吳茱萸貳升 小麥 半夏各壹升洗 生薑壹拾伍两 大棗伍拾枚擘

桂心三两 人參 黄芩 甘草各貳两炙

右玖味㕮咀以水壹斗貳升煑取肆升分爲肆服日壹服壹升日再

茱萸湯 主男子虛熱寒冷婦人寒勞氣逆及胷腹苦滿而急繞臍痛寒心吞酸手足逆冷臍四邊堅悸氣踊起胃中虛冷口中多唾或目口乾手足煩苦渴濕痺風氣動作頑痺不仁骨節盡痛腰背如折惡寒大呼即驚多夢夢見鬼神此皆五藏虛方

吳茱萸貳升 半夏壹升洗 生薑壹斤切 芍藥 桂心各叁两

大棗貳拾枚擘 人參 黄芩 甘草各貳两炙

右玖味㕮咀以水壹斗貳升先煑棗極沸乃內諸藥煑取肆升服捌合日叁

烏頭當歸湯 主虛勞損胷滿痛攣急短氣面黄失色頭眩心煩夢寤失精寒氣支節疼又兩脇不得喘息喘息輒牽痛逆害飲食悉主之方

烏頭炮去皮 獨活 芍藥 蜀椒去目閉口者汗 白朮

人參各貳两 厚朴炙肆两 桂心伍两 麥門冬去心 細辛各壹两

吴茱萸壹升 當歸 生薑切 甘草炙各貳兩

右壹拾肆味㕮咀以水壹斗煮取肆升壹服柒合日叁烏頭炮令黄乃用之

澤蘭子湯 主傷中裏急兩脇攣痛久致欬嗽四肢寒熱小便赤黄飲酒困卧長風百脉開張血痺不仁夢寤失精脣口乾燥奄然短氣方

澤蘭子 半夏洗 麻仁各壹升 大棗貳拾枚擘
糖壹斤 人參 茯苓 細辛各貳兩
遠志去心 桂心 龍骨 甘草炙各壹兩

右壹拾貳味㕮咀以水壹斗貳升煮取四升分肆服日叁夜壹

寫膈湯 主胷心逆滿牽引腰背疼痛食飲減少方

桂心 乾薑 枳實炙 甘草炙各肆兩

芫花壹分熬 茯苓貳兩 大黄半兩 半夏洗
人參 桔梗 麥門冬去心各伍分

右壹拾壹味㕮咀以水壹斗煮取叁升分叁服

人參湯 主養神補益長肌肉能食安利五藏通血脉調氣方

人參 乾薑 黄耆 芍藥 細辛 甘草炙各壹兩

右陸味㕮咀以水肆升煑取壹升捌合壹服叁合

飲食不消第十 方一十七首 論一首

太一白圓 主八瘕兩脇積聚有若盤盂胷痛徹背奄奄惻惻裏急氣滿噫項強痛極者耳聾消渴洩痢手足煩或有流腫小便苦數淋瀝不盡不能飲食少氣流飲時復悶寒少腹寒大腸熱恍惚喜忘意有不定五緩六急食不生肌肉面目黧黑方

狼毒 桂心各半兩 烏頭炮去皮 附子炮去皮 芍藥各壹兩

右伍味擣篩爲末鍊蜜和更擣叁千杵圓如梧子大旦以
酒服貳圓暮叁圓知熱止令人消穀長肌強中久服大佳

淮南五柔圓 主補虛寒調五藏和榮衛通飲食消穀長肌肉
緩中利竅方

茯苓 細辛 芍藥 半夏洗 當歸各壹兩
蓯蓉 葶藶熬各貳兩 柴胡叁兩 大黃壹斤蒸

右玖味擣篩爲末鍊蜜和更擣萬杵圓如梧子大以飲服
伍圓稍漸加至拾伍圓以調爲度有憂氣者加松子仁壹
兩千金用前胡

凡身重不能食心下虛滿時時欲下喜卧者皆先針胃管太
倉服建中湯及服此平胃圓必差方

杏仁伍拾枚去皮尖双仁者熬 大黃肆兩 葶藶熬 麥門冬去心
玄參 苦參 丹參各貳兩 沙參壹兩半 人參

當歸 芎藭 五味子 桂心各壹兩

右壹拾叁味擣篩爲末鍊蜜和圓如梧子空腹酒服伍圓
日貳以知爲度

崔文行平胃圓 主百病消穀五勞七傷平胃氣令人能食小
兒亦患冷者減大黃倍乾薑小便利者生用葶藶方

菖蒲 大黃 葶藶熬 小草 芍藥
當歸 桂心 乾薑 茯苓 麥門冬去心
芎藭 細辛各貳兩 甘草貳兩半炙

右壹拾叁味擣篩爲末鍊蜜和圓如梧子空腹以酒服伍
圓日再千金一方并七味

調中五參圓 主十年嘔手足煩疼羸瘦面黃食不生肌膚傷飽
食不消化方

人參 丹參 沙參 苦參 玄參

防風　蜀椒去目閉口者各壹兩汗　附子炮去皮　乾薑各半兩
葶藶一合熬　大黃肆兩　巴豆去心皮熬　䗪蟲熬各伍拾枚
右壹拾叁味擣篩爲末鍊蜜和圓如小豆大空腹飲服貳
圓日叁服蒸大黃於伍升米下夂熟切之日暴乾

消穀圓主數年不能飲食方
小麥糵　七月七日麴各壹升　乾薑　烏梅各四兩
右肆味擣篩爲末鍊蜜和圓如梧子大空腹酒服拾丸日
再稍加至叁拾圓其寒在肖中及反胃番心皆瘥

三部茯苓圓主三焦上中下焦合爲三部三焦道閉塞不通
留水在膈上不消化名曰淡水積年不去雖服藥下之不能
便去雖得小去隨復如故其病面目黧黑手足逆冷身體枯
燥肌膚甲錯身無潤澤吸吸羸瘦或已嘔吐或大便燥或復
重下起止甚難夂或絞痛雷鳴時時下痢者悉主之方
茯苓柒分　大黃　白朮各壹兩半　芎藭　桔梗各伍分
前胡　乾地黃　神麴各貳兩半　乾薑　桂心各壹兩
人參　芍藥　黃芩　菖蒲各叁分
右壹拾肆味擣篩爲末鍊蜜和圓如梧子食後飲服拾圓
日再

大桂枝圓主叁焦受寒寒在中焦即滿噫氣吞酸或咽中不
下中冷胃不可下食食已或滿不消痛上搶心結食拘痛時
時洩痢不食溫溫如醉方
桂心　附子炮去皮各貳兩半　芍藥柒分　當歸　蜀椒去目閉口者各壹兩半汗
人參壹兩　乾薑　前胡各貳分　特生礜石壹分鍊
右玖味擣篩爲末鍊蜜和圓如梧子大空腹飲服拾圓日三

小桂枝圓主胃中冷虛滿醋咽婦人產後寒中腹內雷鳴吞
醋飲食不消方

桂心貳兩半 乾薑玖分 蜀椒去目閉口者貳兩汗 烏頭去皮七分炮 附子壹兩半炮去皮
前胡伍分 芎藭 白薇各壹兩 防葵半兩 吳茱萸壹兩半
右壹拾味擣篩為末鍊蜜和圓如梧子酒飲任性服叁圓
日叁
大黃甘草圓 主久寒胷脇支滿憂思傷損奔氣膈氣腸中虛
冷呼吸短氣不得飲食淡氣腫聚輾轉上下肢冒厥絕顏色
恍惚夢寤不定羸瘦萎黃經年不起方
大黃 甘草炙 桂心 桔梗各貳兩 白斂
茯苓各半兩 附子炮去皮 芎藭 阿膠炙 澤瀉
防風 署預 石斛 芍藥 乾薑
紫菀 黃芩 蜀椒去目閉口者汗 白朮各壹兩 當歸
人參 蓯蓉 乾地黃 山茱萸 麥門冬去心各壹兩半
右貳拾伍味擣篩為末鍊蜜和圓空腹酒下如梧子大拾
圓日叁稍加至叁拾圓
附子圓 主胷膈中寒温不和心下宛宛痛逆害飲食氣滿噓
吸乾噫吞酸胷背中冷兩脇急痛腹中有冷水抑抑作聲繞
臍痛頭眩滿悶身體羸瘦方
附子炮去皮 人參各貳兩 芎藭半兩 乾薑貳兩半 礜石壹兩鍊
皂莢炙去皮子 半夏洗 桂心 礬石各伍分燒 吳茱萸
茯苓 黃芩各三分 當歸 細辛 蜀椒去目閉口者汗
芍藥各壹兩 麥門冬去心 甘草炙各壹兩半
右壹拾捌味擣篩為末鍊蜜和圓如梧子未食酒服貳圓
日三
人參圓 主百病三蟲疝瘕成魚鱉蝦蟇令人面目枯無潤澤
精寒勞瘦方
人參 龍膽 杏仁去皮尖及雙仁熬 礜石各貳兩鍊

曾青叄分　黃石脂壹兩

右陸味擣篩爲末餳和爲圓如梧子飲服貳圓日三亦可作散服一刀圭服藥二日白蟲下十日長蟲下有蟲皆相隨下耐藥者二十日乃下

乾薑圓主胃中冷不能食或食已不消方

乾薑拾兩　赤石脂陸兩

右貳味擣篩爲末鍊蜜和圓如梧子服拾圓日三稍加至叄拾圓服不限食前食後

八等散主消穀下氣神驗方

白朮　厚朴炙　人參　茯苓

吳茱萸　陳麴　麥蘖　芎藭各叄兩

右捌味擣篩爲散食後酒服方寸匕日三

治虛勞冷飲食不消勞倦噫氣脹滿憂恚不解人參散方

人參　茯苓　陳麴　厚朴炙

麥蘖　白朮　吳茱萸各貳兩　檳榔捌枚

右捌味擣篩爲散食後酒服方寸匕日貳服

麻豆散主脾氣僻弱不下食服此以當食方

大麻子叄升熬香末　大豆黃壹升末

右貳味和飲服壹合日四五任性多少

乾薑散主不食心意冥然不憶食方

乾薑　乾豉　神麴　蜀椒汗去目閉口者　大麥蘖

右伍味各壹升擣篩爲散食後酒服方寸匕日三以食爲度

論曰凡人食生冷雜物或寒時衣薄當風食不消化或夜食冷臥心腹脹滿煩急或連日不差者燒地令熱以席布上厚覆取汗便愈其地沃水去大熱又坐臥於上一月日永差凡食過飽煩悶但欲臥腹脹熬麴末令香酒服一方寸匕日五

六服大麥蘗益佳

雜療第八　方法一百二十首

鐵屑炒使極熱投酒中飲之療賊風痙又裹以熨䏶療胡臭有驗

石灰療金瘡止血大效若五月五日採蘩蔞葛葉鹿活草槲葉芍藥地黃葉蒼耳青蒿葉合擣石灰爲團如雞卵暴乾末以療瘡生肌大神驗

桑薪灰療黑子肬贅用煑小豆大下水腫

青蒿灰燒蒿作之柃灰燒木葉作之並堪蝕惡肉東壁土摩乾濕癬極有效

茺蔚莖擣傅丁腫服汁使丁腫毒內消又下子死腹中主産後血脹悶諸毒腫丹油等腫取汁如豆滴耳中主聤耳中虺蛇毒傅之良

莎草根名香附子大下氣除胷腹中熱

艾主下血衄血膿血痢水煑及圓散任用

草蒿生挼付金瘡大止血生肉止疼痛良

羊桃取根煑以洗風痒及諸瘡腫

羊蹄主赤白雜痢又療蠱毒

蚤休醋磨療癰腫蛇毒

苧根安胎貼熱丹毒腫漚苧汁主消渴

萞麻葉油塗炙熱熨顖上止衄尤驗

甘焦根擣汁服主産後血脹悶傅腫去熱毒

松花名松黃拂取酒服輕身療病勝皮葉及脂松取枝燒其上下承取汁名湇主牛馬瘡疥柏枝節煑以釀酒主風痺歷節燒取湇療瘑疥及癩瘡良

牡荊葉主久痢霍亂轉筋血淋下部瘡濕䘌薄脚主脚氣腫

滿其根水煑服主心風頭風肢體諸風解肌發汗
槐八月斷大枝使生嫩蘖煑汁釀酒療大風痿痺
槐耳主五痔心痛婦人陰中瘡痛枝炮熨止蝎毒
檳榔人主腹脹生擣末服利水穀道傅瘡生肌肉止痛燒為
灰主口吻白瘡
桑椹主消渴葉水煎取濃汁除脚氣水腫利大小腸
鼠李木皮主諸瘡寒熱毒痺子採取日乾圓蒸酒漬服貳合
日再能下血及碎肉除疝瘕積冷氣大良
杉材水煑汁浸捋脚氣滿服之療心腹脹痛出惡氣
欅皮煑汁以療水及斷痢取嫩葉挼貼火爛瘡有效
莢蒾煑枝汁和作粥甚美以飼小兒殺蚘蟲藥子主破血止
痢消腫除蠱疰蛇毒
柳木枝及木中蟲屑枝皮主痰熱淋可為吐湯煑洗風腫痒

煑含主齒痛木中蟲屑可為浴湯主風瘙痒癮胗大效
梓口皮主吐逆胃反去三蟲小兒熱瘡身頭熱煩蝕瘡湯洗
之并封傅嫩葉主爛瘡
枳椇苗藤切以酒浸服或以釀酒去風冷癱瘓亂髮灰療轉
胞小便不通赤白痢哽噎鼻衂癰腫狐尿刺尸疰下腫骨
疽癰瘡
人乳取首生男乳療目赤痛多淚解獨肝牛肉毒合豉濃汁
服之神效又和雀屎去目赤努肉
人屎主諸毒卒惡熱黃悶欲死者新者最效須與水和服之
其乾者燒之煙絕水漬飲汁傷寒熱毒水漬飲彌善破疔
腫開以新者封之一日根爛
尿主卒血攻心被打內有瘀血煎服壹升又主癥積滿腹諸
藥不瘥者服之皆下血片塊二十日即出也亦主久嗽上

氣失声溺垽白燒研末主緊脣瘡溺坑中竹木主小兒齒
不生正旦刮塗之即生
熊膽療時氣熱盛亦多為黄疸暑月久痢甘䘌心痛注忤腦療
諸聾血療小兒客忤脂長髮令黒悦澤人面酒鍊服之差
風痺
羊膽療瘡濕時行熱熛疽瘡和醋服之良
羊肺療渴止小便數并小豆葉煑食之
羊腎合脂為羹療勞利甚效蒜韲食脂壹升療癥瘕
羊屎煑湯下灌療大人小兒腹中諸疾疳濕大小便不通燒
之熏鼻主中惡心腹刺痛熏瘡療諸瘡中毒痔瘻等骨蒸
彌良
羊肝療肝風虛熱目赤暗無所見生子肝七枚神效療頭風
眩瘦疾小兒驚癇骨療同血主女人中風血虛悶産後血
運悶欲絶者生飲壹升即活牛鼻中木卷療小兒癇草卷
燒之為屑主小兒鼻下瘡耳中垢主蛇傷惡或毒臍中毛
主小兒久不行白牛懸蹄主婦人崩中漏下赤白屎主霍
亂屎中豆主小兒癇婦人産難特牛莖主婦人漏下赤白
無子烏牛膽主明目及甘濕以釀槐子服之腦主消渴風
眩齒主小兒驚癇尿主消渴黄疸水腫脚氣小便不通馬
毛主小兒驚癇白馬眼主小兒魃母帶之屎中粟主金瘡
小兒客忤寒熱不能食絆繩主小兒癇並煑洗之
狗骨灰主下痢生肌傅馬瘡烏狗血主産難横生血上搶心
下頷骨主小兒諸癇陰卵主婦人十二疾為灰服之毛主
産難白狗屎主丁瘡水絞汁服主諸毒不可入口者
鹿頭主消渴筋主勞損續絶骨主虛勞可為酒主風補虛髓
脂主癰腫死肌温中四肢不隨風頭通腠理角主猫鬼中

惡心腹疰痛血主狂犬傷鼻衂折傷陰痿補虛止腰痛齒
主留血氣鼠瘻心腹痛
虎屎主惡瘡眼睛主癲屎中骨爲屑主火瘡牙主丈夫陰瘡
及疽瘻鼻主癲疾小兒驚癇
貍屎灰主寒熱鬼瘧發無期度者極驗家貍亦好一名猫也
兔皮毛合燒爲灰酒服主産難後衣不出及餘血搶心欲死
者頭皮主鬼疰毒氣在皮中如針刺者又主鼠瘻膏主耳聾
駱駝毛蹄甲主婦人赤白帶下最善
豬耳中垢主蛇傷豬腦主風眩腦鳴及凍瘡血主奔豘暴氣
中風頭眩淋瀝乳汁主小兒驚癇病乳頭亦同發汗十二
月上亥日取肪脂内新瓦器中埋亥地百日主癰疽脂
一升著雞子拾肆枚更良
獺四足皮主手足腫瘃

狐肉及腸作臛食之主疥瘡久不差者腸主牛疫燒灰和水
灌之
白雞距及腦主産難燒灰酒服之腦主小兒驚癇
鵝毛主小兒驚癇極者又燒灰主噎
鴨肪主水腫血主解諸毒肉主小兒驚癇頭主水腫通利小便
鴈喉下白毛療小兒癇有效
鷹屎灰酒服方寸匕主惡酒勿使飲人知
雀屎以蜜和爲圓飲服主癥癖久痼冷病或和少乾薑服之
大肥悅人
胡鷰卵主水浮腫肉出痔蟲越鷰屎亦療痔殺蟲去目瞖
蝙蝠屎灰酒服方寸匕主子死腹中腦主女子面皰服之令
人不忘也
龜取以釀酒主大風緩急四肢拘攣或久癱緩不收攝皆差

鯉魚骨主陰蝕哽不出血主小兒丹腫及瘡皮主丹瘾疹腦
主諸癇腸主小兒肌瘡
蠡魚腸及肝主久敗瘡中蟲諸魚灰並主哽噎
乾鱓頭主消渴食不消去冷氣除痞疹其穿魚繩主竹木屑
入目不出穿鮑魚繩亦主眯目去刺煮汁洗之
露蜂房亂髮蛇皮三味合燒灰酒服方寸匕日貳主諸惡疽
附骨癰根在藏腑歷節腫出丁腫惡脉諸毒皆差又水煮
露蜂房一服五合汁下乳石熱毒壅悶服之小便中即下
石末大效水煮洗狐刺瘡服之主上氣赤白痢尿失禁
蟬殼主小兒癇女人生子不出灰服之主久痢
蚱蟬主小兒癇絕不能言
白殭蚕末之封丁腫根當自出極效
鼈頭燒灰主小兒諸疾又主産後陰脫下墜尸疰心腹痛

鰻鱺魚膏療耳中有蟲痛者
蝦蟇腦主明目療青盲
蛇屎療痔瘻器中養取之皮灰療丁腫惡瘡骨疽蜕皮主
身痒瘑疥癬等
蜘蛛療小兒大腹丁奚三年不能行者又主蛇毒溫瘧霍亂
止嘔逆
蚯蚓鹽霑爲汁療耳聾屎封狂犬傷毒出犬毛神効
蠐螬擣爲圓塞下部引痔蟲出盡永差
蜆殼陳久者療反胃及失精
田中螺殼療口瘡心腹痛又主失精水漬飲汁止渴
棗葉揩熱痱瘡良
藕主熱渴散血生肌久服令人心懽
栗嚼生者塗瘡上療筋骨斷碎疼痛腫瘀血其皮名扶擣爲

散蜜和塗肉令急縮毛殼療火丹毒腫飼孩兒令齒不生木
白皮水煑汁主溪毒
櫻桃葉擣付蛇毒絞取汁服防蛇毒內攻
梅根療風痺出土者殺人梅實利筋脉去痺
枇杷葉主欬逆不下食
火柿主殺毒療金瘡火瘡主肉止痛軟柿熟柿解酒熱毒止
口乾壓胃間熱
烏芋一名茨菰主百毒產後血悶攻心欲死產難衣不出擣
汁服一升
桃膠主下石淋破血中惡疰忤花主下惡氣消腫滿利大小腸
梨削貼湯火瘡不爛止痛易差又主熱嗽止渴葉主霍亂吐
痢不止煑汁服之
赤莧主赤痢又主射工沙蝨馬莧一名馬齒草主諸腫瘻疣
目擣揩之飲汁主反胃諸淋金瘡血流破血癥瘕小兒尤良
用汁洗緊脣面皰馬汗射工毒塗之差
蔓菁子療黃疸利小便水煑五升取濃汁服主癥瘕積聚少
飲汁主霍亂心腹脹末服主目暗
白芥子主射工及疰氣發無常處丸服之或擣為末醋和塗
之隨手有驗
苜蓿莖葉平根寒主熱病煩滿目黃赤小便黃酒疸擣取汁
服一升令吐利即愈
水蓼主被蛇傷擣傅之絞取汁服止蛇毒入腹心悶者又水
煑漬脚捋之消脚氣腫
胡葱主諸惡蛓狐尿刺毒山溪中沙蝨射工等毒煑汁浸或
擣付大效
白蘘荷根主諸惡瘡殺蠱毒根心主稻麥芒入目中不出者

以汁注目中即出
雞蘇主吐血衂血下氣消穀大效
苦瓠瓤主水腫石淋吐呀嗽囊結疰蠱痰飲或服之過分令
人吐利不止宜以黍穰灰汁解之又煑汁漬陰療小便不通
胡麻生嚼塗小兒頭瘡及浸淫惡瘡大效
小豆葉名藿止小便數去煩熱
大麥麪平胃止渴消食療脹
小麥麪止痢平胃主小兒癇消食痔又有女麴黃蒸女麴完
小麥爲之一名䴹子黃蒸磨小麥爲之一名黃衣並消食止
洩痢下胎破冷血
粟米泔汁主霍亂卒熱心煩渴飲數升立差臭泔止消渴良
米麥麨主寒中除熱渴解煩消石氣蒸米麥熬磨作之一名
糗也

白英鬼目草也蔓生葉似王瓜小長而五椏實圓若龍葵子
生青熟紫黑煑汁飲解勞地膚子擣絞取汁主赤白痢洗眼
去熱暗雀盲澀痛其苗灰主痢亦善
防風乂頭者令人發狂乂尾者發痼疾子似胡荽子而大調
食用之香而療風更佳
石龍芻主療蚘蟲及不消食
絡石生陰濕處蔓延繞木石側冬夏常青十一月子黑而圓
名石龍藤療產後血結又主蝮蛇瘡絞汁洗之服汁亦去蛇
毒心悶金瘡封之立差
千歲虆莖大如椀汁味甘子味甘酸似葡萄其莖主噦逆大
善傷寒後嘔噦更良
天名精鹿活草也主破血生肌止渴利小便殺三蟲除諸毒
丁瘡瘻痔金瘡內射身痒癮胗不止者揩之立已

葛根末主狂犬傷人并飲其汁燒葛燒灰水服方寸匕止喉痺
苦參十月採子服如槐子法久服輕身不老明目有效
蒼耳三月以後七月以前刈取日乾爲散夏月水服冬酒服
主大風癲癇頭風濕痺毒在骨髓日貳服圓服貳叁拾圓散
服壹貳匕服滿百日病當出如瘑疥或痒汁出或斑駮甲錯
皮起後乃皮落肌如凝脂令人省睡除諸毒螫殺甘濕䘌久
服益氣耳目聰明輕身強志主腰膝中風毒尤良亦主猘狗
毒營花主衂血吐血灸瘡
王蓀主金瘡破血生肌肉止痛赤白痢補虛益氣除脚氣
爵牀療血脹下氣又主杖瘡汁塗立瘥
蜀羊泉俗名漆姑葉主小兒驚
惡實根主牙齒疼痛勞瘧脚緩弱風毒癰疽欬嗽傷肺肺壅
疝瘕積血又主諸風癥瘕冷氣子吞壹枚出癰疽頭

揄人醬利大小便蕪荑醬殺三蟲
凡山中石上草中多有蛭食人血入肉中浸淫起方
用灸斷其道即差
又方
常以臘月猪脂和鹽塗脚及足指間足趺上并鞋上則不
著人
用術法
薑黃生蜀中者眞上蕃詐中國人云療萬病一箇一段價買
之不可得後人知是薑黃更不敢將入來凡薑黃不得爵嚼
之損齒療一切腫初覺刮取末和水塗之數度差難産刮取
一箇作末和水服之即生酒亦得産後腹中不淨刮取末水
和服之愈
馬胞轉剖取末筒吹半大豆許耳鼻中即通此藥末滿月孕

婦勿令見好落娠慎之
貯薑黄法
以袋盛置白米大小麥中袋中著少許米懸乾燥處勿令
雞犬女人見之
造麋鹿二角膠法
三月九月爲上時取新角連臺骨者上細剉大盆中浸一宿
即淘汰使極淨待澄去下惡濁汁取上清水還浸一宿又淘
汰如前澄去下惡濁取汁浸三宿澄取清水并所漬骨角微
微火煑大率角屑一石水三石去角澄取清汁煎水盡至五
升許出貯銅器中湯上煎之三日三夜如糖出置盤上待凝
以竹刀割爲薄片於淨布上暴乾成也其煑角者更細剉之
加水一倍煑成至三四升内銅器中重湯煎如前法
服法
炙膠使極黄沸擣篩爲散每膠一斤末以大附子二兩炮
又一法取惟大者去皮細切炙令黄勝炮日空腹酒服方
寸匕日再稍稍加至二匕不可過二匕補五藏六腑虛羸
瘦極陳者爲上
殺烏頭三建法
烏頭二月採天雄附子並八月採春宜早秋宜晚採
得淨去鬚毛其莖留二分先以大木桶内酢泔三斛酒糟
七升攪之經三日後用次法一如次第遂至法畢
右以粟米一升淨淘擣作粉以烏頭安桶中厚三寸布令
平即摻米粉令遍復加烏頭如前法又加米粉如次第遂
至滿桶去口三寸即止然後取糟汁去桶中一畔下又没
烏頭二寸以物蓋之九月即八九日若十月即經十日候
桶中汁上頭衣作紫色遍即出烏頭以刀刮截看裏許白

黃脉斷即熟但看衣紫色即熟不須致疑即取白茅暴一
日得蔫即得不得太乾於廠屋底乾地上布茅厚五寸漉
出烏頭令乾以布茅上勿令相重其上令布茅厚五寸四
邊閉塞以茅令密經再宿三日從一邊却茅看之若衣勻
斑斑然即好若著白斑又更覆一宿以衣足為限即徐徐
去上茅更經一宿安徐取於廠下薄上布勿令相重經二
十一日後捻出日中暴之三日即成也

又法

烏頭四月收　天雄　附子　側子八月收

右先煎水作生熟湯治附子如前方法內著湯中密封勿
洩經半日出取自灰裛數易灰使乾日暴之其米粥及糟
麴等法並不及此法

服鹽藥法無藥州土則須服之大益

成州鹽官第一　次綿州封井
次鹽州富因井　次益州貴平井
上四井鹽可服之

右法服先以大豆許鹽置口中勿咽之須臾津液滿口令
近齒以方寸匕鹽內口中和津液一時咽之日一服

凡瘧新患者一服得快利即愈百日以上者五服差若一月
服之終身不發

諸下痢初患一兩服即差赤白久痢經年者一七二七服差

諸心腹痛癥結宿澼積聚吐逆食不化者一年以上二三十
年不過三月服之其痢及諸病初服時痢益極者勿怪之也

諸氣滿喘逆不能食者一服即散日服之則根本皆除天氣
熱疾頭痛目眩四肢煩熱者一服得吐利差

諸頭面皮膚百節皆風一月服之差若初服十日內眉間益

悶勿恠

諸淡飲欬逆不能食息者一服差

諸虛勞傷損骨節疼痛起止失聲者二七日服之少氣乏力面無顏色十日服之能三十日服佳也常以平旦空腹服之率以三匕爲節須得吐利者須一度多服三七以上令人大吐利終不傷人若覺煩熱數數飲冷水若至他方異域不伏水土到即服之得一升百事不懼鹽能補虛去冷熱若有宿食不消變成霍亂一服即差

千金翼方卷第十九

雜病下

備急第一　方二十七首　論一首

阿魏藥主一切尸疰惡氣療人有親近死屍惡氣入腹終身不愈遂至死亡醫所不療亦主一切疰神效方

阿魏藥叄兩碎之如麻子大

右壹味以餺飥麪裹半兩熟煑吞之日三服之服滿二七日永差忌五辛油麪生冷酢滑以酒服之即差

玉壺圓主萬病皆用之

雄黃貳兩　八角附子貳兩炮　藜蘆貳兩

丹砂貳兩　礜石貳兩燒　巴豆仁貳兩去皮

右陸味以王相日童子齋戒天晴明時合先擣巴豆三千杵次內礜石又三千杵次內藜蘆又三千杵次內雄黃又

三千杵次內丹砂又三千杵次內附子又三千杵次內白
蜜又三千杵訖更治萬杵佳無丹砂用真朱肆兩代之每
內藥即下少蜜恐藥飛揚盛蜜器中封之勿洩氣安清淨
處大人圓如小豆許服藥下病者宿勿食旦服二圓不知
者爕粥飲發之在膈上者吐膈下者利或但噫氣而已即
愈一切萬病量之不過壹圓二圓莫不悉愈必以王相天
晴明日合之大有神驗若非此日合之極不中用徒事草

倉公散 主萬病方

礬石燒 皂莢炙去皮子 雄黃研 藜蘆熬

右肆味等分為散主卒鬼打鬼排鬼刺心腹痛吐下血便
死不知人及臥魘齧脚踵不覺者諸惡毒氣病取藥如大
豆內竹管中吹鼻得嚏則氣通便活未嚏更吹之以嚏為度

備急圓 主暴病脹滿方

大黃 乾薑 巴豆去皮心熬

右叄味等分先擣大黃乾薑下篩研巴豆如脂內散中合
擣一千杵即用之蜜和為圓亦佳蜜器貯之勿令歇主心
腹暴病若中惡客忤心腹脹滿刺痛口噤氣急停尸卒死
者以水若酒服大豆許三四枚捧頭起令得下喉須臾不
差更服三枚腹中轉鳴得吐利即差

千金圓 主百鬼病風注夢與神交通邪病腹脹惡腫氣卒中
忤方

礜石燒貳兩 附子貳兩炮去皮 雄黃貳兩 真朱貳兩 巴豆仁貳兩
藜蘆貳兩 蜈蚣貳枚炙 麝香半兩 犀角叄分

右玖味擣叄千杵每一服二圓如小豆不知至叄圓五更
一點服至日中解解乃食白米粥忌熱食酒肉五辛一切
皆忌之

眞珠附著散 主諸風鬼注毒氣猫鬼所著方

眞珠　雄黃　丹砂各半兩　乾薑壹兩　蜈蚣壹枚炙

桂心壹兩　天雄半兩炮　莽草半兩　細辛壹兩　蜀椒半兩汗去目閉口者

右壹拾味爲散酒服方寸匕日再

太附著散 主一切蜚尸鬼注風痺百處痛如針刀刺痛嘔逆澼飲五勞七傷萬病方

附子柒分炮去皮　烏頭柒分炮去皮　蜈蚣貳枚炙　芫青八分

雄黃柒分　朱砂柒分　乾薑柒分　細辛柒分

蜥蜴貳枚　人參柒分　莽草柒分　鬼臼柒分

右壹拾貳味擣散酒服半錢匕日再

太一神明陷氷圓 主諸病破積聚心下脹滿寒熱鬼疰長病欬逆唾噫辟除衆惡殺鬼逐邪氣鬼擊客忤中惡胷中結氣咽中閉塞有進有退繞臍絞痛惻惻隨上下按之挑手心中慍慍如有蟲狀毒疰相染滅門方

雄黃貳兩　芫青五枚　桂心貳兩　眞珠壹兩半　麝香壹兩

附子壹兩半炮去皮　烏頭八枚炮去皮　犀角壹兩　鬼臼壹兩　巴豆仁壹分

蜈蚣壹枚炙　人參壹兩　杏仁叁拾枚去尖皮兩仁熬　射罔壹兩

丹砂貳兩　蜥蜴壹枚　斑猫柒枚去翅足熬　當歸貳兩　藜蘆壹兩

大黃貳兩　礜石貳兩燒　樗雞柒枚　地膽柒枚　牛黃壹兩

右貳拾肆味擣末蜜爲圓擣三萬杵圓如小豆先食服二圓日再服不知稍稍加以藥二圓著門上令衆惡不近傷寒服之無不即愈若至病家及視病人夜行獨宿服二圓衆邪不近亦可佩之

蜥蜴圓 主癥堅水腫蜚尸遁尸寒尸喪尸尸注骨血相注惡氣鬼忤蛄毒邪氣往來夢寤存亡流飲結積虎狼所嚙猘犬所咬鴆毒入人五藏服藥殺其毒〻即消婦人邪鬼忤之亦能

遣之方

蜥蜴貳枚　蜈蚣炙貳枚　地膽五十枚　䗪蟲參拾枚熬　杏仁參拾枚去尖皮雙仁

螻蛄拾肆枚炙　蝱蟲參拾枚去翅足熬　朴消柒分　澤瀉半兩

芍藥伍分　虎骨壹兩半炙　甘草壹兩炙　桃奴半兩　犀角半兩

巴豆仁柒分　鬼督郵半兩　赤桑雞半兩　乾薑壹兩　款冬花參分

甘遂五分

右貳拾味治巴豆杏仁如膏內藥末研調下蜜擣二萬杵圓如麻子未食服三圓日壹不下加之不取吐下者壹圓日壹有人風冷注癖堅二十年亦得愈

金牙散 主鬼注風邪鬼語尸注或在腰脊胸脇流無常處不喜見人意志不定面目脫色目赤鼻張脣乾甲黃等並治之方

蜈蚣壹枚炙　人參壹兩　蜣蜋柒枚炙　雄黃壹分　徐長卿拾肆枚

蜥蜴壹枚　桔梗參分　鐵精參分　桂心壹兩　鬼臼半兩

金牙壹分燒　野葛壹分　附子壹枚炮去皮　毒公參枚　芎藭半兩

石長生半兩　椒目半兩　大黃壹分　甘草壹分炙　芫菁拾肆枚

鬼督郵半兩　蜂房壹分熬　曾青壹分　真珠壹　蛇脫皮壹分熬

丹砂壹分　烏頭半兩炮去皮　狼毒半兩　斑猫肆枚熬　石膏伍分

藺茹壹分　蕪荑半兩　鬼箭半兩　藜蘆半兩　狸骨壹分

雷丸半兩　狼牙壹兩　乾漆壹分熬　亭長　貝母壹分

凝水石伍分　牛黃壹兩　胡燕屎壹兩　鼈甲半兩炙　滑石半兩

右肆拾伍味為散酒服一刀圭日再稍加如有蟲皆隨大小便出矣

大金牙散 主南方百毒瘴氣疫毒脚弱腫痛濕痺風邪鬼疰

金牙燒　雄黃　丹砂　龍膽　防風

玉支　大黃　曾青　茯苓　桂心

松脂 乾薑 烏頭炮去皮 斑猫去翅足熬 亭長

細辛 消石 野葛 大戟 商陸

蛇脫熬 芫青 鸛骨 芫花 附子炮去皮

寒水石 人參 貫衆 龍骨 蜀椒汗去目閉口者

露蜂房熬 巴豆去皮心 蜥蜴 蜈蚣炙 礜石燒

天雄 貍骨炙 石膽 莽草

右叁拾玖味各等分爲散以絳囊佩帶之男左女右未食以漿水或酒隨意服一刀圭以知爲度

小金牙散 主南方瘴氣疫毒脚弱風邪鬼注方

金牙伍分燒 女萎叁分 莽草叁分 乾薑 桂心

天雄炮去皮 細辛 萆解各叁分 犀角屑 烏頭炮去皮

麝香 虎杖 黄芩 雄黄 朱砂

蜀椒半兩汗去目閉口者 黄連壹兩 牛黄壹分 蜈蚣一枚赤寸者炙

右壹拾玖味爲散訖內牛黄麝香更擣三千杵温酒服壹錢匕日三夜二以知爲度帶之辟不祥弔喪問病皆塞鼻

良一方用由跋無虎杖

又大金牙散 方所主與前方同傳屍骨蒸病家合往

金牙貳兩燒 大黄壹兩 鼈甲壹兩炙 梔子仁壹兩 鬼督郵壹兩

鼉甲壹兩炙壹作鼉甲 桃白皮壹兩 銅鏡鼻壹兩 乾漆壹兩熬

桂心半兩 芍藥半兩 射干半兩 升麻半兩 徐長卿叁分

鳶尾半兩 由跋叁分 蜂房半兩熬 細辛半兩 乾薑半兩

芒消半兩 莽草半兩 龍膽 狼牙 雄黄

真珠各叁分 白朮一兩半 射罔壹分 羚羊角半兩屑

馬目毒公半兩 犀角半兩屑 甘草半兩炙 狼毒半兩

蜣蜋叁枚炙 地膽叁枚 樗雞叁枚 芫青叁枚 雷丸叁分

龍牙壹兩半 杏仁壹兩半去尖皮雙人熬 巴豆拾肆枚去皮心

桃奴拾肆枚 鐵精壹合 赤小豆壹合 烏梅柒枚 胡鷰屎一兩半
鸛骨貳兩 石膏貳兩 蛇脫壹尺熬 斑猫柒分 活草子壹兩半
右伍拾味爲散酒服壹刀圭加至兩刀圭日三夜一以知
爲度絳囊盛帶之男左女右一方寸匕省病問孝夜行塗
中晨昏霧露亦如此密封勿洩氣清齋七日合之一如
法童子沐浴寂靜無人處合勿令人知之買藥勿爭價

太一神明圓 主腹中癥瘕積聚支滿寒熱鬼疰長病欬逆吐
血殺鬼邪氣蠱注胷中結氣咽中如有物宿食久寒方
雄黃肆兩 眞珠貳兩 丹砂貳兩 藜蘆壹兩半 附子壹兩半去皮炮
斑猫貳拾枚熬 杏仁八十枚去尖皮双人熬 地膽貳拾柒枚 礬石一兩燒
赤足蜈蚣貳枚炙 巴豆柒拾枚去皮心 鬼臼參兩 特生礜石五兩燒
右壹拾參味下篩㕮咀礜石令如麥大桑白皮如錢大拾
肆枚令於鐵器中熬桑白皮焦黑止擣二千杵內丹砂雄
黃諸藥合擣四千杵白蜜和爲圓服如小豆大縱不知病
進退遶臍相逐上下不定按之挑手心中溫溫如有蟲者
病走皮中相次即取壹圓摩病上急按手下皮青不青當
白黑若有赤病死皮中也右爲蜂蛇所中中惡服壹圓一
圓著瘡中若不知更加至參圓卒得飛尸腹中切痛服三
圓破壹圓傅瘡上即愈夜夢寤驚恐悶病臨喪服一圓漬
壹圓塗之止惡邪氣不敢近人卒中鬼魅狂言妄語一圓
塗其脉上壹圓塗人中即愈鬼魅逐人以壹圓塗門戶上
鬼不敢前蠱毒病一宿勿食明旦服一圓不知增至二圓
至三圓以知爲度癥結宿物勿食服四圓但欲癥消服一
圓日三病下如雞子白或下蛇蟲下後以肥肉精作羹補
之狐鳴以壹圓向擲之狐即於其處死神秘不妄傳

桔梗圓 主諸注萬病毒注鬼注食注冷注淡飮宿食不消并

酒澼方

藜蘆（貳兩熬）皂莢（貳兩炙去皮子）巴豆仁（貳兩熬）桔梗（貳兩）附子（貳兩炮去皮）

右五味末之蜜和擣萬杵欲服宿勿食旦服兩圓如梧子仰卧勿眠至食時若膈上吐膈下利去惡物如科斗蝦蟇子或長壹尺貳尺下後大虛作羹補之三四日將養禁不盡更服如初

十疰圓主十種注氣注勞注鬼注冷注生人注死注尸注水注食注土注等方

雄黃（壹兩）人參（壹兩）甘草（壹兩炙）藁本（壹兩）巴豆（一兩去皮心熬）

桔梗（壹兩）附子（壹兩炮去皮）皂莢（壹兩炙去皮子）蜀椒（壹兩汗）麥門冬（一兩去心）

右壹拾味末之蜜和空腹服壹圓如小豆大日貳稍加以知為度極效

大麝香圓主鬼注飛尸萬病方

生麝香（半兩）牛黃（半兩）蜈蚣（壹枚炙）丹砂（半兩）雄黃（壹兩）

巴豆仁（伍拾枚去心熬）杏仁（伍拾枚去尖皮双仁熬）桂心（半兩）

地膽（柒枚）芫青（柒枚）亭長（柒枚）蜥蜴（壹枚）獺肝（半兩炙）

大黃（半兩）犀角（半兩屑）礬石（半兩燒）細辛（半兩）藜蘆（半兩）

斑猫（柒枚去翅足熬）鬼臼　礬石（燒）附子（炮去皮）真珠（各半兩）

右貳拾叁味擣為末蜜和擣三千杵飲服如小豆壹圓日二蛇蜂蝎所中以摩之愈（一方地膽作蚺蛇膽）

蜈蚣湯主惡注邪氣往來心痛徹背背或走入皮膚移動不定苦熱四肢煩疼羸乏短氣方

蜈蚣（壹枚炙）牛黃（壹分）大黃（叁分）丹砂（叁分）細辛（壹兩）

鬼臼（壹兩）黃芩（半兩）當歸（壹兩）桂心（壹兩）人參（叁分）

麝香（壹分）附子（一兩炮去皮）乾薑（壹兩）

右壹拾叁味㕮咀以水壹斗煮拾壹味取叁升去滓下牛

黃麝香右末攪令均分三服

鸛骨圓主遁尸飛尸積聚脇下痛連背走無常處或在藏或在腹中或奄然而痛方

鸛脛骨叁分 雄黃一兩 藜蘆半兩 野葛半兩
莽草壹兩 芫青拾肆枚 斑猫拾肆枚熬 巴豆肆拾枚去皮心熬
丹砂貳分 牡蠣壹兩熬 桂心半兩 蜈蚣壹枚炙

右壹拾貳味擣篩蜜圓服如小豆大貳圓一方丹砂作丹參

江南度世圓主萬病癥堅積聚伏尸長病寒熱注氣流行皮中久病著牀肌肉枯盡四肢煩熱嘔逆不食傷寒時氣惡注忤口噤不開心痛方

麝香壹兩 細辛貳兩 大黃壹兩 甘草貳兩炙 蜀椒叁兩汗去目閉口者
紫菀壹兩半 人參貳兩 乾薑壹兩 茯苓貳兩 附子壹兩半炮去皮
眞珠壹兩 丹砂壹兩 烏頭半兩炮去皮 野葛壹兩 牛黃半兩
桂心壹兩 蜈蚣貳枚炙 雄黃壹兩 鬼臼壹兩 巴豆陸拾枚去皮心熬

右貳拾味擣末蜜圓飲服如小豆大貳圓稍加至肆圓日貳加獺肝壹兩大良

大度世圓主萬病與前同方

牛黃壹兩 大黃壹兩 雄黃壹兩 細辛壹兩 附子壹兩炮去皮
眞珠壹兩 甘草壹兩炙 人參壹兩 射罔壹兩 丹砂壹兩
鬼臼壹兩 莽草壹兩 鬼箭貳兩 桂心貳兩 蜀椒壹兩汗去目閉口者
紫菀貳兩 巴豆仁八拾枚去心熬 乾薑貳兩 野葛壹尺
蜥蜴壹枚 蜈蚣壹枚炙 地膽拾伍枚 芫青貳拾枚 樗雞叁拾枚
茯苓壹兩 麝香貳兩

右貳拾陸味擣末蜜圓飲服貳圓如小豆日貳圓先食後服之

細辛散主風入五藏悶絶常自燥痛或風注入身冷注鬼注

飛尸惡氣腫起或左或右或前或後或內或外針灸流移無有常處驚悸腹脹氣滿叉心頭痛或恍惚悲懼不能飲食或進或退陰下濕癢或大便有血小便赤黃房中勞極方

附子貳分炮去皮 秦艽叁分 人參叁分 牡蠣叁分熬 蜀椒叁分汗去目閉口者

乾薑五分 桂心伍分 茯苓壹兩 桔梗壹兩 防風壹兩半

白朮壹兩 當歸壹兩 獨活壹兩 柴胡伍分 黃芩叁分

烏頭半兩炮去皮 甘草叁分炙 麻黃叁分去節 芎藭三分 石南半兩

莽草半兩 牛膝半兩 天雄半兩炮去皮 栝樓半兩 杜仲半兩炙

細辛貳分

右貳拾陸味擣篩為散仍別秤之合和也旦以清酒服伍分匕訖如行十里勢欲歇更飲酒五合佳

芥子薄主遁尸飛尸又主暴風毒腫流入四肢頭面諸風方

芥子壹升蒸熟

右壹味擣下篩以黃丹貳兩攪之分作兩處疎布袋盛之更蒸使熱以薄痛處當更迭蒸袋常使熱薄之如此三五度即定

太一備急散 主卒中惡客忤五尸入腹鬼刺鬼排及中蠱毒注吐血下血及心腹卒痛腹滿寒熱毒病六七日方

雄黃貳兩 丹砂壹兩 桂心壹分 藜蘆柒銖 附子伍分炮去皮

蜀椒半兩汗去目閉口者 野葛貳十壹銖 芫花拾銖 巴豆仁叁拾五枚去心熬

右玖味惟巴豆別治如脂餘下篩以巴豆合和更擣之令和調置器中貯之密封勿洩氣有急疾水服錢五匕可加至半錢匕老小半之病在頭當鼻衄在膈上吐在膈下利在四肢當汗出此所謂如湯沃雪手下皆驗秘之千金非賢勿傳也

治暴心痛面無色欲死方

以布裹鹽如彈子燒令赤置酒中消服之即愈

還魂湯主卒忤鬼擊飛尸諸奄忽氣無復覺或已死口噤拗口不開去齒下湯湯入口活不下者分病人髮左右捉踏肩引之藥下復增取盡壹升須臾立蘇方

麻黃肆兩去節　桂心貳兩　甘草壹兩炙　杏仁柒拾枚去皮双仁

右肆味㕮咀以水捌升煑取三升分叁服

治卒中鬼擊及刀兵所傷血漏腹中不出煩滿欲絕方

雄黃粉以酒服壹刀圭日叁血化為水

論曰凡諸大備急丸散等藥合和時日天晴明四時王相日合之又須清齋不得汚穢於清淨處不令一切雜人雞犬六畜及諸不完具人女人等見則藥無靈驗不可具言若不能如法則必不須合之徒棄財力用之與朽木不殊余以武德中合玉壺丸時值天陰其藥成訖後卒不中用終棄之此等多是上古仙聖愍苦厄人遂造此方以救之皆云買藥不可爭價當知其深意云爾

蠱毒第二　論一首　方七首　灸法一首

論曰亦有以蠱涎合作蠱藥著食飲中與人者惟此一種令人積年乃死

治人中蠱人有行蠱毒以病人者若服藥知蠱主姓名當使呼喚將去方

凡中蠱之狀令人心腹切痛如物嚙或吐血下血不急治食人五藏盡則死驗之法唾至水中沈者是也取敗鼓皮燒作末水服方寸匕須臾自呼蠱主姓名可語令知則愈矣

治人有中蠱毒腹内堅如石面目青黃小便淋瀝變狀無常方

牡羊皮方廣伍寸　犀角壹兩屑　芍藥壹兩　黃連壹兩

梔子柒拾枚　蘘荷肆兩半　牡丹皮一兩

右柒味㕮咀以水五升煑取一升半分三服

治蠱毒方

槲木北陰白皮一大握長五寸以水叄升煑取一升空腹服之即吐出

又方 燒蝟皮灰以水服方寸匕差

又方

槲木北陰白皮 桃根 蝟皮灰 亂髮灰

生麻子汁

右伍味先以水濃煑槲皮桃根取汁壹升和麻子汁著灰等一方寸匕令病人少食訖服一大升行百步須臾著盆吐出水中以雞翎擿吐水盆中當有如牛涎犢胎及諸蠱形並出即愈

治猫鬼方

燒臘月死猫兒頭作灰末以井華水服一錢匕日一立差大驗

治猫鬼方

相思子壹枚 巴豆壹枚去皮 萆麻子壹枚 朱砂半兩 峭粉叄分

右伍味擣作末以蜜蠟和爲圓帶之即不著人先著者酒服麻子大一枚良

又方 多灸所痛處千壯自然走去甚妙

藥毒第三 方一十二首

野葛毒方

雞子一枚打破併呑之須臾吐野葛

又方 煑甘草汁冷飲之

又方 服雞屎汁

解諸藥毒雞腸散方

雞腸草 叁分 薺苨 升麻 各壹兩 藍子 壹合
入坌土 壹分 芍藥 當歸 甘草 各貳分炙
右捌味擣篩爲散水服方寸匕多飲水爲佳若蜂蛇等衆毒蟲所螫上血出著藥如小豆許於瘡中藥箭所中削竹如釵股長一尺五寸以綿纏繞水沾令濕取藥內瘡中趂瘡深淺令至底止有好血出即休也若服藥有毒水服方寸匕毒解病愈

野葛毒口噤方

取青竹去兩節注臍上內冷水注中暖即易之立活忌酒數易水

一切諸毒方

甘草 三兩 粱米粉 一合 蜜 半兩

右壹味以水伍升煑取貳升內粉一合更煎又內蜜半兩服七合須臾更服之

鈎吻衆毒困欲死面青口噤逆冷身痺方

薺苨 八兩

右壹味以水陸升煑取叁升冷如人肌服伍合日叁服夜伍服

又方 煑桂汁飲之

又方 煑藍汁飲之

凡六畜五藏著草自動揺得諸醋鹽不變色及墮地不汙又與犬不食者皆有毒殺人

凡食飲有毒者澆地地墳起者殺人

凡肉汁在器中蓋密氣不洩者皆殺人

凡脯肉熟肉皆不用深藏密不洩氣殺人

若中此毒者皆大糞灰水服方寸匕良

治惡毒藥方

狗舌草壹把去兩頭

右壹味以水伍升銅器中煑取汁搜麪作粥食之

藥毒不止解煩方

甘草貳兩　梁米粉壹升　蜜肆兩

右叁味以水叁升煑甘草取貳升去滓歇大熱內粉湯中攪令調內白蜜煎令熟如薄粥適寒溫飲壹升

從高墮下第四　方一十一首

膠艾湯主男子絶傷或從高墮下傷損五藏微者唾血甚者吐血及金瘡傷經內絶者方

阿膠炙　艾葉熬　芍藥　乾地黃各叁兩

當歸　乾薑　芎藭　甘草炙各貳兩

右捌味㕮咀以水捌升煑取三升去滓內膠令烊分再服羸人三服此湯正主婦人產後及崩中傷下血多虛喘欲死腹痛下血不止者服之良千金一方只四味

墜馬及樹崩血腹滿短氣方

大豆伍升

右壹味以水一斗煑取二升半一服令盡劇者不過三作之千金云治人墜落車馬心腹積血唾吐血無數

治落馬墮車及諸踠折臂脚痛不止方

芎藭壹兩半熬　澤蘭壹分　蜀椒去目及閉口者汗　當歸

桂心　附子炮去皮各半兩　甘草叁兩炙

右柒味微熬令香擣篩為散酒服方寸匕日三凡是傷至骨皆服之十日愈小兒傷損亦同

又方

黃耆　芍藥各叁兩　蜀椒壹合去目及閉口者汗

烏頭半兩去皮炮　大黃壹兩　當歸　附子炮去皮
乾薑　桂心　續斷　乾地黃
通草各貳兩
右壹拾貳味擣篩爲散先食訖温酒服一方寸匕日三

生地黃湯主因損小便血出方
生地黃八兩　柏葉壹把　黃芩　阿膠炙　甘草炙各壹兩
右伍味㕮咀以水七升煑取三升去滓内膠取二升五合
分三服

治瘀血腹中奧瘀不出滿痛短氣大小便不通方
荆芥半兩　大黃　芎藭各叁兩　䗪蟲叁拾枚熬　桂心
當歸　甘草炙各貳兩　蒲黃伍兩　桃仁肆拾枚去皮尖及双仁者
右玖味㕮咀以水一斗煑取三升分三服

治折踠瘀血蒲黃散方
蒲黃壹升　當歸貳兩
右貳味擣篩爲散酒服方寸匕日三先食訖服之

又方
䗪蟲去足翅熬　牡丹皮等分
右貳味擣篩爲散酒服方寸匕血化爲水

又方　菴藺草汁服之亦可散服之日三

又方
大麻根若葉
右壹味擣取汁數升飲之即下氣通蘇息無青者乾者煑
汁亦得千金云治踠折骨痛不可忍并主瘀血心腹脹滿短氣

又方　茅根切擣絞取汁温和酒服一升日三良

金瘡第五　方六十二首

金瘡止血散方

鈎樟根 叁兩 當歸 芎藭 乾地黃
續斷 各壹兩 鹿茸 半兩炙 龍骨 貳兩
右柒味擣篩為散以傅血即止酒服一錢匕日伍夜三

治金瘡箭在肉中不出方
白斂 半夏 洗去滑各叁兩
右貳味擣篩為散水服方寸匕日三淺者十日出深者二十日出終不住肉中效

金瘡腸出令入方
磁石 燒 滑石 各叁兩
右貳味擣細篩為散白飲服方寸匕日五夜二三日當入

治刀斧所傷及冷瘡牛領馬鞍瘡方
續斷 松脂 各壹兩 鹿角 牛骨 腐者 亂髮 燒各貳兩
右伍味擣篩細為散以豬脂半斤并松脂合煎令和下鐺於地內藥攪令冷凝用之瘡有汁散傅之

金瘡煩悶方
白芷 芎藭 甘草 炙各貳兩
右叁味熬令變色擣篩為散水服方寸匕日五夜二

消石散 主金瘡先有石發煩悶欲死大小便不通方
消石 寒水石 栝樓 澤瀉 白斂
芍藥 各壹兩
右陸味擣篩為散水服方寸匕日三夜一稍加之以通為度

琥珀散 主弓弩所中悶絕無所識方
琥珀
右壹味隨多少擣篩為散以童男小便服之不過三服差

弩筋散 主弓弩所中筋急不得屈伸方
故敗弩筋 五分燒作灰 秦膠 伍分 杜仲 半兩炙 大棗 叁枚

乾地黃貳兩半 附子炮去皮 當歸各壹兩

右柒味擣篩爲散以溫酒服一方寸匕日三稍加至二匕以知爲度

續斷散 主金瘡筋骨續絶方

續斷叁兩半 芎藭 蓯蓉 當歸各壹兩半 細辛半兩

附子炮去皮 乾薑 蜀椒汗去目閉口者 桂心各叁分 蛇銜草

乾地黃各貳兩 芍藥 人參 甘草炙各壹兩

右壹拾肆味擣篩爲散酒服方寸匕日三夜一（千金有地榆古今錄驗又有杜衡）

藍子散 主金瘡中藥箭解毒方

藍子伍合 升麻八兩 甘草炙 王不留行各肆兩

右肆味擣篩爲散水服二方寸匕日三夜二水和方寸匕如泥塗瘡上乾易毒即解

澤蘭散 主金瘡內塞方

澤蘭 防風 石膏 乾薑 蜀椒去目閉口者汗

附子炮去皮 細辛 辛夷 芎藭 當歸各半兩

甘草炙壹兩

右壹拾壹味擣篩爲散酒服方寸匕日三夜一膿多倍甘草渴加栝樓半兩煩熱加黃芩半兩腹滿短氣加厚朴三分瘡中瘀血更加辛夷半兩

蒲黃散 主被打腹中有瘀血方

蒲黃壹升 當歸 桂心各貳兩

右叁味擣篩爲散酒服方寸匕日三夜一

甘菊膏 主金瘡癰疽止痛生肉方

甘菊花 防風 大戟 黃芩 芎藭

甘草各壹兩 芍藥 細辛 黃耆 蜀椒去目閉口者汗

大黃 杜仲各半兩炙 生地黃肆兩

右壹拾叁味擣篩以臘月猪膏肆升煎五上五下芍藥色黄膏成綿布絞去滓傅瘡上日三

桃仁湯 主金瘡瘀血方

桃仁 五拾枚去皮尖及双仁　䗪蟲 去翅足熬　水蛭 熬各叁拾枚

大黄 五兩　桂心 半兩

右伍味切以酒水各伍升煑取貳升服一合日三服明日五更壹服

馬蹄散 主被打腹中瘀血方

白馬蹄 燒令烟盡

右壹味擣篩爲散酒服方寸匕日三夜一亦主女人病血消之爲水

金瘡內漏方

還自取瘡中血著杯中水和盡服愈

金瘡腹中有瘀血二物湯方

大麻仁 叁升　葱白 貳拾枚

右藥使數人各擣令熟著玖升水中煑取半頓服之若血去不盡腹中有膿血更令服之當吐膿血耳

金瘡內漏血不出方

牡丹

右壹味爲散服三指撮五日尿出血

治金瘡因房驚瘡方

燒婦人褌襠作灰傅之

金瘡方

取馬鞭草擣篩薄瘡一宿都差冬用乾葉末

麥門冬散 主金瘡乳癰諸腫煩滿方

麥門冬 去心　石膏 研　柏子仁　甘草 炙各半兩　桂心 壹分

右伍味擣篩爲散酸漿和服方寸匕日三夜一煩滿氣上
脹逆長服之佳
治金瘡出血多虛竭内補散方
蓯蓉　芍藥　當歸　芎藭　乾薑
人參　黃芩　厚朴炙　桑白皮　吳茱萸
黃耆　桂心　甘草炙各壹兩　蜀椒叁分去目及閉口汗者
右壹拾肆味擣篩爲散飲服方寸匕日三
治金瘡煩滿方
赤小豆壹升以苦酒浸之熬燥復漬之滿三度色黑治服
方寸匕日三
治金瘡苦不差方
白楊木白皮熬令燥末服方寸匕日三服又以末傳瘡中
即愈

治金瘡刺痛不可忍百方不差方
葱一把水三升煮數沸漬瘡即止
治金瘡煩痛大便不利方
大黃　黃芩等分
右貳味擣篩爲末鍊蜜和圓先食飲服如梧子七圓日三
金瘡以桑白皮裹令汁入瘡中或石灰封並妙
凡金瘡出血必渴當忍噉燥食不得飲粥及漿犯即血出殺
人凡白血不止粉龍骨末於瘡上立止
又方　割取人見著鞋上有斷乳十枚布瘡上立止
又方　末雄黃傅瘡當沸汁出即差
又方　刮具子末服壹錢匕
又方　煮葛根食之如食法務令多
兵瘡方擣車前汁傳之血即止

又方　以人精塗之差

又方　以柳絮裹傅之血便止

又方　以熟艾急裹數日乃解

又方　以人屎屎相和絞取汁飲三升頓服令盡

金瘡驚而堅腫劇者殺人方

擣生地黃螃蟷蟲傅之燒瓦熨其外令溫地黃燥則易瓦冷則易

凡刺在肉中不出方

牛膝根莖擣傅之即出雖已合猶出也

正觀中有功臣遠征被流矢中其背胎上矢入四寸舉天下名手出之不得遂留在肉中不妨行坐而常有膿出不止永徽元年秋令余診看余爲處之瞿麥丸方

瞿麥 貳兩　雄黃 壹兩半研　乾地黃　王不留行 各伍分

麻黃 去節　茅根　敗醤　防風　雀李根皮

牛膝　大黃　藍實　石龍芮　薔薇根皮 各二兩

右壹拾肆味擣篩爲末鍊蜜和圓如梧子酒服十圓日貳稍稍加至貳拾圓以知爲度忌豬魚生冷等可直斷口味凡箭鏃及折刺入身中四體皆急當合此藥服之令四體皆緩緩則其鏃必自跳出余常教服此藥與斷肉遂日日漸瘦其鏃遂跳出壹寸戴衣不得行因即錯却乃得行動已覺四體大緩不比尋常終冬至春其鏃不拔自然而落取而量之猶得三寸半是以身必須斷口味令瘦肉緩刺則自出矣故以記之

又方　磁石末傅之止痛斷血

凡金瘡深不用早合若合則以滑石朱粉則不合治凡竹木刺在肉中方

以羊矢和猪脂塗之出矣

又方　鹿角末水和塗之即出

治因風水腫方

卒刺涉水成腫取韭并塩擣置上以火灸藥上熱徹即愈

又方　取新牛矢承熱塗之

火燒瘡方

燒桃葉塩和煑作湯洗之

又方　以醬汁塗立愈

又方　桑灰水傅乾則易

又方　井底青泥塗之佳

又方　青羊髓塗之佳無青羊白黑羊亦得

治灸瘡及湯火所損晝夜啼呼不止兼滅瘢方

羊脂半兩　猪脂壹分　松脂半兩　蠟壹分

右肆味於松明上以小銚火燒猪脂等皆消以盃承取汁

傅之松明是服松木節也

治灸瘡膿壞不差方

臘月猪脂壹斤　薤白拾枚　胡粉壹兩

右叁味先煎薤令黄去之綿裹石灰壹兩煎去之入胡粉

膏中令調塗故帛上貼之日三度

又方

白蜜壹兩　烏賊魚骨

右貳味擣末相和塗上三五度差

治火瘡方

柏白皮半兩　竹葉壹兩　甘草貳兩

右叁味以猪膏壹斤煎三沸三上三下藥成去滓待冷塗

之集驗有地黄肆兩

治漆瘡方

湯漬芒消伍兩令濃塗乾即爲勿住

又方　取市上磨刀石槽中泥津塗之

又方　取礬石内湯中洗之

又方　羊乳汁塗之

又方　漆姑草挼傅之

又方　末貫衆塗之

沙蝨第六　方三十一首

治沙蝨毒方

以麝香大蒜合擣以羊脂和著小筒中帶之

又方

雄黄　朱砂　常山等分

右叁味五月五日午時童子合之

又治水毒方

凡水毒中人似射工初得之惡寒頭微痛目眶疼心中煩懊四肢振焮腰背百節皆強筋急兩膝疼或吸吸而熱但欲睡旦醒暮劇手足逆冷二三日則腹中生蟲食人下部肚中有瘡不痛不癢令人不覺急治之過六七日下部出膿潰蟲上食五藏熱盛煩毒下痢不禁八九日名工不能醫救矣覺得之當早視若瘡正赤如截者爲陽毒若瘡如鱧魚齒者爲陰毒猶小緩不過二十日殺人欲知是中水毒當作五六斗湯以小蒜五升㕮咀投湯中消息勿令大熱去滓以浴若身體發赤斑文者則非他病也

水毒方

擣蒼耳取汁服一升以綿沾汁滓導下部中日三

又方　取蓼一把擣取汁服一升不過三服

又方　取藍一把擣水解以洗面目身令遍

又方

取大莓根末飲之并導下部生蟲者用汁夏月常多賫此藥屑入水浴以方寸匕投水上流無所畏又辟射工凡洗浴以少許投水盆中即無復毒也

蠼螋尿瘡方

取茱萸東引根土以醋和塗

又方

燒鹿角末和醋傅上已有瘡汁出者燒道邊故蒲席傅之瘡表裏相當一名浸淫取猪牙車骨年久者搥破燒令脂出熱塗之

蠼螋瘡方

取小豆末醋和塗之乾即易小兒以水和

又方

取楝木枝若皮燒灰傅上乾者膏和亦治小兒禿及諸惡瘡

又方

取槐白皮半斤切醋浸半日去痂洗之日五六

狐尿刺方

凡諸螗螂之類盛暑之時多有孕育著諸物上必有精汁其汁乾久則有毒人手觸之不王相之間則成其疾名曰狐尿刺日夜磣痛不識眠睡百方治之不差但取僕公英莖葉根中斷之取白汁塗之令厚壹分塗即差神驗

凡熱傷瘡及狐尿刺腫痛不可忍并風寒者皆馬屎若生桑木趣得煙多熏之汁出即愈

惡刺方

五月蔓菁子擣末和烏牛乳封之無即凡牛乳亦得

又方　取野狐矢燒灰臘月猪膏和封孔上

又方　取桑灰汁熱漬冷即易

又方　以針砂和膠清塗之

又方

取故鞋網如棗大婦人中衣有血者如手掌大到勾棘針二七枚三味合燒作灰以臘月豬膏和塗之蟲出

又方

蔓青子 伍升

右壹味微熬末研小兒尿壹升合內瘡口中周回厚一寸以煻火燒一升投內瘡於中漬之立愈

又方　煑槐白皮取湯漬之

又方　以苦瓠煑作湯漬之

又方　取五月五日蛇皮燒灰臘月豬膏和傅之

又方　取故鞍韉旃燒灰臘月豬膏和封之蟲出

又方　取檡根白皮切一升泔漬煑三沸內孔中亦可漬之

肉刺方　割頭令血出內鉛丹如米許暴之

又方　以刀割却以好墨塗遍差

狗齩方

即以冷水洗瘡任血出勿止之水下血斷以帛裹即愈

蛇齧方　以人屎厚塗以帛裹縛登時毒消

蛇毒方　重臺末唾和封差大驗

蛇蜂毒方

取瓦子摩其上唾二七訖然後拋瓦子却安舊處

癭病第七 方九首

治五癭方

取鹿靨酒漬令沒火炙乾內於酒中更炙令香含咽汁味盡更易盡十具即愈

又方

小麥麪壹斤 特生礜石十兩燒 海藻壹斤

右叄味取三年酢一升漬小麥麪暴乾更浸令酢盡各擣爲散每服兩方寸匕日四五服藥含乃咽之忌薑辛猪魚生菜辛菜吹火讀誦及大語用氣

又方

昆布叄兩 海蛤貳兩 松蘿貳兩 海藻叄兩 白斂貳兩

通草貳兩 桂心貳兩

右柒味擣爲散每以酒服方寸匕日三服

又方

小麥壹升醋壹升夜浸晝暴 昆布洗各貳兩 海藻洗

右叄味擣爲散食後飲服方寸匕日三以差爲度

又方

昆布壹兩 海藻壹兩 海蛤貳兩 半夏洗壹兩 細辛壹兩

土瓜壹兩 松蘿壹兩 通草貳兩 白斂貳兩 龍膽貳兩

右壹拾味擣篩酒服方寸匕日再不得作生活勞動也

又方

昆布貳兩

右壹味切如指大酢漬含咽汁盡愈

又方

海藻壹斤 小麥麪壹升

右貳味以三年酢一升以溲麪末㬠乾往反令酢盡合擣散酒服方寸匕日三忌怒

陷脉散主二十三十年癭瘤及骨瘤石瘤肉瘤膿瘤血瘤或大如杯盂十年不差致有漏潰令人骨消肉盡或堅或軟或潰令人驚惕寐卧不安體中掣縮愈而復發治之方千金云陷腫散

烏賊魚骨壹分 白石英半兩 石硫黃壹分 紫石英半兩
鍾乳半兩粉 乾薑壹兩 丹參叁分 琥珀壹兩
大黃壹兩 蜀附子壹兩炮去皮
右壹拾味擣為散貯以韋囊勿令洩氣若瘡濕即傅無汁者以豬膏和傅之日三四以乾為度若汁不盡者至五劑十劑止勿惜意不作也著藥令人不疼痛若不消加芒消二兩益佳千金有胡燕屎壹兩

治瘻方
昌蒲貳兩 海蛤壹兩 白斂壹兩 續斷壹兩 海藻壹兩
松蘿壹兩 桂心壹兩 蜀椒壹兩汗去目閉口者 羊靨貳百枚炙
神麴叁兩 半夏壹兩洗 倒挂草壹兩
右壹拾貳味各擣下篩以醬清牛羊髓脂丸之一服三丸如梧子日一服

陰病第八 方一十四首

治丈夫陰下癢濕方
以甘草一尺水五升煑洗之生用

又方
以蒲黃粉之不過三

治丈夫陰腫大如斗核中痛方
雄黃壹兩研粉 礬石貳兩研 甘草壹尺生用
右叁味以水壹斗煑取二升洗之神良

治丈夫陰頭癰腫師所不能醫方
鱉甲壹枚
右壹味燒焦末之以雞子白和傅之

治丈夫陰頭生瘡如石堅大者方
刀刮虎牙及豬牙末豬脂煎令變色去滓日三塗之

又方 烏賊魚骨末粉之良

治妬精瘡方
丈夫在陰頭節下女人在玉門内似甘瘡作臼蝕之大痛其甘即不痛以銀釵緜纏臘月猪脂熏黄火上煖以釵烙瘡上令熱取乾槐枝葅塗之以麝香傅瘡上令香黄礬青礬末傅之小便後即傅之不過三度

治男女卒陰中生瘡癢濕方
黄連 梔子各貳兩 甘草壹兩 蛇牀子二分 黄蘗壹兩
右伍味下篩粉之乾者以猪脂和塗上深者緜裹内中日三

治下部痛癢生瘡槐皮膏方
槐白皮伍兩 赤小豆一小合 白芷貳兩 楝實伍拾枚
桃仁伍拾枚去皮尖双仁 甘草貳兩生 當歸貳兩
右柒味切以苦酒漬一宿旦以猪膏一升微火煎白芷黄即成去滓摩上日再并内下部中三寸差

治陰莖頭瘡方
當歸叁分 黄連半兩 桃仁貳兩去皮双仁 小豆壹分
槐子半兩
右伍味作末粉瘡上日三

治陰頭生瘡方
蜜煎甘草塗之即差大良效

治陰瘡黄汁出方
煑黄蘗汁冷漬傅蛇牀黄連末極效

又方
桃仁二七枚熬令黄去皮尖雙仁末之酒服良

又方
生地黄一把并葉擣取汁飲之良

千金翼方卷第二十

千金翼方卷第二十一

萬病

總療萬病第一

論曰後生志學者少但知愛富不知愛學臨事之日方知學爲可貴自恨孤陋寡聞所以愍其如此忘寢與食討幽探微緝綴成部以貽未悟有能善斯一卷足爲大醫凡膈上冷少腹滿腸鳴膀胱有氣冷利者當加利藥服訖當利出泔澱青黃水青泥輕者一兩度加利藥去病即止重者五六度加利藥得日三頻大利方得盡其根源病乃求愈其利法至巳時以來兩行三行即定亦自如舊終不成利病也凡病在上膈久冷淡癊積聚疝瘕癥結宿食堅塊欬逆上氣等固病終日吐唾逆氣上衝胷脅及咽喉者此皆胃口積冷所致當吐盡乃差輕者一二度重者五六度方愈其吐狀初唾冷沫酸水

次黃汁重者出赤紫汁若先患注人當出黑血下吐藥大吐吐時令人大悶須臾自定不令人虛惙得冷飲食已耳不虛聾手足不痹亦有人當吐時咽中有一塊物塞喉不能得出者飲一二合藥酒須臾即吐出一物如拳許大似段雞子中黃重者十塊輕者五六枚

右件等疾狀病之根本若今日不出此根本之疾雖得名醫與一二劑湯藥押定於後食觸其病還發善醫者當服此藥一出根本即終身無疾矣

吐利出疾法

凡長病人　虛羸人　老人　貴人

此等人當少服積日不已病當內消也不須加吐利藥

凡加吐利藥傷多吐利若不止者水服大豆屑方寸匕即定卒無豆屑嚼藍葉及烏豆葉亦得定丈夫五勞七傷陽氣衰損羸瘦骨立者服之即差旬月之間肌膚充悅腦滿精溢仍加補藥加法在後章中

療風方用藥多少法

歷節風貳拾兩酒伍斗　賊風　熱風　大風用藥與歷節同

偏風　猥退　癱緩風拾貳兩酒叁斗

右以上風皆帶熱須加冷藥仍須利藥得利佳也

賊風掣縱捌兩酒貳斗　濕風周痹捌兩酒貳斗

脚腰攣痛拾貳兩酒叁斗　筋節拘急捌兩酒貳斗

食熱如針刺捌兩酒貳斗　熱病後汗不出初覺叁服壹服盞年久服壹升

口喎面戾一目不合肆兩酒壹斗年久拾貳兩酒叁斗

起即頭旋肆兩酒壹斗　頭面風似蟲行捌兩酒貳斗

心悶欲嘔吐項強欲陰雨即發者捌兩酒貳斗

因瘡得風口噤脊背反張如角弓伍服壹服壹盞

療冷病方

積冷淡癊 瘦者肆兩酒壹斗 強者陸兩酒壹斗半 淡飲疝瘕 六兩酒壹斗半

宿食吐逆 肆兩酒壹斗 癥癖腸鳴噫 捌兩酒貳斗 奔肫冷氣 六兩酒壹斗半

癲痔癖塊欬嗽上氣 貳拾兩酒五斗 久疰 捌兩酒貳斗

噎噦嘔痢 陸兩酒壹斗半

卒中惡忤心腹脹滿氣急垂死 叁服壹服壹盞當大吐吐出血

瘴氣 叁服 蠱毒 五服 溫瘧 五服 痎瘧 五服

冷痢 六兩酒壹斗半 久勞 捌兩酒貳斗

療婦人方 其風冷等準前

帶下 拾貳兩酒三斗 崩中 六兩酒壹斗半 月水不通 六兩酒壹斗半

冷病絕產 六兩酒壹斗半 斷緒 捌兩酒貳斗 產後諸疾 八兩酒貳斗

月水不調月前月後乍多乍少 四兩酒壹斗

落身後病 六兩酒壹斗半 重者子宮下垂 拾貳兩酒叁斗

大排風散 主一切風冷等萬病方

芫花　狼毒　欒荊　天雄 去皮　五加皮

麻花　白芷　紫菀　烏頭 去皮　附子 去皮

莽草　茵芋　栝樓　荊芥　躑躅

蕘花　大戟　王不留行　赤車使者

麻黃 各貳拾分　石斛　半夏　石南　署預

長生 各拾肆分　藜蘆 柒分　狗脊　人參　牛膝

蓯蓉　蛇床子　菟絲子　萆薢　車前子

秦艽 各柒分　薏苡　五味子　獨活　藁本

柴胡　牡丹　柏子人　芎藭　芍藥

吳茱萸　桔梗　杜仲　桂心　橘皮

續斷　茯苓　細辛　乾薑　厚朴

茯神　山茱萸　防巳　黃耆　蜀椒

巴戟天　高良薑　紫葳　黄芩　當歸

昌蒲　乾地黄　通草各肆分

右六十七味㕮咀熬鍊直置振去塵土即擣麤篩下藥三兩黍米三升麴末二升上酒壹斗伍升淨洮米以水伍升煑米極熟停如人肌下麴末熟搦次下散搦如前次下酒攪之百遍貯不津器中以布片蓋之一宿旦以一淨杖子攪三十匝空腹五更温一盞服之以四服頭面習習爲度勿輙加減非理造次必大吐利欲服散者以絹篩下之一服方寸匕只一服勿再也水飲漿酒皆得服之丸服者蜜和服如梧子七丸惟不得湯服也須補者藥少服令內消即是補也千金方有白朮食茱萸無麻花半夏赤車使者高良薑紫葳止六十四味名芫花散一名登仙酒又名三建散按後加減法中有遠志而此方中無疑此脫遠志也

○凡服此藥法先多服令人大吐下利三五度後乃少服方可得益也其加增藥法如左

麻花　烏頭　王不留行　赤車使者

麻黄　躑躅　茵芋　芫花　五加皮

白芷　莽草　附子　栝樓　荆芥

天雄　芎藭　藁本　署預　巴戟天

細辛　獨活　當歸　黄耆　乾薑

厚朴　防已　山茱萸　大戟　萆薢

桔梗　牡丹　柏子人　狗脊　薏苡

秦艽　菖蒲

右三十六味並主風多者患之者準冷熱加減之

蓯蓉　芎藭　續斷　蛇床子　王不留行

桔梗　芫花　天雄　附子　躑躅

茵芋　當歸　秦艽　芍藥　乾薑

狗脊　萆薢　石南　蜀椒　乾地黄
菖蒲　署預　石斛　牛膝　細辛
柴胡　車前子　桂心　栢子人　五加皮
杜仲　薏苡
右二十二味主濕痺腰脊患之者準冷熱加減之
秦艽　藁本　狗脊　萆薢　通草
石南　芎藭　續斷　牛膝　乾地黄
石斛　薏苡　菟絲子　杜仲　天雄去皮
附子去皮
右十六味主攣急嚲曳患之者準冷熱加減之
莽草　防己　藜蘆
右三味主身痒疥瘙患之者準冷熱加減之
紫菀　牡丹　茯苓　茯神　栢子人

蕘花　人參　遠志　細辛
右玖味主驚癇患之者準冷熱加減之
蜀椒　長生　躑躅
右叁味主鬼魅患之者準冷熱加減之
紫菀　芫花　藜蘆
右叁味主蠱毒患之者準冷熱加減之
高良薑　桔梗　芫花　山茱萸　茯苓
人參　柴胡　牡丹　蕘花　蓯蓉
巴戟天　芍藥　乾薑　附子　烏頭去皮
麻黄　莽草
右壹拾柒味主痼冷積聚腹痛堅實患之者準冷熱加減之
厚朴　橘皮　桔梗　大戟　藜蘆
半夏　乾薑　藁本　人參　呉茱萸

右壹拾味主腹痛脹滿吐逆患之者準冷熱加減之
茯苓　厚朴　芫花　半夏　細辛
烏頭　黃芩　柴胡　山茱萸
右玖味主淡實患之者準冷熱加減之
厚朴　乾薑　紫菀　茯苓　桔梗
蕘花　烏頭　人參　細辛　柴胡
右壹拾味主胷滿痛患之者準冷熱加減之
紫菀　署預　石斛　細辛　巴戟天
牡丹　當歸　人參　菖蒲　五味子
桔梗　柏子人　吳茱萸　山茱萸　乾地黃
右壹拾伍味主補五藏虛損患之者準冷熱加減之
柏子　續斷　黃耆　署預　芍藥
巴戟天　五味子
右七味主益氣患之者準冷熱加減之
肉蓯蓉　蛇床子　五味子　附子　天雄
萆薢　栝樓　署預　遠志　巴戟天
菟絲子　牛膝　柴胡　車前子　細辛
茯苓　杜仲　五加皮　石斛
右壹拾玖味主益精髓患之者準冷熱加減之
乾地黃　菟絲子　天雄　附子
右肆味主補骨髓患之者準冷熱加減之
當歸　藁本　白芷　乾地黃　五加皮
石斛　菟絲子　署預　五味子　厚朴
右壹拾味主長肌肉患之者準冷熱加減之
五加皮　杜仲　續斷
右叁味主陰下濕痒患之者準冷熱加減之

茯苓　人參　栝樓

右參味主消渴患之者準冷熱加減之

栝樓　茯苓　芍藥　橘皮　秦艽

山茱萸　車前子

右柒味主利小便患之者準冷熱加減之

菖蒲　栝樓　山茱萸

右參味止小便利患之者準冷熱加減之

人參　細辛　菟絲子　狗脊

右肆味主明目患之者準冷熱加減之

芎藭　白芷

右貳味主止淚患之者準冷熱加減之

細辛益肝氣　遠志　人參補心氣

右參味補益氣患之者準冷熱加減之

石南　萆薢　狗脊　車前子　石斛

右伍味補養腎氣患之者準冷熱加減之

蜀椒　當歸　麻黃　桂心　吳茱萸

紫菀　蕘花　藜蘆　附子　半夏

烏頭　菖蒲　遠志　細辛　芫花

五味子

右壹拾陸味主欬嗽上氣患之者準冷熱加減之

蛇床子　石斛　細辛　署預　橘皮

右伍味主下氣患之者準冷熱加減之

附子　乾薑　人參　桂心　橘皮

厚朴

右陸味主霍亂患之者準冷熱加減之

萹蓄　通草主漏　厚朴　山茱萸　莽草主三蟲

紫菀　當歸　白芷(主崩中帶下)　黃芩　蛇床子(主寒熱溺)

芎藭　牛膝　栝樓　紫葳

右壹拾肆味主月閉患之者準冷熱加減之

麻黃　栝樓　柴胡　桂心　芍藥(主傷寒)

通草　菖蒲　遠志　人參(主健忘)　附子

黃芩　乾薑　蜀椒(主下)　紫菀　伏苓

芎藭

右壹拾陸味主唾稠如膠患之者準冷熱加減之

論曰所加之藥非但此方所須普通諸方學者詳而用之

阿伽陀圓主萬病第二

阿加陀藥主諸種病及將息服法久服益人神色無諸病方

紫檀　小蘗　茜根　鬱金　胡椒　酪伍

右伍味擣篩為末水和內臼中更擣一萬杵圓如小麥大陰乾用時以水磨而用之

諸咽喉口中熱瘡者以水煮升麻取汁半合研壹圓如梧子大日服之貳服止禁酒肉五辛宜冷將息

諸下部及隱處有腫以水煮牛膝乾薑等取汁半合研壹圓如梧子大日服之四服止禁酒肉五辛生冷醋滑

諸面腫心悶因風起者以水煮防風取汁半合研壹圓如梧子日服之貳服止不須隔日禁酒五辛醋肉

諸四體酸疼或寒或熱以水煮麻黃取汁半合研壹圓如梧子日服止禁酒肉及麪五辛

諸蠒下部有瘡吞壹圓如梧子大又煮艾槐白皮取汁半合研壹圓灌下部二度禁酒肉

諸卒死服者多活看其人手脚頭面腹腫觀顏色無定若有此色而加痢者並不堪治以冷水弱半合研貳圓如小豆灌

口一服不差更與一服若損惟得食白粥鹽醬禁酒肉五辛

諸被魘禱當心常帶壹圓又以水一酸棗許研壹圓如小豆服之叁服止無所禁忌

諸被蛇及惡獸等毒若未被其毒直須辟除隨身帶行便即遠離入草已被毒者以麝香壹相思子大又以水壹酸棗許共藥壹圓如小豆於水内研服并以紫檀以水研取汁用研藥塗其瘡毒處禁酒肉五辛

諸被一切鬼神及龍毒氣者其人飢渴寒熱時來時去不知痛處或恍惚龍毒者其人昏昏似醉膚體斑駮或青取藥壹圓如梧子以水酸棗許共藥研灌鼻及服貳服止無所禁

諸被鬼繞紛失心癲狂莫問年月遠近以艾汁壹酸棗許研藥貳圓如小豆服之若無青艾取乾艾水浸搦取汁用亦得肆服止并帶壹圓常可隨身口味無所禁忌

諸傳尸復連夢想顛倒身體瘦損不知病所乍起乍卧先以水研雄黄一梧子大取汁酸棗許研貳圓如小豆大服之貳服止并挂壹圓著病者房門上及帶壹圓隨身口味無忌

諸消渴者以朴消少許以水攪消取汁半合許研貳圓如小豆服之柒服止禁五辛酒肉麪

諸患淋不問遠近以芒消少許以水攪取壹酸棗許汁研藥貳圓如小豆大服之便止禁酒肉

諸患丁腫以水壹升煑玄參取汁研藥服叁服止又以水半合研玄參根取汁和藥塗上叁遍不須隔日惟食白粥飯自外鹽以上皆不食

諸卒肖膈熱眼暗口臭以水煑苦竹葉取汁半合研藥壹圓如梧子貳服止禁酒肉

諸難產以蒜蔣二七水煑取汁半合研藥壹圓服之若無蒜

蒋研薑黃取汁研藥吞壹圓空吞亦得將息如産時
諸熱瘡無問遠近以水煮大黃取汁半合研藥壹圓如梧子
服之貳服止又水研大黃取汁以藥壹圓研塗瘡上日叄遍
禁房麪五辛宜令將息
諸吐血若因熱吐者不問遠近服之並差冷吐者不治以菖
蒲汁壹酸棗許研藥貳圓如小豆服之肆服止須微暖將息
忌酒肉五辛
諸鼻中血不止以刺薊汁壹酸棗許研貳圓如小豆服之并
研灌鼻貳服灌止若無刺薊之時取乾者水煮取汁依前法
服禁酒肉五辛
諸噎病以水研栝樓取汁壹雞子大研藥壹圓如小豆服之
肆服止忌生冷
諸赤白帶下以牡丹皮刺薊根各貳分以水貳升煮取壹升
分伍服研藥壹圓如梧子服之伍服止禁生冷五辛酒肉
後補法
地榆貳分　桑螵蛸貳分壹云桑耳
右貳味水貳升煮取汁壹合分作貳服取汁壹合研藥壹
圓服之
諸得藥毒以冷水半合研藥壹圓如梧子服之貳服止禁酒
肉五辛宜五日冷將息
諸卒得惡忤以人乳汁半合研藥壹圓如梧子大灌鼻以水
半合研藥壹圓如梧子灌口二三日禁食
諸寒瘧以水一升煮恒山壹兩取汁半合研藥壹圓如梧子
大服之貳服止先取藥如麻子大以冷水研灌鼻中二四嚏
病者垂頭臥便得瘡痒又更灌一邊令相續然後服藥七日
少食禁如前

諸蠱毒濕以生犀角白檀香以水煮取汁壹雞子殼許研藥
貳圓如小豆并蚺蛇膽壹圓共研服之叁服止若毒濕藥及
蚺蛇膽各圓之以綿裹內於下部中叁度止
諸益神色除諸病辟惡氣每日以白蜜如棗核大研藥壹圓
如小豆服長帶少許亦禁如前
諸草藥毒迷悶以泥裹冬瓜燒絞取汁半合研壹圓如梧子
服之若無冬瓜用水服之三日慎食
諸眠驚恐常帶藥壹圓如梧子夜卧安頭邊不得著身每夜
欲卧服壹圓如梧子以水一升煮牡蒙貳分取汁半升入分叁
服七日慎食
諸心勞虛弱以水煮茯神人參取汁半合研壹圓服之拾服
以上止慎生冷
諸心風虛熱以竹瀝漬防風擣絞取汁半合研壹圓如梧子
服之柒服止慎酒肉五辛醋麪
諸心驚戰悸以水壹升切茯苓牡蒙遠志各貳分煮取汁半
升入分叁服壹服研壹圓服之伍服止
諸多忘恍惚以水煮人參取汁半合研壹圓服之伍服止亦
可柒服慎如前
諸溫疫時氣以水煮玄參取汁壹合研壹圓如小豆服之肆
服止量宜緩急惟得食粥及冷食餘皆禁
若患勞家遞相染煮服時并取艾作炷長叁寸門闌當心灸
柒壯即解
諸嘔吐水煮白檀生薑取汁半合研壹圓如梧子服叁服止
七日慎食如前
諸噦病水壹升煮通草橘皮各半兩取汁叁合分再服研貳
圓如小豆服之貳服止慎生冷

諸小兒驚啼以水煮牡豕取汁半合研壹圓如梧子塗乳上令兒飲乳母慎酒肉五辛

諸産後血結以生地黃汁半合研壹圓如梧子服之貳服止血便消下忌食酒肉

諸熱風痺風氣相擊令皮膚厚澀關節不通以防風牡荆子各壹分畢撥壹分以水壹升煮取汁叁合分叁服每日壹服研壹圓如梧子大服之拾服止慎酒肉五辛

諸熱風上衝頭面上痒鼻中痒兼時行寒熱若食嘔吐以人參壹分防風生薑各貳分以水壹升伍合煮取汁叁合分叁服取汁壹合研壹圓如梧子服之柒服止慎如上法

諸黃疸病以黃芩苦參各貳分以水壹升煮取伍合分叁服壹服研壹圓如梧子服之若渴內茯苓栝樓各貳分依前以水煮服惟得與粥

諸卒失瘖不語以防風壹兩和竹瀝擣絞取汁半合研壹圓如梧子貳服止即語重者不過伍服禁酒肉醋麪生冷等

諸懷孕三月以上至臨産不問月日多少忽染種種疾或好傷落及至水腫天行時氣此醫人不許服藥惟得此藥叁服以上重者不過拾服即瘥母子不損平安分解前件諸病可作湯研藥服之甚良

諸産後先痢鮮血後雜膿及腹中絞痛橘皮桔梗各貳分生薑壹兩水壹升煮取半升分叁服壹服研壹圓如梧子服之七日慎生冷油膩醋麪

諸小兒新得風癇以竹瀝半合研壹圓如梧子服之貳服止慎如前

諸女子數傷胎帶壹圓如酸棗大夜即解安頭邊不得著身每日服壹圓如梧子三日止無忌

諸卒腹脹水煑當歸取汁半合旦服壹圓如梧子貳服止慎
生冷
諸臍下絞痛以水煑芎藭取汁半合研壹圓如梧子叁服止
七日慎食生冷
諸蛇蠍蜈蚣毒以水磨鬱金取汁半合研壹圓如梧子服之
貳服止并研壹圓如小豆遍塗螫上忌如前
諸霍亂因宿食及冷者吐逆腹中絞痛吐痢若冷者以桔梗
乾薑以水煑取汁壹酸棗研貳圓如小豆貳服止因熱者用
梔子仁以水煑取汁依前法服皆慎生冷
諸注病以水煑細辛取汁壹酸棗許研貳丸如小豆服之五
服止冷者溫將息
諸中惡以水煑甲香取汁壹酸棗許研貳圓如小豆服之

耆婆治惡病第三 方壹拾壹首 論柒首

論曰疾風有四百四種總而言之不出五種即是五風所攝
云何名五風一曰黃風一曰青風三曰白風四曰赤風五曰
黒風其風合五藏故曰五風五風生五種蟲黃風生黃蟲青
風生青蟲白風生白蟲赤風生赤蟲黒風生黒蟲此五種蟲
食人五藏若食人脾語變聲散若食人肝眉睫墮落若食人
心遍身生瘡若食人肺鼻柱崩倒鼻中生息肉若食人腎耳
鳴啾啾或如車行雷鼓之聲若食人皮皮膚頑痺若食人筋
肢節墮落五風合五藏蟲生至多入於骨髓來去無礙壞於
人身名曰疾風疾風者是癩病之根本也病之初起或如針
錐所刺名曰刺風如蟲走名曰遊風遍身掣動名曰瞤風不
覺痛痒名曰頑風肉起如桃李小棗核從頭面起者名曰順
風從兩脚起者名曰逆風如連錢團圓赤白青黒斑駮名曰
癟風或遍體生瘡或如疥癬或如魚鱗或如榆莢或如錢孔

或痒或痛黃汁流出肢節壞爛悉為膿血或不痒不痛或起
或滅青黃赤白黑變易不定病起之由皆因冷熱交通流入
五藏通徹骨髓用力過度飲食相違房室不節虛勞極汗
流遍體因茲積熱風熱徹五藏飲食雜穢蟲生至多食人五
藏骨髓皮肉筋節久久壞散名曰癩風是故論曰若欲療之
先服阿魏雷圓散出蟲看其形狀青黃赤白黑然後與藥療
千萬無有不差胡云迦摩羅病世醫拱手無方對治名曰正
報非也得此病者多致神仙往往人得此疾弃家室財物入
山遂得疾愈而為神仙今人患者但離妻妾無有不瘥

阿魏雷丸散方

阿魏　紫雷丸　雄黃　紫石英各叁分
朱砂　滑石　石膽　丹砂　藜蘆
白斂　犀角各半兩　斑貓去足翅　芫青去足翅各肆拾枚
牛黃伍分　紫鉚壹兩

右壹拾伍味擣篩為散空腹服壹錢匕清酒貳合和藥飲
盡大飢即食小豆羹飲為良莫多食但食半腹許即止若
食多飽則蟲出即遲日西南空腹更壹服多少如前若覺
小便似淋時不問早晚即更服藥多少亦如前大飢即食
若覺小便時就盆子中出看之蟲從小便出當日即出或
二日三日乃出或四日五日出或殺藥人七日始出其蟲
大者如人指小者大如小麥或出三四枚或五六枚或七
八枚或十枚或三二十枚黃蟲似地黃色赤蟲似碎肉凝
血色白蟲似人涕唾或似魚腦或似薑豉汁青蟲似綠或
似芫青色黑蟲似墨色或似爛椹又似黑豆豉其蟲得藥
者死死者即從小便中出大便中亦有出者不淨不可得
見若出黑色蟲即是黑風不可理之無方可對若出黃蟲即

是黃風當用小便七八升大瓮盛之如竈法安瓮不津者盛
小便中常令使暖入中浸身一日再三度一入中坐浸如炊
二三斗米頃若心悶即出湯數食莫令飢虛則於人無力七
七四十九日即爲一徹以差爲度或一年二年忌房室房室
脉通其蟲得便病即更加其患非冷熱風治如此此是橫病
非正報也若出青蟲即是青風患起由冷風至多其蟲皆青
即是東方木中毒風青蟲宜服自身小便亦名花水亦名清
湯亦名還中水服法空腹服一七日一服六合旦起日初出
即服服不過一升飢即食不得食五辛豬肉雞犬穢食臭惡
之食大嗔怒房室皆忌之服法第一忌之至二七日一日再
服服別四合服小便常取空腹服之則不過一升三七日一
日三服至四七日小便出即服乃至周年以差爲度服之不
過一升百日外小便至少一日之中止可一度二度服之服

大香美好如羹如漿忌法三年佗則難差不佗永愈青蟲如
此是橫病非正報也出白蟲者即是白風赤蟲者即是赤風
同爲一等療二風由熱爲根蟲皆赤白乃是南風西風入五
藏通徹骨髓成患爲疾此之二風與苦參消石酒飲之除患
最疾熱去其患即愈

苦參消石酒方浸酒法在後

苦參　消石　好清酒

右三味先與清酒下消石浸之二七日或三七日然後與苦
參同入酒瓮中盛浸之七日漸漸服之飲法空腹服之一日
三服初七日中一服如半雞子許七日後可飲一升任情飲
之多則爲善患去則速風動亦多勿使醉吐寧漸少飲不用
多飲赤白二風此藥至日無有不愈餘非難治何以故熱爲
根本故苦參能治熱消石除熱消蟲赤白二蟲但聞消石氣

皆變爲水能去熱根本若患赤白二風不問年月多者五年以外加黄消石加酒苦參乃至三四兩無有不愈乃至三十年無鼻柱肢節墮落者但非黑蟲皆悉永愈第一忌房室大瞋怒大熱食禁粘食五辛生冷大醋酪白酒猪魚雞犬驢馬牛羊等肉皆爲大忌自餘不禁此爲對治非正報也若人頑痺不覺痛痒處者當作大白膏藥摩之一日三四度七日徹或二三七日徹乃至七七日四十九日名曰一大徹頑痺即覺痒平復如本即止摩若不平復但使摩之以差爲限不過兩大徹三大徹無有不愈針刺灸燒割劫亦不及摩之爲良乃至身上多有瘡痕生摩之悉愈

大白膏方

白芷 白朮 前胡 吴茱萸各一升

芎藭二升 蜀椒 細辛各三兩 當歸

桂心各二兩 苦酒四升

右壹拾味以苦酒浸藥經一宿取不中水猪脂十斤銅器中煎令三沸三上三下候白芷色黄膏成貯以瓶中隨病摩之即愈若遍體生瘡膿血潰壞當作大黑膏摩之

大黑膏方

烏頭 芎藭 雄黄 胡粉

木防已 升麻 黄連 雌黄

藜蘆 礬石各半兩 杏仁去皮尖 巴豆各四十枚

黄蘗一分 松脂 亂髮各如雞子大

右一十五味擣篩爲末以猪脂二升合藥煎亂髮消盡膏成用塗瘡上日三傳先以鹽湯洗然後塗之勿令婦女小兒雞犬見若患人眉睫墮落不生者服藥後經一百日外即以鐵漿洗其眉睫處所一日三度洗之生毛則速出一大徹眉睫

如本與不患時同也

浸酒法

苦參去上黃皮薄切暴乾擣令散莫使作末秤取三十斤取不津甕受兩斛者甕底鑽作孔甕中底頭著三二十青石子如桃李雞子許大過底孔上二三寸然後下苦參下消石末酒一時著甕中遣童子小兒年十三四者和合調停然後即與五六重故紙繫甕口用小甕口合上泥之莫使漏氣取酒服時法孔中出酒服之一日一服或再服亦得還如法密塞孔勿漏洩不得開甕口取酒酒欲盡時開甕口取苦參滓急絞取酒其滓去却其酒密處盛之莫使漏氣服酒法一二升如前無有不愈若患不得差除者皆由年多十年者更作此藥酒至兩劑無有不愈依法如前雖用良醫治之亦須好酒須行忠直不得不孝不義患除則速矣

論曰苦參處處有之至神良黃消石出龍窟其狀有三種一者黃消石二者青消石三者白消石其形如鹽雪體濡燒之融似曲蟮見鹽為水消石真者燒鍊皆融真偽可知三種消石黃者為上青者為中白者為下用之殺蟲皆不如黃者最良黃消石立殺人身中橫蟲去蟲至速除大風大強藥青消石者至神大藥出在烏場國石孔中自然流出氣至惡大臭蜂蛇飛蟲皆共宗之其氣殺蟲消石與苦參酒相入治熱至良去風至速方稀有用時乃勝於白消石此青消石體狀也如似世間膠漆成時亦如陳蜜亦如餳餔少必枯體澤又似塵汗脂蜜氣味至惡此藥道士貴服則去人身中橫蟲不能得用時先與三升酒浸之二十日多日為佳其勢倍效皆大驗然後與苦參同浸

論曰黃青白消石等是百藥之王能殺諸蟲可以長生出自烏

揚國採無時此方出耆婆醫方論治疾風品法中黃力三歳譯後演七卷治疾風品法云服藥時先令服長壽延年符大驗蕩除身中五藏六腑游滯惡氣皆出盡然後服藥得力其疾速驗無疑符力亦是不思議神力先服藥者無有不效又生造藥入瓮中時令童子小兒和合訖即告符書鎮藥符鎮在瓮腹令藥不壞久久爲好一切神鬼不可近之矣

論曰疑師不治病疑藥不服之服之即不得力決意不疑者必大神驗一切藥有從人意即神疑人必失及久多必損不疑久者有益治病當有愈醫論如此說是以令知服藥先服藥符大驗遣諸惡氣藥勢必當有效朱書空腹服之訖即服藥如前說



朱書此符

先服此符然後服藥一服之後更不須再服書符用六合日勿令小兒女子六畜雞犬等見之符成不忌

論曰病起從上者名爲順病病則易治治則病疾愈從下起者名爲逆病難治倍藥可差

論曰患在五藏骨髓者非湯藥不愈患在皮膚肉脉中者針刺可差湯藥益人精神久有益患易除愈盡其根源針灸雖得目下解急於人神濁養性延年要是湯藥非針灸之所及也湯丸散酒延年益壽燒灸針刺於身不利

論云疾有多種所患不同有蟲癩疥癩風癩金癩木癩水癩火癩土癩酒癩麪癩此皆作癩

蟲癩者得即生瘡膿血潰爛眉髮墮落三年爛壞蟲如馬尾此患難治加藥乃愈

疥癩者狀如𤻙瘙身體狂痒十年成大患加藥乃愈

風癩者風從體入或手足刺痛風冷痺癡不療二十年後成大患加藥乃愈

金癩者是天所爲負功德崇初得眉落三年食鼻鼻柱崩倒難治加藥乃愈

木癩者初得先落眉睫面目痒如復生瘡三年成大患宜急治之加藥乃愈

水癩者先得水病因却留停風觸發動落人眉鬚宜急治之經年病成加藥乃愈

火癩者先於身體生瘡如火燒瘡或斷人肢節七年落眉睫八年成大患難治加藥乃愈

土癩者身體瘖瘰如雞子彈丸許宜急治之六年成大患加藥乃愈

酒癩者飲酒大醉不覺臥黍穰中經夜方起遂即成疾眉鬚墮落速治可差

麪癩者遍身有瘡生蟲其蟲形如麪舉體艾白此病難治加藥乃愈

凡三十九種病或面皰起身體頑痺不覺痛痒或目圓失光或言音[illegible]重或瞋蒙多睡或從腰寬或從足腫種種不同莫能識者病非一般或所得各異若眉鬚墮落皆由風冷因濕得之或因汗入水冷氣太過或飲酒大醉濕地而臥或立當風衝樹下露坐或房室過度流汗極體取冷風入五藏遂成斯患是故論出患之所根本藥之分劑未來病者按而用之無有不愈

浸湯方

桃柳各十　莨菪　藜蘆　烏頭去皮

茵芋　丹參　楮葉　白羊鱣

柏葉　欅皮　大黃　鬼扇

桑甲　藁本　桒葉　松葉
食茱萸各二升　鹽一升五
右一十八味細剉内大釜中以水七斛煎取汁四斛去滓内
槽中令病者卧浸旦至食時便出日中時復入日西復出其
湯常欲得煖以自消息出湯即用十種粉粉之不得使風入
被覆溫卧使身汗流病即差若風多可加藥如左
蒴藋　艾葉　瓜根　虎掌各三斤
兔絲　木防已　狐骨各五兩　礬石二兩
大鹽一升　馬牙消三兩
右壹拾味擣篩為散出湯用粉粉身使風不入諸癩病生瘡
一切諸惡瘡止用粉粉之立差矣
又作酒法
茵芋　烏頭去皮　天雄去皮　附子去皮

蜀椒　防風　石南　乾薑
桂心　躑躅花　莽草　甘草各一兩
右壹拾貳味㕮咀絹袋盛之清酒壹斗漬之春秋七日夏五
日冬十日一服三合日三服以知為度不知漸增禁如藥法
仙人黃靈先生用天眞百畏丸治一切癩病方
淳酒二斗以銅器中煎之減半然後內藥　丹砂　水銀
桂心　乾薑　藜蘆　烏頭炮去皮
蜀椒汗　菖蒲　柏子人各壹兩
右壹拾味擣篩為散內酒中訖復下淳漆二升攪令相得可
丸如梧子作九百九日服一丸日二十日眉鬚生三十日復
本也
九霄君治十種大癩不可名狀者服之病無不愈方
用三月庚寅日取蔓菁花四斤陰乾末之五月辛酉日取

兩井水一斗內銅器中煎之令濃然後內
桂心末　附子末炮去皮　藜蘆末各壹兩　乾漆末四合
石榴末一升
右五味藥末攪使相和煎令成丸如彈丸大服一丸即愈若不差者不過三四丸即愈大驗此方出九霄君守朴經

仙人治癩病神驗方

取松葉不問多少煮三五遍令苦味盡暴乾擣末如麪先食服二方寸匕日三漸增之或可至四兩隨人多少至壹斤飢即服之能愈萬病又益壽延年殺三蟲食人五藏動發若病難忍四肢重不仁婦人產後餘疾月水往來不得續男女少者藥悉主之

礬石釀酒方

礬石燒　石膏　代赭　恒山
蜀椒去目閉口者汗　遠志去皮　狼毒　半夏洗
芒消　礬石鍊　玄參　麻黃去節
防風　桔梗　秦艽　石南
石韋去毛　黃連　莽草　乾地黃
凝水石　菟絲子　甘草炙各壹兩　白石英壹兩半
杏人貳拾枚去皮尖熬
右二十五味擣篩盛韋囊中以時麴三斤米三斗作酒酒熟合藥封之冬十日春七日夏三日秋五日出藥去滓服酒如一雞子酒勢盡復進之所治無有不愈日再十日知三十日愈百日面白如桃李花色耳目聰明邪氣蕩除去魂還復服藥常畏齋戒有效驗矣

蹋麴療冷第四方六首

鹽麴主一切風冷氣等萬病方

麴末五升　鹽末一升五合
右二味熟擣分作五袋旦取二〻袋炒令熱以薄袋各受一升
内藥於中更遞盛之於室内卧以脚蹋袋以被覆之取汗其
藥冷即易初一日一夜限以十度炒之於後連日連夜數炒
頻蹋不得暫停其藥既易多無力即棄之别取新者惟候遍
體汗盡其病方差特須細心多日久候汗盡乃止未盡時間
數有悶亂惟食香漿粥飯特忌生冷所卧床上數白熟羊皮
刺風汗並盡然後乃補之三部脉微弱者勿用之
補酒方
石韋十兩去毛　石南三兩炙　仙靈脾十兩四　細辛五兩
右四味切和以水一斗煎取二升去滓經宿澄杏仁一升去
皮尖及雙人擣以水八升研取汁煎取二升半經一宿以二
汁合之計得四升半以乾麴一斗五升先以五加皮汁浸麴
停一宿其次下石韋等汁一時合和以上黍米七升八分爲七
酘三日下酘凡三十九日即熟取麻子一升淨擇炒令香熟
擣作末以絹袋盛内酒中經三日量力稍稍服之以知爲度
其補日與蹋麴日等盡補以來大小便不得出屋忌房室喜
怒若犯忌後發難差其無酒可補者别補方如左
羊肚肝腎心肺一具以熱湯淨洗肚白餘藏皆生細切　犛牛酥
胡椒　蓽撥各一兩　豉心半升　葱白三握去鬚細切
右五味合和以水六升緩火煎取三升絞去滓和藏等并餘
汁並内肚中以繩急繫口更别作絹袋一口稍小於羊肚煑
之若熟乘熱出以刀子并絹袋刺作孔瀝取汁空腹服令盡
餘者任意分作羹粥食之其無五藏可得用羊骨以補之其
方如左
生羊膏一兩打碎

右以水一石微火煎取三升依食法任意作羹粥食之其不
食肉者以油麪補之方如左
生烏麻油一升 折粳米泔清汁一升
右二味合和微火煎盡泔清汁惟有油在即止停冷以用作
食補法如左
以上油三合 鹽汁七合
右二味先以鹽汁和油攪令鹹淡得所即用以溲麪一升依
常法作餺飥煑五六沸漉出置冷水中更漉出置盤上令乾
後更一葉葉擲釜中又煑如常法十度煑之麪毒乃盡以油
隨意多少和豉令味足以澆食大好
內釀法主婦人絕産及冷結氣宿食不消男子五勞方
生地黃五升細切以水洗漉乾擣取汁 麴末二升
右二味合和內小甕子中密塞口勿洩春夏秋三十日冬埋
入地三尺四十九日出之暴乾擣篩以糯米作粥一升以散
二方寸匕和服之日三任意服之不限時節便以爲常食取
飽足而已更不得餘食也服盡以來其病並差七日後任如
常食

千金翼方卷第二十一

飛鍊研煑鍾乳及和草藥服療第一方六

飛鍊

鍊鍾乳法

鍾乳無問厚薄但令顔色明淨光澤者即堪入鍊惟黄赤二色不堪用一斤置金銀器中可鎮心益氣無者用瓷器亦得大鐺中著水置乳器於水令没煑之常令如魚眼沸水減更添若薄乳三日三夜若鴈齒及厚肥乳管者七日七夜候乳色變黄白即熟如疑生更煑滿十日爲佳煑訖出金銀器其鐺内水盡黄濁弃之勿令人服若服此水便戟人咽喉傷人肝肺令人頭痛又令人下利有犯者噉猪肉即止弃此黄汁更著清水還内上件乳器煑之半日許出之其水猶清不變即止乳無毒矣

研鍾乳法

取所鍊鍾乳於瓷器中用玉鎚擣令碎著水研之水盡更添常令如稀泔狀乳細者皆浮在上麤者沉在下復繞鎚研之易碎滿五日狀如乳汁至七八日其乳放白光非常可愛取少許置臂上拭之狀如捻書中白魚滑自然白光出便以水澆之不隨水落便熟若得水而落者即生更須研之以不落為度熟已澄取暴乾丸散任意服之

崔尚書乳煎鍾乳主治積冷上氣坐卧不得并療風虛勞損腰脚弱補益充悅強氣力方

鍾乳參兩

右壹味研如麪以夾帛練袋盛稍寬容緊繫頭內牛乳壹大升中煎之三分減一分即好去袋空飲乳汁不能頓服分為再服亦得若再服即取晚間食消時服之如能頓服即平旦盡之不吐不利若稍虛冷人即微下少鴨溏亦無所苦明旦又以一大升牛乳准前煎之依法餌之其袋子每煎訖即以少許冷水濯之不然氣不通洩如此三十度以上四十度以下即力盡其袋中滓和麪飼母雞取其生子食亦好不然用浸藥酒亦得若有欲服白石英並依此法若患冷人即用酒煎患熱人即用水煎之若用水及酒例須減半乃好若用牛乳三分減一分補益虛損無以加之永不發動忌食陳久敗物不可噉熱麪猪魚蒜等

服鍾乳酒方

鍾乳叁兩取成鍊上者

右一味以無灰新熟清美酒一斗於不津器中相和密封閉冬七日夏三日空腹温服三合日再漸加之以知為度十五六日可盡將息節食忌如前法

草鍾乳丸方

曹公方主五勞七傷損肺氣急主療丈夫衰老陽氣絶手足冷心中少氣髓虚腰疼脚痺身煩口乾不能食服之安五藏補腸胃能息萬病下氣消食長肌和中方

鍾乳貳兩別研令細　菟絲子壹兩酒浸壹宿別擣

石斛壹兩　吴茱萸半兩

右四味別擣篩爲末鍊蜜丸如梧子空腹服七丸日再服之訖行數百步温清酒三合飲之復行二三百步口胷内熱熱如定即食乾飯豆醬過一日食如常暖將息不得闇見尸穢等氣亦不用食麤臭陳惡食初服七日不可爲房事過七日後任性然亦不宜傷多服過半劑覺有效即相續服三劑終身更無所患多房者加雄蛾三十枚若失精者加蓯蓉叁兩

服軟生乳方此乳名爲甲乳

此乳力減者倍服之永不發其乳長半寸以來水浮者上研依法令極細即於舎米飯下蒸之飯熟即止任意服多少一無禁忌服乳者更石得服餘石當令人却致不和

飛鍊研煑五石及和草藥服療第二論一十一首

服白石英方

白石英上者無闕多少

右壹味先以生絹袋盛於七升米飯下甑中蒸四五遍然後細擣以密絹篩之用玉槌研令細入肉者澄取清水飛取更以白練袋盛急縫裹飯中蒸三遍取猪脂壹斤水浸十日日兩度易水赤脉盡則休剝去薄膜微火鍊出以白石英末和之攪令相入和酒服一匙日二服其飛石水收取用煑粳米粥任性喫酒多少每須覺有酒氣爲佳

燒白石英方

白石英(壹大兩)

右以坩土鍋子盛石蓋頭炭火燒之先取一瓷器貯二升無灰酒燒石令赤即投酒中待冷任酒性多少飲之好石可三兩度乃棄之安庭中即云燠十兩令人年七十氣力可共三二十時無別

白石英和金銀人參煮服方

白石英(伍大兩)　金(拾大兩上熟者生者毒)

銀(四大兩)　人參(貳大兩全用)

右四味取壹鐵釜淨洗即下前藥於釜中先下水叁大升立壹杖入釜中令至底水所浸著處即刻記至更下水貳大斗柒升水通前計叁大斗煎之如魚眼沸漸減之杖所刻處即停火急取濕土置釜底取其汁貯以不津器中金銀石等漉出收取其人參隨藥汁細細喫之其汁每朝空腹服叁大合至暮服貳大合每服之後隨性飲多少酒使藥氣行欲作食餌亦任忌倉米停滯陳臭之食自外百無所忌

石英和磁石浸酒服方

白石英(伍大兩澤州者)　磁石(伍大兩無毛連針多者拾兩亦得)

右貳味各別擣令碎各用兩重帛練袋盛之以好酒壹斗置不津器中挂藥浸經六七日以後每日飲三兩盃常令體中微有酒氣欲加牛膝丹參杜仲生地黃吳茱萸黃耆等藥者各自量冷熱及所患并隨所有者加之仍隨所加有忌者即禁之餘百無忌中年以後則鬚髮變黑腰疼耳聾悉差其酒三五日後即漸添一二升常令瓶滿所加草藥疑力盡者任換之經三四箇月疑石力稍微者即更出擣碎還以袋盛經半年後即棄之準前更合

煮石英服方

石英伍大兩 澤州者

右壹味打碎如小豆蕎麥許大去細末更於水中淘洗令淨重帛練袋盛之以繩繫頭取五大升清水於不津鐵鐺中煮之煮時石袋不用著鐺底恐沙石煎壞先以一杖橫鐺口挂石袋著杖上去底二三分許煮取一升汁置梡中經宿澄取清平旦空腹頓服之若以此汁煮稀粥服之亦佳每服後可行三五百步并飲三兩盞清酒又依前煮經二十度者石即無力可以布裹之埋於南墻下深三尺滿百日又堪用依前服之然終不如新者

服地黃石英酒作丸補益方 神秘

生地黃拾大斤十月採者細切　石英伍大兩　無灰清酒壹斗

右以坩土鍋盛石英燒令極赤內著酒中去石以地黃內酒中浸之經三日出之暴乾復內酒中以酒盡為度惟留壹升許汁擣地黃為末以壹升殘酒和末作丸熟擣為佳日二服任食以意消息極押熱補益百無禁忌亦不發動秘之心腑矣地黃取肥大者佳

牛乳煑石英服方

石英三大兩澤州者　牛乳壹大升　水叁大斗

右先下牛乳於鐺中即以生密絹四重作袋盛石英繫頭下著乳中即勿令袋著底以杖則之為記訖然後下水以炭火消消煎之水盡乳在還以前杖則之至刻即休出石袋以水濯之其乳以綿濾之令煖調適每朝空腹細細服之若患冷氣宜加八顆畢撥和煎之大善或以乳煑粥喫亦佳如是經二十日服即停大補益身心服者乃自知之

紫石湯主心虛驚悸寒熱百病令人肥健方

紫石英　白石英各拾兩　乾薑　赤石脂

白石脂各叁拾兩

右伍味皆完用石英等各取壹兩石脂等三味各取叁兩以水三十升微火煎取二升宿物食分為四服日三夜一服至午時乃可食日日依前秤取以昨日滓仍置新藥中共煮乃至藥盡常然水數一準新藥水藥皆盡訖常添水煮滓服之滿四十日止忌酒肉藥水皆大秤斗取汁亦大升服湯訖即行往坐卧令藥力遍身百脉中行若患大冷者春秋各四十九日服之冷疾退盡極須澄清服之

論曰此湯補虛除固冷莫過於此但能用之有如反掌恐後學者謂是常方輕而侮之若一劑得差則止若傷多者令人大熱復須冷藥押之宜審用之未可輕也

石英汁作薑豉服方

白石英貳大兩　肥猪肉叁斤

右以水捌升煮石英取五升汁量煮猪肉得爛熟為度取猪肉汁下葱豉切肉作薑豉食之一劑可六七日喫令盡二兩石英三度煮之第一度全用第二度中破第三度擣碎煮之每煮皆用帛練袋盛之石經三煮即換新者二月以前八月以後皆可作之

猪肚煮石英服方

白石英末以絹袋重盛縫繫口　生地黃切　生薑細切

人參末各貳大兩　猪肚一具淨料理如食法　豉壹抄

羊肉半斤細切　葱白七莖細切　新粳米壹合

蜀椒四十九顆去目閉口者

右壹拾味藥并石英袋內著猪肚中急繫口勿使洩氣及水入以水二斗煮取八升即停以藥肚著盤上使冷然後破之如熱破恐汁流出先出石袋訖取煮肚汁將作羹服之每年

三度服每服石英依舊餘藥換之分數一依初法每服隔一兩日不用食木耳竹笋又人年四十以下服二大兩年四十五十乃至六十以上加二兩常用四月以後服之者以石性重服經兩月後石力若發即接入秋氣石力下入五藏腰腎得力終無發理也

石英飼牸牛取乳服方

白石英大三斤以上亦得

右壹味擣篩細研經三兩日研了取壹牸牛十歲以上養犢者惟瘦甚佳每日秤一大兩石末和剉豆與服經七日即得取乳每日空腹熱服一升餘者作粥任意食之百無所忌以五月上旬起服大良如急要亦不待時節終無發也其牛糞糞地隨意種菜還供服乳人喫之亦佳

石英糞地種菜食方

白石英伍大斤以下亦可

右壹味擣研末如前取糞地種枸杞牛膝豆菜等食之大益人

鍊白石英方

白石英伍小兩爲一劑取上黨無瑕者佳

右壹味擣石英使碎著研藥鉢中以水浸石纔濕遍不須多著水即研令細如粉訖更著水使石上厚半寸許攪之使渾澄定瀉澄水於一淨器中餘麄者乃更細研之還以水如前法以細爲限最下者即是惡石不堪用棄之摠了又更一遍飛之了可著日中及物藉之安熱灰上即乾每以酒服二匕許酒能使石不用和餘藥

服白石英粉方

白石英任多少瑩淨者

右研飛石如前成粉訖嘗之不磣捻之入肉者為細不然不堪服以四兩為一劑取好白蜜和之分為三十二丸暴乾帛練袋盛之每先食三五匙粳米粥即含咽一丸令消細末以漱口咽之服訖須倍二十日將息不得食臭穢在長安日依此法服至春初頭痛額角如裂即服兩棗許紫雪立止

耆婆大士治人五藏六腑內萬病及補益長年不老方

紫石英研壹兩日　白茯苓　麥門冬去心　防風

芍藥　甘草炙各叁兩

右六味治擇擣篩為散麥門冬擣令如飴和散更擣千杵又內少許蜜更擣一千杵令可丸如梧子酒服七丸日二服服之一年萬病皆愈二年骨髓滿實三年筋化為骨肉變為筋身輕目明除風去冷辟鬼神良服之不絕則壽年千歲不老不衰而致神仙然服忌慎須持五戒十善行慈悲心救護一切乃可長生此等六藥應六時合陽養陰常須服之已有疾病者依檢六味之藥即合服之檢勘諸經此六味之藥相生如母子和也服之久久在人腹耳

五石腎氣丸治諸虛勞亦與前同治方

白石英　紫石英　鍾乳各拾大分　赤石脂

禹餘粮各貳兩半　署預　遠志去心　細辛

茯苓　菟絲子酒浸一宿　蓯蓉　附子炮去皮

乾地黃　乾薑　桂心各五分　海蛤

白朮各七分　石斛壹兩半　五味子　山茱萸

人參　續斷　杜仲炙　澤瀉

蛇床子　桔梗　牛膝　天門冬去心

鹿耳酒浸炙　當歸各三分　甘草半兩炙

右三十一味擣篩為末鍊蜜和丸如梧子大服五丸日二服

稍加至三十丸以酒下佳

五石烏頭丸治男子五勞七傷諸積冷十二風痺骨節沉重四肢不舉食飲減少羸瘦骨立面目焦黑時時或腹內雷鳴膀胱常滿或下青黃經時不止婦人產後惡血不盡腹內堅強諸勞少氣百病間發或時陰腫或即脫肛及下出疼痛方

鍾乳研鍊　紫石英研鍊　白石英研鍊　石硫黃研各貳兩半

黃芩　白薇　白朮各三分　礬石貳兩燒

乾地黃七分　芍藥　附子炮各壹兩去皮　烏頭十五枚炮去皮

吳茱萸貳兩半　蜀椒去目閉口者汗　人參　細辛

白石脂　赤石脂　山茱萸　天雄炮去皮

芎藭　麥門冬去心　前胡　半夏洗

龍骨　桂心各五分　遠志拾伍枚去心　茯苓

黃連　當歸　紫菀　禹餘粮

雲母粉　甘草炙各壹兩半

右參拾肆味擣篩為末鍊蜜和丸如梧子大酒服十丸日三不知增之可至二十丸以心熱為知力也

三石腎氣丸

鍾乳　白石英　赤石脂　禹餘粮

海蛤並研鍊各貳兩半　乾地黃　石斛　白朮各壹兩半

桔梗　五味子　寄生　山茱萸

杜仲炙　牛膝　澤瀉　天門冬去心

蛇床子　當歸各參兩　人參　署預

遠志去心　細辛　菟絲子酒浸　茯苓

蓯蓉　附子炮各壹兩去皮　乾薑　桂心各伍兩

甘草半兩炙　鹿茸貳兩炙

右參拾味擣篩為末鍊蜜和更擣二千杵丸如梧子酒服

十五丸稍加至三十丸日二忌如藥法

五石更生散 治男子五勞七傷虛羸著床醫不能治服此無不愈惟久病者服之其年少不識事不可妄服之明於治理能得藥適可服之年三十勿服或腎冷脫肛陰腫服之尤妙

方

紫石英　白石英　赤石脂　鍾乳

石硫黃　海蛤並研　防風　栝樓各貳兩半

白朮柒分　人參叁兩　桔梗　細辛

乾薑　桂心各伍分　附子炮去皮叁分

右壹拾伍味擣篩為散酒服方寸匕日二中間節量以意裁之萬無不起熱煩悶可冷水洗面及手足身體亦可渾身洗若熱欲去石硫黃赤石脂即名三石更生一方言是寒食散方出何侯壹兩分作三薄日移一丈再服二丈又服

五石護命散 治虛勞百病羸瘦欬逆短氣骨間有熱四肢煩疼或腸鳴腹中絞痛大小便不利尿色赤黃積時繞臍切痛急眼眩冒悶惡寒風痺食飲不消消渴嘔逆胷中氣下滿氣不得息周體浮腫痺重不得屈伸唇口青手足逆齒牙疼產婦中風及大腸寒年老目暗惡風頭著巾帽厚衣對火腰脊痛百病皆治不可悉記甚良能久服則氣力強壯延年益壽

方

紫石英取紫色頭如薦蒲者上　白石英取如箭鏃者上

鍾乳極白乳色者上　石硫黃取乾黃色鮮有光者　赤石脂

海蛤　栝樓各貳兩半　乾薑　白朮各壹兩半

人參　桔梗　細辛各伍分　防風

黑附子炮去皮　桂心各叁分

右壹拾伍味皆取真新好者各異擣篩已乃出散重二兩為一劑分三薄淨溫淳酒服一薄日移一丈再服一薄如此三薄盡須臾以寒水洗手足藥力行者痺便自脫衣冷

水極浴藥力盡行周體涼了心意開明所患即差羸困著床皆不終日愈矣人有強弱有耐藥若人羸弱者可先小食乃服藥若人強不須食也有至三劑藥不行者若病人有宿澼宜先服消石大黃丸下之乃可服散服藥之後宜牽勞若羸著床不能行者扶起行之常當寒食寒臥寒衣能極寒益善若寒藥未發者不可浴也浴則矜寒使藥噤不發令人戰掉當溫酒飲之起跳踊舂磨出力溫乃浴解則止勿過多也又當數令食無晝夜一日可六七食若失食飲亦令人寒從食則溫矣若老小上氣及産婦臥不能起頭不去巾帽厚衣對火者服藥之後便去衣巾將冷如法勿疑虛人易治與此藥相宜實人勿服也此藥雖良令人氣力兼倍然其難將適大要在善將息節度專心候按不可失意當絶人事惟久病著床醫所不治患厭病精意者乃可服耳小病不能自勞者必廢失節度慎勿服之若傷寒大下後乃可服之便極飲冷水若産婦中風身體強痛不得動搖者便溫酒服一劑因以冷水浴取差已浴之後身有小痺便以寒水浴使周遍初得小冷當小惡得水之後自當快之當數食飲酒於意復悄悄不可快者當復冷水浴以病甚者水略不去體也若病偏在一處偏煩偏熱偏冷偏痺及眩心腹滿者便以冷水逐洗於水下即可矣如此盡晝夜洗藥力盡乃止凡服此藥不令人吐也病痛皆自冷若膈上滿欲吐者便餔少冷食即安矣服藥之後大便當變於常或小青黑色此藥功耳勿怪之若大溫欲吐不可禁者當吐不可令人極也明旦當更服若洗浴晚者藥必失勢不行則冷不可強也凡洗浴太早則藥噤寒太晚則吐亂不可失適寒則出力乃溫洗吐則速冷洗

冷食若以飢為寒者食自溫常當將冷不可熱向火若誤更衣臥即為逆凡服此藥食皆須冷惟酒令熱自從或一月而解或二十日而解之當飲酒令體中薰薰不絕當以淳酒若飲薄酒及白酒令人變亂若病癥瘕者要當先下乃可服藥耳

三石散 主風勞毒冷補益諸病悉治之方

紫石英　鍾乳　白石英並研各參分　白朮參兩半

防風　桂心各壹兩半　牡蠣半兩熬　桔梗壹兩

細辛　茯苓　人參　附子去皮

栝樓　蜀椒汗去目　杜仲炙　乾薑各參兩

右壹拾陸味擣伍千杵酒服方寸匕日三行百步

更生散 治男子女人宿寒虛羸胸脅逆滿手足煩熱四肢不仁食飲損少身體疾病乍寒乍熱極者著床四五十年服眾藥不差此治萬病無不愈者悉主之方

鍾乳　白石英　海蛤各研　赤石脂

防風　栝樓各貳兩半　乾薑　白朮各壹兩半

桔梗　細辛各伍分　人參　附子炮去皮

桂心各參分

右壹拾參味皆須新好州土者擣篩為散囊盛四兩為八薄溫酒和服一薄須臾起行隨力所往還欲坐臥隨意著衣乃臥適體中所便食時乃冷不得熱食只得大冷忌食豬肉羹臛湯麪不得房室諸禁忌之物皆不得食服藥後二十日復飲熱食及房室可漸隨意惟服藥時不得耳若頭面中憒憒者散髮風中梳百餘遍一日三飲五合酒訖日下晡渴便飲酒噉脯飯常令體中薰薰有酒勢手足煩熱可冷水洗之加硫黃即邵靳散也

服諸石藥及寒食散已違失節度發病療之法合四十
五條第三 論三首

論曰服石丸散及酒亦有單服異石者旣見未即有效謂不得藥力至後發動之日都不自疑是石不肯作石法將息乃作異治多致其患略述將息節度法如後

一或頭痛欲裂者由熱食作癖故也急下之即差

二或惡食臭如死物氣由溫食作癖故也急下之下不差仍速冷食強行差

三或兩目欲脫者由犯熱在肝故也急下之自止

四或咽中痛鼻塞清涕出者由衣厚近火故也但脫衣當風取冷石熨咽頟即止不須洗之

五或腰痛欲折者由衣厚體溫故也宜水洗石熨

六或大便難腹中堅如盤蛇由犯溫積久有乾糞不去故也宜消酥蜜膏適寒溫調服一二升津潤腹中即下若不可更下乃止

七或頭眩瞢欲蹶者由衣厚犯熱故也宜針頭冷水洗即止

八或淋下不得小便者由坐久下溫乘騎下熱入膀胱故也但冷食飲冷水洗熨以冷石三兩度即止若不止可下之不下殺人

九或腳疼欲折者由久坐下溫故也宜卧單床行役冷水洗止

十或患寒頭掉不自支任者由食少藥氣行於肌膚五藏失守百脉搖動與正氣競故也乃強飲熱酒以和其脉強食冷飯以定其藏強行動以調其關節強洗以宣其擁滯酒行衝遍關機調柔則了了心明也

十一或腹脹欲死者由久坐下熱衣溫失食失洗不行故也

宜冷水洗當風取冷即差亦宜冷食
十二或失氣不可禁止者由犯熱不時洗故也但冷洗之即
差
十三或心痛如刺者由應食而不食應洗而不洗寒熱相擊
氣結不通聚在心中故也宜任性但飲熱酒令酒勢得行
氣息通達氣得已行以冷水淹布手巾著所苦處温復易
之須臾自解仍速冷食能多爲善諸痛之中心痛最惡急
宜速救之惟熱酒爲善起沈滯於血脉之中故當任力自
温更以冷水洗即差
十四或遺糞不自覺者由下温熱氣上入胃腹故也冷水洗
即止
十五或氣絶口噤不得開者由冷熱交競故也病者不自知
當須傍人救之要以熱酒灌之困中寒盛酒入必還出但
頻灌出復内乃至半日許得酒下差不下必死
十六或食便吐出不得安住者由癖故也急下之不下殺人
十七或小便稠數者由熱食及噉諸熱物餅果肉之屬故也
宜以冷水洗浴少服梔子湯差
十八或下部臭爛者由坐薦厚下熱故也坐冷水中即止
十九或耳鳴如風聲又有汁出者由自勞出力過度房室不
節氣上奔耳故也但數數冷食禁房室即差
二十或目痛如刺者由熱入胃肝奔眼故也但數數冷食清
旦以小便洗之三日即止
二十一或口中傷爛舌強而燥不得食味者由食少穀氣不
足藥氣積在胃管中故也以梔子湯三劑即止
二十二或脚指間生瘡者由著履襪太温故也當履冷地冷
水洗之即止

二十三或手足偏痛諸骨節解身體發癰及瘡結核者由寢處久不自移從暴熱偏併聚在一處故也若堅結極痛甚者癰發如覺便以冷水洗之冷石熨之飲熱酒散極熱數日以冷水洗不絶乃差洗之無限要差爲期若乃不差取磨刀石如手許大燒令赤以投苦酒中石自裂細擣以冷水和塗之日二三止

三十四或嗜卧不能自覺者由久坐熱悶故也急起冷水洗冷食自差

二十五或夜不得眠者由食少熱在內故也服梔子湯冷食止

二十六或飲酒不解食不得下乍寒乍熱不洗便熱洗之復又寒甚者數十日輕者數日晝夜不得寢息愁悲恚怒驚悚恐懼恍惚忘誤者由犯温積久寢處失節食熱作癖內

實使熱與藥併行寒熱交競故也雖以法救之終不解也昔皇甫氏曾如此對食垂涕援刀欲自刳未及得施賴叔親見迫事不得行退而自思乃努力強食飲冷水洗即止禍不成矣當困時舉家親知莫能救解賴三兄士元披方得三黃湯令服大便下即差自此常以救急也

二十七或脫衣便寒著衣便熱者由脫著之間無適故也當小寒便著小熱便脫又洗之則醒勿忍不依此者便發病也

二十八或兩腋下爛由兩臂相近故也以物隔之冷水洗之冷石熨之止

二十九或嘔逆咽中傷損清血出者由卧温食熱故也飲冷水冷石熨咽即止

三十或鼻中有氣如斷雞子臭者由熱衣温食故也但脫衣

冷食冷水洗即止

三十一或齒斷腫脣爛牙疼頰噤者由犯熱不時解故也但當對風張口使冷水入咽顙冷水漱口三度叩齒三十六通止

三十二或遍體患腫痛不能自轉徙者由久停久息久不飲酒藥氣沈在皮膚之内血脉不通故也但飲熱酒冷水洗自勞行差若極不能自行使人扶強行令肢節調柔乃止雖行又不得令過過則失度熱復洗之要者酒為佳

三十三或目暗無所見者由飲食熱居處太温故也但冷食冷水洗脫衣目自明也

三十四或下痢如寒中者由食飲犯熱所致故也人多疑是卒疾又滯癖作者皆由犯熱所為慎勿疑也速脫衣冷食飲熱酒即差

三十五或百節酸疼者由厚衣被温故也但卧單床薄被著單故衣差雖冬寒常須散髮受風冷石熨若犯此悶者但緩衣帶冷浴勿忍病而畏浴也

三十六或兢戰惡寒或發熱如温瘧者由失食忍飢失洗不行又由食臭穢故也急冷食冷水洗之數行止

三十七或關節強直不可屈伸者由厚衣坐久停息不煩勞藥氣不散漸侵筋血故也當任力自温便以冷水洗飲熱酒差令行動出力使勞發熱非厚衣近火又仍不遍則失度熱復洗之

三十八或患食冷不可下者由久食冷口中不知味故也當作白糜酒和酥熱食一兩度若熱悶者還冷食飲止

三十九或傷寒温瘧者由犯熱故也亦可以常藥治之無咎但勿服熱藥傷寒瘧藥皆除熱破癖不與寒食相妨可通

服也
四十或藥發輙尸卧不識人者由熱氣盛食少不充邪忤正性故也但飲熱酒冷食冷水洗自勤勞以水淹布巾蓋頭温易之仍自勞差
四十一或肌肉堅如木石不可屈伸者由食熱卧温作癖久而不下五藏隔閉血脉不通故也但下須冷食冷飲冷水洗自勞行差
四十二或四肢面目皆浮腫者由食温久不自勞藥與正氣相隔故也但飲熱酒冷飯自勞行洗浴止
四十三或身肉痛楚移轉不在一處如似遊風者由犯熱故也非是風宜冷水洗冷石熨即止
四十四或寒熱累日張口吐舌眼視高睛不與人相當日用水百餘石洗澆不解者由不能自勞行飲冷酒食熱故也

譬如暍人心下更寒以冷水救之愈劇者氣結成冰得熱熨飲則冰消氣通暍人乃解藥氣聚心乃更寒戰宜急飲熱酒令四肢通暢然後以冷食冷水洗之即止
四十五或臂脚偏急痛由久坐卧温處不移徙熱入腹附骨故也當以冷水淹布巾以搏之温即易之不過三日止
右凡服石之人有病要先以解石法消息之若不效者始可用餘方救之前所列凡四十五條元是服石丸散違失節度發病由狀亦有消息得差者今之世人多有單服鍾乳礜石桃花石紫石亦有兼和草藥服之此等雖非五石亦是五石之例至於將息慎忌禁發動病由消息損益亦同例人既見單石而不稱意乃便輕之惟以大散及至發動乃致困危其服單石者理宜將息若違犯禁忌但看病狀與上徵同者依前法消息必定痊

除

論曰服石發動將息事雖衆多指的而言者要當違人理反常性可依易者將息所謂六反七急八不可三無疑

言六反者

重衣更寒一反　飢則生臭二反　極則自勞三反

溫則滯痢四反　飲食欲寒五反　腫瘡水洗六反

言七急者

當洗勿失時一急　當食勿飢二急　酒必清淳熱三急

衣溫便脫四急　食必須冷五急　食不患多六急

臥必底薄七急

言八不可者

冬寒欲火一不可　飲食欲熱二不可

當疹自疑三不可　畏避風濕四不可

極不欲行五不可　飲食畏多六不可

居貪厚席七不可　所欲從意八不可

言三無疑者

務違常理一無疑　委心棄本二無疑

寢處必寒三無疑

右凡服石之人若能依此六反七急八不可三無疑者雖不得終蠲此疾復常無病可以清旦暮之暴也

解石及寒食散并下石第四　論一首　方六十九首

論曰凡是五石散先名寒食散者言此散宜寒食冷水洗取寒惟酒欲清熱飲之不爾即百病生焉服寒食散但冷將息即是解藥熱實大盛熱服三黃湯也

治石發動上氣熱實不解心腹滿小便赤大便赤大便不利痞逆衝胷口中焦燥目赤方

大黃壹兩 黃連 黃芩 芒消 甘草炙各貳兩

右伍味㕮咀以水伍升煑取二升半再服凡用大黃芒消臨湯熟內之

治石發熱舊小三黃湯殺石熱勝前方除實不及前方

大黃貳兩一方壹兩 黃芩貳兩一方壹兩 梔子拾肆枚擘 豉叁升綿裹

右肆味㕮咀以水六升先煎藥數沸後內豉煑取二升分二服取差止

治熱殺石氣下去實兼發汗解肌中風熱氣湯方

大黃叁兩 黃芩貳兩 梔子拾肆枚擘 豉壹升綿裹

麻黃去節 甘草炙各貳兩

右陸味㕮咀以水九升煑麻黃去上沫內諸藥煑取四升內豉三沸分三服得下止

治虛石發內有客熱胷中痞外有風濕不解肌中急攣黃芩湯方

黃芩貳兩 梔子拾肆枚擘 葱白壹握 豉壹升綿裹

右肆味㕮咀以水柒升煑豉三沸去滓內諸藥煑取三升分二服不止更爲之

治虛勞下焦有熱骨節疼痛肌急內痞小便不利大便數而少吸吸口燥少氣折石熱湯方

大麻子伍合去皮 豉貳升綿裹

右貳味研麻子碎以水四升合煑取一升五合分三服服三劑即止

（大黃湯）治石發煩熱脹滿身生瘡年月深久治不差者石虛熱生瘡方

大黃叁兩 麥門冬壹兩去心 梔子拾肆枚擘 黃芩

芒消 甘草炙各貳兩

右陸味㕮咀以水七升煑取二升五合分為五服得下止

治石發熱熱結生腫堅起始作腫宜下之升麻湯方

升麻　枳實炙　芍藥　大黃各貳兩

當歸　黃芩各壹兩

右陸味㕮咀以水捌升煑取二升分三服得下腫消止熱甚倍加黃芩一方有甘草一兩

治石發熱盛變作癰腫初欲成急治之方

石燕子柒枚

右壹味以水三大升煑之取二升數用淋洗之以差為度

治石發頭痛胷脹滿或寒或熱手足冷或口噤或口爛生瘡乾燥惡聞食氣前胡湯方

前胡　芍藥　黃芩　大黃

甘草炙各貳兩　大棗貳拾枚擘

右陸味㕮咀以水八升煑取二升五合分三服若心脅堅滿加茯苓三兩胷滿塞加枳實一大兩炙速吐胷中冷不飲食加生薑三兩胃虛口燥加麥門冬三兩去心凡欲加藥者則加水一升

治石發身如火燒靳邵黃芩湯方

黃芩　枳實炙各貳兩　梔子拾肆枚擘　栝樓

厚朴炙　芍藥　甘草炙各壹兩

右柒味㕮咀以水七升煑取二升五合分三服

治石毒或十年二十年三十年而發者或慓慓如寒或飲食或不欲食若服紫石英發毒者熱悶惛惛喜臥起止無氣力或寒皆腑氣所生藏氣不和礜石發熱者燥而戰石硫黃發熱者鬱鬱如熱極者身並破裂華佗薺苨湯方

薺苨肆兩　茯苓壹兩　蔓菁子壹升　芍藥

人參　藍子　黃芩　甘草炙各壹兩

右捌味㕮咀以水壹升煑蔓菁子取八升去滓內諸藥煑取二升五合分三服若虛弱者倍人參減黃芩若氣上倍茯苓加薺苨一兩外臺秘要黃芩芍藥各貳兩無人參

治桃花石發即心噤身壯熱頭痛覺者溫清酒飲之隨多少酒熱行即差亦可服大麥麨不解服此麥奴湯方大麥麨見第十七卷中

大麥奴葉是陰乾　麥門冬去心各肆兩　桂心叁兩

葱白捌莖切使淨　人參壹兩　甘草炙貳兩

右陸味㕮咀以水八升煑取三升去滓八分溫三服若無麥奴以麥三升淨淘洗先煑使熟去滓添水滿八升然後內諸藥煑取三升分三服

治一切雜石發動方

麥門冬去心　人參各叁兩　甘草炙壹兩

右叁味擣篩爲末鍊蜜和丸如彈丸一服三丸忌如前法

治心胷肝熱方

人參　黃芩各貳兩　梔子拾枚擘　麥門冬去心

桂心　甘草炙各壹兩

右陸味切以水六升煑取二升分三服

治熱折石皇甫梔子湯方

梔子拾肆枚擘　黃芩貳兩半　豉壹升綿裹

右叁味㕮咀以水六升煑取三升去滓內豉煑取二升分二服

治石發煩熱脹滿身體生瘡年月久遠者兼治諸藥乳石發動方

麻黃去節　甘草炙各壹兩

右貳味㕮咀以水二升煑取半升內清酒五合煎取軟一

升其患者先須火邊炙令熱徹欲汗因即熱服之令盡溫覆卧須臾大汗出即差

治一切石熱發方

但飲淳美熱清酒冷食自勞冷洗差

治乳石痢及常服壓石方

取好豉炒令黄香待冷擣篩心未熟更炒待冷還擣若心熟皮即焦苦所以須再炒日别空腹再服二大匙以冷水服之佳

治石痢方

淡煑真好茶汁服二三升重者三服輕者一二服即差

解散石發動諸藥不治單服酒豉方

清美酒壹升　好豉伍合綿裹

右貳味和煑三五沸熱飲壹升使盡大良

治一切石發單方

擣生冬瓜汁三升分爲三服

治雜石發單方

煑葱白汁服亦解

單煑枸杞白皮汁服亦解

單煑胡荽汁服亦解冬煑根飲之

單煑蕪菁汁飲亦解

解散熱渴最良方

葱白不過一斤　胡荽一兩　蕪菁　枸杞

不越半斤皆單煑取汁飲之

又單煑犬肉汁服解大散良

猪膏湯　解大散方

猪膏壹兩烊之　豉壹升綿裹

右貳味以水三升煑豉取汁一升内猪膏服七合日三服

一石人飲宜清冷不宜熱熱即氣擁痞石惟酒一種須熱也

若爲食倉米臭肉動乳者必須葱豉湯細細服之可立五六度即差

若食飲損者於葱豉湯中内當歸一兩煑之去滓分温三服便差仍未除者可作後蘆根湯服之方

蘆根　地榆　五加皮各壹兩

右叁味㕮咀以水三升煑取一升去滓一服即差此湯力快小可者不須服之

若得四時節氣冷熱不調動乳者皆是寒熱所致其狀似瘧久久不療令人隕命縱服諸藥必終不差必須作生熟湯以浴之方

以大器盛湯若大熱投少冷水即入湯中坐勿動須臾百節開寒熱之氣皆從毛孔中出變作流汗若心中熱悶者還服少許熱湯即定良久乃出湯便厚衣覆蓋臥豁然覺醒平復如患大重者不過三二度即差

人參湯　解散數發動煩悶嘔逆

人參　白术　栝樓　甘草炙各貳兩　黄芩壹兩

右五味㕮咀以水七升煑取二升去滓分爲三服温温服

治服石及散發背癰疽方

取烏豆二升水六升煑令稀稠如薄餳量減取三大合匙抄細細内患人口中審聽腹中作聲如欲利即停須臾必利利後即差忌熱食陳臭等

治石氣發身體微腫面上瘡出方

紫雪湯成下　黄芩各貳兩　萎蕤

梔子拾枚擘　犀角屑　甘草炙各壹兩　升麻各壹兩半

右柒味㕮咀以水五升煑取一升八合絞去滓内紫雪八分温三服每服如人行六七里又服利三行爲度仍用後方塗瘡忌熱麪猪肉海藻等

治石熱面上生瘡方

取寒水石以冷水於白瓷瓯中研令汁濃將塗瘡乾即點之勿令停

治諸石發動口乾寒熱似鬼神病方

麥門冬伍兩去心　大黄　苦參各等分　萎蕤

梔子擘　五加皮　黄芩　生犀屑

芍藥　升麻各壹兩　大青　甘草炙各叁分

右壹拾貳味擣篩爲末錬蜜和丸如梧子每食訖少時以蜜水服十四丸漸稍加至二十丸以意加減忌諸熱食及海藻猪魚炙肉蒜麪等

治石等毒發熱困苦方

猪脂成鍊　葱白切各伍合　芒消壹兩　豉壹兩半

右肆味以水二升煑葱豉取一升五合絞去滓下猪脂芒消分温三服每服如人行三四里進一服快利爲度忌熱麪及炙肉蒜粘食陳臭等物

麻黄湯　治石發困不可解者方

麻黄貳兩去節　梔子拾肆枚擘　香豉壹升　甘草壹兩炙

右肆味㕮咀以酒伍升漬一宿加水二升煑取三升一合分二服忌如藥法

又方

大黄別浸　黄芩　甘草各貳兩炙

右叁味㕮咀以水五升煑取二升八分温三服

治金石發熱及諸熱朴消丸方

朴消成鍊者壹斤

右一味研令成粉以白蜜和調作丸如梧子每食訖以蜜水服三十丸服金石經年以來覺身中少熱即以丸壓之每至夜欲卧時服三十丸或至四十丸取胷膈凉冷爲度此用之極有效若有時患及發者即取一大匙粉和水服之空腹服之得一兩行利即差如不利加服之以利爲度

凡朴消取不著風者黄者殺人赤者傷人白者爲佳

又方是藥冷熱俱治押石主大秘澀

凡朴消煑葵子汁和服一大兩半有芒鋭者亦療暴赤眼用水服孩子量之

治女子先因月經不通研生石服即今見患背膂熱衝頭面腰膝冷極宜服此方

茯苓　萎蕤　大黄別浸　生薑各貳兩切　大棗柒枚擘

石膏六兩碎綿裹　芍藥　黄芩　人參

芒消　甘草炙各貳兩

右壹拾壹味切以水一斗煑取二升八合去滓分三服每服相去如人行十里又進之快利五行以來病即差忌生冷熱麪猪魚蒜等

治石發動心背熱毒萎蕤湯方

萎蕤　黄芩　乾薑　生薑各貳兩切

豉壹六合綿裹　芍藥　升麻　黄連

柴胡各貳兩　梔子柒枚擘　石膏捌兩碎　芒消肆兩

右一十二味㕮咀以水一斗五升先煑石膏減一升次下諸藥煑取二升八合去滓下芒消攪令散分温三服每服相去如人行十里進之利五六行當自止忌如前

治石發熱悶苦宜下石方

露蜂房炙壹升

右壹味切以水三升煑取一升二服五六合日二服石從
小便下如細沙盡停無所忌

又下石方

萎蕤　升麻　薺苨　人參各柒兩
大黃叁兩　黃芩　葛根　紫草各肆兩
犀角拾壹兩屑　梔子貳七枚擘　芒消貳兩　銀屑肆兩研
豬脂拾叁兩臘月者　露蜂房拾兩　玄參　甘草各肆兩炙

右壹拾陸味切以無灰酒八斗漬經十日其豬脂用酒一
升煎鍊取三兩脂與銀屑和研內藥中每日空腹服之量
力多少忌熱麪炙肉海藻菘等

治發背竹葉黃耆湯方

淡竹葉　黃芩　前胡　生薑各四兩切　芍藥叁兩
小麥叁升　黃耆　茯苓　枳實炙　麥門冬去心
梔子各叁兩擘　大棗拾肆枚擘　芎藭　知母　乾地黃
人參　石膏碎　升麻　甘草各二兩炙

右壹拾玖味㕮咀以水一斗六升先煑竹葉小麥取一斗
二升去竹葉麥內諸藥煑取四升一服一升日三夜一

治男子癰始欲發背不甚往來寒熱竹葉黃耆湯方

淡竹葉　小麥各叁升　黃耆　升麻　乾地黃
芍藥　當歸　通草　知母各叁兩　大棗拾捌枚擘
黃芩壹兩半　生薑伍兩切　茯苓　芎藭　前胡
枳實炙　麥門冬去心　甘草各貳兩炙

右壹拾捌味㕮咀以水壹㪷柒升先煑竹葉小麥取壹㪷
貳升去滓內諸藥煑取肆升分溫伍服日三夜二忌如藥法

治癰發背諸客熱腫始作竹葉湯方

淡竹葉 小麥各叁升 生薑肆兩切 大棗拾肆枚擘 茯苓
麥門冬去心 枳實炙 芍藥 人參各貳兩 黃耆
前胡 乾地黃 升麻 射干 黃芩
芎藭 甘草炙各三兩
右壹拾柒味㕮咀以水一斗七升先煑竹葉小麥取一斗
二升去滓內諸藥煑取四升分五服若熱盛秘澀不通者
加大黃二兩已下勿加也
治患大熱體盛發癰或在於背或在陰處生地黃湯方
生地黃八兩 竹葉叁升 小麥貳升 栝樓肆兩 大黃伍兩
人參 當歸各壹兩 黃耆 黃芩 通草
升麻 芍藥 前胡 茯苓 甘草炙各貳兩
右壹拾伍味㕮咀以水二升煑竹葉小麥取一斗二升去
滓內諸藥煑取四升分四服日三夜一不愈常服

治發背黃耆湯方
黃耆 黃芩 麥門冬去心 遠志去心各貳兩
大棗貳拾枚擘 人參 芎藭 乾地黃 芍藥
當歸各壹兩 生薑伍兩切 桑螵蛸拾肆枚炙 雞肶胵貳具
右壹拾叁味㕮咀以水一斗先煑雞肶胵令熟可食去之
內諸藥更煑取四升五合分服九合日三夜一
治發背黃耆湯方
黃耆 麥門冬去心 芍藥 黃芩 人參
甘草炙各叁兩 石膏碎 當歸各貳兩 半夏洗肆兩 生薑切伍兩
生地黃半斤 大棗叁拾枚擘 淡竹葉切貳升
右壹拾叁味㕮咀以水一斗先煑竹葉取九升去竹葉內
諸藥更煑取三升分四服如人行二十里又服良久進粥
消又進消息

甘草炙各壹兩

右壹拾叁味㕮咀以水一斗五升先煑竹葉令減五升去竹葉内諸藥煑取三升五合分四服日三夜一

治癰腫發背竹葉湯方

竹葉切伍升 小麥 生薑切伍兩 桂心壹兩

大棗貳拾枚擘 芍藥 乾地黃各叁兩 茯苓

升麻 當歸 甘草炙各貳兩

右壹拾壹味㕮咀以水一斗七升煑小麥竹葉取一斗一升去竹葉内諸藥煑取三升五合分四服如人行七八里再服

治男子發背肋結塊氣或經一月苦寒熱枳實湯方

枳實炙 芍藥 乾地黃 前胡

黃芩 通草各叁兩 知母 芎藭

細辛 茯苓 黃耆 人參 甘草炙各貳兩

右壹拾叁味㕮咀以水一斗一升煑取三升五合去滓分四服

治發背虛熱大盛腫熱侵進不住内補湯方

乾地黃肆兩 升麻 當歸 人參各壹兩

生薑切伍兩 麥門冬去心 芍藥各叁兩 大棗貳拾枚擘

遠志去心 茯苓 大黃 黃芩

黃耆各貳兩

右壹拾叁味㕮咀以水一斗三升煑取五升去滓分爲五服

生地黃湯治發背方

生地黃捌兩 黃耆 黃芩 茯苓各叁兩

大棗貳拾枚擘 芎藭壹兩 淡竹葉貳升 芍藥

人參 當歸 通草 甘草炙各貳兩

右壹拾貳味㕮咀以水三斗先煮竹葉取一斗五升去滓
内諸藥煮取四升去滓分五服
治發背癰已服生地黄湯取利後服此方
黄耆　芍藥　乾地黄　栝樓各三兩
小麥壹升　黄芩　柴胡　麥門冬去心
遠志去心　升麻各貳兩　當歸壹兩　淡竹葉切肆升
大棗拾肆枚擘
右壹拾叁味㕮咀以水一斗八升先煮竹葉小麥取一斗
去滓内諸藥煮取三升去滓分三服日三
治癰節近肺俞此多虚故不宜用大黄若欲得下但其間數
服此方
黄芩　前胡　栝樓　芍藥
麥門冬去心　知母各叁兩　乾地黄肆兩　淡竹葉切二升

小麥貳升　黄耆　升麻　甘草炙各貳兩
右壹拾貳味㕮咀以水一斗八升先煮竹葉小麥取一斗
去滓内諸藥煮取四升去滓分爲四服日三夜一
治背脊癰節擧身壯熱已行薄貼此方數用有驗連翹湯方
連翹　漏蘆　射干　白歛
升麻　梔子擘　芍藥　羚羊角屑
黄芩各叁兩　生地黄捌兩　寒水石伍兩碎　甘草貳兩炙
右壹拾貳味㕮咀以水一斗煮取四升去滓分四服
治大虚客熱發背上苦牽痛微有腫腫氣來去黄耆湯方
黄耆　乾薑　當歸　桂心各貳兩
大棗貳拾枚擘　麥門冬去心　芍藥各叁兩　半夏洗肆兩
生薑切伍兩　人參　芎藭　甘草炙各壹兩
右壹拾貳味㕮咀以水一斗二升煮取四升去滓分五服

日三夜二

治癰發背及在諸處竹葉黃耆湯方

竹葉切肆升　黃耆　芍藥各叁两　當歸壹两

大黃壹两半　升麻　黃芩　前胡

知母　麥門冬去心　甘草炙各貳两

右壹拾壹味㕮咀以水壹斗七升煮竹葉取九升去滓下諸藥煮取二升八合分三服利两三行佳也

治癰發背內補芍藥湯方

芍藥　乾地黃　桂心各貳两　當歸叁两　生薑肆两切

黃耆伍两　茯苓叁两　人參　麥門冬去心　甘草炙各壹两

右壹拾味㕮咀以水一斗煮取三升分三服

治發背腫即驗前胡建中湯方

前胡叁两　生薑切　茯苓　黃芩各伍两

桂心壹两　人參壹两半　當歸　芍藥

半夏湯洗三十遍　甘草炙各貳两

右壹拾壹味㕮咀以水壹斗煮取四升分四服

治癰發背漏蘆湯方

漏蘆　白斂　黃芩　芍藥　枳實炙

白薇　甘草炙各貳两　大黃別浸　麻黃去節　升麻各叁两

右壹拾味㕮咀以水一斗先煮麻黃去上沫然後下諸藥煮取三升分三服

治男子背上發腫時覺牽痛內補黃耆湯方

黃耆　當歸各貳两　乾地黃　麥門冬各三两

生薑伍两切　大棗拾肆枚擘　芍藥　芎藭

人參　甘草炙各壹两

右壹拾味㕮咀以水一斗煮取三升五合分服七合日三

治發背黃耆湯方
黃耆　乾地黃　茯苓各肆兩　大棗拾伍枚擘
芍藥叁兩　生薑貳兩切　當歸貳兩半　人參
甘草炙各壹兩半
右玖味㕮咀以水壹㪷貳升煑取肆升八分肆服日三夜一
加黃芩貳兩佳
治腫瘡發背芍藥甘草湯方
芍藥　乾地黃　黃耆各叁兩　甘草炙壹兩半
人參壹兩　茯苓　麥門冬去心　生薑各貳兩切
右捌味㕮咀以水八升煑取二升五合分三服
治毒腫發背黃耆湯方
黃耆　白斂　玄參　黃芩
大黃　甘草炙各貳兩　竹葉切壹升

右柒味㕮咀以水九升煑取三升分三服一日令盡忌豬肉
治癰腫始覺即令消其腫五色並爲發背痛欲死腫上加灸不差腹內虛悶麥門冬湯方
麥門冬去心貳兩　升麻　葛根各叁兩　丁香壹兩半
零陵香　藿香各壹兩
右陸味㕮咀以水柒升煑取二升五合分三服
治發背初欲作腫及癰便服此方
大黃別浸　黃芩　甘草炙各叁兩　升麻貳兩
梔子壹百枚取仁
右伍味㕮咀以水九升煑取三升五合去滓分三服得快下數行利便止不下更作
治發背腫如杏核雞子青木香湯方
青木香　麻黃去節各貳兩　升麻叁兩

右叁味㕮咀以水六升煑取二升去滓分叁服一日令盡暖卧取微汗避風以粉粉身

治癰發背升麻湯方

升麻叁两

右壹味㕮咀以水三升煑取一升分三服昔何道静毋在建安夜得發背至曉半臂黑上熱如火噓吸煩悶時無三兩升麻惟一兩以水三升煑得一升如上法一服覺如小寛再服熱差乃得眠至暮服盡轉佳明日視背色還復遂愈也

千金翼方卷第二十三

瘡癰上

黄父相癰疽論第一

九江黄父相癰疽論黄帝問於歧伯曰余聞腸胃受穀上焦出氣以溫分肉而養骨節通腠理中焦出氣如霧上注谿谷而滲孫脉津液和調變化赤而為血血和則孫脉先滿乃注於絡脉絡脉皆盈乃注於經脉陰陽已張因息乃行行有綱紀周有道理與天合同不得休止切而調之從虛去實寫則不足疾則氣減留之先後從實去虛補則有餘血氣已調形神乃持余已知血氣之平與不平未知癰疽之所從生成敗之時死生之期或有遠近何以度之可得聞乎歧伯曰經脉流行不止與天同度與地合紀故天宿失度日月薄蝕地經失紀水道流溢草蘆不成五穀不植徑路不通民不往來巷

聚邑居別離異處血氣猶然請言其故夫血脉榮衛周流不休上應星宿下應經数寒氣客於經絡之中則血泣血泣則不通不通則衛氣歸之不得復反故癰腫也寒氣化爲熱熱勝則肉腐肉腐則爲膿膿不瀉則爛筋筋爛則傷骨骨傷則髓消不當骨空不得泄瀉則筋骨枯虛枯虛則筋骨肌肉不相營（一作親）經脉敗漏熏於五藏藏傷故死矣

診癰疽發起處第二　方一首

黄帝曰願盡聞癰疽之形與忌日名歧伯曰略說癰疽極者有十八種

癰發於嗌中名曰猛疽不急治則化爲膿膿不瀉塞咽半日而死其化爲膿者膿瀉已則含豕膏無食三日已（一云無冷食）

發於頸名曰夭疽其疽大而赤黑不急治則熱氣下入淵腋前傷任脉内熏肝肺則十餘日而死

陽氣大發消腦流項名曰腦爍其色不樂（一作除）項痛如刺以鍼心煩者死不可治

發於肩及臑名曰疵疽其狀赤黑不急治此令人汗出至足不害五藏發四五日逆焫之（逆一作逞）

發於腋下赤堅者名曰朱疽治之用砭石欲細而長疏啓之塗以豕膏六日已勿裹之（衮一作裹）其疽堅而不潰者爲馬刀挾嬰急治之

發於胷名曰井疽其狀如大豆三四日起不早治下入腹中不治七日死

發於膺名曰甘疽其狀如穀實瓜樓常苦寒熱急治之去其寒熱不治十歲死死後膿自出

發於脅名曰改訾改訾者女子之病也久之其狀大癰膿其中乃有生肉大如赤小豆治之方

剉陵翹草及根各一斗以水壹斗陸升煑取貳升即彊飲厚衣坐釜上令汗出足已

發於股脛名曰股脫疽其狀不甚變色癰膿內搏於骨不急治三十日死

發於股陰名曰赤弛不急治六十日死在兩股內者不治六日死

發於尻名曰銳疽其狀赤堅大急治之不治三十日死

發於膝名曰疵疽其狀大癰色不變寒熱而堅勿石之石之即死須其色異柔乃石之生也

諸癰發於節而相應者不可治也

發於陽者百日死

發於陰者三十日死一云四十日死

發於脛名曰兔齧其狀如赤豆至骨不急治殺人

發於踝名曰走緩其狀色不變數石其輸而止其寒熱不死

發於足上下名曰四淫其狀大癰不急治百日死

發於足傍名曰厲疽其狀不大初從小指發急治之去其黑者不消輒益不治百日死

發於足指名曰脫疽其狀赤黑則死不赤黑不死治之不衰急斬去之活也不斬去者死

黃帝曰夫子言癰疽何以別之歧伯曰榮氣稽留於經脉之中則血泣而不行不行則衞氣歸之歸之而不通壅遏不得行故曰熱大熱不止熱勝則肉腐肉腐則爲膿然不能陷肌膚於骨髓骨髓不爲焦枯五藏不爲傷故命曰癰何謂疽答曰熱氣純盛下陷肌膚筋髓骨肉內連五藏血氣竭盡當其癰下筋骨良肉皆無餘故命曰疽疽者其上皮夭瘀以堅如牛領之皮癰者其上皮薄以澤此其候也帝曰善

帝曰有疽死者柰何歧伯曰身有五部伏菟一腓二腨一云背

二五藏之輸四項五五部有疽死也

帝曰身形應九宮柰何岐伯曰請言身形應九野

左足應立春其日戊寅己丑

左脅應春分其日己卯

左手應立夏其日戊辰己巳

膺喉頭首應夏至其日丙午

右手應立秋其日戊申己未

右脅應秋分其日辛酉

右足應立冬其日戊戌己亥

膂尻下竅應冬至其日壬子

六府及膈下二藏應中州大禁太一所在之日及諸戊己也

凡候此九者善候八正所在之處所主左右上下身體有癰腫者欲治之無以其所直之日潰治之是謂天忌日也

凡五子日夜半　五丑日雞鳴　五寅日平旦

五卯日日出　五辰日食時　五巳日禺中

五午日日中　五未日日昳　五申日晡時

五酉日日入　五戌日黃昏　五亥日人定

右以此日時遇疾發癰者不起也

候癰疽色法第三

論曰夫癰疽初發如微人多不以為急此實奇患惟宜速治之治之不速病成難救以此致禍能不痛哉且述所懷以悟後賢謹按黃父癰疽論論癰所著緩急之處死生之期如左

發皮肉淺腫高而赤貼即消不治亦愈

發筋肉深腫下而堅其色或青黃或白黑或復微熱而赤宜急治之成消中半發附骨者或未覺肉色已殃已殃者癰疽之甚凶也

發背外皮薄為癰皮厚為疽如此者多見先兆宜急治之皮
堅甚大者多致禍也
夫癰壞後有惡肉者當以猪蹄湯洗去穢次傅食肉膏散惡
肉盡乃傅生肉膏散及摩四邊令善肉速生當絕房室慎風
冷勿自勞動須筋脉平復乃可任意耳不爾新肉易傷傷則
重潰發則禍至慎之慎之

　診知是癰疽法第四

癰疽之發未辨是非飢渴為始始發之時或發白疽或似小
節或復大痛或復小痛或發米粒大白膿子皆是微候宜善
察之欲知是非重按其處是即便隱痛復按四邊比方得失
審實之是即灸第一便灸其上二三百壯又灸四邊一二百
壯小者灸四邊中者灸六處大者灸八處壯數不慮多也亦
應即薄貼令得即消内須服解毒冷藥令毒氣出外外須薄
貼熱藥法當頭開其口令洩熱氣故也

　診癰疽有膿法第五

凡癰按之大堅者未有膿半堅半軟者半有膿當上薄者都
有膿有膿便可破之不爾侵食筋骨也
破之法應在下逆上破之令膿易出用鈹鍼膿深難見肉厚
而生者用火鍼若不別有膿者可當其上數按之内便隱痛
殃堅者未有膿洩去熱氣不爾長速則不良

　候人年得疽法第六

岐伯曰赤疽發於額不寫十餘日死可刺也其膿赤多血死
未有膿可治人年二十五　三十一　六十　九十五人神
在額不可見血見者死
杼疽發項若兩耳下不寫十六日死其六日可刺其色黑見
膿而癰者死不可治人年十九　二十三　三十五　四十

九　五十一　五十五　六十一　八十七　九十九神在
兩耳下不可見血見者死
蜂疽發背起心俞若肩髃二十日不寫死其八日可刺也其
色赤黑膿見者死不治人年六歲　十八　二十四　三十五
五十六　六十七　七十二　九十八神在肩不可見血見
者死
刺疽發肺俞若肝俞不寫二十日死其八日可刺發而赤其
上肉如椒子者死不可治人年十九　二十五　三十三
四十九　五十七　六十八　七十三　八十一　九十七
神在背不可見血見者死
俠榮疽發脅起若兩肘頭二十五日不寫死其九日可刺發
赤白間其膿多白而無赤可治人年十六　二十六　三十二
四十八　五十八　六十四　八十　九十六神在脅不可見血見者死

勇疽發股起太陰若伏菟二十五日不寫死其十日可刺發
青膿赤黑者死白者尚可治人年十一　十五　二十　三十一
四十三　四十六　五十九　六十三　七十五　九十一神在尻
尾不可見血見者死
標叔疽發熱同同耳聾後六十日腫如水狀如此可刺之但
出水後乃有血血出即除也人年五十七　六十五　七十三
八十　九十七神在背不可見血見者死
旁疽發足趺若足下三十日不寫死其十二日可刺發赤白
膿而不大多其上癢赤黑死不可治人年十三　二十九　三十五
六十一　七十三　九十三神在足不可見血見者死

相五色疽死生法第七

禽疽發如軫者數十處一云四日腫食飲欬痛其狀若攣十
日可刺其內發方根寒齒如噤俞若坐如是十五日死俞若生死未詳

釘疽發兩肩此起有所逐惡血結流內外榮衛不通發爲釘疽三日身腫痛甚七日噤如痓狀十日可刺不治二十日死

陰疽發髀若陰股始發腰彊內不能自止數飲不能多五日堅痛如此不治三歲死

脉疽發環項頸一云始痛身隨而熱不欲動悄悄或不能食此有所大畏恐怖而不精上氣欬其發引耳不可以腫二十日可刺不刺八十日死

龍疽發背起胃俞若腎俞二十日不寫死其九日可刺其上赤下黑若青黑者死發血膿者不死

首疽發背發熱八十日大熱汗頸引身盡如欬身熱同同如沸者皮澤頗腫處淺刺之不刺入腹中二十日死

行疽發如腫或復相往來可要其所在刺之即愈

衝疽發小腹痛而振寒熱冒五日悄悄六日而變十日死

敦疽發兩指頭若五指頭十八日不寫死其四日可刺其發而黑癰不甚赤過節可治

疥疽發腋下若臂兩掌中振寒熱而咽乾者飲多則嘔煩心悄悄或卒胗反有合者此則可汗不汗當死

筋疽發背俠脊兩邊大筋其色蒼八日可刺其癰在肌腹中九十日死

陳乾疽發兩臂三四日痛不可動五十日方身熱而赤六十日可刺如刺脉無血三四日死一云病已

蚤疽發手足五指頭起即色不變十日之內可刺過時不刺後爲食癰在腋三歲死

倉疽發身癢後痛此故傷寒氣入藏篤發爲倉疽九日可刺九十日死

赤疽發身腫堅核而身熱不可以坐不可以行不可以屈伸

成膿刺之即愈
赤疽白一甋發膊若肘後癢目痛傷精及身熱多汗五六日死
赤疽發胷可治
赤疽發髀樞六月可治不治出歲死
赤疽發陰股堅死濡可治
赤疽發掌中者可治
赤疽發脛死不可治
黑疽發腫在背大骨上八日可刺過時不刺爲骨疽膿出不可止出碎骨六十日死
黑疽發腋淵死
黑疽發耳中如米此名文疽死
黑疽發肩死
黑疽發缺盆中名曰伏癰死

黑疽發肘上下不死可治
黑疽發腓腸死
黑疽發膝臏堅死濡可治
黑疽發趺上堅死足下久癰色赤死
手心主脉有腫癰在股脛六日死發膿血六十日而死
脅少陽脉有腫癰在頸八日死發膿血十日死
腰太陽脉有腫交脉來於陽明癰在頸十日而死發膿血七日死
尻太陽脉有腫癰在足心少陽脉八日死發膿血八十日死
頭陽明脉有腫癰在尻六日死發膿血六十日死
股太陽脉有腫癰在足太陽七十日死發膿血百日死
肩太陽太陰脉有腫癰在脛八日死發膿血四百日死
足少陽脉有腫癰在脅八日死發膿血六百日死
手陽明脉有腫癰在腋淵一歲死發膿血二歲死

薄貼第八 方三十一首

松脂貼主癰疽腫方 鍊松脂採松脂法附

松脂貳斤成鍊者 膃脂叁兩 細辛半兩 黃蘗

白芷 芎藭 白斂 芍藥

莽草 白蠟 黃耆 黃芩

黃連 大黃 當歸 防風各壹兩

右壹拾陸味切先以火煖銅鐺令熱以蠟拭鐺使通濕訖

松脂令破內鐺中次下膃脂都消盡訖乃內藥以竹篦攪

令調仍於微火上煎之急攪令勿息十沸下之沸止更上預

作十箇濕土堆一下置一堆上遍十堆則成及熱以新幕

生布上四面又安火炙作絞子絞澄去滓挑取向火塗紙

依病處大小翦取貼之周時易此法稍難好好用心作之

乃可成矣

鍊松脂法

取大麻人三升研之令細水三升淘之生布絞去滓松脂

二升以水三升半煑令消盡及熱新布絞令脂出內麻汁

中待小冷取松脂牽挽令白乃依法秤取

採松脂法

取深山大松本有露根脂自流出白粘者佳火燒黑彊者

不堪用亦可五月六月大暑時破作痕三五日待出取之

須多者多破根取之

升麻薄主癰疽方

升麻 大黃 黃耆 芎藭 龍骨

白及各壹兩 黃芩陸兩 白斂 牡蠣熬 甘草各半兩

右一十味擣篩為散以蜜和之如泥塗布薄癰上乾即易之

痛微用此令消方

黃耆　青木香　梔子　乾地黃　升麻
龍骨　大黃　黃蘗　黃芩　麻黃
黃連　芎藭　生犀取末　白斂　羚羊角

右壹拾伍味等分擣篩為散以醋和之如泥塗故布上開口如小豆以洩熱氣乾則易之差止

白斂薄主癰疽方

白斂　大黃　黃芩各等分

右三味擣篩為散以鷄子白和如泥塗布上薄腫上薄乾則易之亦可以三指撮藥末內三升水中煑三沸綿注汁拭腫上數十遍以寒水石末和塗腫上以紙覆之乾則易之輒以煑汁拭之日夜二十易

食惡肉散方

真朱　藜蘆各壹分半　閭茹半兩　馬齒礬燒
硫黃　雄黃　麝香各叄分

右七味擣篩為散粉瘡上亦可膏和傅之著兌瘡孔中佳

生肉膏主癰疽金瘡方

大黃　黃耆　芍藥　獨活
當歸　白芷各壹兩　薤白貳兩　生地黃叄兩取汁

右八味擣篩為散切薤白以地黃汁成煎豬膏三升煎之二上三下以綿布絞去滓以傅瘡多少隨人意

升麻薄主癰疽結核種種色不異時時牽痛或經年腫勢不消方

升麻　青木香　白斂　芒消　射干
當歸　黃芩　桂心　芍藥　防風
大黃　芎藭　乾葛各貳兩　莽草壹兩

右一十四味擣以酒和令調微火熬令黃以薄腫上日再

易乾若添酒更擣之隨後薄腫上

寒水石薄方

寒水石　黄蘗　黄耆　黄連

大黄　石膏　梔子各貳兩　白斂肆兩

右捌味擣篩爲末粉粥和如泥塗故布上薄腫上乾則易之

當歸貼諸腫方

當歸一作當陸　黄芩　黄連　大黄

莽草　白芷　白斂　白及各貳兩

右八味擣篩爲散消膠汁稍稍和如泥塗紙貼腫上乾則易之

有患癰破下膿訖著兑藥塞瘡痛煩悶困極有人爲去兑藥以楸葉十重貼之以布帛裹令緩急得所日冊三易之痛悶即止腫消此極甚大良無比勝於衆貼此主癰疽潰後及凍瘡有刺不出者用之甚良冬無楸葉當早收之臨時以鹽湯沃之令釋用之亦佳薄削楸白皮用亦得貼楸葉後不復煩悶腫消減膿血惡汁出瘡陷下漸差

治腦瘻諸節諸癰腫牢堅治之方

削附子令如棊子厚正著腫上以少唾濕附子艾灸附子令熱徹附子欲乾輙令唾濕之常令附子熱徹附子欲乾輙更氣入腫中無不愈者此法絶妙不傳

治萬種癰腫方

蒺藜蔓淨洗三寸截之取得一斗以水三升煮取二升去滓内銅器中煮取一升内小器中煎如稠糖下取塗瘡腫上大良

治癰腫方

伏龍肝以大醋和作泥塗布上貼之乾即易之消矣又和

䔩擣如泥塗之

凡癰無問大小亦覺即取膠壹斤如掌水清令軟納納然心開一孔如錢孔大貼腫上若已潰者膿當被膠急撮皆出盡若未有膿者當自消矣

又方

燒鯉魚作灰醋和傅之一切腫用之皆愈以差爲限至良

蛇銜生肉膏主癰疽金瘡敗壞方

蛇銜　當歸各壹兩半　生地黃三兩　黃連　黃耆

黃芩　大黃　續斷　芍藥　芎藭

莽草　附子炮去皮　細辛　蜀椒去目閉口　白芷

白及一作白鮮皮　甘草炙各壹兩　薤白

右壹拾捌味切以大醋漬兩宿以臘月豬脂七升煎三上三下白芷色黃下去滓傅之

又方

生地黃壹斤　薤白五兩　辛夷　芎藭

獨活　當歸　黃耆　白芷

續斷　芍藥　黃芩　大黃各壹兩

右壹拾貳味切以臘月豬脂四升煎白芷黃色下去滓傅之

野葛貼主癰疽痔瘻惡瘡婦人妬乳瘡方

野葛　芍藥　薤白　通草各半兩

當歸參分　附子壹分

右六味切之醋浸半日先煎豬脂八合令煙出內亂髮半兩令消盡下令熱定乃內松脂貳兩蠟半兩更著火上令和乃內諸藥令沸三上三下去滓冷之涴故帛去垢塗貼腫上乾即易之春去附子其亂髮淨洗去垢不爾令瘡痛

又方

煎地黃汁如膠作餅貼之日四易三日差（千金云飲惡肉）

紫葛貼癰腫方

紫葛（貳兩）　大黃（伍分）　白歛　玄參

黃連　黃芩　由跋　升麻

楡白皮（各三分）　青木香（半兩）　赤小豆（半升）

右壹拾壹味擣篩爲散以生地黃汁和之如泥傅之乾即易之大醋和亦得

治癰疽瘡久不差方

松脂　薰陸香

右貳味等分擣入少許鹽爲餅貼瘡上惡汁出盡即差

諸卒腫方

取芥子細末豬膽和如泥漆塗病上日三

蕪菁子封癰腫方

取蕪青子壹升擣作細末大醋和如泥封之乾則易之

芥子亦大佳

又方　槐子半升慎火草一把擣細水和塗之

又方　擣蔚臭汁服一雞子以滓封癰上暖即易之頭面腫更良

葱白瘡癰疽瘻有數孔積年不差方

葱白壹斤細切擣如泥淨洗瘡拭乾封塗之厚一分日三夜一取差止

八味黃耆薄方

黃耆　芎藭　大黃　黃連

莽草　黃芩　梔子　芍藥（等分）

右八味爲散以雞子白和如泥塗布上隨腫大小薄之燥則易之瘡上開孔令得泄氣

搨湯主丹癰疽始發焮熱浸長進方兼主小兒丹長忌近陰

升麻　黃連　大黃　芎藭
羚羊角　當歸　甘草各二兩　黃芩三兩
右八味以水一斗煮取五升去滓又還鐺中內芒消三兩上火令一沸則帛搨腫上數過腫熱便隨手消盡王練甘休秘之

搨湯方

大黃　黃芩　白斂各三兩　芒消壹兩半
右四味以水六升煮取三升以故帛四重內汁中以搨腫上暖復易晝夜爲之

又方

凡癰以梁上塵灰葵莖等分醋和傅之乾則易之

石癰堅如石不作膿者方

生商陸根貼軟布帛貼之數易之亦可擣傅燥即易癰當消濡

處療癰疽第九　論壹首　方叁拾叁首

論曰諸癰狀多種不同無問久近皆五香連翹湯主之先刺去熱小豆薄之其間數數鍼去血若已失療潰爛者猶常服五香漏蘆等湯下之當下大鍼入五分者則速愈凡癰高而光者不大熱其肉正平無尖而紫色者不須治但以竹葉黃耆湯申其氣耳其肉正平爲無膿也癰卒痛用八物黃耆薄大癰七日小癰五日其有堅彊者診寧生破發背及發乳若熱手不可得近者內先服王不留行散外摩發背膏若背生破無苦在乳者宜令極熟熟之候手按之隨手即起者便熟須鍼之鍼法要得著膿以意消息之胸背不可過一寸酌量不得膿以食肉膏散著兌頭內癰口中如人體熱氣歇服木占斯散五日後癰欲差者服排膿內塞散凡破癰之後病人便綿惙欲死內寒外熱腫自有似癰而非者當以手按腫上無所連即是風毒耳勿鍼可服升麻湯外摩膏破癰口當令

上留三分近下一分鍼惟令極熱極熱便不痛破癰後敗壞
不差者作猪蹄湯洗之日再夏湯二日可用冬六七日湯半
劑亦可用胷中痛短氣者當入闇中以手中指按左眼視若
見光者胷中有結癰若不見光者熛疽內發鍼傷脉血不出
住實不寫當成癰也凡脉來細而沉時直者身有癰疽脉來
大漸小者陰結苦肌肉痺癰節尋寸口如此來大而漸小也

漏蘆湯方

漏蘆 白斂 黄芩 枳實炙 芍藥
升麻 麻黄 甘草炙各貳兩 大黄三兩

右九味㕮咀以水一斗煑取三升分叁服無藥處單服大
黄下之一方白薇貳兩

連翹五香湯方

連翹 青木香 薰陸香 麝香 沈香
射干 獨活 桑寄生 通草 升麻各貳兩
丁香壹兩 大黄叁兩別浸

右壹拾壹味㕮咀以水九升煑取減半內竹瀝貳升煑取
叁升分叁服未差中間常服佳

王不留行散主癰疽及諸雜腫已潰皆服之方

王不留行子壹升 五色龍骨貳兩 野葛皮半分 栝樓六合
當歸貳兩 乾薑 桂心各壹兩

右柒味擣篩爲散食訖温酒服方寸匕日三以四服習習
爲度不知漸稍加之此浩仲堪方隋濟闍梨所名爲神散
癰腫即消極安穩千金云治癰腫不能潰困苦無聊賴

黄耆竹葉湯治胷背遊熱癰疽方

黄耆叁兩 生地黄八兩 甘草炙叁兩 芍藥叁兩 黄芩叁兩
人參貳兩 麥門冬去心三兩 石膏貳兩半 芎藭貳兩 當歸貳兩

生薑五兩切　大棗三拾枚擘　半夏四兩洗　淡竹葉切壹升

右壹拾肆味以水壹斗貳升先煮竹葉取九升去滓內諸藥煮取叄升八分肆服相去如人行二十里間食日三夜一服之

黃耆湯主癰腫熱盛口乾除熱止渴方

黃耆　升麻　栝樓　乾地黃

麥門冬去心各三兩　黃芩　芍藥各壹兩　梔子二十枚擘

右八味㕮咀以水壹斗煮取叄升八分叄服

溫中湯主癰疽取冷過多寒中下痢食完出方

甘草炙　乾薑　附子炮各壹兩半　蜀椒二百四十枚汗

右肆味㕮咀以水陸升煮取貳升八分叄服

黃耆散主癰疽撮膿方

黃耆五分膿多倍之　小豆一分熱口乾倍之　芎藭半兩肉大生倍之　芍藥二分痛不止倍之

栝樓二分渴小便利倍之　白斂三分有膿不合倍之

右六味擣篩爲散酒服方寸匕日三廣濟有甘草三分

瞿麥散主諸癰潰及未潰瘡中疼痛膿血不絕不可忍之方

瞿麥　白芷　黃耆　當歸　細辛

芍藥　芎藭　薏苡仁　赤小豆各壹兩

右九味先以清酒漬豆出於銅器中熬之乾復漬漬熬五過止然後治末之合下篩溫酒服方寸匕日夜各五三日後痛者肌肉生一方以苦酒漬小豆多痛倍瞿麥瘡未開倍白芷膿多倍黃耆薏苡芍藥

黃耆湯主癰腫虛弱方

黃耆四兩　升麻三兩　桂心貳分冷用八分　黃芩壹兩　竹葉切壹升

茯苓　生薑切　甘草各貳兩炙

右八味㕮咀以水貳斗煮竹葉減五升去之澄取九升內諸藥煮取叄升去滓八分叄服日三

諸惡腫失治有膿者方

燒刺榆鍼作灰水服之經宿即頭出服壹鍼作壹頭多鍼多頭無刺榆者燒蛇蜕皮灰水和封上一日即孔出仍以別服五香湯以筋作綖任孔中勿令合使引膿血若已成大瘡去血盡煑小兒餔塗之上著乾薑末以漸自消

五利湯主年四十已還彊壯常大患熱發癰疽無定處大小便不通方

大黃 升麻各三兩 黃芩貳兩 梔子十五枚 芒消壹兩

右伍味㕮咀以水伍升煑取叁升肆合去滓下芒消分肆服快利即止

癰疽潰膿大多裏虛方

黃耆 麥門冬去心各三兩 生薑四兩切 五味子四兩

桂心 芎藭 茯苓 遠志去心

當歸 人參各二兩 大棗二十兩去核 甘草六兩炙

右壹拾貳味㕮咀以水壹斗煑取肆升分陸服

乾地黃丸主壯熱人長將服之終身不發癰疽令人肥悅耐勞苦方

乾地黃五兩 天門冬四兩去心 大黃三兩 巴戟天 肉蓯蓉

栝樓 人參各壹兩 芍藥 桂心 當歸

黃芩 黃耆 遠志去心 石斛 甘草炙各二兩

右壹拾伍味擣篩為末鍊蜜和丸如梧子酒服拾丸日二加至貳拾圓

乾地黃圓主虛熱消瘡癤方

乾地黃四兩 大黃六兩 芍藥 茯苓各三兩

遠志去心 升麻 桂心 黃芩

麥門冬去心 人參 王不留行子 甘草炙各二兩

右壹拾貳味擣篩爲末鍊蜜和圓如梧子酒服拾圓日叄加至貳拾圓長服令人肥健（千金有枳實二兩）

乾地黃圓主虛勞客熱數發癰腫瘡節經年不除者悉主之方

乾地黃（四兩） 天門冬（去心五兩） 人參（壹兩） 黃耆 黃連

大黃 黃芩（各三兩） 芍藥 細辛 茯苓

澤瀉 乾漆（熬） 桂心 甘草（炙各二兩）

右壹拾肆味擣篩爲散鍊蜜和圓如梧子酒服拾圓日三夜一加至貳拾圓長服延年益壽終身不發癰節凡大黃皆薄切五升米下蒸之暴乾熱多者倍大黃

排膿內塞散主大瘡熱已退膿血不止瘡中肉虛疼痛方

防風 茯苓 白芷 遠志（去心） 芎藭

桔梗 人參 當歸 黃耆 甘草（炙各一兩）

厚朴（炙） 桂心（各二兩） 附子（二枚炮） 赤小豆（三合熬）

右壹拾肆味擣篩爲散酒服方寸匕日三夜壹服

瞿麥散主排膿止痛利小便方

瞿麥 麥門冬（去心） 黃耆 當歸 白歛（各壹兩）

芎藭 赤小豆（半合） 桂心（半兩） 芍藥（二兩）

右九味擣篩爲散先食溫酒服方寸匕日叄服

薏苡仁散主癰腫令自潰長肌肉方

薏苡仁 乾地黃 肉蓯蓉 白歛 當歸

桂心（各壹兩）

右陸味擣篩爲散先食以溫酒服方寸匕日叄夜貳服

五香湯主惡氣毒腫方

沈香 丁香 麝香（湯成入） 薰陸香 青木香（各壹兩）

右伍味切以水伍升煮取貳升分叄服不差更合服以湯淬薄腫上

兌疽膏方

當歸　芎藭　白芷　松脂　烏頭各二兩

巴豆三十枚去皮　豬脂三升

右七味切內膏中微火煎三沸內松脂耗令相得以綿布絞去滓以膏著綿絮兌頭尖作兌兌之隨病深淺兌之膿自出食惡肉盡即生好肉瘡淺者勿兌著瘡中日三惡肉盡止

乾癰瘡凡是瘡瘍皆用之方

雄黃　雌黃　硫黃　白礬燒　胡粉

松脂各二兩　水銀三兩

右柒味細研如粉以水銀不見為度內後膏中以十隻筋攪之數千匝冷密貯勿洩

藜蘆　漏蘆　狼牙　羊蹄根　青葙

地榆　當歸　萹蓄　蕳茹各二兩　白斂

蛇床子各壹兩半

右壹拾壹味擣篩為散以醋浸一宿以成煎豬膏四升煎三上三下膏成絞去滓以極微火煎之凡一切惡瘡癬疽瘻瘑疥患悉傅之勿令近目及陰其石等研之如粉膏欲凝乃下攪令勻摩之逐手差矣

食惡肉散方

硫黃　雄黃　雌黃　漆頭蕳茹

麝香　礬石燒各半兩　馬齒礬石燒三分

右柒味細作散傅之兌食惡肉令盡（千金有丹砂半兩）

滅瘢膏主一百癰疽惡瘡瘑瘡赤疽皆先以布揩作瘡以塗之鼻中息肉如大豆內鼻中瘑血酒服如棗核大病痔以綿裹梅子大內下部中中風塗摩取愈婦人崩中產後中風皆主之方

烏頭 礬石燒 女萎 狼毒 躑躅
附子 野葛 烏賊骨 皂莢炙 赤石脂
天雄 芍藥 芎藭 礜石燒 當歸
石膏 莽草 地榆 鬼臼 續斷
蜀椒 白朮 巴豆去皮 大黃 細辛
白芷 乾地黃
右貳拾柒味各壹兩擣篩以成煎豬脂四升和藥以此爲率三沸三下內三指撮鹽其中下之須服摩之姙娠婦人勿服其藥絹篩豬膏臘月當多合用之神效別取一升和鷹屎白三兩調和使熟傅之滅瘢大驗

豬蹄湯主癰疽及惡瘡有息肉方

豬蹄一具治如食法 白斂 白芷 狼牙 芍藥各二兩
黃連 黃芩 大黃 獨活各二兩
右玖味切以水三斗煑豬蹄取一斗二升去蹄內藥煑取五升分洗瘡日三良

治節腫方

生椒 麴末 釜月下土末之
右叁味末之以大醋和傅上乾則易之

禁癰方

呪曰癰非癰節非節土塊失癰即滅三七遍取一土塊摩腫上傅與病人男左女右

割一切腫方

凡人身上有腫腫在左割左在右割右足出少血即消在足小指下横文內畔稜上此極良

禁一切腫方

凡一切腫亦覺陰呪曰上有太山下有大海內有大魚主食癰

疽四岳使者於我所須癰疽小鬼隨手消除急急如律令七遍

又方　取紫檀細研大醋和之塗并治遊腫

療身體手足卒腫方

取驢脂塩末傅之

又方　取大醋和蚯蚓矢傅之

又方　擣蒼耳傅之冬用子春用心

又方　取大醋和土消末傅之

千金翼方卷第二十三

千金翼方卷之二十四

瘡癰下

癰疽發背第一　方九首

凡發背及癰疽腫已潰未潰方

取香豉三升少與水和熟擣成彊泥可腫作餅子厚三分已有孔勿覆孔可腫上布豉餅以艾列其上灸之使温温熱而已勿令破肉也其熱痛急易之癰疽當便減決得安或一日二日灸之若先有瘡孔孔中汁出即差

癰腫發背腫并諸毒腫方

楡白皮　栝樓各伍兩　婦人月布洗取汁

胡燕窠土　鼴鼠土各拾兩

右五味擣和作泥封之一日漸消五日全差若壞封四畔差

諸癰腫無聊賴發背及癰節已疼痛方

爇糜穀更遞熨灸之即愈（一云薔薇殼更灸熨之）

癰疽發腹背陰隱處通身有數十癰方

取牛糞乾者燒末以雞子白和塗乾則易差止

又方以牡蠣粉大醋和塗即愈

古期散主消腫癰疽消膿方

木占斯　人參　乾薑（一云乾地黃）　桂心

細辛　厚朴（炙）　敗醬　防風

桔梗　栝樓　甘草（炙各壹兩）

右十一味擣篩為散酒服方寸匕藥入咽覺藥流入瘡中若癰疽灸之不能發壞者可服之瘡未壞者去敗醬已發膿者內敗醬服藥日七夜二以多為善若病在下當膿血出此為腸癰也諸病在裏惟服此藥即覺其力痛者即不痛長服治諸瘡及疽痔瘡已潰便早愈醫人不知用此藥發背無有不治者惟服此耳若始覺背上有不好而渴者即勤服之若藥力行覺渴止便消散若雖已壞但日夜服之勿住也服之腫自消散不覺去時欲長服者當去敗醬婦人乳癰宜速服之（一方無桂心）

癰疽潰漏男發背女發乳及五痔方

蝟皮（燒）　蜂房（燒各壹具）　蜀椒（汗）　乾薑（各壹兩）

厚朴（壹兩半）　附子（炮去皮）　桂心　當歸

續斷　藁本　地榆皮（各五分）

右拾壹味擣篩為散酒服方寸匕日三加斑貓七枚益良

治滑骨疽百方治不差方

可於瘡上以次灸之三日三夜無不愈

又方

久瘡不愈差而復發骨從孔出者名為骨疽取一死烏雌

雞淨去肉取骨熬令成灰取三家牛拘木刮取屑三家炊

單各一兩皆別熬成灰合導瘡中碎骨當出數十片愈

鼠瘻第二 論一首 方二十一首 灸法三首

論曰一切癰疽皆是瘡瘻根本所患癰之後膿汁不止得冷即是鼠瘻是以漏方次之大須急救之

治鼠漏方

馬齒草五升切 檞白皮一斤水煮五升取一升澄清 麝香半兩乾之研末 杏人半升曲煎令黑擣如粉

右四味以甆器貯之合和以三四重帛密繫口病已成瘡者以泔清煎減半洗作貼子塗藥貼著瘡上日三易之若未作瘡如瘰癧子者以艾一升熏黃如棗大乾漆如棗大三味末之和艾作炷灸之三七壯止

治諸漏方

取新生兒屎一百日以來皆收置密器中五六日取塗瘡孔中

又方

取鯉魚腸切作五段火上煖之先洗瘡拭乾以腸貼之冷即易之從旦至夜乾止覺痒開看蟲出即差

又方

取雞子三顆米下蒸半日出取黃熬令黑先拭瘡汁令乾以藥內瘡孔中不過三度

又方

以臘月豬脂以紙紝沾取內瘡孔中日五度夜三度

風漏及鼠漏方

赤小豆　白歛　牡蠣熬　黃耆

右四味等分擣篩為散酒服方寸匕日三

蟻漏方

取陵鯉甲二七枚燒為末豬膏和傳之

又方取半夏一枚屑之以鴨膏和傅之

漏方

鍜鐵屑　狗頰連齒骨　虎矢　鹿角甲半取毛（各貳兩千金一云鹿皮合毛）

右四味擣篩爲散以猪膏和內瘡孔中須臾易之日五六

治鼠漏方

死鼠（壹枚中形者）　亂髮（壹雞子大）

右二味以臘月猪膏纔得没之微火煎之鼠髮消盡膏成以塗瘡上又以酒服半分許鼠從瘡中出

寒熱瘰癧方

連翹　黃連　苦參　栝樓　土瓜根

芍藥　恒山（各壹兩）　龍膽（貳兩）　貍頭骨（壹枚炙）

右九味擣篩爲散酒服五分七日三

治身體瘰癧及常有細瘡又口中有瘡薔薇丸方

薔薇根　黃蘗　黃耆　黃芩　芍藥

苦參　白歛　栝樓　防風　梔子

龍膽　鼠李根皮（各壹兩）　石龍芮（貳兩）

右壹拾叁味擣篩爲末鍊蜜和丸如梧桐子飲服十九日三（千金無黃蘗）

頸漏

擣生商陸根作餅子如大錢厚三分貼漏上以艾灸之餅乾熱則易之可灸三四升艾便差

一法

葶藶子（貳合）　豉（壹升）

右二味合擣大爛熟作餅子如上以一餅子當孔上貼以艾炷如小指大灸上三壯一易三餅九炷日三隔三日一灸

一法

凡是一名瘰癧有結核欲作癰節者以獨顆蒜去兩頭灸之如前法日灸三度差

一法

七月七日未出時採麻花五月五日取艾等分合作炷灸瘡上百壯

治瘻方

馬齒草（陰乾） 臘月淳麻燭（燼）

右貳味等分細篩以臘月猪脂和之先以煖泔清洗瘡拭乾塗之

又方

槲木皮一尺闊六寸去黑皮細切以水二斗煑取五升去滓內白糖十挺煎取一升分三服以銅器中貯之若吐著器中看之

又方

五月五日午時取馬齒草一石以水一石煑取三斗去滓內白糖十挺煎取九升分三服以銅器貯之若吐吐著器中看之

人參散 主寒熱瘰癧在頸脉如如杏李方

人參 乾薑 白芷 甘草（各壹兩）

右四味擣篩爲散先食飲服方寸匕日三少小半匕以意增加

又方

貍骨（伍分炙） 烏頭（柒分炮去皮） 黃蘗（壹兩）

右叄味擣篩爲散先食酒服一錢匕日三

又方

連翹 黃連 芍藥 苦參

土瓜根　龍膽　當歸各半兩

右七味擣篩爲散先食以温酒服錢五七日三稍加至方寸匕千金無當歸有栝樓恒山爲八味

又方取桃枝上不落子擣末以大酢和傅之

鼠乳方

常思根拭去土勿洗以附本𣪠之一日一夜便斷消

瘭疽第三方八首

瘭疽秘方世所不傳神良無比

升麻　乾地黄　枳實炙各貳兩　大黄貳兩半　前胡

犀角壹兩半　麝香　射干　甘草炙各半兩

右玖味以水玖升煑三升分三服以差爲度不限劑數

猪蹄湯主瘭疽諸疽十指頭焮赤痛癢已潰方

猪蹄壹具治如食法　大黄　白芷　芎藭

黄芩　黄連　細辛　當歸

藁本　藜蘆炙一本無　莽草　甘草各壹兩

右壹拾貳味以水三㪷煑猪蹄取一斗煑藥取五升洗漬瘡

搨湯主瘭疽浸淫欲作未成或如桃李核或如雞子赤焮方

黄芩　黄連　大黄　當歸

芒消　甘草各壹兩

右陸味以水六升煑取三升去滓還鐺中内芒消一沸貼布帛中以搨腫上數百遍

瘭疽浸淫多日漸大方

胡粉熬壹分　黄連　蔄茹　甘草各貳兩

右肆味擣篩爲散以粉上日三

瘭疽著手足肩背累累如米起色白刮之汁出愈而復發方

黄耆壹兩半　款冬花　升麻各壹兩　赤小豆

附子炮去皮 苦參各壹分

右陸味擣篩爲散酒服半錢匕稍增至壹錢匕日三服

又方

取虎矢白者以馬矢和之暴乾燒灰以粉之

又方

龍骨 胡粉燒 滑石各半兩 青木香壹兩

右肆味擣篩爲散以米粉一升和之稍稍粉之日四五

瘭疽方

竈室塵 竈突中墨 竈釜下土各壹升

右叁味以水九升煑三沸取汁以洗瘡日三四度

惡核第四 論一首 方十三首

論曰凡惡核似射工初得無定處多惻惻然痛時有不痛者不痛便不憂不憂則救遲救遲則殺人是以宜早防之此尤忌牛肉雞猪魚驢馬等肉初如菜或如麻子在肉裏而堅似皰長甚速初得多惡寒須臾即短氣取茱萸五合作末水一升和之絞取汁頓服之以滓傅之須臾更服此汁令毒氣散不入腹入腹則致禍切慎之

江南毒氣惡核射工暴腫生瘡五香散方

甲香 薰陸香 青木香 羚羊角 丁香

犀角 鼈甲炙 升麻 烏翣 黃芩

黃蘗 黃連 甘草炙各肆兩 吳茱萸叁分

右壹拾肆味擣篩爲末中射工毒及諸毒皆水服方寸匕日三以雞子白和塗腫上乾則易之兼以水和少許洗腫上（疑脫）

野葛膏主射工惡核卒中惡毒方

野葛貳升 巴豆去皮 烏頭 蜀椒各伍 附子

丹砂　茵芋略壹兩　雄黃　大黃　躑躅略貳兩

右壹拾味擣篩為散以不中水豬膏十斤煎三上三下去滓內丹砂雄黃末攪至凝以棗核大摩病上勿近眼凡合名膏皆不用六畜婦人小兒見之

麻子湯主遍身流腫方

麻子伍升熬　赤小豆叄升熬　防風叄兩　附子炮　當歸略壹兩

右伍味先擣麻子令熟以水三斗煑麻子取一斗三升去滓內藥及豆合煑取四升去滓食豆飲汁

治惡毒腫或著陰卵或偏著一邊疼急攣痛牽小腹不可忍一宿殺人方

取茴香草擣取汁飲一升日三四服滓薄腫上此外國方神驗從永嘉以來用之起死人神效無比

九風勞毒腫疼攣痛或牽引小腹及腰髀痛方

取桃仁壹升去尖皮兩仁者熬令黑煙出熱研如脂以好酒三升攪令相和一服覆取汗不過兩三度作之差

若從腳腫向上稍進入腹殺人方

取赤小豆一斗以水三斗煑爛出豆以汁漬膝以下日一數日則愈矣若已入腹者不須漬膝但煑豆食之斷一切鹽菜飲食米麪惟祇食豆一物渴飲豆汁差乃止

大麻子赤小豆湯主毒腫無定處或敕濇惡寒或心腹刺痛煩悶者此由毒氣深重也

大麻子熬　赤小豆略伍升　生商陸貳升薄切之

升麻肆兩　附子炮　射干略叄兩

右六味以水四斗煑諸藥取二斗五升去滓研麻子令破以麻子汁煑豆令極熟去滓可得六七升一服一升一日一夜令盡小便當利即毒除腫減食兼此豆益佳如湯沃

雩丸用麻子皆不得用欝悒者可揀擇用之

丁腫方

狗尿珠一名龍葵取汁傅之抜出根冬用乾者湯漬取汁用之

又方

取蒼耳燒灰和醋泔澱作泥封之乾即塗勿住取抜根出乃止

又方　取黒牛垢封之

又方　刮竹箭上取茹作炷灸上二七壯即消矣

又方　末附子醋和傅上燥即塗

又方　取生薺苨根汁一合去滓塗不過三度

丹胗第五　方二十八首

治丹毒腫升麻搨湯方

升麻　漏盧　芒消〔各貳兩〕　蒴藋根〔伍兩〕

黄芩〔參兩〕　梔子〔貳拾枚〕

右陸味切以水一斗煑取七升冷分用漬搨常令濕爲佳

丹毒方一名天火也肉中忽有赤如朱塗之赤色大者如掌劇

者遍身亦有痛癢微腫者方

赤小豆貳升綃下篩雞子白和塗之小乾即塗逐手消也

復合漏蘆湯以防其内其方如左

漏蘆　白歛　黄芩　白薇　枳實〔炙〕

升麻　芍藥　麻黄〔去節〕　甘草〔炙貳兩〕　大黄〔貳兩〕

右壹拾味㕮咀以水壹斗煑取三升分三服

治五色丹俗名油腫若犯者多致死不可輕之方

縛母猪枕頭卧即差

又方　牛屎塗乾則易之

又方　雞子白蒲席灰塗之

又方　擣麻子水和塗之

又方　煎羊脂摩之青羊尤佳

又方　赤小豆五合末水和取汁一合服滓塗五心

又方　以芸薹菜末雞子和塗之一云芸薹菜汁服三合滓塗丹上

又方　榆根皮末雞子和傅之

又方　燒苦竹葉篩灰和臘月豬脂塗之亦治油腫

又方　擣芸薹菜封即差止

又方　擣慎火草封之神良

又方　鯽魚五枚五寸以上者去鱗熟研朱砂一合擣如泥

封病上厚三分乾易之

瘤病方

取麞鹿二肉治如厚脯火炙令熱搨掩瘤上冷更炙搨可

四炙四易肩膿便愈不除更炙新肉用之

白瘤方

先極搔刮以繩縛之即愈又取東向木空中水熱刮瘡上

洗之二三遍即愈

又方　硫黃　礬石燒

右二味等分末以酢和傅上

麻遊腫方

以生布一片揾油中布入油出以火然之持照病上呪曰

日出遊遊不知羞脂火燎你頭七遍差

白遊腫方

熟擣生羊脾塗之

青白赤遊手近微痛者方

大黃　蒲黃　伏龍肝兩各貳

右三味以水和如薄粥塗之

治赤遊方

以鷹矢水和塗之二三差

又方　胡鷰巢灰醋和傅之日二三

又方　冷水射注之

又方　大黃壹兩　紫檀壹兩　豉壹合

右三味擣細篩為末大醋和傅之

又方　擣慎火草如泥塗之此最大效

火遊腫方

大黃慎火草和為末塗之

又方　胡粉壹兩和醋一合煎塗之

火遊腫流遍身赤色者入腹即死方

以生猪肉傅上其肉蟲鳥不食臭惡故也

甘濕第六 論一首 方三十八首

論曰夫甘濕之為病也或熱或寒如病虎狀或時下痢或痢則斷或常痢不止無有時節或時睡眠有時思食而氣力漸弱日日羸瘦腹背攣急頭項無力嗜臥食少試法先指琢其脊上兩邊若逐指即起如粟者即是甘病若不起者非是甘也若起者可漸向上琢之若起至頸骨兩邊者即是蟲已入腦矣病難愈矣療十得一二終須多灸若未入腦醫之可差先以繩拘項向心厭頭令當齊骨下尖處即插著轉繩向背背上當脊骨插頭橫量病人口兩吻頭作定於捉繩頭脊骨上點兩處灸必須細意點處齊平即灸初旦灸二壯滿一七日至第二七日灸二七壯第三七日日暮灸七壯第四七日目秪三壯第五七日日二壯看初灸二三日若灸瘡發膿者易差五六日乃發者難差惟得食白飯苜蓿苦苣蔓菁菜香漿少許燒塩差後百日乃可得依常食又須灌藥三遍相去五日一灌

葱白壹握 豉壹升 蜀椒叁合 塩貳合
右四味以水一斗煑取七升去滓煖灌之取一升乃灌也
療甘濕食口齒及下部方
飛廉蒿獨名
右壹味燒作灰擣篩以兩錢匕著病處甚痛忍之若不痛
則非甘也特忌油膩窰魚有人患甘食口刺痛穿着此得
差著下部中蟲如馬尾大相續出無數十日後差二十日復
又方
取五葉紫花草末和杏仁薑花灰相和吹下部中差
甘濕方
擣五葉紫花草熟先病拭乾內著病上差爲限所中甘者絞取
汁五合服之日三夜一
下部癢如蟲行方
眞朱砂壹銖 礬石熬貳分 芎藭壹兩
右三味擣末綿裹內下部中
又方 取蝦蟇末 兔矢末用之如上法
又方
以紙裹莨菪根煻火燒熟以蜜塗內下部中一切蟲痔皆愈
又方
黃連貳兩 蛇床子兩半 黃蘗 梔子各壹兩
右肆味擣篩爲散以臘月猪脂和塗內下部中日再
又方
大黃 黃芩 黃耆 玄參各壹兩 丹參叁分
芍藥半兩 吳茱萸五分炒
右柒味擣篩爲散酒服方寸匕日三
治甘濕久下痢赤白百療不差方

兎頭(炙) 孤骨(皆臘月採炙) 葶藶子(熬) 百草(五月五日收) 蛇頭(炙)
蝦蟆(炙) 蜣蜋(皆五月五日採炙) 石黛 晩蠶蛾(熬) 青礬(熬)
黃礬(熬) 丁香 麝香 菥蓂(灰) 故緋(灰)
苦參 蘗皮 乾薑 角蒿(灰) 丹砂
芒消 鐵衣 印成盐 救月木 蠍蟲矢
桂心 床中桃木
右貳拾柒味等分細研如粉以筩子吹下部日三良(千金有倒挂草)

甘濕下蟲方(千金云下黑)
熏黃 朱砂 石黛 石盐 麝香
丁香 礬石(熬) 梔子 鐵衣 莨菪子(熬)
細辛(熬) 土瓜(熬) 乾薑(熬) 蜀椒(汗) 葶藶子(熬)
昌蒲(熬) 蝦蟆(乾者熬) 故靴底(炙) 髑髏骨(炙之枯腐者佳新者不任用)
右壹拾玖味等分擣篩爲散以筩子吹藥杏仁大下部中

所有患甘䘌悉傅之其丁香麝香皆別細研內藥中合之
一方有芥子若病大重者用灌法如左
丁香 麝香 甘草(各叁分) 犀角(伍分)
右四味細末如粉別以盐三合蜀椒三合豉二升以水三
升煑取一升去滓內諸藥合和分再灌之旦一酉一

月蝕惡瘡息肉方
硫黃(一云雄黃) 䕡茹 斑猫(去足翅熬各壹兩)
右叁味擣篩爲散以粉瘡上乾者以猪膏和塗日三夜二

治甘食人諸處凡是赤白痢久不差秘之方
五月五日蝦蟆(壹枚半熬半生作末) 金銀土堝(伍分)
麝香(壹分) 人矢灰(伍分) 銀末(小豆太)
右伍味細研如粉傅病上即差三七日愼食甜物痢者吹
下部中

凡人口中生𤺋久不差下至咽喉胃中有三年不差者此亦
是甘食病宜塗角蒿灰於病上有汁咽之不過一宿差
又方 薔薇根濃煮汁含咽三宿差
又方 大麻子 胡麻各壹升半並熬令焦赤
右貳味以叁升瓮餅泥裹上厚一寸待乾內麻子等令滿
以四五枚葦管插口中密泥之掘地作竈立瓶竈口中竈
底著瓮器承之密塡竈孔與地平聚炭餅四面以墼壘之
日沒放火燒之至明旦開取脂適寒溫灌下部中一合尋
覺咽中有藥氣爲佳亦不得過多多則傷人隔日一灌重
者再三灌止旦起灌至日夕極覺體中之勞勿怪也非惟
治甘濕凡百異同𤺋疥癬並洗塗之無不差一云口含一丸
甘食下部生𤺋及日月食方
麝香 乾薑 𧖅蟲矢 葵莖灰

礬石各叁分燒 五月五日蝦蟆壹枚炙
右陸味擣篩爲粉以竹管吹下部入內三寸日再
又方
藋蘆壹兩 狼牙叁兩 橘皮 萹蓄 青葙各半兩
右伍味準前法用之
甘濕方
取乾羊矢一升以煖水三升漬之一宿絞取矢汁和末石
黛一顆內汁中溫之灌下部令藥停腹一食久病乃差
又急甘食鼻口數日盡欲死方
藍澱塗所食上令遍日十度夜四差止
又方 細末沒石子吹下部立差
又方 燒文蛤灰臘月豬脂和塗 又方 灌白馬尿一升
治痛𤺋方

細楸枝葉水煮稠可丸以竹筒内下部中甘蟲漏皆差煎

楸葉汁數洗之良

甘蟲月蝕濕䘌等方

臘月兎頭貳枚燒　五月五日蝦蟆壹枚燒　青黛壹兩

地黄葉灰大雞子　虎頭八分炙　具齒柒枚燒　小薊灰大雞子

右柒味爲散綿裹如棗核大内下部中亦筒吹半棗核大

成人者井華水旦服五分匕隔日一服

論曰凡患濕䘌蟲多是熱病後或久下不止或有客熱結在腹中或遇暑濕涼氣者多生此病病亦有燥䘌不甚泄痢而下部瘡癢不問燥濕久則殺人爲病診齒無色舌上盡白甚者滿口有瘡四肢沉重喜眠如此者此爲蟲蝕其肛肛爛盡見五藏即死矣治之方

黄連　生薑各拾兩　艾葉捌兩　苦參肆兩

右肆味㕮咀以水一斗煮取三升爲三服日三久者三劑良

凡濕䘌欲得冷而苦痢單煮黄連及艾葉苦參之屬皆可單用

懊憹散主濕䘌瘡爛殺蟲除熱方

雚蘆　青葙　女青　桃仁去皮尖熬

雷丸各參兩　萹蓄半兩

右陸味擣篩爲散粥飲服方寸匕日三稍增至貳匕酒服亦得

濕䘌神方

取生薑刮去上皮斷理切之擣極熟取汁壹升五合又以水壹升五合和合相得旦空腹服之仍刮生薑貳枚如指大以楸葉桃葉數重裹之煻火中燒之令極熟内下部須臾若濕盛者頻三日作之無有不差

陰蝕瘡方

蒲黄壹升　水銀壹兩

右貳味熟研令散以粉磨上五月六月七月食將忌肥濃慎之者即免此

又方

肥猪肉叁拾斤并得陰肉雜用益良以水貳石煮取熟訖去肉以湯汁内大盆中以自洗冷即易不過四遍

殺九蟲散主寒疝心痛及蟲齧心痛方

雚蘆　貫衆　乾漆熬各貳兩　狼牙壹兩

右肆味擣篩爲散以羊臛和服之壹合日叁貳日下蟲矣

治熱心中懊憹方

雚蘆貳兩半　乾漆熬　萹蓄各叁分

右叁味擣篩爲散粥飲服方寸匕日叁

治蟲痛方

熬乾漆末之蜜和圓如梧子飲服十圓日三

又方

燒槐木耳灰水服棗大差不止飲一盞熱湯立有蟲出

有人患心腹脹滿不能食飲至於死有人教取羊子肝搵蒜虀服之遂轉下五升如粉粥寸寸皆是蟲即差此人口中生瘡時人名曰乾甘以此療之得差百日内必不得食醬食醬即發常食蒜虀平旦服至日西即下其蟲須和調作不同尋常食虀也

腸痔第七　方二十六首　論一首

療痔方

臘月牛脾一具炙熟食之令盡即差

又方

牛脾一具熟煮空腹食之盡勿與鹽醬等一具不差更與

一具從旦至未令盡

療外痔方

麻子肆升擣生布袋盛飯下蒸之絞取脂銅盤盛㬉之以綿作貼子坐使正當蒸痔孔須叓易之更坐蟲出

又方

擣萹蓄絞取汁溲麪作餺飥空腹喫日三頓常食良

療痔方

桑耳切三升水一斗五斗煑取三斗旦服一斗日三日服一劑

又方

桑耳作羹臛調和令美空腹下飯取飽不過三頓差

又方

蝟皮一具熬 乾地黃伍兩 連翹子 槐子各叁兩 當歸

乾薑 附子炮 續斷 礬石燒 黃耆各壹兩

右壹拾味擣篩爲末錬蜜丸如梧子飲服十丸日二稍加至三十丸兼主漏

又方

取生槐白皮十兩熟擣丸如彈丸綿裹內下部中長喫萹蓄菜及煑汁作羹粥食之大佳

治下部癢痛純緣腫起內欲生肉突出方

大豆叁升水柒升急火煑取肆升 槐白皮切六升 甘草叁兩炙

右以大豆汁煑取二升漬故帛薄之冷則易之日三五

槐白皮膏主下部癢痛痔瘡方

槐白皮伍兩 赤小豆貳合 楝實 桃人各五拾枚 當歸叁兩

白芷 甘草各貳兩

右柒味以成煎猪膏一斤微火煎白芷色黃去滓摩病上

兼導下部中

療痔方

取故鑿由一枚燒作灰以井華水空腹服一分

又方　取地黃末傅下部日三夜一良

又方

乾薑　芫花　蜀椒（各壹兩半汗）　猪懸蹄（拾枚燒）

附子（叁枚炮）　芍藥　白薇　白歛　大黃

牡蠣（熬）　桂心（各半兩）　甘草（壹兩炙）

右壹拾貳味擣篩爲散酒服方寸匕日二

療痔下部出膿血有蟲傍生孔方

取槐白皮一檐以水煑令極熟出置木盆內坐其中欲大便狀蟲悉出冷復易之不過二三度

又方　煑槐根汁洗之

又方　煑桃根汁洗之

諸痔去血過多氣息惙惙不下食或腹痛牽引下部當歸湯

當歸　乾薑　桂心　甘草（各叁兩炙）　糖（捌兩）

牡丹　白芷　附子（炮）　芍藥　人參（各貳兩）

乾地黃（肆兩）

右壹拾壹味㕮咀以水壹斗煑取叁升貳合去滓內糖令消分爲肆服

諸大去血積日虛乏內補湯方

人參　續斷　白芷　芍藥　附子（炮）

當歸　甘草（各叁兩炙）　桂心　茯苓　乾薑

芎藭　乾地黃　五味子　麥門冬（去心各叁兩）

大棗（貳拾枚去核）

右壹拾伍味㕮咀以水壹斗煑取肆升分肆服

諸痔下血蒲黃湯方

蒲黃壹升 當歸 白芷 白石脂各叁兩

黃連 芎藭 乾地黃 甘草各貳兩炙

右八味㕮咀以水壹斗煮取叁升分叁服

諸痔去血大虛黃耆湯方

黃耆 當歸 芎藭各叁兩 龍骨壹兩 芍藥

桂心各肆兩 糖壹斤 附子炮去皮 甘草各貳兩炙

右九味㕮咀以水一斗煮取三升二合去滓入糖令消

分伍服

槐子圓主燥濕痔有雄雌者主之方

槐子 吳茱萸根皮 乾漆各肆兩熬 蒺藜叁兩

秦艽 黃芩 牡蠣熬 雷丸 白芷

龍骨 黃耆 桂心 丁香 青木香

八角附子炮去皮各貳兩

右壹拾伍味擣篩為末鍊蜜和丸如梧子飲服二十丸日

三服

小槐實圓主五痔十年方

槐子叁斤 白糖貳斤 礬石燒 硫黃各壹斤 龍骨

大黃 乾漆各拾兩熬

右柒味擣篩四味其礬石及糖並細切內銅器中一石米

下蒸之以綿絞取汁以和藥令作丸併手丸之如梧子陰

乾酒服二十丸日二稍增至三十丸

槐酒主五痔十年不差者方

槐東南枝細剉一石 槐白皮細剉一石 槐東南根細剉三石

槐子壹斗

右肆味以大釜中安十六斛水煮取五斛澄取清更煎取

壹石六斗炊兩斛黍米上麴二斗釀之攪令調封泥七日酒熟取清飲適性常令小小醉耳合時更煑滓取汁淘米洗器不得用生水作酒如此藥忌生水故也

主痔神方

七月七日多採槐子熟擣取汁重綿絞之内銅器中著中庭高門上暴乾之二十日以上煎成如鼠屎大内穀道中日三亦主瘻及百種瘡

又方

取三具鯉魚腸以火炙令香以綿裹之内穀道中一食頃蟲當出魚腸數數易之盡三枚便差

又方　炙魚腸令香坐上蟲即出

又方

虎頭骨炙　犀角末

右貳味各末之如雞子大以不中水猪膏和塗之

治痔方　取八月槐子擣取汁煎作丸塗之

又方　取熊膽塗之取差止但發即塗

又方

以紙裹小瓜以泥裹三四分煻火埋燒之令大熟經宿勿食使大飢開取承熱任意飽食之覆暖卧一炊久其痔差

五痔方

五月五日收蒼耳莖葉擣爲末水服方寸匕日三差採時陰乾

又方　燒羊角䚡末酒服方寸匕日三

又方　常服蒲黃方寸匕日三良

論曰凡人大便有血即是痔病勿得慢之慎乾棗油膩猪魚夫患痔在身所服名藥皆不得力徒弃功夫一無所益欲服

餌者當斷之乃可服也弟一槐子人丸大有效驗方在前篇中必須事之勿致疑也

治脫肛方

蒲黃貳兩

右壹味以猪肪和傅肛門上内之日二三愈

又方

腸出不入生栝樓取汁猪脂等分湯上温塗内之差

又方

以鐵精粉上内之每出即粉取差止

疥癬弟八 論一首 灸法一首 方三十四首

論曰瘑瘡疥癬之病皆有諸蟲若不速愈三年不差便為惡疾何者諸蟲族類極盛藥不能當所以須防之不可輕也凡療疥瘙黄耆酒中加烏蛇脯一尺烏頭附子茵芋石南莽草各等分大秦艽散中加之亦有大効小小疥瘙十六味小秦艽散亦相當 千金云小秦艽散中加烏蛇貳兩

香瀝主燥濕癬及瘑疥百瘡方

沈香 松節各壹斤 一方更有柏節松節各壹斤

右貳味破之如指大以布袋盛之令置麻油中半食久出取一口甆坩穿底令孔大如雞子以松葉一小把藉孔上以坩安著白盌上以黄土泥坩固濟令厚五分以藥内坩中以生炭著藥上使然其瀝當流入盌中然盡乃開出坩取汁以傅瘡上日再并治白秃疽惡瘡皆差當服小秦艽散即差

礬石瀝主乾濕癢及惡瘡白秃方

礬石 硫黄 芒消 大鹽各叁分 松脂陸合

白糖捌兩

右陸味切諸藥令如指大先取甀瓶仰銅器上内甀中以

藥安蔽上以松脂白糖布藥上都訖重以大蔽覆之炊五
升米藥汁流入器中其汁密覆之臨用小温塗瘡上日再

治癬秘方

擣羊蹄根分以白蜜和之刮瘡四邊令傷先以蜜和者傅
之如炊一石米頃拭去更以三年大酢和塗之以傅癬上
燥便差若刮瘡處不傷即不差

治久疥癬方

丹砂　雄黄　雌黄各壹兩　藺茹叁兩
松脂　白蠟各壹兩　巴豆拾肆枚去皮　猪膏貳斤　亂髮壹兩洗淨

右玖味先煎髮令消盡內松脂蠟等三上三下去滓末藺
茹石藥等內中更煎一沸止傅之三數度差

治久癬不差方

細研水銀霜如粉和臘月猪膏先以泔清洗瘡拭乾塗之
一塗即差後時重發更塗即永差妙塗時大須薄慎勿厚

又方

水銀　礬石燒　蛇床子　黄連

右肆味各壹兩臘月猪膏柒合和攪不見水銀爲熟傅之
治一切無問幼小諸瘡上方加漆頭藺茹壹兩

治諸瘡癬療不差方

水銀壹斤　猪膏臘月者伍斤

右貳味以鐵器中壘竈馬通火七日七夜勿住火炊之停
冷取猪膏去水銀不妨別用以膏塗一切諸瘡無不應手
即差

又方

牸牛尿壹升　羊蹄根切伍升

右貳味内羊蹄漬一宿日暴之乾則内尿中漬一宿尿盡

止擣作末塗諸瘡癬上和豬脂用更精

又方

諸瘙疥皆單用水銀豬膏研令極細塗之

又方　取生烏頭十枚切煑取汁洗之即差

治癬方

淨洗瘡取醬瓣尿和塗之差止

又方

水銀　蕪荑末

右貳味酥和塗之即差

又方

正日中午時灸病處影上三姓灸之呪曰癬中蟲毛茸茸

若欲療待日中

又方　取酥墨塗之

凡諸瘡癬初生時或始痛癢即以種種單方救之或嚼鹽塗之妙

又方　取鯉魚鮓糕塗之

又方　取薑黃塗之

又方　取牛李子塗之

治癬方

取黃蒿穗作末粉傳之日三夜二一切濕癬並差

又方

取八月八日日出時令病人正當東向戶長跪平舉兩手

持戶兩邊取肩頭小垂際骨解宛宛中灸之兩火俱下各

三壯若七壯十日愈

又方　擣刺薊汁服之

又方　服地黃汁佳　又方　服驢尿良

又方　燒蛇皮一具酒服良

又方　擣莨菪蜜和封之良

又方　熱搨煎餅不限多少日一遍薄之良

又方　酢煎艾塗之差

又方　擣羊蹄根和乳塗之

又方　大酢和雄黃粉先以新布拭之令癬傷傅之妙

治瘑疥百瘡經年不差方

楝實壹升　地榆根伍兩　桃皮伍兩　苦參伍兩

右肆味以水壹斗煑取伍升稍温洗之日一度

治瘑疥濕瘡浸淫日痛癢不可堪搔之黃水汁出差復發取羊蹄根勿令婦女小兒猫犬見之淨去土細切熟熬以大酢和淨洗傅瘡上一時間以冷水洗之日一傅凡方中用羊蹄根皆以日未出前採者佳

又方

作羊蹄根散癢時搔汁出以粉上又以生根揩之神驗

療渴利後發瘡坐處瘡疥及疵癬方

薔薇根叁兩　石龍芮叁兩　苦參貳兩　黃耆貳兩

黃連貳兩　芍藥叁兩　雀李根叁兩　黃蘗叁兩

黃芩叁兩　當歸壹兩　續斷壹兩　栝樓肆兩

大黃壹兩

一云薔薇飲服之

右壹拾叁味擣篩鍊蜜和以飲服之丸如梧子大一服十五九日三加至三十九瘡差乃止所是癰疽皆須服之釬

又方

赤小豆一升熬內酢中如此七遍　人參貳兩　甘草貳兩　瞿麥貳兩

白斂貳兩　當歸貳兩　黃芩貳兩　猪苓貳兩　防風壹兩

黃耆叁兩 薏苡仁叁兩 升麻肆兩

右壹拾貳味擣爲散飲服方寸匕日三夜一

治疥疽諸瘡方

水銀 胡粉各壹兩半 黃連貳兩 黃蘗柒分 礬石熬叁分

附子叁分 蛇床子兩半 苦參壹兩

右捌味下篩六種水銀胡粉別以猪脂研令水銀滅不見乃以猪膏合研令調如泥以傅瘡上日三夜一

代指第九 方六首

治代指逆腫方

以毛雜黃土作泥泥指上令厚五分內煻灰中令熱可忍之泥乾即易之不過數反即差

又方

單煑地榆作湯漬之半日便愈

治代指方

麻沸湯內指其中即愈

又方 先刺去膿炙鮓魚皮令溫以纏指周匝痛止愈

治指疼欲脫方

取猪脂和薑末稍令熱內指甲中食頃即差

治指掣痛方

取醬清和蜜任多少溫塗之即愈

濕熱瘡第十 方三十四首

治濕熱諸惡瘡方

狼牙伍兩 芍藥伍兩 大黃叁兩 白芷伍兩 黃蘗伍兩

丹參伍兩

右陸味切以水四升煑取一升半以洗之日三度

治濕熱瘡多汁粉散方

芎藭 大黃 白斂 芍藥 黃連

槐皮　龍骨各壹兩

右柒味擣篩爲散以粉瘡上日三度

又洗之方

茵芋叁兩　石南叁兩　莽草叁兩　蛇床子貳兩

躑躅貳兩　礬石貳兩

右陸味切以水壹斗煑取五升洗瘡日再

治惡瘡三年不差方

巴豆去皮　甘草

右貳味等分細下爲散先別煑甘草湯洗瘡訖以藥傅之

先從四面起向中心日三夜一

治惡瘡似火爛洗湯方

取白馬矢暴乾以水和煑十沸絞取汁洗之極佳

治惡瘡十年不差似癩者方

蛇脫皮壹枚

右壹味燒之末下篩以豬脂和傅之良

又方

苦瓠

右壹味㕮咀煑取汁洗瘡日三度洗煎以洗癬甚良須先

以泔清洗瘡也

治諸惡瘡烏頭膏方

烏頭　雄黃　雌黃　芎藭　升麻各半兩

杏仁貳柒枚　胡粉壹分　巴豆仁去皮柒枚　黃蘗半兩

亂髮如雞子大一枚　松脂如雞子大一枚　防己三分

黃連半兩

右壹拾叁味切以豬膏三升急煎令亂髮消盡去滓停小

冷以真珠二錢匕投中攪令相得以傅之凡用膏皆令先

溫酢泔清洗瘡拭乾乃傅之訖以赤石脂黃連散粉之此治諸惡瘡皆差

梔子湯 主表裏俱熱三焦熱實身體生瘡或發即大小便不利方

芒消貳兩 大黃肆兩 梔子仁二七枚擘 黃芩參兩

知母貳兩 甘草貳兩炙

右陸味㕮咀以水五升煮減半下大黃煮取一升八合絞去滓內芒消分爲三服

又方

礬石燒 蠟 松脂 亂髮

右肆味各半兩豬脂四兩煎之令髮焦內礬石令消內松脂次內蠟去滓先刮洗瘡以塗之日再三不痛久瘡時愈新瘡遲愈癢瘡頭禿皆即愈生髮此膏勝飛黃膏及諸名藥

治諸瘡久不差并療六畜方

棗膏參斤

右壹味以水參斗煮取壹斗伍升數洗取差爲度

治身瘡及頭瘡不止方

以昌蒲末傅之日三夜一

治濕熱瘡惡瘡洗湯方

槐子貳升 蛇床子壹兩 黃連伍兩 當歸 芍藥

黃蘗各參兩

右陸味切以水參斗煮取壹斗五升去滓以洗瘡日三度

治濕熱瘡方

生地榆貳斤

右壹味以水三斗煮取一斗五升以洗瘡日三度

烏膏主種種諸瘡治不愈方

水銀壹兩 黃連壹兩 經墨半兩

右叁味末之以不中水猪脂和傅之不過三四度愈神效欲多任人惟不治金瘡其藥惟須熟研

惡瘡黃水出流方

燒故鞍屜氈灰和臘月猪脂封塗

又方

藜蘆 巴豆

右貳味等分燒灰和臘月猪脂封塗

又方

松脂灰 薰陸香各伍分 生地黃汁伍合

白羊脂貳分 石鹽半兩 亂髮灰半兩

右六味以猪脂一升煎取五合内地黃汁煎成膏去滓貼之日再差止

治惡瘡瘑瘡方

杏仁去皮 巴豆去皮各貳兩 藜蘆 黃連各一兩 水銀壹錢許

右伍味以青羊脂和研水銀令滅先以塩湯洗之去上痂傅瘡日二

時氣病後得風生瘡疼癢搔之黃汁出方

皂莢炙 烏頭 礬石各叁兩 黃連壹升 牡蠣肆兩

藜蘆 桂心各壹兩陸銖

右柒味切以水壹斗煮取七升去滓先搔瘡令血出溫洗瘡緩浸良久佳

卒患發熱瘡方

取炭長二尺者二枚燒令赤置地中以水二升灌之取地上汁洗瘡即差

瘡中惡肉出方

取烏梅二七顆燒作灰傅瘡中其瘡中惡肉乃盡矣

治惡瘡方

取白及黃汁洗瘡訖傅膏膏用桑東向枝作末以臘月猪膏和傅之亦主狗瘡初大痛一宿即愈

瘡初患似節後破無痂疼痛難忍名曰猪啄瘡方

燒猪鼻作灰傅之差

反花瘡方

煎柳葉爲煎塗之差

又方

燒馬齒草灰傅之

又方

燒鹽末灰傅之

又方

以蜘蛛幕裹之

王不留行湯 主白禿及頭面久瘡去蟲止痛方

王不留行伍兩　桃東南枝伍兩　茱萸根皮伍兩

蛇床子叁升　牡荊叁升　苦竹葉切叁升　蒺藜叁升

大麻仁壹升

右捌味以水貳斗煮取一斗洗瘡日再并治疽及月蝕瘡爛

治白禿方

三月三日桃花開者陰乾　**柏子**　**赤桑根**

右叁味爲末猪脂和先以灰汁淨洗禿處拭乾塗之

又方

細柳枝壹兩　水銀　皂莢炙

右叁味以醋煎如餳塗之

松脂膏 主白禿及癰疽百瘡方

木蘭皮壹兩　礬石　杜衡　雄黃

附子　大黃　石南　秦艽

眞朱　苦參　水銀各貳兩　松脂陸兩

右壹拾貳味以酢漬一宿猪膏一斤半煎之候附子黃去滓乃内礬石雄黃水銀更著火煑三沸還濕地待凝以傅瘡差

又方

以牛肉作五味脯炙令香及熱搨瘡上不過三四度即差

治頭瘡腫方

燒杏仁令黑磨塗復取東柴葛蔓及乾魚頭燒灰和熏黃臘月猪脂塗之

千金翼方卷第二十四

千金翼方卷第二十五

色脉

診氣色法第一

夫爲醫者雖善於脉候而不知察於氣色者終爲未盡要妙也故曰上醫察色次醫聽聲下醫脉候是知人有盛衰其色先見於面部所以善爲醫者必須明於五色乃可決生死定狐疑故立候氣之法冠其篇首焉

肝受病色青　心受病色赤　脾受病色黄

肺受病色白　腎受病色黑皆先視本色

春面色青目色赤新病可療至夏愈

夏面色赤目色黄新病可療至季夏愈

季夏面色黄目色白新病可療至秋愈

秋面色白目色黑新病可療至冬愈

冬面色黑目色青新病可療至春愈
論曰此四時王相本色見故療之必愈夫五藏應五行若有病則因其時色見於面目亦猶灼龜於裏吉凶之兆形於表也
扁鵲云病人本色青欲如青玉之澤有光潤者佳面色不欲如青藍之色若面白目青是謂亂常以飲酒過多當風邪風入肺絡於膽膽氣妄泄故令目青雖云天救不可復生矣
病人本色赤欲如雞冠之澤有光潤者佳面色不欲赤如赭土若面赤目白憂恚思慮心氣內索面色反好急求棺槨不過十日死
病人本色黃欲如牛黃之澤有光潤者佳面色不欲黃如竈中黃土若面青目黃者五日死
病人著床心痛氣短脾竭內傷百日復愈欲起彷徨因坐於地其亡倚床能治此者是謂神良
病人本色白欲如璧玉之澤有光潤者佳面色不欲白如堊若面白目黑無復生理也此謂酣飲過度榮華已去血脈已盡雖遇岐伯無如之何
病人本色黑欲如重漆之澤有光潤者佳面色不欲黑如炭若面黑目白八日死腎氣內傷也
病人色青如翠羽者生青如草滋者死
赤如雞冠者生赤如衃血者死
黃如蟹腹者生黃如枳實者死
白如豕膏者生白如枯骨者死
黑如烏羽者生黑如炲煤者死
凡相五色面黃目青面黃目赤面黃目白面黃目黑皆不死
病人目無精光及齒黑者不治

病人面失精光如土色不飲食者四日死
病人及健人面色忽如馬肝望之如青近之如黑必卒死
論曰夫五色者五藏之華也故天晴明時覩萬物辨白黑審
長短若五色不分長短乖錯此爲錯亂故人亦然
黃帝問伯高曰察色知病何如伯高曰白色起於兩眉間薄
澤者病在皮膚唇色青黃赤黑者病在肉榮氣霈然者病在
血脉目色青黃赤白黑者病在筋耳焦枯受塵垢者病在骨
問曰病狀如是取之奈何伯高曰皮有部肉有柱氣血有輪
筋有結骨有屬經曰皮部在於四肢肉柱在於臂脛諸陽分
肉之間及少陰分肉之間氣血之輪在於諸經絡脉氣血留
居則盛而起筋部無陰陽左右唯疾之所在骨之屬骨空之
間所以受津液而益腦髓若取之者必須候病間甚者也間
者淺之少之甚者深之多之隨變而調之故曰上工經言知

一藏爲下工知二藏爲中工參而知之爲上工上工十全九
中工十全六下工十全三此之謂也
雷公問曰人有不病而卒死者何以知之黃帝曰大氣入於
藏府者不病而卒死矣
雷公問曰病少愈而卒死者何以知之黃帝曰赤色出於兩
顴上大如拇指者病雖少愈必卒死矣黑色出於顏貌大如
拇指者必卒死顏貌者面之首也顏齃兩目下也貌當兩目上眉下也
扁鵲曰察病氣色有赤白青黑四氣不問大小在人年上者
病也惟黃氣得愈年上在鼻上兩目間如下黑氣細如繩在
四墓發及兩顴骨上者死或冬三月遠期至壬癸日逢年衰
者不可理病者死四墓當兩眉坐直上至髮際左爲父墓右
爲母墓從口吻下極頤名爲下墓於此四墓上觀四時氣
春見青氣節盡死

夏見赤氣節盡死

夏秋見白氣節盡死

春見白氣至秋死

夏見白氣暴死黑氣至冬死

秋見赤氣節盡死冬至後甲子日死

冬見赤氣暴死見黃氣至長夏死

論曰凡病黃色入鼻從口入井竈一百日死井在鼻孔上曲中是竈在口吻兩傍上一寸是若入者丙丁日死

凡人死色易驗但看年上有黑色橫度者此人不出百日死

若天中從髮際兩墓皆發黑色此人三年死天中當鼻直上至髮際是也若顴骨上發黑色應之者二百日死

日下有黑色橫度年上者不出三十日死黑色入口應天中者不出一年死

若天中發死色年上命門上並黃色者未好半惡也以天中爲主五年内死天中發黑色法三年内死所以然者有二處得主故五年死

凡天中發黑色兩顴上發赤色應之若不出六十日兵死若年上發赤色應之者不出三十日死若命門上發赤色應之者不出百日市死婦人産死兵死同氣從命門入耳年上死赤色從眉衝下入目五日死或丙丁日死

黑色在左右眉上一日死或壬癸日死

若白色亦死或庚辛日或二三日死

赤色入口三日死遠期丙丁日死

黑色從天中及年上入目三日死或壬癸日死或二三日死或百日半年死

青色如鍼在目下春死或甲乙日死
黃色入目匝四邊戊己日死
黑色準上行或入目期壬癸日死遠期二十日死若入耳鼻三日死(準上者當鼻上也所謂在壽上年上下降接相次)
黃色橫兩顴入鼻一年死
黑色如拇指在眉上不出一年暴死一云三年
赤色如馬黑色如烏見面死(在口傍左右也右名馬左名鼬)
黑色從眉繞目死
赤色在口兩傍死
黑色如深漆繞口或白色皆死
黃帝問扁鵲曰人久有病何以別生死願聞其要對曰按明堂察色有十部之氣知在何部察四時五行王相觀其勝負之變色入門戶為凶不入為吉白色見衝眉上者肺有病入闕庭者夏死黃色見鼻上者脾有病入口者春夏死青色見人中者肝有病入目者秋死黑色見顴上者腎有病入耳者六月死赤色見頤者心有病入口者冬死所謂門戶者闕庭肺門戶目肝門戶耳腎門戶口心脾門戶若有色氣入者皆死黃帝曰善

問曰病而輒死甚可傷也寧可拯乎對曰藏實則府虛府實則藏虛以明堂視面色以針補寫調之百病即愈鼻孔呼吸氣有出入出為陽入為陰陽為府陰為藏陽為衛陰為榮故曰人一日一夜一萬三千五百息脉行五十周於其身漏下二刻榮衛之氣行度亦周身也

夫面青者虛虛者實之補虛寫實神歸其室補實寫虛神捨其墟衆邪並進大命不居黃帝曰善

五實(未見)

六虛者皮虛則熱脉虛則驚肉虛則重骨虛則痛腸虛則洩溏髓虛則墮

仲景曰鼻頭色青者腹中冷若痛者死鼻頭色微黑者有水氣色白者無血色黃者胷上有寒色赤者爲風色青者爲痛色鮮明者有留飲

又仲景曰病人語聲寂然喜驚呼者骨節間病言聲喑喑然不徹者心膈間病言聲啾啾細而長者頭中病一作痛

診脉大意第二

問曰手足三陰三陽十二經皆有動脉而獨取寸口者何也扁鵲曰晝夜漏水下百刻凡一刻一百三十五息十刻一千三百五十息百刻一萬三千五百息脉行五十度周於身漏下一百刻榮衛行陽二十五度行陰二十五度合五十度爲一周而復會於手太陰手太陰者寸口也寸口者五藏六府氣血之所終始故法取於寸口也脉有尺寸者從關至尺是尺內陰之所治從關至魚際是寸內陽之所治寸口位八分關上位三分尺中位八分合三部一寸九分寸口關上爲陽陽脉常浮而速尺中爲陰陰脉常沈而遲初持脉如三菽之重與皮毛相得者肺脉也如六菽之重與血脉相得者心脉也如九菽之重與肌肉相得者脾脉也如十二菽之重與筋平者肝脉也按之至骨舉指來疾者腎脉也

凡診脉當視其人大小長短及性氣緩急稱其形性則吉與本性相乖則凶何則人大而脉細人細而脉大人樂而脉實人苦而脉虛性急而脉緩性緩而脉躁人壯而脉細人羸而脉大此皆爲逆逆則難治反此爲順順則易治

凡婦人脉常欲濡弱於丈夫也小兒四五歲者脉自疾駃呼吸八至也

凡春脉細弦而長夏脉洪浮而長來疾而去遲

秋脉微浮而散冬脉沈滑而實季夏脉洪而遲

凡心肺二脉大率俱浮何以別之浮而大者心也浮而短者肺也凡肝腎二脉俱沈何以別之牢而長者肝也按之濡舉指來實者腎也遲緩而長者脾也

夫人受氣於穀穀入於胃乃傳於五藏六腑五藏六腑皆受氣於胃其清者爲榮濁者爲衛榮行脉內衛行脉外陰陽相貫如環之無端故曰胃爲水穀腑主稟四方皆以胃氣爲本也

凡人病脉不病名曰內虛脉病人不病名曰行尸死不治

夫平和之脉不緩不急不澀不滑不存不亡不長不短不低不昂不縱不横此爲平也無病尺欲小大關欲小實老人脉欲微陽羸於陰者平也

夫按之不足舉之有餘名曰浮浮陽也

按之去來促急名曰數數陽也

按之如琴瑟絃三關通病梗梗無有屈撓名曰弦弦陽也（王脉經爲陰）

按之如動珠子名曰滑滑陽也

按之實強其脉有似沈伏名曰牢牢陽也

按之浮大在指下而滿名曰洪洪陽也

按之洪大牢強隱指名曰實實陽也

脉見於關上無頭尾大如豆厥厥搖名曰動動陽也

右件八條皆陽脉也

按之有餘舉之不足名曰沈沈陰也

按之無舉之來兩傍實而中央空名曰芤芤陰也

按之遲小名曰細細陰也

按之短實而數有似切繩狀名曰緊緊陰也
按之依依名曰緩緩陰也
按之大而遲名曰虛虛陰也
按之短小不至動搖若有若無或復浮薄而細急輕手乃得
重手不得名曰微微陰也
按之乃得舉之無有濡而細名曰弱弱陰也
按之盡牢舉之無有不前不却但出不入如魚之接食動中
名曰遲遲陰也
按之無有舉之有餘或如帛衣在水中輕手與肌肉相得而
軟名曰濡濡陰也
按之促數浮短如刮竹皮輕手乃得重手不離其處或多入
而少出名曰澀澀陰也
按之來數時一止名曰促促陰也

脉來動而中止按之小數中能還者舉指則動名曰結結陰
也不死
脉動而止不能自還因而復動名曰代代陰也代者死
右件一十四條皆陰脉也
脉有相薄者寸口微而尺中弦此爲相薄也或但寸口微而
弦亦爲相薄也
沈與伏相類　濡與弱相類　弦與緊相類
浮與芤相類　牢與實相類　微與澀相類
遲與緩相類　滑與數相類
凡脉出爲陽入爲陰來往之間爲脾大陰也
凡脉浮滑長皆爲陽沈澀短皆爲陰也
脉有一陰一陽者脉來沈而滑也一陰二陽者脉來沈滑而
長也一陰三陽者脉來浮滑而長時一沈也一陽一陰者

脉來浮而澀也一陽二陰者脉來長而沈澀也一陽三陰
者脉來沈澀而短時一浮也
脉有伏匿者謂陰陽更相乘伏也若脉居陰部反陽脉見爲
陽乘陰也雖陽脉時沈澀而短者此爲陽中伏陰也脉居
陽部反陰脉見爲陰乘陽也雖陰脉時浮滑而長者此爲
陰中伏陽也故重陰者癲重陽者狂
脉有太過有不及有陰陽相乘有覆有溢有關有格關之前
者陽之動也脉當見九分而浮過者謂之太過減者謂之
不及遂上魚爲溢爲外關内格此陰乘之脉關之後者陰
之動也脉當見一寸而沈過者謂之太過減者謂之不及
遂入尺爲覆爲内關外格此陽乘之脉是眞藏之見也得
此諸脉人不病自死寸脉下不至關爲陽絶尺脉上不至
關爲陰絶此皆死不治欲决死生當以月節期之

脉有相乘有縱有橫有逆有順何以知之水行乘火金行乘
木名曰縱火行乘水木行乘金名曰橫水行乘金火行乘
木名曰逆金行乘水木行乘火名曰順也
夫欲知人病將愈當診其三部之脉大小遲疾浮沈正等雖
有寒熱不解然陰陽已平知當愈也
夫病者發熱身體疼痛此爲表有病其脉當浮大今脉反沈
遲故知當愈病卒腹中急痛此爲裏有病其脉當沈細今
脉反浮大故知當愈然此二脉其人不即愈者必當死以
其病與脉相反也
夫脉者血之府也長則氣治短則氣病數則煩心大則病進
上盛則氣高下盛則氣脹代則氣衰細則氣少短而急者
病在上長而緩者病在下弦而沈者病在内浮而洪者病
在外脉實者病在内脉虚者病在外滑而微浮病在肺下

堅上虛病在脾胃長而弦者病在肝脉小血少病在心大
而緊者病在腎
凡脉腑爲陽主熱臟爲陰主寒陽微自汗陰浮自下陽數即
口瘡陰數即惡寒陽數出血陰澀下血脉與肌肉相得久
持之至者可下之
失脉有三部陰陽相乘榮衛氣血任人體躬呼吸出入上下
於中因息遊布津液流通隨時動作傚象形容春弦秋浮冬
沈夏洪察色觀脉大小不同一時之間變無經常尺寸參差
或短或長上下乖錯或存或亡病輒改易進退低昂心迷意
惑動失紀綱願爲其陳令得分明師曰子之所問道之根源
脉有三部尺寸及關榮衛流行不失衡銓腎沈心洪肺浮肝
弦此自經常不失銖分出入昇降漏刻周旋水下百刻一周
循環當復寸口虛實見焉變化相乘陰陽相干風則浮虛寒
則牢堅沈潛水畜支飲急弦動即爲痛數即熱煩設有不應
知有所緣三部不同病各異端太過可怪不及亦然邪不空
見終必有奸審察表裏三焦別焉知其所舍消息診看料度
臟腑獨見若神爲子條記傳與賢人
凡療病當察其形氣色澤脉之盛衰病之新故乃可療之形
氣相得色澤以浮脉順四時此爲易治形氣相失色夭不
澤脉實堅甚脉逆四時此爲難療
夫形盛脉細少氣不足以息者危形瘦脉大胷中氣多者死
形氣相得者生參伍不調者病
夫關前爲陽關後爲陰陽出陰入以關爲界陽數則吐陰數
則下陽弦頭痛陰弦腹痛
診四時脉第三
春肝木王其脉弦細而長者平脉也反得微浮而短澀者是

肺之乘肝金之剋木爲賊邪大逆十死不治反得浮大而洪者是心之乘肝子之乘母爲實邪不治自愈反得沈濡而滑者是腎之乘肝母之歸子爲虛邪雖病自愈反得大而緩者是脾之乘肝土之畏木爲微邪雖病不死

夏心火王其脉浮大而洪者是平脉也反得沈濡而滑者是腎之乘心水之剋火爲賊邪大逆十死不治反得大而緩者是脾之乘心子之乘母爲實邪不治自愈反得弦細而長者是肝之乘心母之歸子爲虛邪雖病當愈反得微浮而短濇者是肺之乘心金之畏火爲微邪雖病不死

季夏六月脾土王脉大穠穠而緩者爲平脉也反得弦細而長者是肝之乘脾木之剋土爲賊邪大逆十死不治反得微浮而短濇是肺之乘脾子之乘母爲實邪不治自愈反得浮大而洪者是心之乘脾母之歸子爲虛邪雖病自愈反得沈濡而滑者是腎之乘脾水之畏土爲微邪雖病不死

凡脾脉王則不見衰時即見

秋脉金王其脉微浮而短濇者是平脉也反得浮大而洪者是心之乘肺火之剋金爲賊邪大逆十死不治反得沈濡而滑者是腎之乘肺子之乘母爲實邪不治自愈反得大而緩者是脾之乘肺母之歸子爲虛邪雖病自愈反得弦細而長者是肝之乘肺木之畏金爲微邪雖病不死

冬腎水王其脉沈濡而滑者是平脉也反得大而緩者是脾之乘腎土之剋水爲賊邪大逆十死不治反得弦細而長者是肝之乘腎子之乘母爲實邪不治自愈反得微浮而短濇者是肺之乘腎母之歸子爲虛邪雖病自愈反得浮大而洪者是心之乘腎火之畏水爲微邪雖病不死

診寸口脉第四

寸口緊者中風風頭痛亦爲傷寒頭痛

寸口沈而横者脅下有積腹中有横積痛

寸口浮大而實宿食不消浮滑亦然

寸口沈而緊寒結在心下痛（千金云沈而緊苦心下有寒時時痛有積邪）

寸口沈滑胷中有水氣面目腫有微熱名爲風水

寸口沈而弱寒熱疝瘕少腹痛

寸口微而弱氣血俱虛男子吐血婦人下血嘔汁出

寸口弱而弦胷中脅下腰背並痛

寸口雙弦脅下拘急而痛濇濇而寒

寸口弦緊而細痛在心下

寸口洪而大傷寒熱病兼胷脅下滿痛

寸口細沈滑者有積聚在脅下左右皆滿背相引痛

寸口細而數數即發熱細即反吐

寸口緩而數者中風

寸口沈而喘則寒熱

寸口盛而緊者傷於食也

寸口急疝瘕少腹痛

寸口浮大而疾者名曰陽中之陽病苦煩滿身熱頭痛腹中熱

寸口沈細者名曰陽中之陰病苦悲傷不樂惡聞人聲少氣時汗出陰氣不通臂不能舉

寸口脉壯大尺中無有此爲陽干陰病苦腰背痛陰中傷足脛寒

寸口偏絶者則臂偏不用其人兩手俱絶者不治

寸口脉弱而遲弱即衛氣微遲即榮中寒榮爲血血寒即發

熱衛為氣氣微即心中飢飢而虛滿不能食

寸口脉弱而緩弱則陽氣不足緩即胃氣有餘噫而吞酸食卒不下氣填於膈上（一作下）

寸口脉微而弱微即無氣弱即血不足血不足即不能呼氣不足則不能吸呼吸不足則胷滿短氣

寸口脉微而濇微即衛氣不行濇即榮氣不逮榮衛不能相將三焦無所仰身體痺不仁榮氣不足即疼而煩滿口即難言衛氣虛即惡寒而數欠

寸口脉微而濇微即衛氣衰濇即榮氣不足衛衰其色黃榮不足其色青榮為根衛為葉榮衛俱微即根葉枯槁而寒慄欬逆唾腥吐涎沫

寸口脉微而緩微即衛氣䟽䟽即其膚空緩即胃氣足足即穀消而水化穀入於胃脉道乃行水入於經其血乃成榮盛則其膚必踈三焦絕經名曰血崩

寸口脉微而數微即為風數即為熱微為風風即汗出數為熱振而寒慄

寸口脉微而遲尺脉沈即為血滑即為實血實內結入絡胷臆肺痿色薄不能喘息而心堅脫色口不能言肝舉筋厥四逆不識人

寸口脉微而濡濡即為弱微即為寒濡即惡寒弱即發熱濡即厥逆微濡相薄即為煩其氣在心

寸口脉微尺中緊其人虛損多汗知陰常在絕不見陽

寸口諸微為無陽諸濡為無血諸弱為發熱諸緊為寒微濡為血不足

診關上脉第五

關上浮而數胃中熱

關上浮大風在胃中腹脹急心下澹澹然羸瘦不能食千金云關上浮大風有胃中張口肩息心下澹澹食欲嘔

關上細微而絕者腹中癖少氣不能食

關上微而芤唾血亦吐血

關上弦緊而細癥在胃管

關上緊而滑者蛔蟲動

關上微浮積熱在胃中

關上滑而大小不均是爲病方欲來不出一二日內復欲發動其人欲多飲飲即注痢如痢止者生不止者死

關上弦大有痛在臍左右上下脉經云關脉弦長者積在臍左右上下

診尺中脉第六

尺中緊數而弦下痢病

尺中浮數小便不利尿黃

尺中微而滑帶下病

尺中微而芤尿血

尺中弦而細癥在臍下

尺中細而急筋攣疼痺不能行

尺中細而滑婦人欲産

尺中虛小者足脛痠寒痺脚疼

尺中虛者漏血小便不禁

尺中沉細者名曰陰中之陰病苦兩脚疼酸不能久立陰氣衰小便有餘瀝陰下濕痒

尺脉滑而浮大者名曰陰中之陽病苦少腹痛滿不能尿尿則陰中痛大便亦熱

尺中牢長關上無有此爲陰干陽病苦兩脛重少腹引腰痛

尺寸俱數有熱俱遲有寒

尺寸俱濡發熱汗出

尺寸俱浮直下此爲督脉腰背強痛不得俛仰大人癲病小兒風癇

尺寸俱微血氣不足其人短氣

尺寸俱牢直上直下此爲衝脉胷中有寒疝

診雜病脉第七

熱病大汗後脉不安靜者死

熱病脉盛大而駛不得汗此熱發也

寒熱瘈瘲脉絶代者死

熱病未得汗脉盛大者生細小者死

熱病多汗脉虛小者生緊實者死

熱病得汗脉常喘而熱不退者死

汗出而衄其脉小滑者生大躁者死（一云微細爲難治）

傷寒脉浮而洪大者易治譫言妄語身熱脉洪大者生沈細而微手足四逆者死

欬而尿血羸瘦脉大者死

欬且羸瘦脉堅大者死

上氣注液脉虛慢伏匿者生牢弦者死

寒疰上氣脉虛濡者生牢急而疾者死

上氣喘息脉滑手足溫者生澀而四肢寒者死

上氣喘息脉滑者生大而駛者死

上氣而浮腫肩息脉浮大者死

唾血脉沈弱者生（一云緊強者死滑者生）

吐血脉牢實者死

吐血鼻衄脉沈細者生浮大而牢者死

中惡腹大脉緊實細者生浮大者死

金瘡出血不斷脉大而止者七日死
金瘡出血太多脉虗細者生大數者死
金瘡所傷在陽處者去血四五升脉弱微緩而遲者生急疾者死
人被笞榜內有結血脉實大者生虗小者死
從高墮下及金瘡內有瘀血腹脹脉牢大者生沈細者死
心腹痛脉沈細者生浮大而長者死
腹脹脉浮者生虗小者死
下痢脉微細者生浮大者死
下痢脉代絶者不死
腸澼便膿血脉沈細虗遲者生疾大而有熱者死
腸澼下白沫脉沈者生浮者死
腸澼下赤白脉細微而遲身體溫暖可治
腸澼其脉滑者生浮者死懸絶者死
洩痢脉緩時小結者生浮大而數者死
洞洩或去膿血食不化者脉微小者生實急者死
洩痢脉細微而濇者生緊大而滑者死
洩痢寸關脉不見尺中時一見此腎氣見爲難治
下痢脉絶手足寒晬時脉還手足溫者生脉不還不溫者死
霍亂脉大可治微細難治
霍亂吐下脉微遲氣息劣口不欲言者不治
病手足厥逆脉當沈細而濇反得堅大而滑者死
水病脉洪大者生微細者死
消渴脉數大者生細小浮短者死
卒中風四肢不收脣口僻語言不正脉浮遲者生癲病卒忤脉堅弦實大者生虗伏濡小者死

癲狂恍惚脉實牢者生沉細者死
中風口噤不能言四肢不收其脉浮遲者生實大數急者死
病風痺不仁痿厥脉虛數者生牢急者死
目䀮䀮脉大緩者死
閉目不欲見人脉得肝脉者生反得肺脉者死
耳聾脉大者生沉遲細者難治
堅積泄痢脉微細者生浮者死
頭痛脉短澀者死浮滑者生
中毒藥陽脉洪大而速者生微細者死(脉經速作遲)
暴病脉微細者生大急洪直者死
大人得小人脉者死
脉但出不能入者死
將死之脉如羣鳥之聚一馬之馭系不交緊(一作馳)之狀如懸石之落出筋之上藏筋之下堅關之裏不在榮衛伺候交射不可知也
困病脉如蝦之游如魚之翔者死蝦游者冉冉而起尋復退没不知所在久而復起起輒遲而没去甚速是也魚翔者似魚不行而但掉尾動身其動疏而住久是也
脉病人不病脉如屋漏雀啄者死屋漏者其脉既絶而止時復一起不相連屬也雀啄者脉來甚數而急疾絶止久已復頓來
脉來如彈石去如解索者死彈石脉辟辟急也解索脉動數而隨散亂無次緒也
脉來涌涌不去者死
脉如轉豆者死
脉如偃刀者死

脉怒來忽去暫止復來者死

脉中移者死

脉久絶者死

脉有表無裏者死

婦人尺脉按之不絶者胎也

産後寸口焱疾不調者死沈微附骨不絶者生新産後渇熱病脉細而四肢冷者死

三部脉沈浮正等不斷絶者有娠也

妊娠脉滑疾重手按之不散者胎已三月也但疾不滑者五月也妊娠七八月脉實大牢强弦緊者生沈細者死欲産者其脉細而滑也

婦人欲産其脉離經者曰生也

新産脉小緩滑者生實大弦急者死

已産脉沈虚小者生實牢堅者死

婦人月經不通脉絶小實者生浮虚者死

婦人脉寸關調如故而尺脉絶不至者月經不利當患少腹引腰絞痛氣積聚上叉胷脅也

漏下赤白脉急疾者死遲滑者生

婦人脉尺寸俱微弱則絶子不産也

小兒脉沈者乳不消也

小兒絃急者客忤氣也

凡按人脉五十至而不止者五藏皆受氣足吉也四十動而一止一藏無氣四歲死三十動而一止者二藏無氣三歲死二十動而一止者三藏無氣二歲死一十動而一止者四藏無氣歲中死

凡脉一動一止或三動一止或十動一止投數無常此死脉

也命雖未盡正當小引日月耳
凡脉一呼再至一吸再至呼吸定息其脉五至不大不小爲平若一呼三至一吸三至始爲得病也
夫脉前大後小則爲頭痛目眩前小後大則爲胷滿短氣
問曰何謂損至荅曰脉有損至謂一呼再至曰平三至曰離經四至曰奪精五至曰死六至曰命絕此謂至脉也一呼一至曰離經二呼一至曰奪精三呼一至曰死四呼一至曰命絕此謂損脉也至脉從下上也損脉從上下也損脉之爲病也一損損於皮毛皮聚而毛落二損損於血脉血脉虛少不能榮於五藏三損損於肌肉肌肉消瘦飲食不爲肌膚四損損於筋筋緩不能自扶持五損損於骨骨痿不能起於床反此者至於收病從上下者骨痿不能起於床者死從下上者皮聚而毛落者死

損其肺者益其氣損其心者調其榮衛損其脾者調其飲食適其寒溫損其肝者緩其中損其腎者益其精氣也
凡脉一息再至爲平無病也一息三至名離經離失也經常也其人榮衞已虧將欲病也
一息四至爲奪精其人已病也一息五至爲絕命有大有小爲難治一息六至爲將滅一息七至爲命盡一息八至爲無魂一息九至爲無魄一息十至爲今死
一息一至其人雖行當着床其人血脉已病諸氣皆不足也二息一至爲危三息一至爲困四息一至爲行尸將死五息一至爲定死

千金翼方卷第二十六

針灸上

取孔穴法第一

論曰安康公李襲興稱武德中出鎮潞州屬隨徵士甄權以新撰明堂示余余既暗昧未之奇也時有深州刺史成君綽忽患頸腫如數升喉中閉塞水粒不下已三日矣以狀告余余屈權救之針其右手次指之端如食頃氣息即通明日飲噉如故爾後縉紳之士多寫權圖略遍華裔正觀中入爲少府奉勅修明堂與承務郎司馬德逸太醫令謝季卿太常丞甄立言等校定經圖於後以所作呈示甄權曰人有七尺之軀藏腑包其內皮膚絡其外非有聖智孰能辨之者乎吾十有八而志學於醫今年過百歲研綜經方推究孔穴所疑更多矣竊聞尋古人伊尹湯液依用炎農本草扁鵲針灸一準

黄帝雷公問難歎慇懃對揚周密上聖久遠愚人無知道聽塗說多有穿鑿起自胷臆至如王遺烏銜之法單行淺近雖得其効偶然即謂神妙且事不師古遠涉必泥夫欲行針者必准軒轅正經用藥者須依神農本草自餘名醫別録益多誤耳余退以甲乙校秦承祖圖有旁庭藏會等一十九穴按六百四十九穴有目無名其角孫景風一十七穴三部針經具存焉然其圖闕漏仍有四十九穴上下倒錯前後易處不合本經所謂失之毫氂差之千里也至如石門關元二穴在帶脉下相去一寸之間針關元主婦人無子針石門則終身絶嗣神庭一穴在於額上刺之主發狂灸之則愈癲疾其道幽隱豈可輕侮之哉人誠知惜命罕通經方抄寫方書專委下吏承誤即録紕繆轉多近智之徒不見正本逢爲經鈔以此而言可爲深誡今所述針灸孔穴一依甄公明堂圖爲定學者可細詳之且夫當今醫者各承一業未能綜練衆方所以救疾多不全濟何哉或有偏功針刺或有偏解灸方或有惟行藥餌或有專於禁呪故以綱羅諸疾有愈於是慨其如此聊以養疾之暇撰録灸經以貽後嗣其於條例具之醫者意也善於用意即爲良醫良醫之道必先診脉處方次即針灸内外相扶病必當愈何則湯藥攻其内針灸攻其外不能如此雖時愈疾兹爲偶差非醫差也又以孔穴難諳非圖莫可雖復經本具述自非碩學之士造次未可卒知所以先述取穴方法云爾

仰人面二十六穴第一

神庭在髮際直鼻不刺一云入髮際分

曲差夾神庭一寸半在髮際

攢竹在眉頭陷中

睛明在目內眥
迎香在禾窌上鼻下孔傍（一云在禾窌上一寸）
素窌在鼻柱端
水溝在鼻柱下人中
兌端在脣上端
齗交在脣內齒上齗縫
本神在曲差傍一寸半
陽白在眉上一寸直瞳子
承泣在目下七分直瞳子不灸
四白在目下一寸
巨窌夾鼻傍八分直瞳子
禾窌直鼻孔下夾水溝傍五分
地倉夾口傍四分（一云在口角一韭葉近下動脉）

承漿在頤前下脣之下
廉泉在頷下結喉上舌本
頭維在額角髮本神傍一寸半不灸
上關在耳前上廉起骨開口取之
下關在客主人下耳前動脉下空下廉合口有穴張口則閉
頰車在耳下曲頰端陷中
大迎在曲頷前一寸二分骨陷中動脉
絲竹空在眉後陷中不灸
瞳子窌在目外去眥五分
顴窌在面鼽骨下下廉陷中
○頭上第一行九穴第二
上星在顱上直鼻中央入髮際一寸陷容豆
顖會在上星後一寸陷中

前頂在顖會後一寸半骨陷中
百會在前頂後一寸半頂中心
後頂在百會後一寸半枕骨上
強間在後頂後一寸半腦户前一寸半
腦户在枕骨上強間後一寸半不灸
風府入髮際一寸大筋内宛宛中不灸（一云在瘖門上一寸）
瘖門在項後髮際宛宛中不灸（三壯一云在腦户下又名瘂門）
○頭上第二行六穴第三
五處在頭上去上星一寸半
承光在五處後一寸不灸（一云一寸半）
通天在承光後一寸半
絡却在通天後一寸半
玉枕在絡却後七分半夾腦户傍一寸三分起肉枕骨上入髮際三寸
天柱夾項後髮際大筋外廉陷中
○頭上第三行六穴第四
臨泣當目上眥直入髮際五分陷中
目窻在臨泣後一寸
正營在目窻後一寸
承靈在正營後一寸
腦空在承靈後一寸半夾玉枕骨下陷中
風池在顳顬後髮際陷中
○伏人耳後六穴第五
顱息在耳後青脉間
瘈脉在耳本雞足青脉不灸
完骨在耳後入髮際四分

竅陰在完骨上枕骨下
翳風在耳後陷中按之引耳中
浮白在耳後入髮際一寸此穴在翳風前竅陰後寫時請爲用心看
○伏人脊中第一行十一穴第六
大椎在第一椎上陷中
陶道在大椎下節間
身柱在第三椎下節間
神道在第五椎下節間
至陽在第七椎下節間
筋縮在第九椎下節間
脊中在第十一椎下節間不灸
懸樞在第十三椎下節間
命門在第十四椎下節間

腰俞在第二十一椎下節間
長強在脊骶端

○伏人脊中第二行二十一穴第七
大杼在項第一椎下兩傍各一寸半陷中
風門熱府在第二椎下兩傍各一寸半
肺俞在第三椎下兩傍各一寸半
心俞在第五椎下兩傍各一寸半
膈俞在第七椎下兩傍各一寸半
肝俞在第九椎下兩傍各一寸半
膽俞在第十椎下兩傍各一寸半
脾俞在第十一椎下兩傍各一寸半
胃俞在第十二椎下兩傍各一寸半
三焦俞在第十三椎下兩傍各一寸半

腎俞在第十四椎下兩傍各一寸半
大腸俞在第十六椎下兩傍各一寸半
小腸俞在第十八椎下兩傍各一寸半
膀胱俞在第十九椎下兩傍各一寸半
中膂俞在第二十椎下兩傍各一寸半
白環俞在第二十一椎下兩傍各一寸半
上窌在第一空腰果下一寸夾脊陷中
次窌在第二空夾脊陷中
中窌在第三空夾脊陷中
下窌在第四空夾脊陷中
會陽在陰尾骨兩傍

○伏人脊中第三行十三穴第八

附分在第二椎下附項内廉兩傍各三寸
魄戶在第三椎下兩傍各三寸
神堂在第五椎下兩傍各三寸
譩譆在肩髆内廉夾第六椎下兩傍各三寸
膈關在第七椎下兩傍各三寸
魂門在第九椎下兩傍各三寸
陽綱在第十椎下兩傍各三寸
意舍在第十一椎下兩傍各三寸
胃倉在第十二椎下兩傍各三寸
肓門在第十三椎下兩傍各三寸
志室在第十四椎下兩傍各三寸
胞肓在第十九椎下兩傍各三寸
秩邊在第二十一椎下兩傍各三寸

○側人耳頸二十穴第九

頷厭在曲周顳顬上廉
懸顱在曲周顳顬中
懸釐在曲周顳顬下廉
天衝在耳上如前三寸
曲鬢在耳上髮際曲隅陷中
角孫在耳郭中間上開口有穴
率谷在耳上入髮際一寸半
和髎在耳前兊髮下動脉
耳門在耳前起肉當耳缺
聽會在耳前陷中張口得之
天容在耳下頰後
聽宮在耳中珠子大如赤小豆
天牖在頸筋缺盆天容後天柱前完骨下髮際上（一云在風池上一寸）

缺盆在肩上横骨陷中
天鼎在頸缺盆直扶突氣舍後一寸半
天窻在曲頰下扶突後動應手陷中
扶突在曲頰下一寸人迎後
人迎在頸大筋脉動應手夾結喉旁以候五藏氣不灸
水突在頸大筋前直人迎下氣舍上
氣舍在頸直人迎夾天突陷中

○側脅十穴第十

章門一名長平在大横外直臍季肋端
京門在監骨腰中季肋本夾脊
帶脉在季肋下一寸八分
五樞在帶脉下三寸（一云在水道下一寸半）
維道在章門下五寸三分

居窌在長平下八寸三分監骨上
泉腋在腋下三寸宛宛中舉臂取之
大包在泉腋下三寸
輒筋在腋下三寸復前行一寸著脅
天池在乳後一寸腋下三寸著脅直腋撅肋間

○胷部中央直下第一行七穴第十一

天突在頸結喉下五寸中央宛宛中
琁璣在天突下一寸陷中仰頭取之
華蓋在琁璣下一寸陷中仰而取之
紫宮在華蓋下一寸六分陷中仰而取之
玉堂在紫宮下一寸六分陷中
亶中在玉堂下一寸六分直兩乳間陷中
中庭在亶中下一寸六分陷中

○胷部第二行六穴第十二

俞府在巨骨下去琁璣傍各二寸陷中仰卧取之
或中在俞府下一寸六分陷中仰卧取之
神藏在或中下一寸六分陷中仰卧取之
靈墟在神藏下一寸六分陷中仰而取之
神封在靈墟下一寸六分
步郎在神封下一寸六分陷中仰而取之

○胷部第三行六穴第十三

氣户在巨骨夾俞府兩傍各二寸陷中
庫房在氣户下一寸六分陷中
屋翳在庫房下一寸六分陷中
膺窻在屋翳下一寸六分
乳中不灸刺

乳根在乳下一寸六分陷中

○胷部第四行六穴第十四

門在巨骨下氣户兩傍各二寸陷中動脉應手舉臂取之

中府在雲門下一寸乳上三肋閒動脉應手陷中

周榮在中府下一寸六分陷中

胷鄉在周榮下一寸六分陷中

天谿在胷鄉下一寸六分陷中

食竇在天谿下一寸六分陷中舉臂取之

○腹中央第一行十四穴第十五

鳩尾在臆前蔽骨下五分不灸刺

巨闕在鳩尾下一寸

上管在巨闕下一寸去蔽骨三寸

中管在上管下一寸

建里在中管下一寸

下管在建里下一寸

水分在下管下臍上一寸

臍中不刺

陰交在臍下一寸

氣海在臍下一寸半

石門在臍下二寸女子不灸

關元在臍下三寸

中極在臍下四寸

曲骨在橫骨上中極下一寸毛際陷中

○腹第二行十一穴第十六

幽門在巨闕傍半寸陷中

通谷在幽門下一寸陷中

陰都在通谷下一寸

石關在陰都下一寸

商曲在石關下一寸

肓俞在商曲下一寸直臍傍五分

中注在肓俞下五分

四滿在中注下一寸

氣穴在四滿下一寸

大赫在氣穴下一寸

橫骨在大赫下一寸

○腹第三行十二穴第十七

不容在幽門傍一寸五分去任脉二寸直四肋端相去四寸

承滿在不容下一寸

梁門在承滿下一寸

關明在梁門下太一上一寸（千金云梁門下五分）

太一在關明下一寸（千金甲乙經皆云梁門下一寸）

滑肉門在太一下一寸

天樞去肓俞一寸半夾臍各二寸陷中

外陵在天樞下大巨上（千金云在天樞下半寸）

大巨在長谿下二寸（千金云在臍下一寸兩傍各二寸）

水道在大巨下三寸

歸來在水道下二寸

氣衝在歸來下鼠鼷上一寸

○腹第四行七穴第十八

期門在第二肋端不容傍各一寸半上直兩乳

日月在期門下五分

腹哀在日月下一寸半

大横在腹哀下三寸直臍傍

腸結在大横下一寸三分（一云腹結）

府舍在腸結下三寸

衝門上去大横五寸在府舍下横骨兩端約中動脈（一云衝門）

○手太陰肺經十穴第十九

少商在手大指端内側去爪甲角如韮葉

魚際在手大指本節後内側散脈内

大泉在掌後陷中

經渠在寸口陷中不灸

列缺去腕上一寸半

孔最在腕上七寸

尺澤在肘中約上動脈

俠白在天府下去肘五寸動脈

天府在腋下三寸臂臑内廉動脈不灸

臑會在臂前廉去肩頭三寸

○手陽明大腸經二十穴第二十

商陽在手大指次指内側去爪甲角如韮葉

二間在手大指次指本節前内側陷中

三間在手大指次指本節後内側陷中

合谷在大指歧骨間

陽谿在腕中上側兩筋間陷中（一云在合谷上三寸）

偏歷在腕後三寸

温留在腕後小士五寸大士六寸

下廉在輔骨下去上廉一寸

上廉在三里下一寸

三里在曲池下二寸按之肉起兌肉之端

曲池在肘外輔屈肘曲骨之中一云在肘上橫文中

肘窌在肘大骨外廉陷中

五里在肘上行馬裏大脉中不刺甲乙經一云在肘上二寸

臂臑在肘上七寸䐃肉端

肩窌在肩端臑上斜舉臂取之

秉風在夾天窌外肩上髃後舉臂有空

肩井在肩上陷解中缺盆上大骨前

天窌在缺盆中上毖骨之際陷中

巨骨在肩端上行兩叉骨間陷中

肩髃在肩端兩骨間

○手少陰心經八穴第二十一

少衝在手小指內廉之端去爪甲角如韭葉

少府在手小指本節後陷中直勞宮

神門在掌後兊骨之端陷中

陰郄在掌後脉中去腕半寸

通理在腕後一寸

靈道在掌後一寸半

少海在肘內廉節後陷中

極泉在腋下筋間動脉入胷

○手太陽小腸經九穴第二十二

少澤在手小指之端去爪甲一分陷中

前谷在手小指外側本節前陷中

後谿在手小指外側本節後陷中

腕骨在手外側腕前起骨下陷中

陽谷在手外側腕中兊骨之下陷中

養老在手踝骨上一空在後一寸陷中

支正在腕後五寸
小海在肘內大骨外去肘端五分陷中
肩貞在肩曲甲下兩骨解間肩髃後陷中
○手厥陰心主經八穴第二十三
中衝在手中指之端去爪甲如韭葉陷中
勞宮在掌中央動脉
內關在掌後去腕二寸
大陵在掌後兩筋間陷中
間使在掌後三寸兩筋間陷中
郄門去腕五寸
曲澤在肘後內廉下陷中屈肘得之
天泉在曲腋下去臂二寸舉腋取之
○手少陽三焦經十七穴第二十四

關衝在手小指次指之端去爪甲角如韭葉
腋門在手小指次指間陷中
中渚在手小指次指後本節後間陷中
陽池在手表腕上陷中
外關在腕後二寸陷中
支溝在腕後三寸兩骨間陷中 一云在陽池上一寸
會宗在腕後三寸空中
三陽絡在臂上大交脉支溝上一寸不刺
四瀆在肘前五寸外廉陷中
天井在肘外大骨後一寸兩筋間陷中屈肘得之
清泠泉在肘上三寸伸肘舉臂取之
消濼在肩下臂外開腋斜肘分下行
天宗在秉風後大骨下陷中

臑俞夾肩窌後大骨下甲上廉陷中
肩外俞在肩甲上廉去脊三寸陷中
肩中俞在肩甲內廉去脊二寸陷中
曲垣在肩中央曲甲陷中按之應手痛
○足太陰脾經十二穴第二十五
隱白在足大指端內側去爪甲角如韭葉
大都在足大指本節後陷中
太白在足內側核骨下陷中
公孫在足大指本節後一寸
商丘在足內踝下微前陷中
三陰交在足內踝上三寸骨下陷中
漏谷在足內踝上六寸骨下陷中
地機在膝下五寸

陰陵泉在膝下內側輔骨下陷中伸足得之
血海在膝臏上內廉白肉際二寸
箕門在魚腹上越筋間動應手陰市內（一云在陰股內起脉間）
氣衝在陰股內動脉（此穴已見上腹第三行中）
○足陽明胃經十五穴第二十六
厲兊在足大指次指之端去爪甲角如韭葉
內庭在足大指次指外間陷中
陥谷在足大指次指外間本節後去內庭二寸
衝陽在足趺上五寸骨間去陷谷三寸
解谿在衝陽後一寸半腕上陷中
豐隆在外踝上八寸下廉胻外廉陷中
上廉在三里下三寸（一名上巨虛）
下廉在上廉下三寸（一名下巨虛）

條口在下廉上一寸
三里在膝下三寸䯒外廉
犢鼻在膝臏下骭上俠解大筋中
陰市在膝上三寸伏兎下若拜而取之
伏兎在膝上六寸起肉
髀關在膝上伏兎後交分中
梁丘在膝上二寸兩筋間
○足厥陰肝經十一穴第二十七
大敦在足大指端去爪甲如韭葉及三毛中
行間在足大指間動應手陷中
太衝在足大指本節後二寸或一寸半陷中
中封在足內踝前一寸仰足取之伸足乃得
蠡溝在足內踝上五寸

中都在足內踝上七寸䯒骨中與少陰相直
膝關在犢鼻下三寸陷中甲乙經云二寸
曲泉在膝內輔骨下大筋上小筋下陷中屈膝而得之
陰包在膝上四寸股內廉兩筋之間
五里在陰廉下二寸甲乙針經一云在陰廉下去氣衝三寸陰股中動脉
陰廉在羊矢下去氣衝二寸動脉
○足少陽膽經十五穴第二十八
竅陰在足小指次指之端去爪甲角如韭葉
俠谿在足小指次指歧間本節前陷中
地五會在小指次指本節後陷中不灸
丘墟在足外踝如前陷中去臨泣三寸一云伸脚取之
臨泣在小指次指本節後間去俠谿一寸半
付陽在外踝上三寸太陽前少陽後筋骨間懸鍾一名絕骨

在外踝上三寸動者中
光明在足外踝上五寸　外丘在足外踝下七寸
陽輔在足外踝上輔骨前絕骨端如前三分許去丘墟七寸
陽交在足外踝上七寸斜屬三陽分肉間
陽陵泉在膝下一寸外廉陷中
陽關在陽陵泉上五寸犢鼻外陷中
環銚在髀樞中側卧伸下足屈上取上足一云髀樞中外硯骨陷中
中瀆在髀外膝上五寸分肉間陷中
○足少陰腎經十一穴第二十九
涌泉在足心陷中屈足捲指宛宛中
然谷在足內踝前起大骨下陷中
太谿在足內踝後跟骨上動脉陷中
太鍾在足踝後　水泉去太谿下一寸在內踝下

照海在足內踝下
復溜在足內踝上二寸陷中
交信在足內踝上二寸少陰前太陰後廉筋骨間
築賓在內踝上端分中
陰谷在膝內輔骨之後大筋之下小筋之上按之應手屈膝
得之
會陰在大便前小便後兩陰間
○足太陽膀胱經十七穴第三十
至陰在足小指外側去爪甲角如韭葉
通谷在足小指外側本節前陷中
束骨在足小指外側本節後陷中
京骨在足外側大骨下赤白肉際陷中
申脉在足外踝下陷中容爪甲

金門在足外踝下名曰關梁

僕參在足跟骨下陷中

崑崙在足外踝後跟骨上陷中一云在外踝從地直上三寸兩筋骨中

承山在兌腨腸下分肉間陷中

飛揚在外踝上七寸

承筋在腨中央陷中不刺千金云在脛後從脚跟上七寸腨中

合陽在膝約中央下二寸

委中在膕中約文動脉

委陽在足太陽後出于膕中外廉兩筋間承扶下

浮郄在委陽上一寸展足得之

殷門在肉郄下六寸

扶承一名肉郄在尻臀下股陰下文中

○三陰三陽流注法

肺手太陰 少商 魚際 大泉 列缺 經渠 尺澤 幕中府 俞三椎

大腸手陽明 商陽 二間 三間 合谷 陽谿 曲池 募天樞 俞十六椎

心主手厥陰 中衝 勞宮 大陵 內關 間使 曲澤 募巨闕 俞五椎

心手少陰 少衝 少府 神門 通里 靈道 少海

小腸手太陽 少澤 前谷 後谿 腕骨 陽谿 小海 募關元 俞十八椎

脾足太陰 隱白 大都 大白 公孫 商丘 陰陵泉 募章門 俞十一椎

胃足陽明 厲兌 內庭 陷谷 衝陽 解谿 三里 募中管 俞十二椎

肝足厥陰 大敦 行間 太衝 中封 中郄 曲泉 募期門 俞第九椎

膽足少陽 竅陰 俠谿 臨泣 丘墟 陽輔 陽陵泉 募日月 俞第十椎

腎足少陰 涌泉 然谷 太谿 水泉 復溜 陰谷 募京門 俞十四椎

膀胱足太陽 至陰 通谷 束骨 京骨 崑崙 委中 募中極 俞十九椎

三焦手少陽 關衝 腋門 中渚 陽池 支溝 天井 募石門 俞十三椎

右五藏六腑三陰三陽十二經脉藏府出井流滎注俞過

原行經入合爲募前後法假令肺手太陰爲藏出於少商爲井流於魚際爲滎注於大泉爲俞過於列缺爲原行於經渠爲經入於尺澤爲合募在中府俞在第三椎他皆倣此

陽井爲金　陰井爲水　陽滎爲水　陰滎爲火

陽俞爲木　陰俞爲火　陽原爲火　陰原爲金

陽經爲火　陰經爲金　陽合爲土　陰合爲水

婦人第二 法四十五首

絶子灸然谷五十壯穴在内踝前直下一寸

胞門閉塞絶子灸關元三十壯報之

妊胎不成若墮胎腹痛漏胞見赤灸胞門五十壯關元左邊二寸是也右邊名子户

又灸氣門穴在關元傍三寸各五十壯千金云百壯

子藏閉塞不受精灸胞門五十壯

絶嗣不生漏下赤白灸泉門十壯三報之穴在横骨當陰上際石門穴在氣海下一寸針入一分留三呼得氣即寫主婦人氣痛堅硬産後惡露不止遂成結塊崩中斷緒日灸二七至一百止

關元在石門下一寸主斷緒産道冷針入八分留三呼寫五吸灸亦佳但不及針日灸一百止

崩中帶下因産惡露不止中極穴在關元下一寸婦人斷緒最要穴四度針即有子若未有更針入八分留十呼得氣即寫灸亦佳但不及針日灸三七至三百止

白崩中灸少腹横文當臍孔直下一百壯

又灸内踝上三寸左右各一百壯

帶下灸間使三十壯又淋小便赤尿道痛臍下結塊如覆盃或因食得或因産得惡露不下遂爲疝瘕或因月事不調

血結成塊皆針之如上

婦人遺尿不知時出灸橫骨當陰門七壯

姙不成數墮落灸玉泉五十壯三報之（中極是）

灸夾丹田兩邊相去各一寸名四滿主月水不利賁血上下

并無子灸三十壯丹田在臍下二寸

婦人胞落頹灸臍中二百壯

水洩痢灸氣海百壯三報之

胞落癩灸身交五十壯三報之是臍下橫文中

又灸背脊當臍五十壯

又灸玉泉五十壯三報之

又灸龍門二十壯三報之是陰中上外際

胞下垂注陰下脫灸夾玉泉三寸隨年壯三報之

陰冷腫痛灸歸來三十壯三報之夾玉泉兩傍五寸

婦人無乳法

初針兩手小指外側近爪甲深一分兩手腋門深三分兩手天井深六分若欲試之先針一指即知之神驗不傳

婦人逆產足出針足太陰入三分足入乃出針穴在內踝後白肉際陷骨宛宛中

橫產手出針太衝入三分急補百息去足大指奇一寸

胞衣不出針足太陽入四寸在外踝下後一寸宛宛中

又針足陽蹻入三分在足外踝下白肉際

產後脉絕不還針合谷入三分急補之又主胎上搶心

心（陰一作）中懊憹痛針涌泉入三分

心中懊憹痛針勞宮入五分補之

產後出汗不止針太衝急補之

產難月水不禁橫生胎動皆針三陰交

胞衣不出或腹中積聚皆針胞門入一寸先補後寫去關元
左二寸
又針章門入一寸四分
子死腹中及難產皆針胞門
胎動及崩中下痢責氣上逆針丹田入一寸四分在臍下二寸
凡難產針兩肩井一寸寫之須臾即生也
漏胞下血不禁灸關元兩傍相去三寸百壯
婦人陰中痛引心下少腹絞痛灸膝外邊上去一寸宛宛中
婦人下血洩痢赤白漏血灸足太陰五十壯在內踝上三寸
百壯主腹中五寒
婦人漏下赤白月水不利灸交儀穴在內踝上五寸
婦人下血漏赤白灸營池四穴三十壯在內踝前後兩邊池
上脉一名陰陽

婦人漏下赤白四肢痠削灸漏陰三十壯穴在內踝下五分
微動脉上
婦人下赤白漏洩注灸陰陽穴隨年壯三報之在足拇指下
屈裏表頭白肉際

小兒驚癇第三 法二十一首

曲澤主心下澹澹喜驚
陰交氣海大巨主驚不得卧
陰蹻主卧驚視如見星
大鍾郄門主驚恐畏人神氣不足
然谷陽陵泉主心中怵惕恐人將捕之
解谿主瘈瘲而驚
少衝主太息煩滿少氣悲驚
行間主心痛數驚心悲不樂

陽谷主風眩驚手捲
厲兌主多卧好驚
腋門主喜驚妄言面赤
神門主數噫恐悸少氣
間使主喜驚瘖不能言
三間合谷主喜驚
陽谿主驚瘈
通里主心下悸
大陵主心中澹澹驚恐
手少陰陰郄主氣驚心痛
天井主驚瘈
後谿主淚出而驚
腕骨主煩滿驚

鼻病第四 法七首

鼻中擁塞針手太陽入三分在小指外側後一寸白肉際宛
宛中
顖一穴主鼻塞不聞香氣日灸二七至七百壯初灸時痛五
十壯已去不痛七百壯還痛即止至四百壯漸覺鼻輕
治鼻中息肉灸上星二百壯入髮際一寸
又夾上星相去三寸各百壯
衂時痒便灸足大指節横理三毛中十壯劇者百壯衂不止
灸之并主陰卵腫
鼻衂不止灸涌泉二穴百壯
灸鼻兩孔與柱七壯主鼻涕出不止

舌病第五 法二十五首

重舌灸行間隨年穴在足大指岐中二穴

小兒重舌灸左足踝上七壯
又灸兩足外踝上三壯
緊唇灸虎口男左女右七壯　又灸承漿三壯
牙齒疼灸兩手中指背第一節前有陷處七壯下火立愈
齒疼灸外踝上高骨前交脉上七壯
風牙疼逐左右以繩量手中指頭至掌後第一横文折爲四分以度横文後當臂兩筋間當度頭灸三壯隨左右灸之兩相患灸兩臂至驗
耳聾鳴客主人一名上關在聽會上一寸動脉宛宛中針入一分主耳聾鳴如蟬
又聤耳膿出亦宜灸日三壯至二百壯側卧張口取之
又聽會在上關下一寸動脉宛宛中一名耳門針入三分主耳聾耳中如蟬鳴通耳灸日五壯至七七上十日後還依前灸之慎生冷醋滑酒麪羊肉蒜魚熱食、
又合谷在虎口後縱文頭立指取之宛宛中主耳聾颼颼然如蟬鳴宜針入四分留三呼五吸忌灸慎洗手凡針手足皆三日勿洗也
耳風聾雷鳴灸陽維五十壯在耳後引耳令前絃絃筋上是
耳聾不得眠針手小指外端近甲外角肉際入一分半補之
又針關衝入一分半補之
又針腋門在手小指次指奇間入三分補之
牙車失欠蹉跌灸第五椎日二七壯滿三百壯不差灸氣衝二百壯胷前喉下寅骨中是
又灸足内踝上三寸宛宛中三百壯三報之
聽會主牙車急及脫臼相離二寸在上關下一寸一名耳門側卧張口乃得之針入三分留三呼得氣即寫不補宜灸

日五壯至七壯止十日後還依前灸慎生冷醋滑
又法下關在耳門下一寸宛宛中動脉際是也主牙車脫關
不得嚼食側卧開口取之針入四分與上同法灸數亦同
忌熱食酒麪
頰車在耳下二韭葉宛宛中主牙車不開口噤不言及牙疼
不得食牙頰腫側卧張口取之針入四分得氣即寫不補
宜灸日七壯至七七壯即止
喉痺針兩手小指爪文中出血三大豆許即愈左刺左右刺
右
又手無名指甲後一韭葉名關衝主喉痺不得下食飲心熱
噏噏常以繆刺之患左刺右患右刺左也都患刺兩畔
咽喉酸辛灸少衝七壯雀矢大注
神門合谷主喉痺心煩

脚氣第六 法三首 論一首

初灸風市　次伏菟　次犢鼻　次膝目
次三里　次上廉　次下廉　次絕骨
凡八穴風市穴令病人起正身平立垂兩手直下舒十指掩著兩髀便點手中指頭髀大筋上灸百壯逐輕重灸之輕者不可減百壯重者一穴五六百壯伏菟穴令病人累夫端坐以病人手夫横掩膝上夫下傍與曲膝頭齊上傍側夫際當中央是灸百壯亦可五十壯犢鼻穴在膝頭蓋骨上際外角平處以手按之得節解是一法云在膝頭下近外三骨箕踵中動脚以手按之得窟解是灸五十壯可至百壯膝目穴在膝頭下兩傍陷者宛宛中是灸百壯三里穴在膝頭骨節下一夫附脛骨外是一法云在膝頭骨節下三寸人有長短大小當以病人手夫度取灸百壯上廉穴在三里下一夫亦附

脛骨外是灸百壯下廉穴在上廉下一夫亦附脛骨外是灸百壯絶骨穴在足外踝上一夫亦云四寸是灸百壯凡此諸灸不必一頓灸盡壯數可日日報灸之三日之中令盡壯數爲佳凡病一脚灸一脚病兩脚便灸兩脚也凡脚弱病多著兩脚一方云覺脚異便灸三里及絶骨各一處兩脚異者合四穴灸之多少逐病輕重大要雖輕不可減百壯不差速令以次灸之多則佳

脚疼三陰交三百壯神良一云灸絶骨最要論曰有人得之不以爲事不覺忽然入腹腹腫心熱其氣大上遂至絶命當知微覺有異即湏大灸之乃得應手即差亦依舊支法存灸之梁丘犢鼻三里上廉下廉解谿大衝陽陵泉絶骨崑崙陰陵泉三陰交足太陽復溜然谷涌泉承山束骨等凡一十八穴舊法多灸百會風府五藏六府俞募頃來灸者悉覺引氣向上愼不得灸以上大忌之

又灸足十指奇端去奇一分兩足凡八穴名曰八衝極下氣足十指端名曰氣端日灸三壯其八衝可日灸七壯氣下即止文炷湏小作之

諸風第七 法六十九首 論一首

肺中風者其人偃卧而胷滿短氣冒悶汗出者肺風之證也視眼以下鼻上兩邊下行至口色白者尚可治速灸肺俞百壯小兒減之若色黄者此爲肺已傷化爲血矣不可復治其人當妄言掇空指地或自拈衣尋縫如此數日死若爲急風所中便迷妄恍惚狂言妄語或少氣惙惙或不能言若不速治宿昔而死亦覺便灸肺俞膈俞肝俞數十壯急服續命湯可救也若涎唾不止者既灸當與湯也

肝中風者但踞坐不得低頭遶兩眼連額微有青者肝風之

證也若脣色青面黃尚可治急灸肝俞百壯急服續命湯若
色大青黑者此爲肝已傷不可復治數日而死
心中風者其人但得偃卧不得傾側悶亂冒絕汗出心風之
證也若脣正赤尚可治灸心俞百壯急服續命湯若或青或
白或黃或黑此爲心已壞爲水不可復治旬日死一云五六日死
脾中風者其人但踞坐而腹滿視身通黃口吐鹹汁尚可治
灸脾俞百壯急服續命湯若目下青手足青不可復治
腎中風者其人踞坐腰痛視脅左右未有黃色如餅粢大尚
可治灸腎俞百壯急服續命湯若齒黃赤鬢髮直面土色不
可復治
大腸中風者卧而腸鳴不止灸大腸俞百壯服續命湯
論曰凡風病內外沈浮者內是五藏外是皮膚沈是骨髓浮
是血脉若在腠理湯藥所及若在五藏酒醪所至若在血脉

針灸所中深在骨髓扁鵲自云不能如何
風痱者卒不能言口噤手不隨而強直灸法度病者手小指
內歧閒至指端爲度以置臍上直望心下丹注度上端畢又
作兩度續在注上合其下開上取其本度橫置其開上令三
合其狀如倒作厶字形也男度右手女度左手嫌不分明故
以丹注三處起火各百壯夫眼瞤動口偏喎舌不轉者灸口
吻邊橫文赤白際逐左右隨年壯三報之不差更報
肝風占候口不能言灸鼻下人中次大椎次肝俞各五十壯
心風灸心俞各五十壯
脾風灸脾俞各五十壯
脾風占候言聲不出或手上下灸手十指頭次灸人中大椎
兩耳門前脉去耳門上下行一寸次兩大指節上下六穴各
七壯

卒中風口喎以葦筒長五寸以一頭刺耳孔中四畔以麪密塞勿令洩氣一頭內大豆一顆并艾燒之令然灸七壯差患右灸左患左灸右千金不傳 ○ 又灸手交脉三壯左灸右右灸左其炷如鼠矢橫安之兩頭放火燒之

凡卒中風口噤不得開灸頰車二穴穴在耳下八分小近前灸五壯即得語又隨年壯口僻左右灸之

治尸厥法

凡尸厥如死脉動如故針百會入二分補之灸熨兩脅又針足中指頭去甲如韭葉又針足大指甲下肉側去甲三分

灸失瘖不語法

先灸天窻五十壯訖息火乃移灸百會五十壯畢還灸天窻五十壯若初發先灸百會則風氣不得洩內攻五藏當閉伏更失瘖也所以先灸天窻次灸百會乃佳一灸五十壯息火

洩氣復灸之視病輕重重者處各三百壯輕者以意（一云大灸肩井得二百壯即灸三里三壯若五壯以下氣也鳩尾可灸百壯灸至五十壯暫息火也）

又法 凡一切中風服藥益劇者但是風穴皆灸之三壯神良欲除根本必須火艾專恃湯藥則不可差

灸角弓反張法

脣青眼戴角弓反張始覺發動即灸神庭七壯穴在當鼻直上髮際

次灸曲差二穴各七壯穴在神庭兩傍各一寸半

次灸上關二穴各七壯在耳前上廉起骨陷中一名客主人

次灸下關二穴各七壯在耳前動脉下空下廉陷中

次灸頰車二穴各七壯穴在耳下曲頰端陷中

次灸廉泉一穴七壯在當頤直下骨後陷中

次灸顖會一穴七壯在神庭上一寸

次灸百會一穴七壯在當頂上正中央
次灸本神二穴各七壯在耳直上入髮際二分
次灸天柱二穴各七壯在項後大筋外入髮際陷中
次灸陶道一穴七壯在大椎節下間
次灸風門二穴各七壯在第二椎下兩傍各一寸半
次灸心俞二穴各七壯在第五椎下兩傍各一寸半
次灸肝俞二穴各七壯在第九椎下兩傍各一寸半
次灸腎俞二穴各七壯在第十四椎下兩傍各一寸半
次灸膀胱俞二穴各七壯在第十九椎下兩傍各一寸半
次灸曲池二穴各七壯穴在肘外曲頭陷中屈肘取之
次灸肩髃二穴各七壯在兩肩頭正中兩骨間陷中
次灸支溝二穴各七壯在手腕後二寸兩骨間陷中
次灸合谷二穴各七壯在手大指虎口兩骨間陷中

次灸間使二穴各七壯在掌後三寸兩筋間
次灸陽陵泉二穴各七壯在膝下骨前陷中
次灸陽輔二穴各七壯在外踝上絕骨陷中
次灸崑崙二穴各七壯在外踝後跟骨上陷中
右以前主久風卒風緩急諸風發動不自覺知或心腹脹滿或半身不遂或口噤不言涎唾自出目閉耳聾或舉身冷直或煩悶恍惚喜怒無常凡有風皆灸之神驗臯交頞中一穴針入六分得氣即寫留三呼寫五吸不補亦宜灸然不如針此主癲風角弓反張羊鳴大風青風面風如蟲行卒風多睡健忘心中憒憒口噤闇倒不識人黃疸急黃八種大風此之一穴皆主之莫不神驗慎酒麪生冷醋滑猪魚蒜蕎麥漿水

雜灸法

凡風灸上星二百壯又前頂二百壯百會二百壯腦戶三百

壯風府三百壯

凡大風灸百會七百壯

凡百諸風灸大椎平處兩相二寸三分以病人指寸量之各一百壯

治風耳後八分半有穴灸一切風若狂者亦差耳門前灸百壯

治卒病惡風欲死不言及肉痺不知人灸第五椎名曰藏輸各一百五十壯

扁鵲曰凡心風灸心俞各五十壯第五節對心是也

肝俞主肝風腹脹食不消化吐血酸削四肢羸露不欲食鼻衄目𥇀䀮眉頭脅下痛少腹急灸百壯

大腸俞主風腹中雷鳴大腸灌沸腸澼洩痢食不消化少腹絞痛腰脊疼強大小便難不能飲食灸百壯三報之

治卒中惡悶熱毒欲死灸足大指横文隨年壯若筋急不能行者若內筋急灸內踝上三十壯外筋急灸外踝上三十壯愈若戴睛上插者灸兩目後眥二七壯

若不語灸第三椎五百壯

若不識人灸季肋頭七壯

若眼反口噤腹中切痛灸陰囊下第一横理十四壯

腋門二穴主風灸五十壯亦可九壯

治風身重心煩足脛疼灸絶骨百壯在外踝上三寸一云四寸又云一夫

凡卒中風口噤不開灸機關二穴在耳下八分近前灸五壯即愈一云隨年壯僻者逐左右灸之

治頭風搖動灸腦後玉枕中間七壯

治猥退風偏風半身不隨法

肩髃主偏風半身不隨熱風頭風刺風手不上頭捉物不得挽弓不開臂冷酸疼無力針入八分留三呼寫五吸在膊骨

頭陷中平手取之偏風不隨可至二百壯過多則臂強慎酒
肉五辛熱食漿水
又針曲池入七分得氣即寫然後補之太宜灸日十壯至一
百壯止十日更報下少至二百壯
又針列缺入三分留三呼寫五吸亦可灸之日七壯至一百
總至三百壯
陽池上一夫兩筋間陷中主刺風熱風耳聾鳴手不仁冷風
手戰偏風半身不隨陽池支溝下一夫覆腕當文宛宛中亦
主或因損後把捉不得針入三分留三呼寫五吸忌灸
商丘在內踝前陷中主偏風痺脚不得履地刺風頭風熱風
陰痺針入三分留三呼寫五吸疾出之忌灸
偏風半身不隨脚重熱風疼不得履地針入四分留三呼得
氣即寫疾出針於痕上灸之良七壯

灸猥退風半身不隨法

先灸天窻次大門腦後尖骨上一寸次承漿次風池次曲池
次手髓孔腕後尖骨頭宛宛中次手陽明大指奇後次脚五
冊屈兩脚膝腕文次脚髓孔足外踝後一寸次足陽明足拇
指奇三寸各灸百壯若有手足患不隨灸百會次本神次肩
髃次心俞次手少陽次足外踝下容爪外並依左右五百壯
面上游風如蟲行習習然起則頭旋眼暗頭中溝壟起灸天
窻次兩肩上一寸當瞳人次曲眉在兩眉間次手陽明次足
陽明各灸二百壯

時行法第八 法四首

初得一日二日但灸心下三處第一去心下一寸名巨闕第
二去心下二寸名上管第三去心下三寸名胃管各灸五十
壯然或人形小大不同恐寸數有異可以繩度之隨其長短

寸數最佳取繩從心骨鳩尾頭少度至臍孔中屈之取半當繩頭名胃管又中屈更爲二分從胃管向上度是上管上度取一分是巨闕大人可五十壯小兒可一七二七壯隨其年灸以意量之

若病者三四日以上宜先灸囟上二十壯以繩度鼻正上盡髮際中屈繩斷去半便從髮際度入髮中灸繩頭名天窻又灸兩顳顬又灸風池又灸肝俞百壯餘處各二十壯

又灸太衝三十壯神驗無比

豌肉瘡灸兩手腕研子骨尖上三壯男左女右

黃疸第九法一十一首

脣裏正當承漿邊逼齒斷針三鋥治馬黃黃疸

顳顬在眉眼尾中間上下有來去絡脉是針灸之治疸氣溫病

夾人中火針治馬黃疸通身並黃語音已不轉者

灸錢孔百壯度乳至臍中屈肋頭骨是灸百壯治黃疸

夾承漿兩邊各一寸治馬黃急疫

灸太衝七壯（一云針灸隨便）

又灸風府熱府肺俞心俞肝俞脾俞腎俞男陰縫拔陰反向上灸治馬黃黃疸若女人玉門頭是穴針灸無在

脚跟在白肉後際針灸隨便治馬黃黃疸

臂石子頭還取病人手自捉臂從腕中大淵文向上一夫接白肉際灸七壯治馬黃黃疸

黃疸灸第七椎七壯黃汁出

瘧病第十法一十三首

瘧灸上星及大椎至發時令滿百壯艾炷如黍米粒俗人不解務大炷也

又覺小異灸百會七壯若更發更七壯極難差不過三灸

又灸風池二穴三壯　又灸腎俞百壯

又灸三間在虎口第二指節下一寸三年瘧欲發卽下火

治一切瘧無問處所仰卧以繩量兩乳間中屈從乳向下灸

度頭隨年壯男左女右

治瘧刺足少陰出血愈

治諸瘧而脉不見者刺十指間見血血去必已先視身赤如

小豆者皆取之

瘧日西發者臨泣主之

瘧實則腰背痛虛則鼻衄飛揚主之

瘧多汗腰痛不能俛仰目如脫項如拔崑崙主之

灸一切瘧尺澤主之

凡瘧有不可差者從未發前灸大椎至發時滿百壯無不差

千金翼方卷第二十六

千金翼方卷第二十七

針灸中

肝病第一　五十一法

治眼目法

攢竹主目視不明䀮䀮目中熱痛及瞤針入一分留二呼寫三吸徐徐出之忌灸宜出血塗鹽

膚瞖白膜覆瞳人目闇及眯雀目冷淚目視不明努肉出皆針睛明入一分半留三呼寫五吸冷者先補後寫復補之雀目者可以留十吸然後速出

視眼喎不正口喎目瞤面動葉葉然眼赤痛目䀮䀮冷熱淚目瞼赤皆針承泣在目下七分匡骨中當瞳子直下陷中入二分半得氣即寫忌灸

目闇不明鍼中渚入二分留三呼寫五吸灸七壯炷如雀矢

大在手小指次指本節後間眯目偏風眼喎通睛耳聾鍼
客主人一名上關入一分久留之得氣即寫亦宜灸日三
七壯至二百壯炷如細竹筯大側卧張口取之眼暗灸大
椎下第十節正當脊中二百壯唯多佳可以明目神良灸
滿十壯不假湯藥
肝勞邪氣眼赤灸當容一百壯兩邊各爾在眼後耳前三陰
三陽之會處以手按之有上下橫脉是與耳門相對也
肝俞主目不明灸二百壯小兒寸數斟酌灸可一二七壯
治目急痛不可遠視灸當瞳子上入髮際一寸隨年壯
治風翳灸手中指本節頭骨上五壯炷如小麥大逐病左右
灸之
治風痒赤痛灸人中鼻柱二壯仰卧灸之
治目卒生翳灸大指節橫文三壯逐左右灸之

治眼暗若一眼暗灸腕後節前陷中兩眼暗兩手俱灸隨年
壯
治溫病後食五辛即不見物遂成雀目灸第九椎名肝俞二
百壯永差

治脚轉筋法

治脚轉筋鍼內崑崙穴在內踝後陷中入六分氣至寫之
又灸承山隨年壯神驗
第二十一椎主腰背不便筋轉痹灸隨年壯
治筋攣轉筋十指筋攣急不得屈伸灸足外踝骨上七壯
治失精筋攣陰縮入腹相引痛灸中封五十壯又下滿灸五
十壯兩脚一百壯此二穴亦主喉腫厥逆五藏所苦鼓脹
悉主之老人加之五十以下及小兒並隨年壯
治轉筋脛骨痛不可忍灸屈膝下廉橫筋上三壯

腹脹轉筋灸臍上一寸二七壯

治癥瘕法

少腹堅大如盤盂胷腹中脹滿飲食不消婦人癥聚瘦瘠灸三焦俞百壯三報之

灸內踝後宛宛中隨年壯　灸氣海百壯

久冷及婦人癥瘕腸鳴泄痢繞臍絞痛灸天樞百壯三報之勿鍼臍兩傍各二寸

積聚堅滿痛灸脾募百壯章門是也

治瘕癖患左灸左患右灸右第一屈肋頭近第二肋下即是灸處第二肋頭近第三肋下向肉翅前亦是灸處初日灸三次日五後七周而復始至十止唯忌大蒜餘不忌

又灸關元五十壯　又灸臍上四指五十壯

膏肓俞兩穴主無病不療方

先令病人正坐曲脊伸兩手以臂著膝前令正直手大指與膝頭齊以物支肘勿令臂得動也從甲骨上角摸索至甲骨下頭其間當有四肋三間灸中間依甲骨之裏去甲骨容側指許摩胎去表肋間空處按之自覺牽引肩中灸兩甲內各一處至六百壯多至千壯數百壯當氣下礱礱然如流水當有所下若停淡宿疾亦必下也此灸無所不治主諸羸弱瘦損虛勞夢中失精上氣欬逆及狂惑妄誤皆有大驗若病人已困不能正坐當令側卧挽上臂令前索孔穴灸之求穴大較以右手從左肩上住指頭表所不及者是也左手亦然及以前法灸若不能久正坐伸兩臂者亦可伏衣襆上伸兩臂令人挽兩甲骨使相遠不爾甲骨覆穴不可得也所伏衣襆當令大小有常不爾則前却失其穴也此穴灸訖後令人陽氣盛當消息自養令得平復其穴近第五椎相準望求索

治頭重髆肘重法

頭重風勞灸腦户五壯鍼入三分補之

頭重不能勝灸腦户下一寸半

身體重四肢不能自持灸脾俞隨年壯鍼入五分補之

身重嗜眠不自覺灸天府五十壯鍼入三分補之

身重灸水分百壯鍼入一寸補之

體重四肢不舉灸天樞五十壯忌鍼

身重腫坐不欲起風勞脚疼灸三里五十壯鍼入五分補之

又灸足太陽五十壯鍼入三分補之

臂重不舉灸肩井隨年壯可至百壯鍼入五分補之

又灸足澤三十壯鍼入三分補之

第一椎名大杼無所不主俠左右一寸半或一寸二分主頭項痛不得顧胷中煩急灸隨年壯

諸煩熱時氣温病灸大椎百壯鍼入三分寫之橫三間寸灸之

心煩上氣灸肺俞鍼入五分

心煩短氣灸小腸俞

又灸巨闕期門各一百壯鍼入五分

又灸心俞百壯鍼入五分

頭身熱灸胃管百壯勿鍼

煩悶憂思灸大倉百壯

煩熱頭痛鍼虎口入三分

煩躁恍惚灸間使三十壯鍼入三分

骨熱煩胷滿氣悶鍼三里入五分

身體煩熱鍼中府　又灸絶骨五十壯

膽病第二　十二法

左手關上陽絶者無膽脉也苦口中無味（一云苦眯目）恐畏如見鬼多驚少力刺足厥陰治陰在足大指間或刺三毛中

左手關上陽實者膽實也苦腹中不安身軀習習刺足少陽治陽在足第二指本節後一寸

俠膽俞傍行相去五寸名濁浴主胷中膽病隨年壯

膽虛灸足内踝上一夫名三陰交二十壯

治吐血法

虛勞吐血灸胃管三百壯亦主嘔逆吐血少食多飽及多唾百病

凡口鼻出血者名曰腦衄灸上星五十壯

吐血唾血灸胷堂百壯忌鍼

吐血腹痛雷鳴灸天樞百壯

吐血唾血上氣欬逆灸肺俞隨年壯

吐血酸削灸肝俞百壯

吐血嘔逆灸手心主五十壯大陵是

吐血灸頸項上二七壯

心病第三 十八法

心俞各灸二七壯主心病老小減之不能食胷中滿膈上逆氣悶熱皆灸之

卒心疝暴痛汗出刺大敦左取右右取左男左女右刺之出血立已

俠巨闕兩邊相去各半寸名曰上門主胷中痛引腰背心下嘔逆面無滋潤各灸隨年壯

凡顏色焦枯勞氣失精肩背痛手不得上頭灸肩髃百壯穴在肩外頭近後以手按之有解宛宛中

當心下一寸名巨闕主心悶痛上氣引少腹冷灸二七壯

脉不出鍼不容兩穴在幽門兩傍各一寸五分

健忘忽忽鍼間使入五分掌後三寸

心裏懊憹徹背痛煩逆灸心俞百壯

心痛如錐刀刺氣結灸膈俞七壯

心痛冷氣上鳩尾上一寸半名龍頷灸百壯不鍼

心痛惡氣上脅痛急灸通谷五十壯在乳下二寸

心痛暴惡氣叉心灸巨闕百壯

心痛胷脅滿灸期門隨年壯

心痛堅煩氣結灸太倉百壯

心痛暴絞急欲絶灸神府百壯附鳩尾正當心有忌

胷痺心痛灸亶中百壯忌鍼兩乳間

心痛灸臂腕横文三七壯

心痛灸兩虎口白肉際七壯

小腸病第四 八十一法 訣二首

左手關前寸口陽絶者無小腸脉也苦臍痺少腹中有疝瘕主月即冷上搶心刺手心主治陰在掌後横文中入一分

左手關前寸口陽實者小腸實也苦心下急熱痺小腸内熱小便赤黄刺手太陽治陽在手第二指本節後一寸動脉

侠中管兩邊相去半寸名曰陰都灸隨年壯主小腸熱病

侠臍兩邊相去一寸名魂舍灸一百壯主小腸洩利膿血小兒減之　又灸小腸俞七壯

灸風眩法

以繩横度口至兩邊既得度口之寸數便以繩一頭更度鼻盡其兩邊兩孔間得鼻度之寸數中屈之取半合於口之全度中屈之先覓頭上廻髮當廻髮中灸之以度度四邊左右前後當繩端而灸前以面爲正並依年壯多少一年凡三灸

皆須瘥差又更灸之壯數如前若速灸火氣引上其數處廻
髮者則灸其近當鼻也若廻髮近額者亦宜灸若指面爲瘢
則闕其面處然病重者亦不得計此也

治卒癲法

灸陰莖上宛宛中三壯得小便通卽差當尿孔上是穴
又灸陰莖頭三壯
又灸乳頭三壯
又灸足大指上聚毛中七壯
又灸督脉三十壯在直鼻人中上入髮際三報之
又灸天窻百會各漸灸三百壯炷惟小作

一法 灸耳上髮際各五壯

治卒中邪魅恍惚振噤法

鼻下人中及兩手足大指爪甲令艾炷半在爪上半在肉上
七炷不止十四壯炷如雀矢大作之
狂鬼語鍼其足大拇指爪甲下入少許卽止

治大人癲小兒驚癇法

灸背第二椎及下窮骨兩處以繩度中折繩端一處是脊骨
上也凡三處畢復斷此繩作三折令各等而參合如厶字
以一角注中央灸下二角俠脊兩邊便灸之凡五處也以
丹注所灸五處各百壯削竹爲度勝繩也
狂風罵詈撾斫人名爲熱陽風灸口兩吻邊燕口處赤白際
各一壯
又灸陰囊縫三十壯令人立以筆正注當下已卧却核卯令
上乃灸之勿令近前中卯核恐害於陽氣也

卒發狂言鬼語法

以甑帶急合縛兩手大指便灸左右脅當對屈肘頭兩處火

俱下各七壯須臾鬼語自道姓名乞去徐徐語問乃解其
手
狂癇不識人癲病眩亂灸百會九壯
狂走瘈瘲灸玉枕上三寸一法頂後一寸百壯
狂邪鬼語灸天窻九壯
又灸口吻十五壯
狂癲哭泣灸手逆注三十壯在手腕後六寸
狂走驚癇灸河口五十壯在手腕後陷中動脉此與陽明同
也
狂癲風癲吐舌灸胃管百壯不鍼
又灸大幽一百壯
又灸季肋端三十壯（千金一云治狂走癲癇）
狂言恍惚灸天樞百壯

又灸間使三十壯（千金一云治狂言妄語）
狂走喜怒悲泣灸巨覺隨年壯在背上俠內側反手所不及
者骨罅穴上六分捻之痛是也（一云巨闕俞）
狂邪驚癇灸承命三十壯在內踝後上行三寸動脉上
又灸巨陽五十壯（千金一云治狂癲風驚厥逆心煩）
又灸足太陽五十壯（千金一云治狂癲鬼語）
又灸足少陽隨年壯（千金一云治狂癲癇狂易）
又灸足陽明三十壯（千金一云治狂走驚恍惚）
狂走癲厥如死人灸足大敦九壯（千金一云灸足大指三毛中）
狂走罵詈灸八會隨年壯在陽明下五分
狂癲驚走風恍惚瞋喜罵笑歌哭鬼語吐舌悉灸上星腦戶
風池手太陽陽明太陰足太陽陽明陽蹻少陽太陰陰蹻
足跟悉隨年壯

驚怖心忪少力灸大橫五十壯
邪鬼妄語灸懸命一十四壯在口脣裏中央絃絃者是一名
鬼祿一法以鋼刀決斷絃絃乃佳
狂邪鬼語灸伏兔百壯
又灸慈門五十壯（千金云治悲泣邪語鬼忙歌哭）
悲泣鬼語灸天府五十壯
狂邪發無常披頭大喚欲殺人不避水火者灸間使男左女
右隨年壯
狂走剌人或欲自死罵詈不息稱鬼神語灸口吻頭赤白際
一壯
又灸兩肘內屈中五壯
又灸背胛中間三壯報之
驚狂走灸內踝上三寸近後動脉上七壯

邪病四肢重痛諸雜候尺澤主之一名鬼堂
邪病語不止及諸雜候人中主之一名鬼市（千金云一名鬼客廳凡人中惡先掐鼻下是也）
邪病臥冥冥不自知風府主之一名鬼穴
邪病大喚罵詈走十指端去爪一分主之一名鬼城
邪病鬼癲胷上主之一名鬼門并主四肢重
邪病大喚罵走三里主之名鬼邪
勞宮一名鬼路
陽澤一名鬼臣
耳前髮際宛宛中名鬼床
尺中動脉名鬼受
足太陽名鬼路
癲狂二三十年者灸天窻次肩井次風門次肝俞次腎俞次

手心主次曲池次足五冊次涌泉各五百壯日七壯

鍼邪鬼病圖訣法

凡百邪之病源起多途其有種種形相示表癲邪之端而見其病或有默然而不聲或復多言而謾語或歌或哭或笑或吟或眠坐溝渠噉食糞穢或裸露形體或晝夜遊走或嗔罵無度或是飛蠱精靈手亂目急如斯種類癲狂之人今鍼灸與方藥並主治之

扁鵲曰百邪所病者鍼有十三穴凡鍼之體先從鬼宮起次鍼鬼信便至鬼壘又至鬼心未必須併鍼止五六穴即可知矣若是邪蠱之精便自言說論其由來往驗有實立得精靈未必須盡其命求去與之男從左起鍼女從右起鍼若數處不言便遍鍼也依訣而行鍼灸等處並備主之

第一初下鍼從人中名鬼宮在鼻下人中左邊下鍼出右邊

第二次下鍼手大指爪甲下三分名鬼信入肉三分

第三次下鍼足大指爪甲下入肉二分名鬼壘五指皆鍼

第四次下鍼在掌後橫文入半解名鬼心

第五次下鍼在外踝下白肉際火鍼七鋥鋥三下名鬼路

第六次下鍼入髮際一寸大椎以上火鍼七鋥鋥三下名鬼枕

第七次下鍼去耳垂下五分火鍼七鋥鋥三下名鬼床

第八次下鍼承漿從左刺出右名鬼市

第九次下鍼從手橫文三寸兩筋間鍼度之名鬼路此名間使

第十次下鍼入髮際直鼻上一寸火鍼七鋥鋥三下名鬼堂

第十一次下鍼陰下縫灸三壯女人玉門頭三壯名鬼藏

第十二次下鍼尺澤橫文中內外兩文頭接白肉際七鋥鋥

三下名鬼臣此名曲池

第十三次下鍼去舌頭一寸當舌中下縫刺貫出舌上仍以一板橫口吻安鍼頭令舌不得動名鬼封

右以前若是手足皆相對鍼兩穴若是孤穴即單針之

治風邪法　灸間使隨年壯

又灸承漿七壯三報之

又灸心俞七壯　又灸三里七壯

治鬼魅　灸入髮際一寸百壯　灸間使手心各五十壯

野狐魅　合手大指急縛大指灸合間二七壯當狐鳴而愈

脾病第五　三十二法

脾俞主四肢寒熱腰疼不得俛仰身黃腹滿食嘔舌根直并灸椎上三穴各七壯

治老小大便失禁法　灸兩脚大指去甲一寸三壯　又灸大指奇間各三壯

大小便不通　灸臍下一寸三壯　又灸橫文百壯

治大便難法　灸第七椎兩傍各一寸七壯

灸俠玉泉相去二寸半名腸遺隨年壯一云二寸

又灸承筋二穴三壯　又灸大都隨年壯　又灸大敦四壯

腹中熱閉時大小便難腰痛連胷灸團岡百壯在小腸俞下二寸橫三間寸灸之

大便閉塞氣結心堅滿灸石門百壯

大小便不利欲作腹痛灸榮衛四穴各百壯在背脊四面各一寸

大小便不利灸八窌百壯在腰目下三寸俠脊相去四寸兩

邊各四穴

小兒大小便不通灸口兩吻各一壯

小便不利大便數洩注灸屈骨端五十壯

又灸天樞百壯在俠臍相去各二寸魂魄之舍不可下鍼云相去三寸

治痢法

大便下血灸第二十椎隨年壯恐是中膂內俞

赤白下痢灸窮骨頭百壯多多益佳

食不消化洩痢不作肌膚灸脾俞隨年壯洩注五痢便膿血重下腹痛灸小腸俞百壯洩痢久下失氣勞冷灸下腰百壯三報之在八魁正中脊骨上灸多多益佳三宗骨是忌鍼

少腹絞痛洩痢不止灸丹田百壯三報之在臍下二寸鍼入五分

下痢不嗜食食不消灸長谷五十壯三報之在俠臍相去五寸一名循際

下痢赤白灸足太陰五十壯三報之

久冷五痔便血灸脊中百壯

五痔便血失屎灸迴氣百壯在脊窮骨上赤白下灸窮骨惟多爲佳

久痢百治不差灸足陽明下一寸高骨之上中去大指奇間三寸灸隨年壯

又灸關元三百壯十日灸并治冷痢腹痛

又先屈竹量正當兩胯脊上點記下量一寸點兩傍各一寸復下量一寸當脊上合三處一灸三十壯灸百壯以上一切痢皆差亦主痔濕脊上當胯點處不灸

又灸臍中稍稍至二三百壯

胃病第六　三十四法

治胃補胃灸胃俞百壯主胃中寒不能食食多身羸瘦腸鳴

腹滿胃脹

灸三焦俞主五藏六腑積聚心腹滿腰背痛飲食不消吐逆寒熱往來小便不利羸瘦少氣隨年壯

又灸心下二寸名胃管百壯至千壯佳

小腸俞主三焦寒熱灸隨年壯

治胃中熱病膝下三寸名三里灸三十壯

反胃食即吐出上氣灸兩乳下各一寸以差為限

又灸臍上一寸二十壯

又灸內踝下三指稍斜向前有穴三壯（外臺秘要云一指）

灸胷脅脹滿法

臚脹脅腹滿灸膈俞百壯三報之

脹滿水腫灸脾俞隨年壯三報之

脹滿雷鳴灸大腸俞百壯三報之

脹滿氣聚寒冷灸胃管在心鳩尾下三寸百壯三報之

脹滿繞臍結痛堅不能食灸中守百壯在臍上一寸一名水分

脹滿瘕聚滯下疼灸氣海百壯在臍下一寸忌鍼

脹滿氣如水腫狀少腹堅如石灸膀胱募百壯在中極臍下四寸

脹滿腎冷瘕聚洩痢灸天樞百壯

胷滿心腹積聚痞疼痛灸肝俞百壯

灸乾嘔法

乾嘔不止所食即吐不停灸間使三十壯若四厥脉沈絕不至者灸之便通此法起死人

又灸心主尺澤亦佳

又灸乳下一寸三十壯

凡噦令人惋恨灸承漿炷如麥大七壯

又灸臍下四指七壯

治卒噦灸亶中中府胃管各數十壯灸尺澤巨闕各七壯

灸吐法

吐逆不得食灸心俞百壯

吐逆不得下食今日食明日吐灸膈俞百壯

卒吐逆灸乳下一寸七壯

吐變不下食灸胷堂百壯

又灸巨闕五十壯　又灸胃管百壯三報之

又灸脾募百壯一名章門在大横外直臍季肋端三報之

嘔吐宿汁吞酸灸神光一名膽募百壯三報之甲乙經云日月膽募也在期門下五分

嘔吐欬逆霍亂吐血灸手心主五十壯

噫噦膈中氣閉塞灸腋下聚毛下附脇宛宛中五十壯神良

噫噦嘔逆灸石關百壯

肺病第七　四十五法

肺脹氣搶脅下熱痛灸俠胃管兩邊相去一寸名陰都隨年壯

又刺手太陰出血主肺熱氣上欬嗽寸口是也

肺脹脅滿嘔吐上氣等灸大椎并兩乳上第三肋間各三壯

凡肺風氣痿絶四肢脹滿喘逆胷滿灸肺俞各兩壯肺俞對乳引繩度之

肺俞主喉痹氣逆欬嗽口中涎唾灸七壯亦隨年壯可至百壯

嘔吐上氣灸尺澤在肘中大不三則七

腹中雷鳴相逐食不化逆氣灸上管下一寸名太倉七壯

章門一名長平二穴在大横外直臍季肋端主奔豘腹腫灸百壯

治奔豘上氣法

又灸氣海百壯在臍下一寸半

又灸關元五十壯亦可百壯在臍下三寸

中極一名玉泉在臍下四寸主奔豘搶心不得息灸五十壯

心中煩熱奔豘胃氣脹滿不能食鍼上管入八分得氣即寫若心痛不能食爲冷氣宜先補後寫神驗灸之亦佳日二七至一百止不差倍之大忌房室

奔豘冷氣心間伏梁狀如覆杯冷結諸氣鍼中管入八分留七呼在上管下一寸寫五吸疾出鍼須灸日二七壯至四百止愼忌房室

又中府二穴主奔豘上下腹中與腰相引痛灸一百壯

又期門二穴直乳下二肋端傍一寸五分主奔豘灸百壯

又四滿俠丹田兩傍相去三寸灸百壯（一云三十壯）主奔豘氣上下搶心腹痛

凡上氣冷發腹中雷鳴轉叫嘔逆不食灸太衝不限壯數從痛至不痛止灶如雀矢太

第四椎名巨闕俞主胸膈中氣灸隨年壯

太倉一穴一名胃募心下四寸主心腹諸病堅滿煩痛憂思結氣寒冷霍亂心痛吐下食飲不消腸鳴泄痢灸百壯

肓募二穴在乳頭斜度至臍中屈去半從乳下行盡度頭是主結氣囊裏鍼藥所不及灸隨年壯

臍下結痛流入陰中發作無時此冷氣灸關元百壯

又灸天井百壯

氣短不語灸大椎隨年壯　又灸肺俞百壯
又灸肝俞百壯　又灸尺澤百壯
又灸小指第四指間交脉上七壯
又灸手十指頭各十壯
少年房多短氣灸鳩尾頭五十壯　又灸臍孔中二七壯
乏氣灸第五椎下隨年壯
下氣灸肺俞百壯
又灸太衝五十壯此穴并主肺痿

灸飛尸法

以繩量病人兩乳間中屈又從乳頭向外量使肋鏬於繩頭
灸隨年壯主一切注（千金云三壯或七壯男左女右）
胃管主五毒注不能食飲百病灸至千壯
忤注灸手肘尖隨年壯（佚一文）

又第七椎灸隨年壯
又灸心下一寸三百壯
食注灸手小指頭隨年壯男左女右
水注口中涌水出經云肺來乘腎食後吐水灸肺俞及三陰
交隨年壯寫肺補腎
灸一切注無新久者先仰臥灸兩乳兩邊斜下三寸名注市
隨年壯
第二肋間名期門灸隨年壯（凡中尸者飛尸遁尸風尸尸注也今皆取一方治之其狀皆腹脹痛急不得氣息上衝心胷兩脅或踝踊起或攣引腰脊灸乳後三寸男左女右可二七壯不止者多其壯數即愈）
又兩手大指頭各灸七壯
乳下一寸逐病所在灸之病差止
一切惡注氣急不得息欲絶者及積年不差者男左手虎口

文於左乳頭並四指當小指節下間灸之婦人以右手也

大腸病第八 一十二法 論首

大腸俞主腸中臚脹食不消化灸四十壯

俠巨闕相去五寸名承滿主腸中雷鳴相逐痢下兩邊一處各灸五十壯

治欬嗽法

肝欬刺足太衝心欬刺手神門脾欬刺足太白肺欬刺手太泉腎欬刺足大谿膽欬刺陽陵泉厥陰欬刺手大陵

嗽灸兩乳下黑白肉際各一百壯即差

又以蒲當乳頭周匝圍身令前後正平當脊骨解中灸十壯

又以繩橫度口中折繩從脊灸繩兩頭邊各八十壯三報之三日畢兩邊者口合度也

又灸大椎下數下行第五節下第六節上穴中間一處隨年壯并主上氣

呀嗽灸兩屈肘裏大橫文下頭隨年壯

上氣欬逆短氣氣滿食不下灸肺募五十壯

上氣欬逆短氣風勞百病灸肩井二百壯

上氣短氣欬逆胷背徹痛灸風門熱府百壯

上氣欬逆短氣胷滿多唾唾血冷痰灸肺俞隨年壯千金云五十壯

上氣氣悶欬逆咽塞聲壞喉中猜猜灸天瞿五十壯一名天突

上氣胷滿短氣灸雲門五十壯

上氣欬逆胷痺徹背痛灸胷堂百壯忌刺

上氣欬逆灸亶中五十壯

上氣欬逆胷滿短氣牽背徹痛灸巨闕期門各五十壯

灸欬手屈臂中有橫文外骨捻頭得痛處二七壯

又內踝上三寸絕骨宛宛中灸五十壯主欬逆虛勞寒損憂

恚筋骨攣痛又主心中欬逆洩注腹痛喉痺項頸滿腸痔
逆氣痔血陰急鼻衂骨瘡大小便澀鼻中乾燥煩滿狂易
走氣凡二十二種病皆當灸之也
論曰凡上氣有服吐藥得瘥亦有鍼灸得除者宜深體悟之

治淡飲法

諸結積留飲澼囊胷滿飲食不消灸通谷五十壯
又灸胃管三百壯三報之
心下堅積聚冷熱腹脹灸上管百壯三報之

腎病第九二十四法

對臍當脊兩邊相去各一寸五分名腎俞主腎間風虚灸
百壯

治小便失精法

灸第七椎兩傍三十壯
又灸第十椎兩傍三十壯
又灸陽陵泉陰陵泉各隨年壯
灸第十九椎兩傍各三十壯
夢泄精灸中封五十壯
男女夢與人交洩精三陰交灸五壯喜夢泄神良
丈夫夢失精小便濁難灸腎俞百壯
男子陰中疼痛尿血精出灸列缺五十壯失精五藏虚竭灸
曲骨端五十壯陰上橫骨中央宛曲如却月中央是也一
名橫骨
男子失精陰上縮莖中痛灸大赫三十壯在俠曲骨端三寸
男子腰脊冷疼小便白濁灸脾募百壯
男子失精膝脛疼冷灸曲泉百壯
男子失精陰縮灸中封五十壯

第二十二椎主腰背不便筋攣痹縮虛熱閉塞灸隨年壯兩
傍各一寸五分
小腸俞主小便不利少腹脹滿虛乏灸隨年壯
骨髓冷疼灸上廉七十壯三里下三寸

治腰疼法

腰卒痛去窮脊上一寸灸七壯
腎俞主五藏虛勞少腹弦急脹熱灸五十壯老小損之若虛冷可至百壯橫三間寸灸之腰痛不得動者令病人正立以竹杖拄地度至臍取杖度背脊灸杖頭處隨年壯良灸訖藏竹杖勿令人得之丈夫痔下血脫肛不食長洩痢婦人崩中去血帶下淋露去赤白雜汁皆灸之此俠兩傍各一寸橫三間寸灸之腰痛灸足跟上斜文中白肉際十壯
又灸巨陽十壯巨陽在外踝下
又灸腰目窌在尻上約左右是
又灸八窌及外踝上骨約中

膀胱病第十三十二法

灸轉胞法

玉泉主腰痛小便不利若胞轉灸七壯
第十七椎灸五十壯
又灸臍下一寸
又灸臍下四寸各隨年壯
第四椎名厥陰俞主胷中膈氣積聚好吐隨年壯灸之
俠屈骨相去五寸名水道主三焦膀胱腎中熱氣隨年壯屈骨在臍下五寸屈骨端水道俠兩傍各二寸半
俠臍傍相去兩邊各二寸半名大橫主四肢不可舉動多汗洞痢灸之隨年壯

第十五椎名下極俞主腹中疾腰痛膀胱寒澼飲注下隨年壯灸之

小腸俞主膀胱三焦津液下大小腸寒熱赤白洩洞痢腰脊痛又主小便不利婦人帶下灸之各五十壯

小腸俞主三焦寒熱一如灸腎法

治霍亂法

凡霍亂灸之或雖未即差終無死憂不可逆灸或但先腹痛或先下後吐當隨病狀灸之内鹽臍中灸二七壯并主脹滿

治霍亂轉筋令病人正合面卧伸兩手着身以繩横兩肘尖頭依繩下俠脊骨兩傍相去一寸半灸一百壯無不差者

肘後云此華佗法

若先心痛先吐灸巨闕二七壯不差更二七壯

若先腹痛灸太倉二七壯不差更二七壯

若先下痢灸穀門在臍傍二寸男左女右一名大腸募灸二七壯不止更灸二七壯

吐痢不禁三陰三陽但數者灸心蔽骨下三寸

又灸臍下三寸各六七十壯

霍亂上下吐瀉灸臍下十四壯

又灸關元三七壯

手足逆冷灸三陰交各七壯不差更七壯

轉筋灸涌泉三七壯不止灸足踵聚筋上白肉際七壯立愈

又灸慈宮二七壯

走哺轉筋灸踵踝白肉際左右各二十一壯

又灸少腹下横骨中央隨年壯

轉筋四厥灸兩乳根黑白際各一壯

轉筋在兩臂及胷中灸手掌白肉際七壯

又灸亶中中府巨闕胃管尺澤

又灸承筋五十壯

又灸承山一百壯

下若不止灸大都在足大拇指本節內側白肉際各七壯

若轉筋入腹欲死四人持其手足灸臍上一寸十四壯四五壯自不動勿持之

又中管建里二穴皆主霍亂腸鳴腹痛脹滿弦急上氣鍼入八分留七呼寫五吸疾出鍼可灸百壯日二七壯

千金翼方卷第二十七

千金翼方卷第二十八

鍼灸下

消渴第一 論一首 十二法

消渴咽喉乾灸胃下俞三穴各百壯在背第八椎下橫三間寸灸之

消渴口乾不可忍小腸俞百壯橫三間寸灸之

消渴欬逆灸手厥陰隨年壯

消渴口乾灸胷堂五十壯

又灸足太陽五十壯

消渴口乾煩悶灸足厥陰百壯

又灸陽池五十壯

建氏灸消渴法

初灸兩手足小指頭及項椎隨年壯

又灸膀胱俞横三間寸灸之各三十壯五日一報之

又灸背脾俞下四寸俠脊梁一寸半二穴隨年壯

論曰灸上諸穴訖當煑白狗肉作羹汁飲食不用薑醬豉可用葱薤隨意當煑肉骨汁作淡羹可食肉當稍漸進忌食猪肉法須二百日乃善

又灸腎俞二穴并腰目在腎俞下三寸俠脊兩傍各一寸半以指按陷中

又關元俠兩傍各二寸一處

又陰市二穴在膝上當伏菟上三寸臨膝取之

曲泉陰谷陰陵泉復溜凡此諸穴斷小便利大佳不損陽氣亦云上遺尿也太谿中封然谷太白大都趺陽行間大敦隱白涌泉凡此諸穴各一百壯腹背兩脚凡三十七穴其腎俞腰目關元水道可灸三十壯五日一報之各得一百五十壯佳涌泉可灸十壯大敦隱白行間可灸三壯餘者悉七壯皆五日一報之滿三灸可止也若灸諸陰不差可灸諸陽諸陽在脚表宜審用之無有不驗造次則并灸肺俞募按流注孔穴壯數如灸陰家法

灸小便數而少且難用力輙失精此方萬驗也令其人舒兩手合掌并兩大指令齊急逼之令兩爪甲相近以一炷灸兩爪甲本肉際際方後自然有角令炷當兩角中小侵入爪上此兩指共當一炷也亦灸脚大指與手同法各三炷經三日又灸之此法甚驗

淋病第二　二十三法

著鹽臍中灸三壯

五淋不得尿灸懸泉二七壯在內踝前一寸斜行小脉闕是中封之別名

五淋灸大敦三十壯

氣淋灸關元五十壯

又俠玉泉相去一寸半灸三十壯

勞淋足太陰百壯在内踝上三寸三報之

石淋臍下三十六種疾不得小便灸關元三十壯一云百壯

血淋灸丹田隨年壯

血淋灸腹溜五十壯

卒淋灸外踝尖七壯

失禁尿不自覺知鍼陰陵泉入五分灸隨年壯

莖中痛灸行間三十壯

屈骨端主腹中滿小便數灸二七壯小兒以意量之

不得尿灸太衝五十壯

失尿不禁法

灸大敦七壯　又灸行間七壯

小兒遺尿灸臍下一寸半隨年壯　又大敦一壯

尿床灸法

垂兩手髀上盡指頭上陷處灸七壯　又臍下橫文七壯

遺尿鍼遺道入二寸補之在俠玉泉五寸灸隨年壯　又灸陰陵泉隨年壯　又足陽明隨年壯鍼入三分

尿血第三　七法

第七椎兩邊各五寸主尿血

又灸大敦各隨年壯

虛勞尿血白濁灸脾俞百壯

又灸三焦俞百壯

又灸腎俞百壯

又灸章門百壯

尿黃灸石門五十壯

水病第四　一十五法

灸足第二指上一寸隨年壯
又兩手大指縫頭各灸七壯
虛勞浮腫灸太衝百壯
灸腎俞百壯主病水腫
灸胃倉隨年壯
水腫灸陷谷隨年壯
水腫氣上下灸陰交百壯
水腫脹灸曲骨百壯
大腹灸陰市隨年壯
人中滿脣腫及水腫大水灸臍中石門各百壯
風水灸上廉隨年壯
水腫不得臥灸陰陵泉百壯
石水灸然谷氣衝四滿章門

水分主水腫脹滿不能食堅硬灸日七壯至四百即止忌鍼鍼水出盡即死水病灸至差止在下管下一寸
鼓脹灸中封二百壯

癰疽第五 七法論一首

卒疽著五指急不得屈伸灸踝尖上數壯亦可至一百壯
凡卒患腰腫附骨腫癰疽節腫風遊毒熱腫此等諸疾但初覺有異即急灸之立愈遇之腫成不須灸從手掌後第一橫文後兩筋間當度頭灸五壯立愈患左灸右患右灸左當心胷中者灸兩手俱下文
丁腫在左灸左臂曲肘文前取病人三指外於臂上處中灸之兩筋間從不痛至痛腫在右從右灸不過三四日差
又灸掌後橫文從五指男左女右七壯即驗已用得効
論曰丁腫灸法雖多然此一法亦甚効驗出於意表也

癮㾬灸曲池二穴隨年壯神良

頭痛癮㾬灸天窻七壯

白癜白駮浸淫瘻瘍著頭及胷前灸兩乳間隨年壯立差

痔漏第六 十八法

鍼漏法

少海在臂曲側肘内横文頭屈手向頭取之主腋下瘰癧漏臂疼屈伸不得風痺瘙漏鍼入三分留七呼寫五呼

鍼瘰癧先拄鍼皮上三十六息推鍼入内之追核大小勿出核三上三下乃拔出鍼

灸漏法

頸漏灸天池百壯穴在乳後一寸腋下著脅直腋屈肋間

又灸兩耳後髮際直脉七壯

又灸背後兩邊腋下後文頭隨年壯

又灸心鳩尾下宛宛中七十壯

又兩膀内有患癧處宛宛中百壯

又灸章門臨泣支溝陽輔各百壯

又以艾炷繞四畔周匝灸七壯即止

又灸肩井隨年壯 一云二百壯

諸惡漏中冷息肉出灸足内踝上各三壯二年者六壯

鍼痔法

長強在窮脊骨下宛宛中主下漏五痔甘䘌食下部鍼入三寸伏地取之以大痛為度灸亦良不及鍼灸日三十壯至七日止特忌房室

鍼足太陰穴在内踝上一夫一名三陰交亦主大便不利鍼入三分

飛揚商丘復溜勞宮會陰承筋扶承委陽委中並主之

灸腸癰法

屈兩肘正尖頭骨各灸百壯則下膿血者愈

灸乳癰妒乳法

灸兩手魚際各二七壯斷癰脉也

又以繩横度口以度從乳上行灸度頭二七壯

指忽掣痛不可忍灸指端七壯

脫肛第七 四十法

灸尾翠骨七壯立愈主脫肚神良

又灸臍中隨年壯

灸癭法

灸風池俠項兩邊兩穴耳上髮際百壯又大椎百壯大椎兩邊相去各一寸半小垂下各三十壯又頸衝在兩伸手直向前令臂著頭對鼻所住處一名臂臑灸隨年壯凡五處共九穴又垂兩手兩腋上文頭各灸三百壯鍼亦良

灸癭肩髃左右相宛宛中男左十八壯右十七壯女右十八壯左十七壯冊三以差止

癭上氣短氣灸肺俞一百壯

癭上氣胷滿灸雲門五十壯

癭惡氣灸胷堂百壯

又灸天府五十壯

又灸大椎横三間寸灸之

又灸衝陽隨年壯在肘外屈横文外頭據此是曲池穴衝陽在足趺上五寸

癭灸天瞿三百壯横三間寸灸之

癭氣面腫灸通天五十壯

癭灸中封隨年壯

灸癲卵法

以蒲横度口如横折之一倍增之以布著少腹横理令度中央上
當臍勿令偏僻灸度頭及中央合三處隨年壯好自養勿勞動作
役大言大怒大笑
又牽陰頭正上行灸頭所極牽向左右髀直下行皆倣此隨年壯
又灸足厥陰在右灸左在左灸右各三壯厥陰在足大指本節間
男癩有腸癩卵癩氣癩水癩四種腸癩卵癩難差氣癩水癩鍼灸
易差卵偏大入腹灸三陰交隨年壯在内踝上八寸
又肩井肩臂接處灸隨年壯
又灸關元百壯
又灸手小指端七壯在左灸右在右灸左
癩卵偏大灸玉泉百壯報之
又灸泉陰百壯三報之在横骨邊三寸
凡癩病陰卒腫者令並足合兩拇指爪甲相並以一艾炷灸兩爪
端方角上七壯
陰腫欲潰困灸足大拇指本節横文中五壯
又灸足太陽五十壯報之
又灸足太陰五十壯在内踝上一夫
又灸大敦在足大指三毛中隨年壯
又灸足大指内側去端一寸白肉際隨年壯甚驗若雙癩灸兩處
又横骨兩邊二七壯俠莖灸之
又足大指下理中十壯隨腫邊灸之神驗
小兒癩先時將兒至碓頭呪之曰坐汝令兒某甲陰囊癩故灸汝
三七二十一灸訖便牽兒令雀頭向下著囊縫當陰頭灸縫上七
壯即消已用有驗又炷如蝟屎頭大
凡男癩當騎碓軸以莖中置軸上齊陰莖頭前灸軸木上隨年壯
即愈

夘腫如瓜入腹欲死灸足大指下横文中隨年壯

灸汗法

多汗寒熱灸玉枕五十壯鍼入三分

多汗瘧病灸譩譆五十壯

盜汗寒熱惡寒灸肺俞隨年壯鍼入五分

又灸陰都各一百壯鍼入八分補之穴在俠胃管相去三寸

多汗四肢不舉少力灸横文五十壯在俠臍相去七寸

又灸長平五十壯在俠臍相去五寸不鍼

卒死第八（十三法）

鍼間使百息　又灸人中

灸魘不覺法

灸兩足大指聚毛中二十一壯

治卒忤法

灸人中三十壯　又灸肩井百壯

又灸間使七壯　又灸巨闕百壯

又灸十指爪甲下各三壯

治鬼擊法

夫鬼擊之為病卒著人如刀刺狀胷脅及心腹絞切急痛不可按抑或即吐血或即鼻中出血或下血一名鬼排灸人中一壯立愈若不止更加灸臍上一寸七壯又灸臍下一寸三壯（一云七壯）

中惡灸胃管五十壯

治蛇毒灸毒上三七壯無艾以火頭稱瘡孔大小爇之

治熱暍灸兩乳頭七壯

治狂犬咬人令人吮去惡血盡灸百壯已後日日灸一百日乃止差血不出慎酒豬肉一生慎之

雜法第九

用鍼法

凡用鍼者虛則實之滿則泄之宛陳則除之邪勝則虛之大要徐而疾則實疾而徐則虛言實與虛若有若無察其後先若存若亡爲虛爲實若得若失虛實之要九鍼最妙補寫之時以鍼爲之重則爲補輕則爲寫雖有分寸得氣即止明堂偃側鍼訖皆無不灸凡病皆由血氣擁滯不得宣通鍼以開道之灸以溫煖之灸已好須將護生冷醋滑等若不謹慎之反增疾矣

黃帝曰五藏五行五時病何以故岐伯曰假令春月和暢條芳水淥心盪意盈神亂於內而形病於外卒有西方飄風凜然毛聳因腠理開不復得散便居孫脉孫脉滿流入絡脉絡脉入大經大經注府府歸藏四時同然故風病多歸於心也手心主灸刺血出多令人心驚三里刺入四分令人氣上涌泉刺深殺人陰交灸多絕孕

凡諸孔穴名不徒設皆有深意故穴名近於木者屬肝穴名近於神者屬心穴名近於金玉者屬肺穴名近於水者屬腎是以神之所藏亦各有所屬穴名府者神之所集穴名門戶者神之所出入穴名舍宅者神之所安穴名臺者神所遊觀穴名所主皆有所況以推百方庶事皆然(穴名五藏元闕脾)凡孔穴者是經絡所行往來處引氣遠入抽病也故經云灸三壯者即爲足數也

禁忌法

凡灸頭與四肢皆不欲少須熟宜令灸計壯滿三百足以愈病頭手足肉薄若併灸則血氣絕於下宜時歇火氣少時令血氣遂通使火氣流行積數大足自然邪除疾差也乃止火耳本經多云刺入三分灸三壯茲乃舉其大綱未盡聖心且手足皮薄炷小數少腹背肉厚炷大壯多斯皆以意商量也背欲熟即爲佳也凡灸生

熟候人盛衰老少肥盛灸之

凡微數之脉及新得汗後並忌灸

凡孔穴皆逐人形大小取手中指第一節爲寸男左女右一云三寸者盡一中指也人年三十以上若灸頭不灸三里穴令人氣上眼闇所以三里穴下氣也

一切病皆灸三里三壯每日常灸下氣氣止停也

凡灸法先發於上後發於下先發於陽後發於陰凡鍼刺大法在午時後不欲午時前

治冷痺脛膝疼腰脚攣急足冷氣上不能久立有時厭厭嗜臥手脚沈重日覺羸瘦此名復連病令人極無情地常愁不樂健忘嗔喜有如此候即宜灸之當灸懸鍾穴在足外踝上三指當骨上各灸隨年壯一灸即愈不得再灸也取法以草從手指中文橫三指令至兩畔齊將度外踝從下骨頭與度齊向上當骨點之兩脚令三姓人灸之候天晴日午後在門外四達道上灸之神良若年月久更發依法更灸若意便欲多者七日外更灸七壯

巨闕可百壯　上管可二百壯　中管可千壯　下至五五百壯
下管可百壯　中守可一百壯　陰交可三百壯　中極可五百壯
大椎可三百壯　風門可二百壯　䰟門可五壯　陽綱可五壯
意舍可百壯　肓門胞門可各一百壯　懸樞可五壯
命門可七壯　白環俞可三壯又云七壯　心俞　肝俞　肺俞
脾俞　腎俞　小腸俞　膽俞　大腸俞　胃俞　膀胱俞
三焦俞　膈俞

右五藏六府俞皆得滿一百壯

肺募中府　心募巨闕　肝募期門　膽募日月
脾募章門　腎募京門　小腸募關元　三焦募石門
大腸募天樞　膀胱募中極　胃募中管

右五藏六府募亦得滿百壯
鳩尾三十壯三報之　巨闕五十壯　上管胃管建里下管水分
臍中各五十壯三報之　陰交　氣海　石門　關元五十壯
中極五十壯
右從鳩尾下第一行皆得百壯以此爲大率自外諸穴或中病
乃止或取隨年壯以意商量也
頭維　腦户　風府　絲竹空　下關　耳中　人迎
瘖門　承泣　經渠　脊中　氣衝　鳩尾　地五會　陰市
陽關　乳中　泉腋　伏菟　承光　天府　白環俞　石門女人忌灸
右二十四處禁不可灸大忌
上關　左角　乳中　鳩尾　五里　承筋　復溜　顱息
缺盆　臍中　神庭　雲門　伏菟　三陽絡　然谷
右十五穴禁不可刺大凶

玉枕、維角　睛明　舌根　結喉　胡脉　天窻　神符
巨覺一作　血海　足太陰　丘墟
右十二穴無病不可灸刺

鍼灸宜忌第十

論曰凡欲灸鍼必先診脉知醫須看病者行年本命禍害絶命
生氣所在又須看破除開日人神取天醫若事急卒暴不得已者
則不拘此也既得吉辰當知忌穴乃以繩量依圖朱點并疏患穴
及壯數然後用心乃療之則無不愈矣其分寸法取病人男左女
右手中指第一節爲寸宜忌等列之如左

治病服藥鍼灸法訣

凡鍼灸服藥皆須審知病人生年月日推其行年遊宫生氣絶命
訖乃处斷之
舊法男避除女避破又男忌戊女忌己

假令木命人行年又在木則不宜鍼及服青色藥
火命人行年又在火則不宜發汗及服赤色藥
土命人行年又在土則不宜吐及服黃色藥
金命人行年又在金則不宜灸及服白色藥
水命人行年又在水則不宜下及服黑色藥
凡醫者不知此法下手即困若遇病人年命厄會深者下手即死矣

凡入月六日十五日十八日二十二日二十四日小盡日治病令人長病

戊午甲午此二日大忌鍼刺出血服藥及灸不出月凶
甲辰庚寅乙卯丙辰辛巳此日灸刺大凶
壬辰此一日大忌鍼灸
甲辰巳巳丙午丁巳此日男子特忌鍼灸
甲寅乙卯乙酉乙巳此日女人特忌鍼灸
丙子壬子甲子丙辰丁巳辛卯癸卯乙亥以上日切忌鍼灸

立春春分脾　立夏夏至肺　立秋秋分肝　立冬冬至心
四季十二日後腎　右以前日並不得治療凶

凡五藏王時不得治及鍼灸其經絡凶
凡春左脅　秋右脅　夏臍　冬腰　以上人神皆不宜鍼灸
凡五辰五酉五未等日及八節先一日後一日皆不得鍼灸

建日申時頭　除日酉時膝　滿日戌時腹　平日亥時腰背
定日子時心　執日丑時手　破日寅時口　危日卯時鼻
成日辰時脅　收日巳時足　開日午時耳　閉日未時目
右件其時並不得犯其處殺人

一日足大指　二日外踝　三日股內及脚腨　四日腰及髀
五日口齒舌根咽懸癰及足指　六日手小指少陽及臍下　七

日內踝　八日足腕（一云脚）　九日尻尾手陽明　十日腰眼及足拇指　十一日鼻柱及眉　十二日髮際　十三日牙齒　十四日胃管咽喉足陽明　十五日遍身　十六日胷乳　十七日氣衝及脅　十八日股內及腨腸　十九日足趺足下及項　二十日膝以下（一云內踝及膊）　二十一日脣舌足小指　二十二日伏兔外踝（一云胷臆中）　二十三日肝俞足趺兩腋　二十四日足陽明兩脅及小腸　二十五日足陽明心腹（一云膝足）　二十六日手足胷　二十七日膝內踝（一云膝肩臍髖下及兩足并陰囊中）　二十八日內踝玉莖（一云陰中）（頰及耳）　二十九日膝頭顳顬兩手足　三十日關元下至足（一云足趺）（上及頰膝頭　又云遍身）

右人神並須依之吉

肝神丁卯　心神庚辰　肺神癸酉　腎神庚子　脾神戊己

此五神之日特須避之餘日不假避諱也余以此論爲得之近矣必須依而行之餘者猥碎徒費辞難領固非君子之言諸忌之法以施俗士通人達道豈拘此哉

月忌	正	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	
血忌	丑	未	寅	申	卯	酉	辰	戌	巳	亥	午	子	忌鍼灸
月厭	戌	酉	申	未	午	巳	辰	卯	寅	丑	子	亥	忌鍼灸
四激	戌	戌	戌	丑	丑	丑	辰	辰	辰	未	未	未	忌鍼灸
月殺	丑	戌	未	辰	丑	戌	未	辰	丑	戌	未	辰	忌鍼灸千金法不同
月刑	巳	子	辰	申	午	丑	寅	酉	未	亥	卯	戌	忌鍼灸
六害	巳	辰	卯	寅	丑	子	亥	戌	酉	申	未	午	忌鍼灸
天醫	卯	寅	丑	子	亥	戌	酉	申	未	午	巳	辰	宜尋醫取藥呼師

右呼師宜天醫上來療病吉若刑害上來及鍼灸大凶

又行年天醫法

人年至子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥

天醫卯戌子未酉亥辰寅巳午丑申

推歲天醫法

常以傳送加大歲太一下爲天醫

推月天醫法

陽月以大吉陰月以小吉加月建功曹下爲鬼道傳送下爲天醫

避病法

以小吉加月建登明下爲天醫

療病法

以月將加時天醫加病人年上療之差

日天醫法

甲乙丙丁戊己庚辛壬癸　天醫卯亥丑未巳

行年人神所在法

年一歲　十三　二十五　三十七　四十九　六十一
七十三、八十五　神在心辰
年二歲　十四　二十六　三十八　五十　六十二
七十四　八十六　神在喉卯
年三歲　十五　二十七　三十九　五十一　六十三
七十五　八十七　神在頭寅
年四歲　十六　二十八　四十　五十二　六十四
七十六　八十八　神在肩丑
年五歲　十七　二十九　四十一　五十三　六十五
七十七　八十九　神在背子
年六歲　十八　三十　四十二　五十四　六十六
七十八　九十　神在腰亥
年七歲　十九　三十一　四十三　五十五　六十七
七十九　九十一　神在腹戌

年八歲　二十　三十二　四十四　五十六　六十八
八十　九十二　神在頭酉
年九歲　二十一　三十三　四十五　五十七　六十九
八十一　九十三　神在足申
年十歲　二十二　三十四　四十六　五十八　七十
八十二　九十四　神在膝未
年十一歲　二十三　三十五　四十七　五十九　七十一
八十三　九十五　神在陰午
年十二歲　二十四　三十六　四十八　六十　七十二
八十四　九十六　神在股巳

十日人神所在

甲日在頭　乙日在項　丙日在肩臂　丁日在胷脅　戊日在腹
己日在背　庚日在膝　辛日在脾　壬日在腎　癸日在足

十二日人神所在

子日在目　丑日在耳　寅日在胷一云面及口
卯日在鼻一云在脾　辰日在腰　巳日在手一云在頭口
午日在心腹　未日在足一云兩足心　申日在頭一云在肩額又云在腰
酉日在背一云在脛　戌日在頸一云在咽喉　亥日在項一云在臂頸又云兩膝

十二時人神所在

子時在踝　丑時在頭　寅時在耳一云在目
卯時在面一云在耳　辰時在項一云在口　巳時在乳一云在肩
午時在胷脅　未時在腹　申時在心
酉時在膝一云在背脾　戌時在腰一云在陰左右　亥時在股

右件人神所在血不可鍼灸損傷慎之慎之

千金翼方卷第二十八

千金翼方卷第二十九

禁經上

論曰夫清濁未分無間昏曉玄黃肇判乃見温涼四時攸分降生寒暑三光照爛日景虧盈人禀五常腠理通塞故老子曰吾所以有大患者為吾有身及吾無身吾有何患由此觀之形質既著則痾瘵興焉静言思之惟無形者可得遠於憂患矣夫天地聖人尚不能無患況如風燭者乎古有調針切脉之君嘗藥鍊石之帝憂勞庶類不遑寧處者亦以衆矣自時厥後窮神極智之士抽心盡思之賢相與贊成其業者不可勝紀是以醫方千卷未盡其性故有湯藥焉有鍼灸焉有禁呪焉有符印焉有導引焉斯之五法皆救急之術也何者病起無端醫療萬品閭閻之内猶有夭枉之哀朝野之中尚致膏肓之疾誠可悲夫方今醫者學不稽古識悟非深各承家技便為洞達自負其長競稱彼短由斯對執卒不得挹

其源流也余早慕方技長崇醫道偶逢一法豈悋千金遂使名方異術莫能隱秘且此書也人間皆有而其文零疊不成卷軸縱令有者不過三章兩章既不專精探其至賾終爲難備斯之一法體是神秘詳其辭采不近人情故不可得推而曉也但按法施行功效出於意表不有所緝將恐零落今編爲兩卷凡二十二篇名曰禁經其於條例後科詳悉博雅君子無或隱焉

持禁齋戒法第一

神仙經曰凡欲學禁先持知五戒十善八忌四歸皆能備治此者萬神扶助禁法乃行

五戒者

一曰不殺　二曰不盜　三曰不淫　四曰不妄語

五曰不飲酒嫉妒

十善者

一濟扶苦難　二行道見死人及鳥獸死者皆埋之

三敬重鬼神　四不行殺害起慈愍心　五不憐富憎貧

六心行平等　七不重貴輕賤　八不食酒肉五辛

九不淫聲色　十調和心性不乍嗔乍喜

八忌者

一忌見死屍　二忌見斬血　三忌見産乳　四忌見六畜産

五忌見喪孝哭泣　六忌抱小兒　七忌共女人同牀

八忌與雜人論法

四歸者

一不得著穢汚不淨潔衣服即神通不行

二不得惡口呪詛罵詈　三不得共人語詐道稱聖

四不得飲酒食肉殺害無道

又云不得穢處誦禁文　又云不得與不信人行禁

又不得向人說禁法　又不得穢汙手執禁文
又不得與雜人諠戲　又不得輕說神明
又不得嗔打六畜及人不得乘車馬
有犯此滿三事則禁道不行能不犯者其禁大驗
經曰若履城邑汙穢者當用此方
竹葉拾两　桃白皮肆两　柳白皮肆两
右三味以水壹石貳斗煑之一沸去滓浴身百穢消除又辟温
瘴瘟疫此法天仙下游既返之日未嘗不用此方解穢也至於
符水呪漱及外舍之近術皆不及此方若能常用此湯湯浴者
益佳惟不可洗目也
紫微王夫人勑水洗目得清淨法
呪曰濁不穢形死不妨生摩掌㲉目三遍令我長生青龍在吾左
白虎在吾右朱雀在吾前玄武在吾後神禁勑水除塵垢急急如

律令　一法解穢禁水曰東流之水滑如苔中有主君與三台某
甲汚穢蕩除急急如律令
受禁法第二
神仙經曰陽道強堅而易歇陰道微軟而久長聖人閉口萬物可
藏迴轉清白改易陰陽應言不言神明相傳應語不語神明相與
故萬法閉口藏身之禁法流行五藏神明衆人游戲而我獨往衆
人浩浩而我獨靜衆人言說而我獨嘿此行禁之道畢矣
仙經曰凡受禁之法當先齋戒百日精心不行淫慾惟得清淨沐
浴著鮮淨衣口常不出惡言罵詈精思靜念勿生異想一如前章
仍更七日之中閉口不共人語乃可受之
正月一日　三月三日　五月五日　七月七日　九月九日
三年之中三遍於此月日受之并一心持齋戒不犯則行禁其
驗如神

正月一日受法

正月一日平旦寅時清淨澡漱在無人清淨之處著鮮淨衣不得令人輒見燒衆名香正面向東禹步三匝勿迴轉長跪讀啓度文曰上啓三師神童玉女天醫盧醫一切諸師太上老君諸仙神王日月五星二十八宿北斗三台諸神仙官屬諸大神王咸知弟子某甲受持符禁之法願濟拔衆生苦難除毒消邪辟却奸惡萬事如勑急急如太上老君律令

都受禁文曰

想東方木禁在吾肝中　想南方火禁在吾心中

想西方金禁在吾肺中　想北方水禁在吾腎中

想中央土禁在吾脾中

想左青龍右白虎前朱雀後玄武天師禁駕萬無事不苦東王公西王母道吾禁有隨當止急急如太上老君律令訖還誦所得禁文各三遍禮一十二拜仍更七日勿共人作一言及惡罵詈等語七日勿洗手

三月三日受法

三月三日平旦寅時至東流水上正面向東立端心正意讀前啓度文如正月法并啓江河四瀆一切水官四海大龍王願知弟子某甲受持禁法願大神王立契訖誦所得禁文各六遍禮九拜

五月五日受法

五月五日正中午時在靜處燒香正面向南立讀啓度文訖誦所得禁文各三遍禮十二拜

七月七日受法

七月七日雞鳴丑時在靜處燒香正面向西立讀啓度文訖誦所得禁文各三遍禮七拜

九月九日受法

九月九日人定亥時在靜處正面向北立盆盛水口銜刀讀啓度文投香火長跪誦所得禁文各三遍禮九拜此五日處法用一如正月法惟所向方及拜數不同耳

太白仙人受法

四月一日齋戒至八日立道場四面懸幡蓋燒香然燈啓醮五方五帝五方禁師五方呑精啖毒夜叉神王願知弟子某甲受持禁法呪訖誦所得禁文各三遍七日齋戒

同力受禁法

候初雷時舉目看雷右手把刀以左手摩之呪曰助我行禁振聲如雷吼萬毒伏閉氣待雷聲盡訖七日齋戒不出言一本云候初雷時眼所見物隨便把取唱言聲如雷萬邪皆怖畏待雷聲盡乃棄之一云口銜刀手捉大斧摩之言口如毒手如毒聲如雷吼云云

神仙王受禁法

候鷰初來時仰頭看之以手按地云口如毒以鷰去不見乃止此等潔淨齋戒一如正月不別乃至七日不洗手

天帝太一受禁法

初受禁時在寂靜無人之處敷坐設案燒香正面向北閉口並足正立左手持刀依式思存青龍在左白虎在右朱雀在前玄武在後北斗七星覆頭上柄指前次思東治大禁師願持兵萬石趙侯驃騎大將軍蘇平南公八部將軍七十二禁師陳師趙師直符小吏直日童子護直今日不得以左爲右以前爲後若有倒錯即依使者法律科罪之急急如律令如此陰念三遍然後禹步三匝至香火前叩齒三遍呪曰東方青龍銜水來南方赤龍銜水來西方白龍銜水來北方黑龍銜水來中央黃龍銜水來悉投杯中三台三台此水非常水洗除天穢地穢三十六穢某甲身穢淨除之急急如律令三遍呪訖以水洗目并噀四方上下餘水自飲之洗腹

內令淨想又讀前啓度文然後長跪誦所得禁文各三遍訖禮四方各再拜即成神驗刀子水盆不得用曾經酒肉五辛者

又一法

正月一日東方明星出時洗浴在清淨無人之處白茅爲藉置坐設案燒香火井花水洗面目正面東向並足立先舉左手呼青龍次舉右手呼白虎前行呼朱雀後行呼玄武訖依前左手持刀次第思神師日符禁同法更無別法也若欲受符印者以帛若紙子盛挂著左手指句之而擎水盆閉氣禹步依法次第呪請有效也

七星受呪法

正月一日　三月三日　五月五日　七月七日　九月九日

先以香湯洗浴取東流水未經用瓦器盛之以誦所得禁文呪一遍受人自洗浴於曠野無人之處以淨草爲坐以瓦器盛水七盞作七星形北向云謹啓七聖真君弟子某乙願持禁法禁斷邪惡鬼毒之氣救理人民伏願降真氣流布臣身令臣所行符禁應聲除差應手除愈次第飲前件水各少許餘洗手不得手捻不淨之物即有大驗一云七佛呪法下又有一觀自存呪法今並不取

黃帝越禁受法

黃帝曰凡受符禁者皆清淨齋潔百日不得近死亡產乳房室三年之中三度　正月一日　三月三日　五月五日　七月七日　九月九日　以夜衆星之下置神座設案燒香盆盛水臨刀北面叩齒捻三師目次第思神訖禹步三匝長跪讀啓度文又誦所得禁文各三遍神驗水盆不得用曾盛酒肉五辛者臨欲越時朱書帛素上左手持之捻目陰誦呪之欲行禁時閉氣朱書帛素上右手持之捻目陰誦呪之

雜受禁法第三

正月一日日未出寅時　三月三日寅時

五月五日午時　七月七日丑時　九月九日寅時一云丑時
正月受一年用　三月受一春用　五月受一夏用
七月受一秋用　九月受一冬用
右年年常依此日受之法不得飲酒食肉五辛芸薹乳酪酥蜜
心如藥王藥上願救護一切衆生不作艱難不求財物但作此
心下口即差萬不失一受法用前月日先以清淨井花水沐浴
上下衣服一切鮮淨清齋七日至其日先以井花水澡浴漱口
燒香禮五方五帝各五拜訖正面向東燒香端立淨器盛井花
水置傍誦所得禁文各三七遍訖口含水仰噀五方承取洗手
面訖向東方吸青氣想入口中七吸次向南方吸赤氣次向西
方吸白氣次向北方吸黑氣次吸中央黃氣皆作七吸入腹想
訖更禮五方各五拜訖後作兩月持齋戒作得禁想不得作一
切諸惡行受訖即成禁法器物不得用曾經盛酒肉五辛者

受禁腫法

古塚北桑樹陰内有艾者五月五日平旦日未出時從塚北向南
步取五十四步至艾作禹步北斗七星訖還閉氣將取艾葉挼手
使汁入手中七日勿洗手持齋過七日以外即成禁五十四步之
中標記使分明一步七尺登取艾時面向西方呪願我此手一切
癰腫一切諸毒乃至一切病手著即差作法訖還勿反顧受時以
五月四日作齋標記步數亦四日使記先從艾東置魁因北向爲
尾向北五十四步作標記五日旦從北向南步之作法了齋至十
一日上桑樹在塚北從地三尺於塚上生者佳亦於四日在塚東
宿五日旦即作法禹步法閉氣握固若治病時作想此手作熱鐵
叉想前人病如雪手著病即散又治病時常在病人生氣上若病
人頭面上有浮腫不得頻治使盡即傷人必當留少許明日更治
此法大業六年琅邪郡莒縣令梁閣送擅持　山善寂道場靈法師

所行神驗不傳

受禁瘧法

候瘧初來時以紙一張濃點筆於紙上望瘧與點瘧没乃止後若瘧病人來向云我患瘧即語我與你治你但去陰押取一點塞壁孔中即愈 又法 正月元日呼牛馬時火下將筆閉氣多書紙上作鬼字氣盡乃止瘧病欲發時押取一鬼字與吞之即差

受禁腫都禁法

正月元日東方動時以淨席一領於寂靜無人之地以井花水沐浴漱口三遍手持香灶禮五方五帝君呪願曰弟子某甲今日受天神呪願救一切衆生苦四方各禮三拜訖想取東方青氣入口蒲七咽南方赤氣西方白氣北方黑氣中央黃氣等各七咽訖向南東方閉氣誦呪各七遍七日持齋戒呪曰天之所圓地之所方受天神符可以長生二十八宿其色亭亭五色変化與符合并急急如律令次呪曰無根肉本生無留停大腫如山小腫如粟登高山臨海水旦起生向暮死急急如律令

須紫檀杷刀子以刀杷按腫上其腫疼痛用前禁文若不疼痛用此禁禁之然此二禁皆是正禁腫文凡是惡腫皆用此二文

其大腫日別四五度禁五日差小者當日差

大總禁法

呪曰朝日不良為物所傷上告天公下告地皇地皇夫人教我禁瘡仙人持水玉女持漿一唾止毒二唾止瘡三唾已後平復如常天雷馬鳴瘡亦不驚天雷地動瘡亦不恐皮相連肉相當不疼不痛不腫不膿急急如律令用法以刀子一枚先吸一口水捻鹽著口中和水噀病上若小兒驚恐當噀地上一二三過駚唾病上以口附近病上誦禁每一遍三唾每七遍一遍鹽水漱口三七遍成一禁也若不差多加遍數取差為限若百遍不差者此病大重不可

救也慎勿與治

禁時氣病法

頭痛以刀隱痛處唾禁如前緣但有患疼痛處皆用刀背隱而禁之若金瘡從高墮下六畜狼虎毒蛇所傷手足卒攣躄凡百一切痛苦不如意處並用此法禁咒之悉得除愈不可具載男女並得受持

論曰此之雜法由禁師不能具美大法所以須受輕法易者約者若受大法此亦不須

禁法大例第四

論曰用禁大例誦禁文必不得出聲令自耳聞聲若聞之呪即禁法不行行之無益慎之慎之受禁之時不得令人畜等一切見之見之即不成受法時刀及水盆皆不得曾經酒肉五辛用者

神仙經曰對治禁萬病擊同類

逢水難土王擊之　逢土難木王擊之

逢刀難陽精擊之　逢鬼難桃湯擊之

逢虎難五常氣擊之萬病擊同類對治皆持刀持桃持火持鑑持水持繩持藥持符持戟持弓持箭持弩持食持坐持粉持意持神持想持氣持晝持石持土持鹽持幡持脂持肉持血持麪持金持玉持印故其法皆禁擊之所須用禁之法有請有告有祭有害（善神即歆食祭之住之惡鬼即殺之却之）有殺有畏有愛有喜有惡有死有走有住有滅是故對治用時各各條列

仙經曰用禁有六法一牙齒禁意存氣至牙齒二營目禁開一目閉一目三意想禁存意以去想諸疾以除四捻目禁謂手上有一十五日五氣道禁謂吹呼呵噓嘻呬六存神禁存諸神在以食醮祭之感天靈氣至又鳴天鼓叩齒是也

凡爲人請療疾出門三步呪曰

天殺黃黃地殺正方千鬼萬神誰復敢藏飛歩一及百鬼滅
亡急急如律令
若至主人家先當解穢即作五龍水法手持水椀呪曰
東方青龍含水來　南方赤龍含水來
西方白龍含水來　北方黒龍含水來
中央黃龍含水來
五方五龍吐水没殺邪鬼急急如律令訖叩齒三百遍
呪曰神水解天穢地穢生穢死穢人穢鬼穢身穢病人之穢速除
去之立令清淨急急如律令三噓三叱以刀右攪三迴以右足跟
蹴地三下含水四方噴之及噴病人上盡令清潔然後按法思神
行禁又存氣至牙齒令住閉一目存意已去即捻目然後用存七
星在其頂上存青龍白虎朱雀玄武來護身存大神在其前後五
星存之腹內吐氣存如雲霧擊彼處令如徐行步法乾坤如此行

按即外邪不入五藏神明自通仍皆須審之萬不失一【又法】欲向
病人家當須存想作白虎吐火燒病人家屋舍皆令湯盡又作龍
舐病人身肉令盡還作充滿悅懌然後用氣急治之欲擊物一一
皆如是此令行禁神明萬物皆神效驗須精審之若唾熱病以冷
氣吹之二七然後禁之若唾冷病以熱氣呵之二七然後禁之三
唾之後行禁禁後三唾乃放之
仙經曰受符禁同法先當脩身潔已安魂定魄口勿妄言齋戒百
日可致神仙避逆惡氣除滅災祥可以長生

掌訣法第五

天師曰若欲修之先持齋戒一如正月法斷口味絶房室先取龍
骨烏頭附子皐角各一兩以水三斗煮取二斗遍身澡浴有餘者
明日更洗手面訖以盆盛水燒香禹歩三匝口銜刀北面長跪讀
前啓度文訖誦所得禁文各三遍一依正月戒忌即成神驗

天師曰得吾法者上士昇仙下士遷官庶人得之益壽延年父子兄弟不得相傳傳必賢人非賢勿傳殃及子孫

又受禁法

呪曰女口禽艾一日誦七遍七日止

凡禁病大例禁一切病先須口嚼楊枝去口中穢氣訖又嚼鹽乃呪唾之若犯一切口味者即燒牛糞灰淋取汁飲漱服之此除腹中諸穢并作解穢符水法還得清淨此是掌訣解穢法也

凡遊行人間有所犯穢者皆亦如之

凡欲行禁者皆須先捻鬼目若與男禁捻左手目若與女禁即捻右手目一云男子行禁捻左手目女人行禁捻右手目並逐四時王相正向向月建正心定意閉氣三捻目左營目順天道即成禁法用之神效左營目者開左目閉右目右營目者開右目閉左目

凡禁訖須解禁法

假令禁虎須存作師子捻虎目若欲解之還存作虎

一云男畨捻右手虎目女畨捻左手虎目若欲禁狗存作虎捻狗目若欲解之還存作狗以此爲例觸類長之皆須倣此

大指第一節是生人蛇虎頭若有惡人侵犯己身罵詈不止者緩即捻之急即閉氣押之左營目惡人即怒止也若不止則押喉向官府門亦如之一百步外預作之乃入官官見不瞋欲禁虎蛇亦依此法即虎蛇避人入草畏見人也

大指第二節是生人蛇虎喉若惡人罵詈不止與人争者閉氣捻之急即押之左營目令彼吃訥不能言也

第二指第一節是蛇虎目治蛇虎瘡閉氣捻之己身及他人同若見蛇虎便捻之急即嗔怒而押之

第二指第二節是鬼目欲見鬼去鬼擊鬼皆捻之急則閉氣押之左營目九氣則鬼神立至矣呼即去吸即來治病捻之

第二指第三節是生人目欲藏身翳已與人鬭爭及在深山曠野
皆須捻之以伏衆人之言急則閉氣押之左營目人不見己也
第三指頭甲下是蜂蠍及百鳥飛蟲之目若人被蜂蠍螫捻之七
左營目五氣則觧之若不差押蠍目及人天二道并捻掌心即差
第三指第一節是地獄治鬼目若欲禁諸神不令來左閉目向王
閉氣五十息捻之急即左營目押之
第二指第二節下是天獄目欲禁鬼攝鬼刼鬼殺鬼皆向王閉氣
捻之急則押之左營目若為鬼魅所著或悪夢魘押之
第三指第三節是鼠目一名天地獄治鬼目若住鬼定鬼住神皆
向王閉氣五十息捻之左營目
第四指次甲下是蚊子蚤虱蟲之目欲除之閉氣捻之
第四指第二節是都監目一名神都目都監者監領一切諸神都
管一切諸鬼欲召鬼神問其意向王閉氣五十息捻之左營目
鬼神立至矣
第四指第三節是禁鬼目一名蛇胎欲行考鬼令鬼住鬼問鬼捻
之閉氣若入山澤畏逢蛇蟒當押蛇胎令不來見人及已逢亦
押之蛇口禁不得開
第五指頭是天心欲求天神向王閉氣押之神自來奉賽大住
第五指第一節是游師目
第五指第二節是天師目
第三節是三師目此皆是初學符禁法時向王閉氣捻之九十息
左營目啓請即有神驗
掌中一理是鬼道欲誅符破壙斷鬼魍魎悪氣伐神樹皆向月建
閉氣五十息押之左營目神驗
凡欲呪勑符皆須捻斷鬼道使鬼常敬之掌中一理一名鬼舍亦
名地軸亦名左都監鬼道目欲誅符破廟除社公社地或召諸

鬼神湏有請問及治病并欲解鬼皆押左都監鬼道目鬼神立
至若田野中浪宿押地軸令鬼賊及神皆不敢近人若入神屋
止宿恐怕不安押鬼舍即不魘夢
掌中一理斜文名食地食地上一文名天文下一文名人道若入
山澤畏逢虎狼向王閉氣押手虎口中即不來若已逢亦押之
令虎狼閉口不開
第四指第一節名左金堂若遠行求財押之萬倍
第三指第一節名玉堂欲求官覔職押之必遂意
第二指第一節亦名玉堂欲求官押之
論曰此掌訣直用閉氣左營目捻之無呪文也禁病則皆湏禹步
誦禁文捻而用之急則瞋而押之緩則捻之禁男用左手禁女用
右手禁手之用勿失左右也
凡禹步法移步左右脚前後不同

凡欲作法必先取三光氣又禹步然後作法驗矣三光者日月星
禹步者或三步七步九步不定若欲受三光氣者極晴明日向日
兩脚並立先所願事隨意多少小呪之然後取禹步三步也所欲
步時先舉頭看日光剩開口吸取日光明即閉口塞氣至三步始
得放氣也三步者從立處兩過移兩脚始成一步三步即是六過
移脚也向日光禹步時左脚先移右脚從後移若向月星三光禹步
時並右脚先移左脚在後也但步數不同耳若向星禹步時須滿
九步也九步者向日中三步更足六步耳三三步合九步也星者
即是北斗七星也星中最須懇懃所以須九步也於日月中或用
三步或所用七步也呪願及閉氣方法並如日中作也受三光氣
時日必須明亮好晴日也日是陽月與星是陰又左是陽右是陰
是故受日氣時左脚先移受月星氣時右脚先移也又向星禹步
作九步時既長久若一氣不得度是以三步作一閉氣則九步即

三過閉氣也呪願亦須三過願之又須識北斗下三台星男識兇
獄厄女識兇産厄問曰雖云兩過移兩脚成一步猶未可好其狀
云何釋曰先兩脚正並立先舉左脚進前往次舉右脚就左脚處
正齊並立此猶未一步次第二又先舉左脚進往次舉右脚就左
脚住方始成一步也如此六過雙移兩脚成三步此是步法也

禁鬼客忤氣第六

呪曰吾上太山府謁拜皇老君交吾却鬼語我神方上呼玉女收
攝不祥登天左契佩戴印章頭戴華蓋足躡魁剛左呼六甲右呼
六丁前皇神後越章神師誅罰不避豪強先斬小鬼後殺游光何
神敢住何鬼敢當一鬼不出斬付兇剛急急如律令一云吾上太山道逢東王父教吾殺鬼語我有神禁上帝王子捕收飛祥登天左契佩戴印章頭戴華蓋足躡天罡先殺小鬼後殺游光何神敢住何神敢當縛汝正身薦汝鑊湯三日一治五日一量門丞收縛竈君上章吾含天地之氣讀呪殺鬼之方唾天自裂唾地自缺唾山自崩唾水自竭唾癰自潰唾火自滅唾邪自走唾鬼自殺急急如律令

又吾為天師祭酒為天地所使身佩乾靈之兵百千萬億在吾前
後羅列左右何神敢住何鬼敢當正神當住邪鬼速去急急如律令
又六甲六乙邪鬼自出六丙六丁邪鬼入冥六戊六己邪鬼自止
六庚六辛邪鬼自分六壬六癸邪鬼自死急急如律令
又神師所唾嚴如雪霜唾殺百鬼不避豪強當從十指自出前出
封侯後出斬頭急急如律令七遍呪之先呪水噴病人然後呪之
欲殺鬼然後下刀不差更呪看之手十指頭毛出若呪病人時當
以單被籠病人頭更遣兩人捉被單兩頭以遮前病人洗手莫拭
合手胡跪然後呪之

禁溫疫時行第七

禁時氣溫疫病法一日十禁自防難為人施无限也
天封吾以德地封吾以道吾奉天威取地武吾遇石石爛按癥癥
散左達右貫骨達體追病所在何邪敢進進者斬死北斗七星

飲汝血叱叱滅手下急急如律令

禁時氣法亦禁水沐浴身體令淨法温疫惡鬼

九眞行道邪氣敢當元氣洞達百邪消亡伏羲女媧五疸地主流入四肢主作千病萬病亡氣虛寒皆以風邪鬼所爲急按急按滅絶手下急急如律令

出病家門禁法從病家門出去門三步嚙禁閉氣左轉而去然後呪之曰

一畫成湖再畫成海斬汝黃奴老古頭不得追吾天師祭酒之後急急如律令使以左手畫背後地因去勿反顧

禁疫鬼文

吾上知天文下知地理天地夫人教吾禁名能禁疫鬼汝從東來名曰狗入人身中倚於心口神師呪汝汝自走汝從南來名曰羊入人身中倚於肝腸神師呪汝汝自亡汝從西來名曰雞入人身中倚於皮神師呪汝汝自衰汝從北來名曰蛇入人身中倚於百脉神師呪汝汝自厄科斗七枚在吾目前口是天門不得枉開若唾東方甲乙木木折若唾南方丙丁火火滅若唾西方庚辛金金缺若唾北方壬癸水水竭若唾中央戊己土土裂六甲六乙疫鬼自出六丙六丁知鬼姓名六戊六己疫鬼自死六庚六辛知鬼東西六壬六癸疫鬼自死六亥六戌百鬼速出急急如律令

禁時氣温疫法

東方青温吾肝中之氣南方赤温吾心中之氣西方白温吾肺中之氣北方黑温吾腎中之氣中央黃温吾脾中之氣五方五温悉在吾身中不得動作即歸在實急急如律令

度惡出禁法

東方青帝甲乙君南方赤帝丙丁君西方白帝庚辛君北方黑帝壬癸君中央黃帝戊己君千乘萬騎護衛吾身前有萬石桃湯後有萬隊將軍主斬黃奴之鬼欲行我者吾祭酒父長甲母奇仲語

我吾萬厄之中不近我急急如律令一日十念度惡世也

禁時氣却疫法一日十念万惡不近人也

吾是天師祭酒當爲天師驅使頭戴日月北斗五星吾有乾靈之兵十萬人從吾左右前後吾有太上老君天地父母在吾身中左手持節右手持幢何鬼不役何神不走何邪不去何鬼敢住急急如律令

禁時氣溫疫法

吾頭戴朱雀足履玄武左挾青龍右挾白虎前有萬石鑊湯後有虎賁猛士天騶甲卒在吾前後黃奴之鬼去我萬里急急如律令

又禁溫疫法存青龍白虎朱雀玄武逐後禁之

咄汝黃奴老古知吾否吾初學道出於東方千城萬仞上紫宮靈鋼百鍊之劍利如鋒芒斬殺凶咎梟截不祥叱汝黃奴老古先出有禮後出斬你叱叱急急如律令

唾時行頭痛法

南越太公還故鄉壬申之唾自有方神師所唾上白太一皇天使者督察不祥威若山海唾若雪霜當吾者死值吾者亡魅精魍魎自受其殃急急如律令

勑水逐鬼法

習習詳詳使生水光直符使者住立水傍眞止補虛邪氣消亡吾左手捉鬼右手持鉞斧斬鬼死急急如律令

禁唾惡鬼法禁住亦得

吾從狼毒山中來飢食眞珠渴飲武都戎鹽一把冷水一盂口含五毒常與唾居但老君之唾唾殺飛鳥唾河則竭唾木則折唾左徹右唾表徹裏銅牙鐵齒嚼鬼兩耳速去千里不得留止急急如律令

禁病勑粉大法禁住亦得

粉在紙中爲神粉舉手以摩體百鬼走出精魅魍魎應聲散走出天皇老教我唾粉腹中跳跟五藏安穩録保三氣道保精神急急如律令

禁溫鬼法

天門亭長外都使欲得九卿縛鬼士非子法往左手持刀右手持斧斫黃奴溫病之鬼何不走去前出封侯後出斫頭急急如律令

禁瘧病第八

呪瘧鬼法

登高山望海水水中有一龍三頭九尾不食諸物惟食瘧鬼朝食三千暮食八百食之不足差使來索符藥入五藏瘧鬼須屛跡不伏去者縛送與河伯急急如律令（一云登高山望海水天公下捕瘧鬼咄汝不疾去吾家有貴客子名破頭如東山軀如東澤不食五穀但食百鬼朝食三千暮食八百一食未足摧促來索急急如律令）

禁瘧病法連年不差治之即愈

若治之須在淨處平地以手小指畫地作鬼字口中陰道病人生時年月日姓名以塼覆之勿令知之至三三七日不開永差如三七日內開其病還復發若治必須知發時逆前預治勿使患人知之大良若丈夫左手畫之女人右手畫之陰爲之勿使人知靜作大驗

禁瘧病法

唾瘧鬼翁字園（一作周）母字欲大兒羸長吴小兒如石大女䶊䶊炊小女魯子因王道將軍取瘧鬼不得留停速出速去不得停住急急如律令

禁瘧鬼法

南山一神字銅柱出門入戶口有語捉得瘧鬼大鑊煑

南山一神字長丘早起至門遶家遊捉得瘧鬼斬却頭

南山一神字辟邪銅作髑髏鐵頷車斧鑿作齒金剛作牙生吞瘧鬼三萬車北斗七星知汝姓字不得住家急急如律令

禁瘧鬼法

登高山望海水使蝗螂捕瘧鬼朝時來暮時死暮時來朝時死捕之不得與同罪急急如律令

禁瘧鬼法

將狗上山下使入海中有一蟲不食五穀只食瘧鬼朝食三千暮食八百一食不足下符更索速出速去可得無殃急急如律令

禁瘧病法

日正中時正南立取西北桃枝結項兩手脚灰遶三匝中心立刀曰頭上戴九天兩手把九弓兩脚履九江腹安四神皆出自然吾生食天育養四神上得精禁能轉人身蜈蚣蟒蛇止殺汝身并鬼子孫急急如律令

禁瘧鬼法

先取一平塼令病人在無人處不得見人大從月建向月破以磚磨地令平以手按塼四角使不動還以手發塼立在前可塼下書北斗傍置三台外畫孤虛直取旬孤虛其北斗中畫作小鬼患人姓名年幾置下在斗柄中呪曰

小鬼字某甲年若干你從台入斗瘧鬼斷後若患人時頭上先下若非患人時頭下先下若無逆順平下塼訖若患人日一發以手二七下打塼若隔日發三七下打塼三日一發以上四七下打塼訖取塼傍土擁塼即復左手取一把土散塼上而去慎勿反顧大驗

又以故筆畫六尺方中畫作北斗形皆以北斗相應其魁衝必令開門以身左行向斗魁閉氣並足俱前而立呪曰

小鬼吾令出天門入地户不得從我去住遂出建上之門急去不得反顧即差三七日不發與人治患還得此患必用此治欲令患人還發二七日內發之法

還取患人發以足蹴塼呪曰
小鬼爾從斗入台瘧疾還迴即發
勑禁瘧鬼法
書桃枝一尺欲發即用嚛病人面誦呪文二七遍繫著頭底天姓
張地姓皇星月字長日字紫光南山有地地中有蟲赤頭黄尾不
食五穀只食瘧鬼朝食三千暮食八百少一不足下符請索語你
速去即得無殃汝若不去縛送䰢剛急急如律令
禁瘡腫第九
呪曰先奄腫上閉右目左目營之三匝然後唾之三乘車四獄吏
載癰神棄都市登高山臨海水呂河伯捕癰鬼大腫如斗小腫如
粟吾唾一腫自腫屏跡唾汝二七毒自出急急如律令
禁唾癰法
禁唾一遍一度刀割一二三四七五六七皆陰向陽吾朝晨行女媧相逢教

我唾癰從甲至乙癰疽速出從乙至丁癰疽一不生從丁至癸癰疽
皆死青癰赤癰白癰黑癰黄癰血疽肉疽兄弟八人吾皆知汝姓
名徒忍割汝汝須急去急急如律令
禁癰腫法正面向東以手把刀按其邊令匝以墨點頭重重圍訖然後急唾之即愈
日出東方赤尔黄牽牛織女教我唾方若是癰癧若是痤
癧鉀碎若是癰癧鉀減若是腫癧鉀鑨不疼不痛速去速去急急
如律令又法取東壁土三九向井東置一九三呪曰赫赫洞洞
日出東方上有崑崙之山下有清冷之泉某甲患某處上有發癰
土入井中天公當爛石癰當散七星北斗光織女教我方唾汝急
出不得留藏急急如律令又嘘三七遍置土井中三九三禁三嘘之也
禁五毒法禁蛇亦得
吸東方青毒南方赤毒西方白毒北方黑毒中央黄毒天毒地毒
水毒火毒霧毒塵毒死生毒百毒之精知汝姓名天毒上昇地毒

下藏百毒止息五毒滅亡惡毒須出毒腦破毒腹出毒腸止不止不已拘汝牙折汝齒吸吸叱叱急急如律令

禁腫法（三七遍）

骨肉皮膚血氣空虛遠入江海急去無留大腫如山小腫如粟唾一腫千腫滅急急如律令（滅一作死）

禁腫法（七重右廻一氣朱書皆以右手封之 指七過周於五指右手持禁如法）

呪封山山沒封石石爛封湖湖決封火火滅上白東王公西王母教我神方白刃封汝大腫如山小腫如米封一腫萬腫死急急如律令先以手按之久令痛次以金刀按之四邊令散以氣七呵令熱然後急氣七吹令冷陰陽氣定然後却唾之

禁天下大腫法（別室中以木衣相背令人以繩繫定上 安一擲一禁一扑擲令沒以三七遍）

東方青帝攝青精之毒氣南方赤帝攝赤精之毒氣西方白帝攝白精之毒氣北方黑帝攝黑精之毒氣中央黃帝攝黃精之毒氣五方毒氣并及五精內吾腹中天下最尊者莫大於五帝夫天下最神者莫及於五精天下大惡者莫過於五毒吾含五帝五精五毒與禁共居其聲如雷禁如風霜經口即死逢禁即亡五昌禁東方木木折禁南方火火滅禁西方金金缺禁北方水水竭吾上禁飛鳥落下禁井泉枯竭吾禁一腫百腫滅五昌禁盤石開深淵契天架摧地柱折曉停光夜星滅冬變雨夏積雪冷腫熱腫速消滅急急如律令

禁水腫方

呪曰天陽在上人陽在中陰陽在地水從下流唾腫消化急急如律令

太白仙人禁腫法 先向王方三噓三吹以刀約之以手握之訖然後三噀之禁曰日出東方雷起西南蝦蟇白兔食月中心營月帶日無所不通大腫如山小腫如珠吾唾一腫百腫自除急急如律令

又法 一二三四五六七百腫皆疾出急急如律令

又法 日出東方如懸鼓似白虎吾能唾腫散唾毒爛急急如律令

又法東方青帝禁駕青毒南方赤帝禁駕赤毒西方白帝禁駕白毒北方黑帝禁駕黑毒中央黃帝禁駕黃毒吾有苦口唾十瘥九急急如律令

禁一切腫法

呪曰吾口如天雷唾山崩唾木折唾金缺唾水竭唾火滅唾鬼殺唾腫滅池中大魚化爲鼈雷起西南不聞其音大腫如山小腫如氣浮遊如米吾唾一腫百腫皆死急急如律令

又法呪曰生在木間那得來人間石鹽一撮清水一斗故來治腫南山石羊其角如芒左角觝腫右角決腫東海大鳥飛來食腫左翼掠腫右翼裂腫不疼不痛不壞不膿急急如律令

禁癰腫法

先叩齒三七遍急嘆左營目即唾呪曰雷起地中一聽其音月生東盛蟾蜍白兎食月中心榮衛不通結成癰大腫如山小腫如粟唾呪一腫百腫散死急急如律令

又法日出東方赫赫煌煌威威容容天門亭長來捕癰腫山多石海多龍天門亭長來捕摩得便斬殺莫聞羅一唾當心再唾都愈急急如律令

禁丁瘡法一云初得之時逆以禁即除愈當三七遍唾之訖

呪曰日出東方乍赤乍黃天上織女教我唾方丁公丁母元出南方丁公死丁母亡北斗真氣能治丁瘡吾口如天門不可枉張唾山崩唾石裂唾金缺唾火滅唾水竭急急如律令

禁丁瘡法

用水一椀置棗樹南令搏樹以刀子一枚安椀上刀向樹三指漫撮臨著刀刃上胡跪呪曰上啓伏奴將軍伏奴將軍能治丁瘡今是某年月日姓字某甲年若干患某處生丁瘡或是浮漚丁或是麻子丁或是雄丁或是雌丁或是羊角丁或是蛇眼丁或是爛丁

或是三十六丁或是驅失瘡或是水洗瘡或是刀鐮瘡〻頭著體
於人不量清淨七寸棗樹下之水洗之伏藏急〻如律令
禁丁瘡法先閉氣三遍叩齒三十六通閉氣禁之三七遍即差
東海大神三女郎療丁有神方以藥塗此瘡必使丁公死丁母亡
丁男丁女自受殃星滅即愈大吉良過時不去拔送北方急〻如
律令一云東海大神三女郎三刀細米簸去糠三稱行無灸丁瘡云〻

禁喉痺第十

吸喉痺父喉痺母喉痺婦喉痺孫天生汝時緣上百草露誰使汝
著人喉裏拘汝牙折汝齒破汝頭破汝脅神不得動不得留停北
斗知汝名吸〻急〻如律令

又法

吸日出陽〻吸爲喉痺腫毒所傷莫癰莫痛吸〻愈急〻如律令

禁牙齒法

用桃板長一尺二寸正面南向閉氣書曰某州某縣鄉里女某甲
年若干患口中左右若干齒痛三讀訖埋三路頭以石子蓋之勿
反顧南山有一蟲名赤松子不食五穀但食口中齒埋汝三路頭
塞汝用石子埋汝著樹東千年萬歲不得起急〻如律令

又禁牙齒法

用一枚杖長三握復取兩指團艾三炷灸杖頭上柱牙上呪曰
登高山望海水中有一蟲黃頭赤尾不食五穀專食牙齒吾欲治
之握兩指神灸三壯蟲死矣急〻如律令

禁哽法

南山大虎北山狐狸江中大獺海中鸕鷀某甲得哽共來吞除急
急如律令

又禁哽法

四海蕩〻滑如苔上五虎四獺三鸕鷀共來食哽速消除橫者即

入順若即出急急如律令

禁目痛法以呵之三七遍然後禁之

日出東方赤如紫陽兒子目痛父母心傷吾口一唾明見四方百藥千治不如吾湯若唾唾汝汝眼毒消亡急急如律令

禁目痛法

神師所唾自有方日出東方右陰左陽瞳子生肉瞻視無光吾能誅罰不避鑊湯唾目二遍還復故常大吉神師西岳靈方急急如律令

呪禁產運第十一

取蒜七瓣正月一日正面向東令婦人念之一遍夫亦誦一遍次第丈夫吞蒜一瓣吞麻子七枚便止丈夫正面向東行誦滿七遍不得見穢惡受持之法不用見尸喪見即無驗吾躡天剛遊九州聞汝產難故來求斬殺不祥衆喜投母子長生相見面不得久停留急急如律令

唾運鬼法丈夫從婦人口中受取婦人從男夫口中受取

天無梁地無柱五騎三龍使九虎押運鬼汝身長少許或在人心肝或在人心肺或在人心脊吾受東海王禁故來追捉汝急急如律令

禁運鬼法

先禹步三匝左手持刀右手持水努目急氣然後禁之噴之曰唾東方青運鬼字青姫年七十南方赤運鬼字赤姫年六十西方白運鬼字白姫年五十北方黑運鬼字黑姫年四十中央黃運鬼字黃姫年二十唾天皇地皇六律九章是公運子之鬼未嫁之女頭亂如雚腹脹如宮剋害忠良唾汝急出不得留藏汝若不去吾遣張丞伯捉汝縛送鑊湯急急如律令一云運子之鬼未嫁之女頭亂如雚腹脹如宮但行人間不見運女唾之還本主速出速出更不見汝張丞伯王問驅殺運鬼數萬千速斷因緣東唾无辛惡見運鬼來相呼南唾无擬惡見

運鬼來相逼唾三寸刀二寸刃先治反支却治運唾太山東門一把葦舉高十丈治運鬼初來如碎蜂不著餘處當眉聚一杯水唾運去須臾不去當自死急急如律令

禁產難方

先禁水一杯與服之乃禁曰天有陰陽地有五行星辰列布日月精明四時變化不失其常骨肉已成四體已強毛髮已就今是生時生遲何望河伯在門司命在庭日月已滿何不早生若男若女司命須汝促出無遲并持胞衣急急如律令

千金翼方卷第二十九

千金翼方卷第三十

禁經下

禁金瘡第十二

禁金瘡法

呪曰吾被百箭療無一瘡一人挽弓萬人驚張一箭破於千陣此禁亦是難當急急如律令

又法正月一日日未出時取四壁下土和酒井華水向東三拜云言受神禁願大神如是四方各禮訖口含酒水四方悉噀至日中還復如此七日之中鮮潔齋戒不得惡言出口禁金瘡即定法元閉氣噓三遍呵氣七遍唾之曰日出東方惠惠皇皇上告天公下告地皇地皇夫人教我禁瘡吾行步不良與刀相逢斷皮續皮斷肉續肉斷筋續筋斷骨續骨皮相著肉相當筋筋相連骨骨相承今會百藥不如神師一唾

止痛毋唾愈瘡北斗七星教我禁瘡南斗六星使瘡不疼不痛不
風不膿北斗三台轉星證來急急如律令

唾瘡法

日出東方育育陽陽上白天公下白地王叱王有女教我唾瘡皮
皮相養肉肉相當令瘡不疼不痛不風不膿連筋續骨肌生肉實
急急如律令用王氣唾瘡良便有驗神吉

禁血不止法三七遍

日出東方乍赤乍黄南斗主瘡北斗主血一唾斷血再唾愈瘡青
衣怒士却血千里急急如律令

禁瘡斷血法

某甲不良某甲不慎為刀箭木石所傷上告天公下告地皇地皇
夫人教我禁瘡一唾止血再唾合瘡兩皮相連兩骨相當新瘡莫
痛故瘡莫膿急急如律令

禁金瘡法

吾是天師之子為師之所使執天有綱執地有紀一百二十禁呪
吾以受之吾禁此瘡金血須止吾與天地同體令瘡合急〻如律令

唾百種瘡法

神師所唾口為雷門唾為霹靂雷公主陰霹靂主陽殘賊結氣唾
下消亡急〻如律令

禁唾惡瘡毒法

先閉氣三通神師受告大道最良呪曰
百藥之長不如吾之膏唾吾仰天唾殺飛鳥唾南山之木〻為之
折唾北山之石〻為之裂唾北方之水〻為之竭唾百蟲之毒〻
自消滅唾百瘡之毒生肌斷血連筋續骨肌生肉實扁鵲盧醫教
我禁方三唾何瘡不愈何毒不去天音神師今在汝處急〻如律令

禁水洗瘡法

先左營目二周開目視瘡中閉氣一息欲止然後禁之無弱無強爲其所傷清血無流濁血無往一青一黃一柔一剛皮皮相値脉脉相當南方止血北方止瘡東流海水寒熱如湯朝令淹露暮令復故醫王扁鵲藥術有神還喪車起死人不膿不痛知道爲眞知水爲神急急如律令

禁漆著人法

漆翼丹盈漆翼丹盈丹爲兄漆爲弟汝不漆杯以壬癸乃漆人肌膚刀來割汝斧來伐汝汝不疾去鹹鹽苦醋唾殺汝急急如律令

禁漆著人法 三七遍

一云燒故漆器當著漆急唾之赤非非漆賢丈夫著車移丙丁使者收攝之不得著人體不得著人皮急急如律令 一云安移移漆賢丈夫著車盤

以壬癸何由得著人皮膚保辛保辛收攝漆賢丈夫急急如律令

禁火爛瘡法

浮陽浮陽火燒東壁東壁窮爛上付河伯還付壬癸火精毒滅入地千里急急如律令

禁蠱毒第十三

呪蠱毒文

毒父龍盤推毒母龍盤脂毒孫無度毒子龍盤牙若是蛆蛛蜣蜋還汝本鄉蝦蟆蛇蜥還汝槽櫪今日甲乙蠱毒須出今日甲寅蠱毒不神今日丙丁蠱毒不行今日丙午還著本主雖然不死腰脊僂拒急急如律令

禁蠱毒法

取一赤雄雞滲色者左手持雞右手持刀來至病人戶前去屋溜三步便三聲門尉戶丞某甲病蠱當令速出急急如律令以雞頭柱病人口中三遍畢以苦酒二合刺雞冠上血內苦酒中便與病人服之愈

呪魘蠱及解法

天無梁地無柱魘蠱我者還著本主一更魘蠱不能行一午魘蠱不能語太山昂印昂逐殺魅先魅翁死魅母亡魘蠱大小驅將入鑊湯急急如律令

又呪曰食鬼將軍摩牙利齒不食餘味止食魅鬼魅鬼九千九萬户少一不足下符來取魅鬼速還本主不歸本主反縛送與急急如律令

又有將軍字屈丘牙形帶劒持㦸鋒出門入户遠地遊捉得魅鬼便斫頭又有一神字窮奇頭如破筐髮強相口如羅拔惡神祇不食五穀食魅皮朝食一千暮食九百一口不足使來便索急急如律令

禁五蠱 時氣悉用此

九眞斗光道氣并行大寒小熱當從内出最巨夷㝯除烈水火之先宅中凶殃大神丈人入其身形恍惚無常大道正教眞道常行邪氣急滅手下急急如律令

又法呪曰

東方青帝魘人鬼南方赤帝魘人鬼西方白帝魘人鬼北方黑帝魘人鬼中央黃帝魘人鬼魘公字阿強魘母字阿防有人魘我者還令著本鄉誦魘二七鬼走出誦魘三九魘鬼還向本主走若當不走吾語北斗急急如律令

禁遁注第十四

禁注法

吾從天南來至北食鹽三斛飲水萬千經江量海手捉丘山口含百毒心懷蚰蜒唾天頂轉唾地陷穿唾石碎裂唾火滅煙唾鬼即死唾水竭淵東方之注自名醫入人體中注心根神師呪注注滅門南方之注自名青入人體中注百脉神師呪注注即易西方之

注自名搖入人體中注脊腰神師呪注注即消北方之注自名雌入人體中注心脾神師呪注注即移中央之注自名雉入人體中注十指神師呪注注即死四方之注盡已亡惟我五藏永安強急急如律令

禁注出血法 三七遍急噀之

東方之注自名羊入人體中主腹腸神師呪注注即亡南方之注自名狗入人體中主心口神師呪注注即走西方之注自名雞入人體中主心膂神師呪注注即迷北方之注自名魚入人體中主六府神師呪注注即無中央之注自名雉入人體中主心裏神師呪注注自死

謹告病人身中諸注殃若在心腹及背腸或在四肢并中央

謹告四方諸關節急送血殃三焦關元下部膀胱若有若無不出者亡速去百年毒神符欲居汝處急急如律令

又法

注父張注母楊注兄靖注弟強注姊姫注妹姜知汝姓字得汝宮商何不遠去住何所望前出封侯後出斫頭前出與賞後出與杖汝今不去住何所望急急如律令

又禁注法

東方青帝食青色之注　南方赤氣食赤色之注

西方白帝食白色之注　北方黑帝食黑色之注

中央黃帝食黃色之注　五帝之神食十二注北斗七星食一百二十注或食土公注或食土母注或食土子注或食土婦注或食土孫注或食土孫婦注或食生人注或食死人注或食飛尸遁注大注消小注滅急急如律令

又禁注法 三七遍

東方青注　南方赤注　西方白注　北方黑注中央黃注

五方五注何不速去雷公霹靂欲居汝處吾唾山山崩唾石石裂唾火火滅唾水水竭吾唾五毒逐口消滅急急如律令

呪注文

吾是太山之子今爲太山所使口如天門不可枉張唾如毒藥氣如秋霜當吾者死值吾者亡五注之鬼速出速去不得留藏急急如律令此呪當晨朝日初出時遣病人淨洗手面向東方至心禮太山訖更以水洗手至心合掌正西立師當在東正當病人面向南立以此呪之七遍便愈若不愈者明晨更如是呪之不過三朝無不愈者

禁唾飛尸入腹急切痛法

請天上飛龍窮奇白虎眼如明星腹如建鼓齊功叩齒主食惡鬼入食飛尸出食殃魅人生於天呑氣受道身形之中兆汝所處形中五部各有所主肝爲青龍肺爲白虎心爲朱雀腎爲玄武脾爲中府主御四方上有眞人赤城童子下有咸池青腰玉女各守部界不得留住方名道人教來治汝頭則法天身法北斗手爲魁剛口爲金斧主授六甲直神輔汝何鬼不出何尸不走急急如律令

按摩卒中注忤魍魎法

配陰脉十三陽脉十五二十八脉隨手上下一脉一通知汝有苦男祥女祥客死不葬骸骨消散流離道傍驚恐馳走責人酒漿南山有一人名窮奇不食五穀但食鬼皮朝食鬼父暮食鬼母食正欲壯復索鬼子急急如律令

禁邪病第十五

凡鬼邪著人或啼或哭或嗔或笑或歌或詠稱先亡姓字令人癲狂有此狀者名曰鬼邪唯須伏鬼遣之乃差治之法正發時使兩人捻左手鬼門鬼市兩人捻右手如左手法鬼門

者掌中心是鬼市者腕後厭處是伸五指努手力則厭處是腕後者大指根兩筋中間是一捻之後不得蹔動動鬼出去不得伏鬼又不得太急若太急則捻人力盡力盡即手動手動即鬼出亦不得太緩若太緩復不能制鬼惟須以意消息令緩急得所復使兩人投欆子刺兩肩井中緩急如鬼門鬼市法以鬼伏為限若不伏稍稍急刺若鬼伏即稍輕刺之若病人是丈夫肥壯者則急刺之量人之強弱消息以意若欆尖利以布物裹之勿令人傷亦須誦呪必臣伏如狀貌中有似伏狀不復相罵下情求首叩頭求去遣一人捉呪師自問鬼之姓名住何州縣鄉里年幾貫屬伴侶幾人又問來意有所須為何事來一依病人口筆寫之若其臣伏叩頭求去不敢更住者且停刺肩井等依其所須備覓發遣之須食與食須金銀車馬即采畫人馬像金銀綵帛隨其形貌悉盡作之絹帛以白紙作金以梔子染之若是遠來之鬼須給過所若亦即給之即日早發遣或待後發遣亦得送鬼之時須挑符一板長七寸闊三指綜縱一條長七寸以朱書板上著年號月朔日子鬼之鄉里姓名年幾從人頭數告五道大神河伯將軍上件鬼其甲等在我家中作如此罪過捉獲正身所索之物並已具給發遣速出去不得久停不得久住急急如律令

炬火禁邪法 去百鬼 斷萬邪

勑粉火治邪亦可以按摩病人若欲斷邪鬼以勑粉火以一炬火著戶外令病人住外又師捉一拒火作禹步燒粉令病人越火入戶還牀以向者一炬送大門外道上去門百步棄之勿反顧師取一盆水著病人戶限內以大刀橫上亦可然燈置病人屋內令晝夜不滅至病差師捉火拒燎病人身上隨多少治病呪曰

粉良天火赫赫天火奕奕千邪萬惡見火者避急急如律令

呪水噴病人法

先取淨水一器呪三吸氣閉目存鬼神怒五氣擊之呪曰

持清持濁持正持水所為物無不消化怒石石裂怒木木折邪不干正危不入身大道流行攝録邪精神祇所怒玉石皆化何病不愈何災不斷速出速出急急如律令

呪水治百病法

先取淨水以器盛之十呪曰

太一之水祖且良舉水向口續神光大腸通膀胱蕩滌五藏入胞囊脾腎太倉耳目皆明百病除差邪精消亡急急如律令（噀之遍身然後服之）

禁惡獸虎狼第十六

夫草野山林行見惡蟲但閉右目以左目營之三匝鬼神見之伏而頭脅著地也

禁虎入山法

吾登行五嶽前置辟邪六駮後從麒麟師子揚聲哮吼野獸猛虎聞吾來聲伏地不語若不避吾檄蟲殺汝急急如律令

勑禁虎法

天一太一李耳伯陽教我行符厭伏虎狼垂頭塞耳伏匿道傍藏身縮氣疾走千里舅氏之子不得中傷急急如律令

禁蛇毒第十七

三月三日夜向北燒香閉氣誦滿三七遍呪曰

日出東方赫赫煌煌報你蛇蟲遠逃深藏你若不藏鸛鵲步剛食你蛇頭吞汝入腸大蛇死小蛇亡急急如律令

禁蛇法

押蛇頭呪曰寅加卯寅加卯三遍即愈若欲發蛇毒押蛇尾

到誦之卯加寅卯加寅蛇毒即發劇一注盤右相押左手自
餘皆同

又法

庚寅卯庚寅卯三遍即愈若欲令發云卯寅庚卯寅庚即發

又法

辰生巳辰生巳蛇毒即止三遍即愈欲令發者云巳生
辰巳生辰即發

禁蛇法

一名蛇二名蟾三名蝮居近野澤南山腹蛇公青蛇母黑蛇
公字麒麟蛇母字接肋犀牛角麝香牙鸛鵲野猪牙啄蛇
腹腹熟啄蛇頭頭爛蜈蚣頭鴆鳥羽飛走鳴喚何不急攝汝
毒還汝本鄉江南畔急急如律令

禁蛇斂毒法

暉暉堂堂日沒亭光姿擢之節唾蛇萬方蛇公字蚰蜒蛇母
字彌勒汝從江南來江北言汝何失準則汝當速斂毒若不
收毒吾有鴆鳥舌野猪牙蜈蚣頭何咤沙吾集要藥破汝速
出速出斂毒還家急急如律令

一法

器朱書此符左手把之閉氣唾禁捻目向王爲之吾一唾開
天門再唾諸黃泉天下有惡毒皆來歸吾前吾今捉你一唾
得千千急急如律令

山鵲蛇　山蚱　山青蛇　澤青蛇　馬蛇　蛟黑似蜥蜴

右六種螫人不死令人殘病呪曰

吾有一切之禁山海傾崩九種惡毒元出南廟令渡江北專
欲相傷吾受百神之禁惡毒元出南邊今來江北截路傷人
吾一禁在後你速攝毒受命千年急急如律令

白朔蛇　蒿脊蛇　赤蛇　黃蛇　水蛇　青蛇

右六種嚙人不傷直禁即差

子蛇　尺八蛇　土蟡蛇　沙蝨　毒到蛇　白蜴蛇
罔蛇　蟒蛇
右八種蛇人著者須藥治呪曰
道邊一木百尺無枝鳳凰嘴如絲速去速去吾不知急急如
律令

禁蠍蜂第十八

禁蝢法（捻蛇目閉氣向王爲之）
蠕蝢神祇八節九枝兄字大節弟字蠍兒公字腐屋草母字
爤蒿枝但自攝斂汝毒不出去何爲急急如律令

呪蠍法
蹀蹀移移八節九枝公字腐草母字蒿枝緣他籬落螫他婦
兒何不收毒欲住何爲山雞戴勝食汝四肢頭破尾折伏地
莫移急急如律令（一云山雞頭戴勝角拉爾腰斷不得動尾二云）

又曰蠍蟲毒止速收你尾河伯將軍鐵鉗銅指押你腰斷不
得動尾急急如律令

禁毒蠍螫人法
先二日齋戒正朝一日日未出時淨澡浴洗手北堂東頭下
誦之三七遍呪曰
天有八節地有九枝一非草木二非蒿枝上他牀上傷他婦
兒速去速去戴勝來追不痛不疼不腫不膿急急如律令

禁蜂毒（捻蜂目左營目閉氣向王爲之）
東方青毒還東方　南方赤毒還南方　西方白毒還西方
北方黑毒還北方　中央黃毒還中央
黃蜂颺颺黑蜂奕奕王有小女嫁與河伯吾有銅掌鐵指押
汝便死汝是小蟲何不速去毒陰吾曰大鳥數翅三千八萬
里不得張口汝應是死急急如律令

禁蜂毒法

（捻蜂目左營目向王閉氣爲之）

兄弟三人走出野大兄名蝮南山上下中兄名蛇走田野小弟名蜂看屋梁堅如瓦熱如火二七唾毒當墮急急如律令

禁惡蚝螫人毒法

蛆似蜂著山蓑蚝似蝎著山腹老蚝蚑緣木枝兄弟五人吾都知攝汝五毒莫令移汝不攝毒滅汝族急急如律令

禁惡蚝文

（一云狐尿刺傷人腫當急閉氣治唾之即愈一七不愈二七遍）

日出東方乍赤乍黄瓜熟離蔓椹熟離桑東家嚙人狗西家好婦娘呪此小蟲雄狐毒死雌狐毒亡急急如律令

禁狗鼠第十九

呪曰 日出東方何堂堂狗不名狗名大黄皇帝遣汝時令嚙猴與鼠不令汝嚙人傷若嚙人傷白虎吞入汝腸急急如律令（一云不令汝嚙人傷爛汝齒腐汝牙自不去虎嚼汝云云）

禁狗毒法

犬牙狗齒天父李子教我唾汝毒出乃止皇帝之神食汝腦髓白虎之精食汝之形唾汝二七狗毒便出急急如律令（以氣噓呵之捻狗目左營目向王爲之）

禁狗令不咬人法

（捻狗目向王閉氣七息七禁之令不咬人）

吾口如天門不可枉張舌如拔劍唾如秋霜北斗照耀列宿天蒼畢集聲氣正其發陽牽牛持形織女侍傍此之小狗呪之滅亡天狗地狗何反不走欲傷我者牙折口啞急急如律令（一法下文不同令不取）

又法

取西廂屋簷下土擣末絹羅之和大苦酒漬作團如雞子於瘡上摩之呪曰

東方木爲折 南方火爲滅 西方金爲缺 北方水爲竭 中央土爲絶 吾太上府逢西王母教我禁毒語我神方東

句枝西句枝庶民往狗咬我天公兒急出急出汝若不出莫使我怒吾能唾山崩唾石裂唾火滅唾海竭速出速出急急如律令如此三呪壁泥中見隨狗毛色有驗

又取竈中黃土與水和作泥丸如雞子大摩瘡上隨犬毛色毒隨而出擘破泥丸明視之瘡痛則又以一盆水瀉屋上以器盛取以洗瘡餘水破落地則和爲泥封瘡上擘中必見犬毛色瘡不疾痛也

禁狗文

呪曰汝是小犬惡獸之餘爲物有幸得與人居汝命如泥土精空虛吾以西方白虎咬汝頭汝毒急收急急如律令

凡向人家先以脚踏門右呪曰

主人某甲家門丞戶尉籬落諸神主人有狗黃白不分師來莫驚師去莫瞋急急如律令

禁狗不吠人法

黃狗子養你遣防賊捕鼠你何以嚙他東家童男西家童女吾請黃帝竈君震宮社土付與南山黃斑北山黑虎左脚踏汝頭右脚踏汝肚向暮必來咬殺食汝狼在汝前虎在汝後三家井底黃土塞汝口五县禁你四脚蹉不得走右擲不得左擲搊草吾來上牀汝亦莫驚吾出十里汝亦莫起急急如律令

禁鼠令出法

桃枝一枚茅草索一條呪曰

天皇地皇卯酉相當天皇教我壓鼠羣侶聚集一處地皇教我壓鼠羣侶聚集一處速出速出莫畏猫犬莫畏呪咀汝是猫之䳲又非猛獸之侶東無明南無明西無明北無明教我壓鼠失魂精群陽相將南一作西目失明呼喚盡集在於中庭急急如律令作此法時於室中淨掃地冗前遍掃之桃枝以

茅草索結杖中腹以三箇穴立呼之矣

初越集鼠法

初越時以香湯浴身灑室中及庭前地訖用三盆三家漿粉以刀子横着盆上以灰匝之以筆一管去盆三尺着地所有穴前皆安灰廣一尺上作子字一云穴上紫字乃呪曰

北斗三台招揺所録天李自形必歸所屬寄食附人穿穴我屋胡爲楊時飯食欲熟急勑鼠王召集眷屬大鼠小鼠并須來食側立單行洗盪心垢伏罪勿走汝父小奚汝母幽方汝兄阿特汝弟阿當汝妹僕姜室家相將歸化坐傍固告勑汝莫以舊爲常急急如律令

又去鼠法

鼠必栗兠牛必栗兠蛾蛾必栗兠犯犯必栗兠母名必栗兠三喚神來赴

欲辟之法悉在華上勿得東西

解放鼠法

日東向曠二里西向曠二里辟方八里此廣闊耐停止雞零星牽至廳雞零祿牽至獄汝等此中行勿得與人相牽觸當斷汝手足急急如律令

禁鼠耗并食蠶法

呪曰天生萬蟲鼠最不良食人五穀啖人蠶桑腹白背黑毛短尾長跳高三尺自稱土公之王今差黃頭奴子三百箇猫兒五千頭舍上穴中之鼠此之妖精呪之立死隨禁破滅伏地不起急急如律令

越百怪法

乾坤定位陰陽化成門丞戶尉侍從交并二十八宿黑白赤青千殃萬怪急収汝形吾知汝姓吾知汝名急須屏跡不得

久停違即斬殺萬不得生急急如律令
又呪曰日出東方赤如紫陽百怪妄起損害忠良吾口呪之
辟除凶殃怪鬧我呪速去他方禍去福來萬惡潛藏急急如
律令

護身禁法第二十

呪曰諾諾罡罡左帶三星右帶三牢天翻地覆九道皆塞使
汝失心從此迷惑以東爲西以南爲北人追我者終不可得
明星北斗却閉千里六甲反張不避禍殃乘車追我折其轅
軸乘馬追我掩其兩目步行追我腫其兩足揚兵追我刀反
自伏明星北斗却敵萬里追我者亡覓我者死牽牛織女化
爲江海急急如律令

又法 太一神人曰凡欲遠行避難若爲惡人迫逐危厄之中出門
禹步三呪乃去可以消災追我者迷惑五道旋轉到還惡人
欲來侵己者逆而却之呪曰
東方青毒南方赤毒西方白毒北方黑毒中央黃毒五毒之
氣令有某甲無道欲來侵吾被太一神符歷行四海乘風駕
雲使有限會某甲懷惡逆之心殘賊忠良不肯休止五毒之
氣并力收攝付與地官莫令某甲復懷惡心賊害之意應時
了命言切千二百等急急如律令

若逢怨家惡人法 先却三步捻生人喉又以左足大指躡地呪曰
北斗神君來滅惡人斬截冤家某甲頭送上天門急急如太
上老君魁剛律令

又法 惡人欲來侵害者先閉氣三噓竊呪勿令人聞呪曰

頭戴朱雀足履玄武左佩青龍右佩白虎吾來到處百惡悉走吾有天丁力士椎殺惡鬼遠迸千里急急如律令

自防身禁咒法

咄某甲左青龍蓋章甲寅右白虎監兵甲申頭上朱雀陵光甲午足下玄武執明甲子脾爲貴子中央甲辰甲戌急急如律令

右此一法凡是學人常以旦夕闇誦令熟莫使聲出若有縣官口舌軍陣危險厄難之處四方興功起土殃禍之氣或入他邦未習水土及時行疫癘但以晨夜數數存念誦之勿忘若弔喪問病臨尸凶禍之家入門一步誦一遍出門三步誦一遍皆先叩齒三通并捻鬼目

又法

凡行山澤晨夜恐怖之處使人鬼惡總不相忤呪曰

人皆濁我獨清人皆去我獨停人皆極我獨丁人皆枯我獨榮人皆破我獨成天長地久我與并依文昌遊六星登太玄星紫庭飲甘露食陽精佩日月體安寧乘三鳳駕羽英堅藏擇九天仙公以趍刑急急如律令

被人所禁解之法

先捻生人喉呪曰

煒煒煌煌天有九柱地有九梁北斗七星爲我除殃青龍在前白虎在後青龍飲汝血白虎咬汝喉頭破腦裂汝死不擇日急急如律令

被人禁却解之法

噴之行頭及天公亦是吾師坐頭及天公亦是吾師眠卧及天公亦是吾師却看天師欲作禁吾解千禁萬惡若有禁吾反自著急急如律令

禁令家和法

南無伽帝伽帝膩伽帝收溜避南無阿乾陀羅呵彌陀羅灌陀沙婆呵

右此法能令家内有不孝子不順婦女皆孝順用法取一把土呪三七遍置家大門下又呪一把置中門下又呪一把置堂門下又呪一把撒在井中又呪一把置竈額上如是七日内外自然和順但使行禁人精心呪之

又凡人行處不安穩疑有恐怖之事即以氣噀之便以拒禁呪之曰急令辟惡鬼除制不祥衆邪消盡魍魎逃亡神符宣流以知天惡當我者死值我者亡急急如律令

又法

唾三十六鬼大鬼打頭破作七分如阿梨樹枝沙呵

凡行經神廟及斷虎狼呪

吾爲天地祭酒當爲天地頭戴日月身佩北斗急急如律令

禁惡人鬼火法

呪曰吾是元皇之孫太上之子口含聖真神氣付與東西百鬼隨吾驅使吾東向一唾九木折南向一唾八火滅西向一唾金剛鈌北向一唾流水絶道氣流布隨吾所説急急如律令

禁賊盗第二十一

夫欲出行先畫地爲壇　房中六尺　庭中六尺　野外六十步

置十二辰位身居甲地自呼名某乙今欲出往某處征討時神保佑於我吉昌三言乾大呼青龍下呪曰六甲九章天圓地方四時五行青赤白黃太一爲師日月爲先禹前開道蚩尤辟兵青龍俠舉白虎承衞熒惑先引辟除不祥北斗誅罰除凶去殃五神導我周遊八方當我者死向我者亡欲惡我者先受其殃吾受北斗之孫今日出行乘青龍出天

門入地戸遊㑒ㄣ覆華蓋去寇賊矛楯刀戟戟弩見我摧伏
莫敢當御急急如律令

禁賊法

唾此惡賊欲來狂圖其甲者或從東方青帝來或從南方赤帝來或從西方白帝來或從北方黒帝來或從中央黄帝來欲來傷害人者令其作事莫成拔刀自刺拔箭自射吾於四道開通盜賊伏匿五兵摧折蜂蛇莫動大尾辟側百步莫令相傷吾禁五方惡賊伏吾手下不得浪行急急如律令

呪童子令説鬼姓字第二十二

太上老君禁神三呼三吸以取其真

東方青帝木中精　南方赤帝朱雀形

西方白帝白虎神　北方黒帝乘舡行

中央黄帝黄龍聲

吾有其禁知天神蓋不自發身歸誠日南施禁火精日北施禁五帝動經吾三禁莫敢不來神道神名鬼道鬼字蠱道蠱名魅道魅字偷道偷名賊道賊字高山騰蛇下山騰蛇高山之崎下山之峻或在天上或在人間河伯將軍五道脩羅十二神將登明君天魁君傳送君小吉君勝光君太一君天罡君大衝君功曹君大吉君速送速送汝名不得久停急急如律令

畾（天仇）九九山（使靈符）國三（法錄）玉䰢鬼（一本如此）

右前件取清水半升以刀子攪之誦此呪三七遍與小兒飲之朱書前件籙於小兒髆（作膝）下少時召鬼並來小兒自見一一問之即道所作病所作鬼抄取姓名發遣如治癩法與過所遣之如上説也

度符啓請神言曰

先上香呪筆曰　以筆指口鳴六鼓
謹請東方青帝老君來下纏吾筆
謹請南方赤帝老君來下纏吾筆
謹請西方白帝老君來下纏吾筆
謹請北方黑帝老君來下纏吾筆
謹請中央黃帝老君來下纏吾筆指天天傾指地地寧指鬼
鬼死指人人生急急一如太上老君律令
請五方水度符言曰
謹請東方青龍真氣入吾水中
謹請南方赤龍真氣入吾水中
謹請西方白龍真氣入吾水中
謹請北方黑龍真氣入吾水中
謹請中央黃龍真氣入吾水中

謹請五方五龍真氣入吾水中吾水非常之水煑桃作湯吾刀非常之刀七星俠傍吾口非常之口内含魁罡水在江中名曰江水水在井中名曰井水水在井中名曰井水水在吾椀中名曰清淨神水水在吾口中名曰太上老君解穢之水吾水噀山山崩噀地地裂噀人人生噀鬼鬼滅急急如律令

灑水言噓係天師陽平等二十四化真氣臣某弟子自稱道號某嶽真人某先生以今月今日今時奉爲某家弟子度某符隨符言之　神符度呪曰

日出東方光曜表裏行符勅水出於老子老子行符從五嶽所使東九夷從符行南八蠻從符起西六戎捉鬼軍北五狄破鬼營中三秦從符所攝急急收錄一鬼不去斬付北嶽天有三皇地有五嶽某所行符自有法則非當吾真當符者死值符者亡一鬼不去斬付魁剛急急如律令

又曰符主東方木折　南方火滅　西方金缺　北方水竭
中央土裂　符主天清地裂人生鬼滅急急如律令
噀水三口　度神符主符啓請
謹請虛無直符直事三十六人從吾符行
謹請太清直符直事今歲直符直事今月今日今時直符直事各三十六人從吾符行保其家弟子三災度脫急急如律令
噀水三口又曰天圓地方六律六章神符燒香災厄消亡符到奉行急急如律令

禁經上下兩卷二十二篇其間辭語鄙野蓋出俗傳思邈切於救人且錄其文不加刪潤令其有云庶成一家之書

千金翼方卷第三十

文政十二年重彫元大德刊本

校正千金翼方後序

夫疾病之至急者有三一曰傷寒二曰中風三曰瘡癰是三種者療之不早或治不對病皆死不旋踵孫氏撰千金方其中風瘡癰可謂精至而傷寒一門皆以湯散膏丸類聚成篇疑未得其詳矣又著千金翼三十卷辨論方法見於千金者十五六惟傷寒謂大醫湯藥雖行百無一效乃專取仲景之論以太陽方證比類相附三陰三陽宜忌霍亂發汗吐下後陰易勞復病爲十六篇分上下兩卷亦一時之新意此於千金爲輔翼之深者也從而著之論曰傷寒熱病自古有之名賢濬哲多所防禦至於仲景特有神功尋思旨趣莫測其致有以見孫氏尊而神之之心也是二書者表裏相明至纖至悉無不該備世又傳千金髓者觀其文意殊非孫氏所作乃好事者爲之耳王道集外臺祕要方各載所出亦未之見似

出於唐之末伐博雅者勿謂其一家書也至於合藥生熟之
宜炮炙之制分兩升斗之齊並載千金凡例中此不著云爾

大德丁未良月
梅溪書院刻梓

50.00